

114 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2308

類科名稱：醫事檢驗師

科目名稱：臨床血液學與血庫學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 遺傳性球狀紅血球增多症 (hereditary spherocytosis, HS) 是因為紅血球某些膜蛋白出問題。目前用以篩檢 HS 的 eosin-5-maleimide binding method，主要是針對下列何者做量化評估？
 - A. α -spectrin
 - B. β -spectrin
 - C. Ankyrin-1
 - D. Band 3
2. 當發生血管內溶血性貧血時，下列何種現象最先出現？
 - A. Serum haptoglobin 上升
 - B. Hemosiderinuria
 - C. Serum bilirubin 下降
 - D. Hemoglobinuria
3. 有關再生不良性貧血 (aplastic anemia) 病人的周邊血液，下列敘述何者錯誤？
 - A. Normochromic, normocytic RBC
 - B. Reticulocytosis
 - C. Absolute neutrophil count 下降
 - D. Thrombocytopenia
4. 有關慢性病引起之貧血的檢驗結果，下列何者錯誤？
 - A. Serum iron 降低
 - B. Serum ferritin 降低
 - C. % transferrin saturation 降低
 - D. TIBC (total iron-binding capacity) 降低
5. 有關各種 hemoglobin 的敘述，下列何者錯誤？
 - A. ζ , γ , δ 與 β -globin 的基因位於第 11 號染色體
 - B. Hb F 是 $\alpha_2\gamma_2$

C. Hb A₂ 是 $\alpha_2\delta_2$

D. 正常情形下，人類出生後， β -globin 的量增加，而 γ -globin 的量減少

6. 關於人體的鐵質吸收，下列敘述何者正確？

A. 健康人的血清鐵，主要來自腸道吸收日常食物中所含的鐵

B. 飲食中鐵吸收主要透過迴腸部位的 enterocytes

C. 飲食中的無機鐵質以 ferrous (Fe^{2+}) 態進入腸道細胞

D. 無機鐵質進入腸細胞的通道 DMT-1，在缺鐵情況下鐵質調節蛋白 (IRP-1) 可結合至 *DMT-1* mRNA 5'-非轉譯區促進 DMT-1 的表現

7. 下列何者不是 microcytic hypochromic anemia？

A. Iron deficiency anemia

B. Thalassemia major

C. Sideroblastic anemia

D. Anemia of chronic renal disease

8. 關於 sideroblastic anemia 之敘述，下列何者正確？

A. 骨髓 iron stain 顯示有 15% 以上的 erythroblasts 是 ring sideroblasts

B. Hereditary sideroblastic anemia 比骨髓生成不良症候群 RARS 亞型 (MDS-RARS) 常見

C. Ring sideroblast 是因 heme 生成異常，鐵質堆積於溶小體

D. 是 normocytic normochromic anemia

9. 有關 Cooley's anemia 之敘述，下列何者錯誤？

A. α -globin 鏈含量過多

B. β -globin 鏈沉積在紅血球內

C. Globin 基因出現突變為常見

D. 需定時輸血

10. 惡性貧血之致病機轉與下列何者最無關？

A. 胃壁細胞抗體 (anti-parietal cell antibody)

B. 內因子抗體 (anti-intrinsic factor antibody)

C. 缺乏 cobalamin

D. 骨髓無法吸收葉酸

11. 下列何種物質是由紅血球 hexose monophosphate shunt 代謝途徑產生？

A. NADH

B.NADPH

C.ATP

D.2,3-DPG

12.下列何種病人在接觸氧化劑壓力（oxidant stress）時，最容易引起急性溶血性貧血？

A.Aplastic anemia

B.Pernicious anemia

C.Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency

D.Hereditary spherocytosis

13.Deoxyuridine suppression test 可用來檢測下列何種貧血？

A.再生不良性貧血

B.Vitamin B₁₂缺乏引起的貧血

C.缺鐵性貧血

D.溶血性貧血

14.有關 macrocytic anemia 的檢驗數據，下列何者錯誤？

A.骨髓中的細胞密度多是下降的（hypocellular）

B.Reticulocyte count 下降

C.有些 neutrophils 會有 hypersegmented nuclei

D.血清中的 lactate dehydrogenase 通常上升

15.在鹼性（pH 8.6）的 cellulose acetate 電泳系統中，血色素的帶電情形為下列何者？

A.正電荷

B.負電荷

C.不帶電

D.部分帶正電荷，部分負電荷

16.下列何種蛋白質參與紅血球細胞膜骨架（membrane skeleton）之橫向連結（horizontal interaction）？

A.Glycophorin A

B. α -spectrin

C.Band 3 protein

D.Glycophorin B

17.鐵質沉積症（hemochromatosis）病患的檢驗結果，下列何者最常見？

A.Normal serum iron

B.Increased transferrin saturation

C.Decreased ferritin

D.Decreased liver iron index

18.下列關於 Hb H disease 的敘述，何者正確？

A.MCV 約為 80~95 fL

B.可藉超活染色 (supravital stain) 見到高爾夫球狀的紅血球

C.必須利用檸檬酸鹽瓊脂電泳 (citrate agar electrophoresis) 才能區分出來

D.不是溶血性貧血的一種

19.正常成人之 MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) 應為多少%？

A.25~30

B.31~35

C.36~45

D.46~50

20.造血生長因子 (hematopoietic growth factors) G-CSF 及 EPO 屬於下列那一類的激素？

A.Phosphoprotein

B.Lipoprotein

C.Phospholipid

D.Glycoprotein

21.關於造血幹細胞 (hematopoietic stem cell) 的細胞表面標記 (cell-surface marker)，下列何者正確？

A.Lin⁻/CD34⁺/CD90⁺/CD38⁻

B.Lin⁺/CD34⁻/CD90⁻/CD38⁺

C.Lin⁻/CD34⁺/CD90⁻/CD38⁺

D.Lin⁺/CD34⁻/CD90⁺/CD38⁻

22.有關骨髓生成不良症候群 (MDS) 患者的骨髓及周邊血液檢驗特徵，下列敘述何者最不適當？

A.Bone marrow hypercellularity

B.Bone marrow blasts >20%

C.Increased myeloid precursor cells

D.Myeloid dysplasia

23.有關 IgG、IgA 與 IgM 的敘述，下列何者錯誤？


A.分子量以 IgM 最高

B.正常情況下，血中以 IgG 含量最高

C.IgA 通常可以穿越胎盤

D.IgA 可以存在於體液，如胃腸道分泌物中

24.藉由如下圖所示的細胞型態和 peroxidase (PO) 特殊染色，則初步診斷最可能是下列何者？




A.Acute myeloid leukemia

B.Acute lymphoblastic leukemia

C.Chronic myeloid leukemia

D.Chronic lymphocytic leukemia

25.病人有出血傾向，周邊血液抹片如圖示。箭號標示為下列何者？



A.裸核

- B.嗜鹼性球
- C.巨大血小板
- D.淋巴球

26. 下列何者最可能是 AML (acute myeloid leukemia) 的免疫標記檢測結果？

- A. CD13⁻/CD33⁻/CD34⁺/CD19⁺
- B. CD13⁺/CD33⁺/CD19⁻/CD117⁺
- C. CD3⁺/CD19⁺/CD117⁻/TdT⁺
- D. CD13⁻/CD34⁺/CD117⁻/TdT⁺

27. 下列那一種疾病最不可能出現 leukoerythroblastic reaction？

- A. Severe aplastic anemia
- B. Severe hemolytic anemia
- C. Primary myelofibrosis
- D. Severe megaloblastic anemia

28. 下列那個基因的突變在 AML (acute myeloid leukemia) 中最不常見？

- A. *FLT3*
- B. *NPM1*
- C. *EZH2*
- D. *DNMT3A*

29. 脾臟有很多重要的功能，其中之一是“pitting”。下列有關“pitting”的功能，何者敘述最適當？

- A. 去除異常或老化的紅血球
- B. 去除紅血球中異常的 inclusion bodies
- C. 移除血漿中的異常顆粒，如 carbon particles
- D. 儲藏紅血球、血小板與白血球

30. 下列那種疾病與 Epstein-Barr virus (EBV) 之關聯性最低？

- A. Adult T cell leukemia/lymphoma
- B. Burkitt lymphoma
- C. Nasopharyngeal carcinoma
- D. Hodgkin lymphoma

31. 下列何者最適合用於鑑別慢性骨髓性白血病 (CML) 與 leukemoid reaction？

- A. Leukocyte alkaline phosphatase (LAP) stain

B.Immature granulocyte (IG) %

C.Myeloperoxidase (MPO) stain

D.Acid phosphatase (ACP) stain

32.Nitroblue tetrazolium (NBT) test 最主要是用來測試下列那一種功能？

A.Opsonization of complement

B.Phagocytosis of neutrophils

C.Antibody production of B cells

D.Cytotoxicity of T cells

33.下列何種腫瘤不屬於 B-cell neoplasms？

A.Chronic lymphocytic leukemia

B.Small lymphocytic lymphoma

C.Sézary syndrome

D.Hairy cell leukemia

34.當懷疑臨床病人是 multiple myeloma 時，其骨髓抹片可檢測下列何種表面標記作確認？

A.CD56

B.CD138

C.CD64

D.CD117

35.關於 polycythemia vera 的檢驗數據，下列何者最不常見？

A.血液中 platelet count 升高

B.血清中 erythropoietin 升高

C.周邊血中白血球數目升高

D.腫瘤細胞常見 *JAK2* mutation

36.圖中箭號所指細胞為何？



A. Metamyelocyte

B. Blast

C. Monocyte

D. Reactive lymphocyte

37. 當病人發生 reactive neutrophilia 時，可能見到下列那些臨床檢驗特徵？①circulating neutrophils $> 7.5 \times 10^9/L$ ②Döhle bodies ③hypersegmented neutrophils ④白血球分類 " shift to the left " ⑤toxic granulation ⑥Pelger-Huët anomaly


A. ①②③

B. ①⑤⑥

C. ①②④⑤

D. ②③⑤⑥

38. 下圖最可能是下列何種血液腫瘤病人的周邊血液抹片？





- A. Acute myeloid leukemia
- B. Acute lymphoblastic leukemia
- C. Chronic myeloid leukemia
- D. Chronic lymphoid leukemia

39. 有關 ALL (acute lymphoblastic leukemia) 預後指標之敘述，下列何者正確？

- A. 男孩及小於 1 歲的嬰幼兒，預後較好
- B. 發病時沒有出現中樞神經症狀者，預後較好
- C. 出現 Ph+者，預後較好
- D. 在小兒病人中，T-ALL 較 B-ALL 的預後好

40. 圖示的有核細胞各為何？



- A. ①Neutrophil，②Eosinophil
- B. ①Eosinophil，②Monocyte
- C. ①Lymphocyte，②Neutrophil
- D. ①Monocyte，②Basophil

41. 下列關於嗜中性球減少症 (neutropenia) 的敘述，何者錯誤？

- A. 血液中嗜中性球的絕對量可能少於 $0.2 \times 10^9/L$
- B. 可能與 neutrophil elastase 基因突變有關

C.可能會出現在病毒性肝炎感染患者

D.可能會出現在 leukemoid reaction 患者

42.下列何種細胞化學染色的組合最適合區分 acute myelomonocytic leukemia (M4) 與 acute monocytic leukemia (M5) ?

A.Non-specific esterase/chloroacetate esterase

B.Alkaline phosphatase/acid phosphatase

C.Periodic acid Schiff/myeloperoxidase

D.Sudan black B/myeloperoxidase

43.病人之 PT 為 25 秒，mean of normal PT (MNPT) 為 12.5 秒，試劑之 ISI=2，則 INR 為何？

A.0.5

B.1

C.2

D.4

44.若血漿中含有 coagulation inhibitor，則一小時混合反應之 mixing APTT 檢驗結果 (mixing APTT, 1 hr)，下列判讀何者正確？

A.Not corrected

B.Corrected

C.Within normal range

D.Shorter than normal range

45.有關肝素抗性 (heparin resistance) 之現象，下列敘述何者最適當？

A.肝素被血小板第四因子 (PF-4) 吸附

B.利用低劑量肝素才可達到 APTT 標的範圍 (target level)

C.病人 antithrombin 濃度太高而誘發

D.病人出現自體免疫抗體

46.下列凝血相關因子，何者在正常人血漿內的濃度最高？

A.Prothrombin

B.Factor X

C.Protein S

D.Factor VIII

47.有關肝素所引發的血小板低下 (heparin-induced thrombocytopenia, HIT)，下列敘述何者最適當？

- A. 血栓生成是 HIT 常見且風險性較高的臨床症狀
- B. 可用 warfarin 替代肝素來治療病人
- C. 使用低分子量肝素（low-molecular weight heparin）治療時仍須嚴密監控，主要是因其引起 HIT 的發生率與傳統肝素（unfractionated heparin）相似
- D. 主要是由於血小板所釋出的 PF3 與肝素形成具抗原性的複合體而誘發抗血小板抗體所導致

48. 有關 Bethesda assay 的敘述，下列何者最適當？

- A. 用於定量檢測血漿中之 anti-factor VIII antibodies 或 inhibitor
- B. 在 Nijmegen 修正方法（Nijmegen modification）中，是以 pH 7.4 的 imidazole 緩衝液與病人血漿進行 1：1 混合
- C. 一個 Bethesda 單位（BU）是指可以完全中和一個單位（U）的 factor VIII 活性的抗體量
- D. 檢測步驟是須將病人之檢體與試劑混合後於室溫反應兩個小時

49. 有關巨核細胞（MK）之細胞骨架與血小板生成過程之間的相關性，下列敘述何者最適當？

- A. MK 中胞器的分布主要是由波形蛋白（vimentin）負責調控
- B. Spectrin-actin 是形成和維持 MK 中 DMS（demarcation system）所不可或缺的細胞骨架
- C. F-actin 藉由解開 DMS（demarcation system）的纏繞而拉長 proplatelet，為成熟血小板的裂解做準備
- D. 一個 MK 可產生 10000～50000 顆血小板

50. 下列何者為血小板最主要的能量來源？

- A. 葡萄糖
- B. 半乳糖
- C. 乳酸
- D. 肝醣

51. 從三群人檢測血中血小板生成素（thrombopoietin, TPO）濃度：正常對照組、再生不良性貧血（aplastic anemia）及原發性血小板過多症（essential thrombocythemia）。結果如圖所示，各組排列最可能是下列何者？




- A. ①正常對照組，②再生不良性貧血，③原發性血小板過多症

B. ①正常對照組，②原發性血小板過多症，③再生不良性貧血

C. ①原發性血小板過多症，②正常對照組，③再生不良性貧血

D. ①原發性血小板過多症，②再生不良性貧血，③正常對照組

52. 初級止血作用如圖所示。(A) 血小板在受傷後露出之 sub-endothelium 滾動，(B) 滾動後接著附著，(C) 最後血小板進行凝集作用。在 (A) 步驟中的血小板受器與其對應 sub-endothelium 之配體 (ligand) 各分別為何？



A. Glycoprotein Ib/IX/V 及 von Willebrand factor

B. Glycoprotein IIb/IIIa 及 fibrinogen

C. Glycoprotein IIb/IIIa 及 collagen

D. Glycoprotein Ib/IX/V 及 collagen

53. 有關 thrombotic thrombocytopenic purpura 之敘述，何者錯誤？

A. 致病機轉：體內有抗 von Willebrand factor (VWF) 抗體，導致 ultra-large VWF 不足

B. 臨床表現為微小血管溶血性貧血 (microangiopathic hemolytic anemia)

C. 血液抹片可以觀察到許多 schistocyte

D. Direct Coombs' test 陰性

54. 下列何種出血疾病是因血小板細胞膜之磷脂質活化過程發生異常所致？

A. Scott syndrome

B. May-Hegglin anomaly

C. Wiskott-Aldrich syndrome

D. Bernard-Soulier syndrome

55. 下列何者為維生素 K 依賴型凝血相關因子，但不屬於 serine protease？

A. Factor VIII

B. Thrombin

C. Protein S

D. Factor X

56. 下列何者並非 thrombin 的生理功能？

- A. 活化 protein S
- B. 活化血小板
- C. 活化 factor XIII
- D. 活化 protein C


57. 有關血小板相關檢測的敘述，下列何者錯誤？

- A. 以流式細胞儀輔以抗體染色無法用來評估血小板的活化及分泌功能
- B. Bleeding time 與手術中出血情形之相關性不高
- C. 血小板被刺激後的光學分析可用來評估血小板凝集及分泌的功能
- D. PFA-100 結果會受血漿中的 VWF 濃度及功能影響

58. 檢體凝血檢驗 thrombin time 時間延長，下列何者為最不可能的情況？


- A. 來自 Warfarin 治療病人的檢體
- B. 檢體中 fibrinogen 濃度低下
- C. 檢體中含 fibrin degradation product
- D. 檢體中含 heparin

59. 圖示為血液凝固作用之 extrinsic tenase 複合物，圖中①為輔因子，②為酵素，則①與②分別為何種凝血因子？



- A. Tissue factor, FVII
- B. FVII, FVIII
- C. FVIII, FIX
- D. Thrombin, FIX

60. 圖 A 與圖 B 分別為病人血漿 VWF multimers 電泳分析及不同濃度 ristocetin 刺激血小板的凝集試驗曲線，則下列何者最可能為此病人的診斷結果？



A.Type 2B VWD

B.Type 1 VWD

C.Type 2A VWD

D.Type 3 VWD

61.關於以 ristocetin 誘導血小板凝集 (agglutination) 之檢驗，下列敘述何者正確？

A.使用之儀器為 platelet function analyzer (PFA) -100

B.Bernard-Soulier syndrome 的血小板凝集反應下降

C.與 VWF 血中濃度無關

D.與血小板膜上 GPIIb/IIIa 相關

62.下列那種凝血因子之活性比較不會受膽道堵塞性肝疾影響？

A.Prothrombin

B.Factor VII

C.VWF

D.Protein C

63.關於 ABO 血型系統的結構及其表現，下列敘述何者錯誤？

A.ABO 基因位在染色體 9q34.1~9q34.2

B.有 8 個外顯子 (exon)

C.外顯子 (exon) 6、7 占 77.5%的編碼子 (codon)

D.正向調控啟動子 (promoter) 所在位置為 -117~+31

64. 某位血型 A 型的病人，做 reverse typing 結果為 A₁ cells : 1+，B cells : 4+，下列敘述何者最不可能？

- A. 病人血清中 A transferase 酵素測試為弱陽性
- B. 病人每顆紅血球 A 抗原數目約為百萬之多
- C. 病人為 A₂ 亞型，產生 anti-A₁
- D. 唾液檢驗結果含有 A 及 H 物質

65. *H* (*FUT1*) 基因產物是將下列那一種醣類轉移到第二型前驅物質末端？

- A. 葡萄糖 (glucose)
- B. 岩藻醣 (fucose)
- C. 半乳糖 (galactose)
- D. 甘露醣 (mannose)

66. 有關 Lewis 血型的敘述，下列何者正確？

- A. *LE* 基因產物可將半乳糖轉移到第一型前驅物質
- B. *LE* 基因產物可製造 Le^c 抗原
- C. 紅血球本身並不製造 Lewis 抗原，是由血漿中吸附上去的
- D. *LE* 基因產物不可作用到第二型前驅物質

67. 有關抗人類球蛋白 (AHG) 試驗之目的與步驟，下列敘述何者正確？

- A. 試驗最主要的目的是偵測會產生血球凝集的 IgM 完全抗體
- B. 清洗紅血球的目的是要去除殘留在紅血球周圍的血清或血漿
- C. 加入特異性抗球蛋白抗體最主要是為了避免偽陽性反應
- D. 無法得知紅血球表面是否已吸附抗體

68. 依據臺灣捐血中心對減除白血球之紅血球濃厚液的標準，每袋紅血球 (250 c.c.) 內之白血球數目應低於多少？

- A. 5×10^6
- B. 2.5×10^6
- C. 5×10^5
- D. 2.5×10^5

69. 關於血型 B₃ 亞型受血者，下列敘述何者最適當？

- A. 其血清中 B transferase 酵素測試為陰性
- B. 其血球與 anti-B 及 anti-A,B 反應為混合凝集反應
- C. 其紅血球上 H 抗原極少

D.其唾液檢驗結果 B 物質含量極少

70. 下表血型抗體鑑定之結果最可能為何？

	Rh								MNS				Lutheran		p	Lewis		Kell		Duffy		Kidd					
Cell	D	C	E	c	e	f	V	c ^w	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	P ₁	Le ^a	Le ^b	K	k	Fy ^a	Fy ^b	JK ^a	JK ^b	IS	37°C	AHG	C
1.R ⁺ r-2	0	+	0	+	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	2+	
2.R1 ^w R1-1	+	+	0	0	+	0	0	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	0	0	2+	
3.R1R1-6	+	+	0	0	+	0	0	0	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	+	0	0	0	2+	
4.R2R2-8	+	0	+	+	0	0	0	0	+	+	+	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	0	+	0	0	0	3-
5.R ⁺ r-3	0	0	+	+	+	+	0	0	+	+	+	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	0	0	3-
6.rr-32	0	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0	0	+	+	0	0	0	+	+	+	+	0	0	0	0	3-
7.rr-10	0	0	0	+	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	0	3-
8.rr-12	0	0	0	+	+	+	0	0	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+	0	0	+	0	0	0	3-
9.R ₀ -4	+	0	0	+	+	+	0	0	+	0	0	+	0	+	0	+	0	0	+	0	0	0	+	0	0	0	3-
Cord cell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/				
Patient																								0	0	0	3-

A. Anti-C

B. Anti-C^w

C. Anti-Lu^a

D. Anti-Fy^b

71. 關於各類血液成分製品的保存敘述，下列何者錯誤？

A. 全血在 CPDA-1 保存液保存期限為 35 天

B. 以新鮮全血分離出來的血小板在 10°C 保存期限為 1 週

C. 白血球濃厚液保存於室溫中，並在 24 小時內快速使用完畢

D. 新鮮冷凍血漿在 -20°C 保存期限為 1 年

72. 有關減除白血球之紅血球濃厚液的製備與儲存，下列何者錯誤？

A. 倒轉離心法的白血球去除率約 70%~80%，不會有紅血球損失

B. 洗滌法的白血球去除率比倒轉離心法還要高

C. 過濾法的白血球去除率最佳，高於 95%

D. 開封後，再經過濾器所製作的減除白血球之紅血球濃厚液，只能儲存 24 小時

73. 下列何種抗體是臨床上有意義的溫型抗體，且此抗體不會與經無花果蛋白酶（ficin）處理過的紅血球反應？

A. Anti-D

B. Anti-Fy^a

C. Anti-M

D. Anti-Jk^a

74. 2 M urea 溶液通常用來篩檢下列何種血型的紅血球？

A. Le (a-b-)

B.Fy (a-b-)

C.Jk (a-b-)

D.Lu (a-b-)

75. 冷凍沉澱品可以用來治療下列那些疾病？①hemophilia A ②hemophilia B ③VWD ④afibrinogenemia

A. ①②④

B. ①③④

C. ①②③

D. ②③④

76. 臨床上最常見的輸血反應是：

A. 細菌感染

B. 急性溶血性輸血反應

C. 發熱性非溶血性輸血反應

D. 輸血後肝炎

77. 在紅血球凝集抑制試驗 (hemagglutination-inhibition test) 中，若最終加入的 A 細胞產生凝集反應，但 B 細胞未產生凝集，則該唾液中應表現何種抗原？

A. 僅表現 A 抗原

B. 僅表現 B 抗原

C. 表現 A 和 B 抗原

D. 不表現 A 和 B 抗原

78. 承上題，此患者的紅血球與 anti-A、anti-B 皆無凝集，但其血清與 A 細胞、O 細胞皆有 1 價凝集反應，則該患者的血型為下列何者？

A. 孟買 A 型

B. 孟買 B 型

C. 亞孟買 A 型

D. 亞孟買 B 型

79. 血色素的測量方法是將血色素 (hemoglobin) 轉成下列何者？

A. Cyanmethemoglobin

B. Oxyhemoglobin

C. Sulfhemoglobin

D. Carboxyhemoglobin

80. 有關流式細胞儀檢測細胞之光散射 (light scatter) 訊號，下列敘述何者正確？

- A. 正向散射 (forward scatter) 訊號反應細胞內容物複雜度
- B. 側向散射 (side scatter) 訊號反應細胞尺寸大小
- C. 成熟淋巴球比顆粒球之正向散射訊號強度高
- D. 嗜酸性球比單核球之側向散射訊號強度高