

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、
社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、
牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（二）（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 某 67 歲女性因長期氣喘反覆發作，最近因呼吸不暢就診，肺功能檢查 FEV1/FVC：48%。症見喘促動則加重，形瘦神疲，呼多吸少，氣不得續，咳痰無力，痰色白稀薄，易大汗淋漓，跗腫，肢冷，面青唇紫，舌苔淡白，脈微細。治以下列何方最適宜？
(A)生脈散 (B)金匱腎氣丸 (C)玉屏風散 (D)補中益氣湯
- 2 56 歲女性患者，多年廚房工作史合併支氣管擴張病史，使用支氣管擴張劑控制，近 1 個星期患者呼吸呈現喘咳氣湧，胸部脹痛，痰量多黏稠，色黃夾血，苔黃微膩，脈滑數。下列中醫辨證何者最適宜？
(A)痰濁阻肺 (B)表寒裏熱 (C)痰熱鬱肺 (D)肺氣鬱痹
- 3 承上題，下列治法何者最適宜？
(A)清瀉痰熱 (B)化痰降氣 (C)開鬱降氣平喘 (D)宣肺泄熱
- 4 45 歲女性患者，慢性阻塞性肺炎病史，主訴 2 週前開始咳嗽氣急，咳吐黃膿痰有腥味，胸滿痛，轉側加劇，發熱振寒有汗，診其苔黃膩，質紅，脈滑數，X 光片顯示肺膿瘍伴有積液，下列中醫治法何者最適宜？
(A)清肺解表 (B)托裏排膿 (C)清肺消癰 (D)排膿解毒
- 5 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)《千金》葦莖湯 (C)托裏消毒飲 (D)加味桔梗湯
- 6 89 歲林先生，心臟超音波檢查左心室 EF：48%，平常容易心悸胸悶，疲倦，四肢不溫，近一兩年較怕冷，眠稍差易做夢，診其舌淡苔白，脈沉細無力，下列何方最適宜？
(A)桃仁紅花煎 (B)桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (C)黃連阿膠湯 (D)炙甘草湯
- 7 70 歲男性患者，糖尿病 10 餘年，近數年開始規律服藥，血糖控制尚良好，來診時主訴為心悸、胸悶痛氣短，病程已 1 年，斷斷續續發作，每次痛約 1~2 分鐘，休息會慢慢緩解；每當吃太飽或爬樓梯時胸口特別容易覺得不舒服，天氣變冷時胸痛也更容易發作，視其舌苔白滑，切其脈沉遲，以下列何方治療最適宜？
(A)消渴方 (B)炙甘草湯 (C)白虎加參湯 (D)栝蒌薤白白酒湯
- 8 承上題，患者在服用前方之後，表示胸痛有改善，持續規律看診 3 個月後，今晨患者突然胸痛加劇，且服前方後胸口仍痛，沒有減緩，至今已 2 個多小時，痛連上背，平躺後喘甚，身體自覺寒冷，摸其四肢冰冷，切其脈沉緊，以下列何方先做緊急處置最適宜？
(A)栝蒌薤白半夏湯 (B)薤苳附子散 (C)養心湯 (D)烏頭赤石脂丸
- 9 有關歷代醫家對於「癭病」之敘述，下列何者錯誤？
(A)唐代《外台秘要》收載治療癭病的許多方藥含海藻或昆布，表明在晉、隋、唐時期，對含碘藥物療法已有相當的認識
(B)宋代陳無擇，首先指出絕對不要輕易對癭病的腫塊施用刀針，以免引起嚴重後果
(C)明代戴元禮，在病因發病方面，強調了情志因素：「原因憂患所致，故又曰癭氣，今之所謂癭囊者是也」
(D)清代《雜病源流犀燭·癭瘤》：「癭瘤者，氣血凝滯，年數深遠，漸長漸大之症；亦名癭氣，又名影袋」
- 10 72 歲廖先生因長期肺病併發右心衰竭。近因上呼吸道感染，惡寒，無汗，喘咳，痰多白沫，胸悶乾嘔，身體疼痛而沉重，甚則肢體浮腫，苔白，脈弦緊。治法以下列何者最適合？
(A)溫脾化飲 (B)溫補脾腎以化水飲 (C)溫肺化飲 (D)發表化飲
- 11 下列有關胃痛吐酸嘈雜之敘述，下列何者最不最適宜？
(A)泛吐酸水，伴心下煩，咽乾口苦，苔黃，脈弦數者，宜使用左金丸
(B)嘈雜而兼見面萎唇淡，心悸頭眩，舌淡紅，脈細者，宜使用歸脾湯
(C)若因飽餐後胃痛、噯腐吞酸，伴見嘔吐不消化之物，且吐後胃痛減緩，苔白厚膩，脈滑，為水濕停留中焦所致
(D)若更年期潮熱多時，胃部隱痛，口燥咽乾，大便乾硬，舌紅少津，脈細數，宜使用一貫煎合芍藥甘草湯

- 12 45 歲女性乳癌患者，手術後接受化療治療期間出現噁心嘔吐，嘔吐物為清水痰涎，脘悶納差，頭眩心悸，舌苔白膩，脈滑，治以下列何方最適宜？
(A)藿朴夏苓湯 (B)藿香正氣散
(C)理中丸 (D)小半夏湯合苓桂朮甘湯
- 13 50 歲男性鼻咽癌患者，接受化學合併放射線治療期間出現噁心嘔吐，伴隨口燥咽乾，似飢卻不欲食，體重減輕，舌紅少津，脈細數，治以下列何方最適宜？
(A)六味地黃丸 (B)麥門冬湯 (C)玉液湯 (D)增液湯
- 14 關於痢疾的論敘，下列何者錯誤？
(A)本病多因外感濕熱、疫毒之氣，內傷飲食生冷，損傷脾胃與腸腑而成，其發病多發於夏秋季節
(B)本病初起，證見腹痛，裏急後重，便下膿血黏液，舌苔黃膩，脈弦滑實，治宜清熱化濕解毒，兼以調氣行血導滯，可配合收澀止瀉之品
(C)若下痢鮮血黏稠，納差，口乾，心悸，舌光紅少津，脈細數，治以駐車丸加減
(D)若下痢稀薄，甚則滑脫不禁，納差，神倦，四肢不溫，腰痠怕冷，脈沉細弱，治以真人養臟湯
- 15 患者主訴這幾天吃飯後覺得肚子痛，晚上疼痛更明顯，位置偏在左上腹，有刺痛、刀割感，疼痛不會轉移到其他地方，壓上腹部疼痛加劇，下列治法何者最適宜？
(A)疏肝理氣，和胃止痛 (B)清熱化濕，緩急止痛
(C)健脾益胃，散寒止痛 (D)行氣活血，祛瘀止痛
- 16 55 歲女性，B 型肝炎患者，就診時發現神志尚可，腹大脹滿，脈絡怒張，脅腹刺痛，胸臂有血痣，手掌赤痕，唇色紫褐，大便秘，面黯，舌紫紅，脈細澀，血液中天門冬胺酸轉胺酶（AST）為 150 IU/L，丙胺酸轉胺酶（ALT）為 82 IU/L，胎兒蛋白（AFP）為 45609 ng/mL，鈉離子 139 mEq/L，shifting dullness（+）。治以下列何方最適宜？
(A)中滿分消丸 (B)調營飲 (C)膈下逐瘀湯 (D)實脾飲
- 17 某 36 歲女性患者，罹患慢性 C 型肝炎，因面目身黃來診，血液生化檢查顯示 AST：330 IU/L，ALT：562 IU/L，total bilirubin：7 mg/dL，direct bilirubin：4.5 mg/dL。近 3 個月黃疸不退，身目俱黃，黃色晦暗，或如煙薰，腹脹大便不實，口淡不渴，神疲畏寒，舌質淡，苔白膩，脈濡緩。下列治則何者最適宜？
(A)利濕化濁，佐以祛瘀 (B)健脾和胃，溫化寒濕
(C)利濕化濁，兼補腎氣 (D)清熱利濕，佐以瀉下
- 18 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)茵陳蒿湯 (B)茵陳五苓散 (C)甘露消毒丹 (D)茵陳朮附湯
- 19 57 歲女性慢性 C 型肝炎多年，出現腹大脹滿半年，按之如囊裹水，叩診：shifting dullness（+），脘腹痞脹，得熱稍緩，顏面浮腫，下肢水腫：2-3+，體格消瘦，精神困倦，溺少便溏，苔白膩，脈弦。AST：92 IU/L、ALT：56 IU/L、Albumin：2.7 g/dL、T-Bil：13.50 mg/dL、Hb：10.3 g/dL。下列證型何者最適宜？
(A)氣滯濕阻 (B)水濕困脾 (C)濕熱蘊結 (D)肝脾血瘀
- 20 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)茵陳蒿湯 (B)調營飲 (C)實脾飲 (D)中滿分消丸
- 21 下列有關尿濁的敘述何者錯誤？
(A)尿濁又分為白濁與赤濁，其中赤濁皆屬熱證
(B)尿濁指小便混濁，白如泔漿，而溲時無尿道疼痛為特徵的疾病
(C)常見的病因病機可能是：濕熱內蘊、脾虛氣陷、腎元虧虛
(D)治療原則：初起宜清熱利濕，病久則補益脾腎、固攝下元
- 22 癰閉之病位在膀胱，與下列何臟腑氣化功能最相關？
(A)三焦 (B)肝 (C)心 (D)胃
- 23 在《景岳全書·積聚》篇提到積聚為病，主要是由那三種病因導致？
(A)寤寐、飲食、勞逸 (B)飲食、勞逸、情志
(C)痰、濕、瘀 (D)飲食、血氣、風寒
- 24 胃炎，胃痛症狀的敘述中，下列何者多屬於虛證？
(A)痛而脹 (B)痛而拒按
(C)空腹疼痛 (D)用補法治療後疼痛加劇
- 25 一位男性不孕症患者來診，精液分析報告顯示，精子密度是 $10 \times 10^6/L$ ，60 分鐘的精子活動力是 20%，同時主訴小便清長、腰膝酸軟，舌質淡，舌苔薄白，脈沉細，治以下列何方最適宜？
(A)妙香散 (B)金匱腎氣丸 (C)知柏地黃丸 (D)獨活寄生湯

- 26 腰為腎之府，乃腎之精氣所溉之域。外感腰痛腰痠諸邪中，下列何種外邪最易痹著腰部？
(A)熱邪 (B)寒邪 (C)風邪 (D)濕邪
- 27 依張仲景之法，下列有關小便不利證治之敘述，何者錯誤？
(A)氣化不行者，用五苓散 (B)水熱互結者，用豬苓湯
(C)瘀血夾熱者，用甘遂半夏湯 (D)脾腎兩虛而夾濕，用茯苓戎鹽湯
- 28 75 歲劉先生就診時症見說話有氣無力，身倦乏力，抱怨常常有尿意感，但是想解尿時，又解得不順，下腹墜脹感，食慾不振，大便溏，舌質淡，脈偏弱，證型以下列何者最適當？
(A)肝氣鬱滯 (B)腎陽疲憊 (C)膀胱氣化不利 (D)脾氣不升
- 29 依《金匱要略·中風歷節病》文中所述：諸肢節疼痛，身體尪羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，下列何方主之？
(A)烏頭湯 (B)桂枝芍藥知母湯 (C)三痹湯 (D)蠲痹湯
- 30 關於痿證之敘述，下列何者錯誤？
(A)臨床辨證應分清虛實
(B)起病急、發展快，屬肺熱傷津，多屬實證
(C)起病晚、發展慢，屬脾胃肝腎虧虛，多屬虛證
(D)本病以上肢痿躄最為多見，嚴重者肌肉痿削，甚至癱瘓
- 31 在歷代醫書中，與冠心病診斷及治療有關的敘述與闡釋，下列何者最不適切？
(A)《靈樞·五味篇》謂：「心病宜食薤」，其中的「薤」，指的是現治療冠心病常用藥物中的薤白
(B)《金匱要略》云：「胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而遲，關上小緊數，栝蒌薤白白酒湯主之」，是敘述冠心病發作時的症狀及脈象
(C)《世醫得效方·心痛》提出：「蘇合香丸治卒暴心痛」，進一步豐富了冠心病的治療方法
(D)《金匱要略》敘述：「胸痹，胸中氣塞，短氣，茯苓杏仁甘草湯主之；橘枳薑湯亦主之」提出了冠心病重症發作時的治療方劑
- 32 24 歲女性患者，主訴經常下背痛及兩側交替的臀部疼痛，同時伴隨眼部發炎，皮膚上有乾癬，近日又有尿道炎及白帶多，患者多表現為腰骶部酸楚疼痛，僵硬不適，腰部、胸廓活動受限，晨起明顯，偶有出現下肢關節腫痛，有重滯感，腰骶冷痛，遇寒及陰天加重，肢體沉重僵麻，小便不利，惡風，神疲乏力，舌質淡胖，苔白膩，脈弦緊。診斷以下列何證型最適合？
(A)寒濕型 (B)濕熱型 (C)腎虛型 (D)氣虛血瘀型
- 33 貝塞氏症 (Behcet's disease) 與《金匱要略》之狐惑病很相似，下列敘述何者錯誤？
(A)症狀常見口腔和生殖器潰瘍
(B)常見於中國、土耳其、伊朗等地，又稱為絲綢之病
(C)《金匱要略》以甘草瀉心湯治療
(D)蝕於喉為狐，蝕於陰為惑
- 34 38 歲的李小姐，之前診斷有鼻咽癌併頸部淋巴結轉移，經 1 個多月的化學治療合併放射治療。治療完成後 3 個月，她面色蒼白、心悸、胸悶、自汗、稍動則喘，形寒肢冷，食慾不振但體重卻在這 3 個月增加了 5 公斤，並有皮膚乾燥，頭髮變細易脫落，便秘，神倦適臥，少動懶言，月經不規則、淡色經血淋漓不淨等症狀。診察其舌淡雙側紫暗，舌下絡脈怒張、脈沉細遲弱。治以下何組成最適宜？
(A)十全大補湯加艾葉炭 (B)附子理中湯加艾葉炭
(C)左歸丸加艾葉炭 (D)右歸丸加艾葉炭
- 35 72 歲胡先生，罹患糖尿病已十多年，服口服降血糖藥控制中。近 3 個月開始，血糖極不穩定，偶爾過高，偶爾過低，西藥調藥困難；因此想尋求中醫共同治療。目前他症狀為尿頻量多，混濁如膏，口乾唇燥，飲一澠一，面色黧黑，耳輪焦黑，腰膝痠軟，形寒畏冷，陽痿不舉，舌淡苔白，脈沉細無力。治以下列何方最適宜？
(A)六味地黃丸 (B)五子衍宗丸 (C)實脾飲 (D)金匱腎氣丸
- 36 43 歲劉小姐，由於疲累虛弱，肌無力，頭髮變細、掉髮，近來被診斷有 Addison's Disease。除前述症狀外，她還有頭痛、眩暈，耳鳴、眼睛乾澀畏光、視物不明、急躁易怒、肢體麻木，筋惕肉瞤，脇痛隱隱，口燥咽乾的症狀，面潮紅，舌紅，少苔，脈細數。治以下何方最適宜？
(A)大定風珠 (B)一貫煎 (C)加味逍遙散 (D)天麻鉤藤飲
- 37 35 歲陳小姐，近日因疲倦，體重上升，發現甲狀腺功能低下，容易頭暈、心慌、健忘，眠淺易醒，唇舌色淡，苔薄白，脈細。下列診斷何者最適宜？
(A)心氣虛 (B)心陰虛 (C)心血虛 (D)心陽虛
- 38 承上題，下列處方何者最適宜？
(A)保元湯 (B)生脈散 (C)定志丸 (D)養心湯

- 39 關於不寐的敘述，下列何者錯誤？
(A)虛證多屬陽氣虛衰，心失所養 (B)治療需在辨證論治的基礎上施以安神鎮靜
(C)實證多因心火亢盛或肝鬱化火 (D)應注重精神治療的作用
- 40 74 歲劉女士罹患失眠已多年，主訴近數月來睡眠品質不佳，時常多夢紛紜且易醒。伴隨有心悸，記憶變差，時時頭暈，疲倦乏力感等症狀。亦有食慾不佳，口淡無味的困擾，大便一日二行。望其面色少華，舌色淡白，脈細弱。治以下列何方最適當？
(A)歸脾湯 (B)黃連阿膠湯 (C)溫膽湯 (D)加味逍遙散
- 41 陳先生出血性中風後，發現語言蹇澀，舌頭短胖強硬，口角流涎，肢體麻木，皮膚感覺不佳，脈弦滑，苔黏膩，其中風後遺症屬下列何種證型？
(A)氣虛血瘀 (B)筋骨失養 (C)風痰阻絡 (D)腎精虧虛
- 42 患者月前突然肢體偏廢不能用，目前患肢痿軟無力，縱緩不收，肢體麻木浮腫。面色萎黃無華，口眼喎斜，口角流涎，語言蹇澀，舌苔薄白，舌質淡紫有瘀斑，脈象細澀無力。治以下列何方最適當？
(A)地黃飲子 (B)牽正散 (C)安宮牛黃丸 (D)補陽還五湯
- 43 王先生 51 歲患有大腸癌，在西醫三週一次施打 Avastin〈癌思婷〉治療已經半年了，到中醫門診時主訴近半年常有煩躁、睡不著、臉紅、流鼻血、血壓高、腹痛、口乾、長痘和口瘡的症狀，生化檢查及血液常規檢查皆為正常，下列診斷何者最適宜？
(A)氣血兩虛夾血瘀 (B)陰虛陽亢夾熱毒
(C)濕熱下注夾血瘀 (D)熱毒壅肺夾氣血虛
- 44 陳小姐 39 歲從得到乳癌後開始服用 tamoxifen〈泰莫西芬〉已經一年了，這一年來嚴重的潮熱、盜汗、目乾、失眠、情緒低落症狀嚴重，就診時另有眩暈的症狀，脈弦細，舌質紅，苔薄少。下列診斷何者最適宜？
(A)氣滯血瘀、痰濕壅盛 (B)肝鬱化火、肝陽上亢
(C)氣鬱化火、陰虛陽亢 (D)痰氣交阻、熱毒壅盛
- 45 49 歲陳先生罹患大腸癌，經過手術和放化療後出現排便不暢，反覆性發生雖有便意但難解出，大便量少而稍稀軟，便後短氣，疲乏，面色偏白，舌淡，苔白，脈弱。治以下列何方最適當？
(A)潤腸丸 (B)六磨湯 (C)黃耆湯 (D)麻子仁丸
- 46 痺證，若患者以肩肘等上肢關節為主者，則下列何藥物最適宜？
(A)獨活 (B)薑黃 (C)桑寄生 (D)巴戟天
- 47 下列有關「痺證」、「痿證」之鑑別，何者錯誤？
(A)痺證以肢體疼痛為臨床主症
(B)痿證以肢體無力為臨床主症
(C)痺證多虛，痿證多實
(D)《素問·痿論篇》：「腎氣熱則腰背不舉，骨枯而髓減發為骨痿。」
- 48 頸前腫塊光滑，柔軟往往是瘰癧的特徵之一。平時汗出多，急躁易怒，面部烘熱，口苦，眼突手顫，舌質偏紅，左關脈數。病機以下列何者最適合？
(A)氣鬱痰凝，痰氣壅結 (B)氣鬱痰凝，瘀血壅結
(C)痰氣壅結，鬱而化火 (D)痰氣壅結，火鬱陰傷
- 49 關於我國現存最早的產科專書，下列何者是該書正確的書名與作者？
(A)《達生篇》，作者：亟齋居士 (B)《十產論》，作者：楊子健
(C)《胎產經驗方》，作者：陸子正 (D)《經效產寶》，作者：咎殷
- 50 《景岳全書》小營煎與大營煎之比較，下列何者最宜？
(A)大營煎用於血虛型的月經後期；小營煎用於血寒型的月經後期
(B)兩方中相同的藥物有當歸、熟地、枸杞、炙甘草
(C)大營煎中以附子扶陽散寒；小營煎以白芍養血和營
(D)月經後期而小腹刺痛者適合大營煎；月經後期而小腹脹痛者適合小營煎
- 51 當患者因「月經量多」就醫，醫師開立龜板四兩、黃柏二兩、黃芩二兩、白芍二兩、椿根皮一兩半、香附一兩半為丸，調治 3 個月後收效，下列敘述何者錯誤？
(A)本方可以清熱、涼血 (B)黃芩、黃柏、椿根皮清熱止血固經
(C)證屬實熱時適用 (D)症狀常見經血不止、紫而夾塊
- 52 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》關於痛經之敘述，下列何者錯誤？
(A)經前腹脹痛，若脹過於痛，是氣滯其血也，宜用順經湯
(B)經前腹脹痛，若痛過於脹，是血凝礙氣也，宜用琥珀散
(C)經後腹痛，或去血過多，乃血虛也，宜用當歸建中湯
(D)胞中不虛，惟受風寒為病，宜用吳茱萸湯

- 53 一位 30 歲已婚婦女就診，自述生產後兩年之間，每逢月經，於經前 1 日即開始水瀉，持續至經淨方止，無腹中絞痛，但見水瀉時伴隨消化不完全之殘渣，同時經行期間四末冰冷，面目浮腫，疲勞倦怠。應選用下列何者最適宜？
(A)黨參、白朮、茯苓、薏苡仁、巴戟天、吳茱萸、肉豆蔻、五味子、補骨脂
(B)人參、白朮、茯苓、甘草、白扁豆、蓮子、山藥、薏苡仁、陽春砂仁
(C)人參、白朮、乾薑、炙甘草
(D)白朮、白芍、陳皮、防風
- 54 一女性病患平素少氣懶言、易自發汗，行經期間症發低熱、熱勢不暢，脈虛緩，下列何方最適宜？
(A)胡黃連、丹皮、當歸、生地、白芍、川芎、地骨皮
(B)黃耆、麻黃根、牡蠣
(C)當歸、白朮、白芍、黃耆、防風
(D)黃耆、白朮、肉豆蔻、五味子、補骨脂
- 55 楊小姐 25 歲，近半年工作壓力大，月經已 3 個月未至，併見煩躁易怒，胸脅脹滿，舌邊紫暗，脈沉弦諸症。治方最適宜以下列何項組成？①當歸、川芎、白芍、熟地、桃仁、紅花 ②陳皮、半夏、茯苓、白朮 ③柴胡、枳殼、甘草、牛膝、桔梗
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 56 53 歲女性，停經 2 年，突因陰道出血來診。當下首要排除之婦科疾病，下列何者正確？
(A)子宮內膜異位症 (B)子宮肌瘤 (C)子宮內膜癌 (D)子宮肌腺症
- 57 30 歲女性因多年不孕來診，患者體型瘦高，月經約 24 天一行，經量不多，平時容易腰痠，午後常覺身熱。舌紅苔少、脈細數。下列何方最適宜？
(A)《景岳全書》毓麟珠加紫河車、丹參、香附
(B)《傳青主女科》養精種玉湯加女貞子、旱蓮草
(C)《葉天士女科》蒼附導痰湯加當歸、川芎
(D)《傳青主女科》開鬱種玉湯加柴胡、梔子
- 58 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》陰挺之敘述，下列何項正確？①屬瘀者，必便秘腹痛拒按 ②屬熱者，必腫痛小便赤數 ③屬虛者，宜補中益氣湯加青皮、山梔
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 59 依歷代醫家所言，「血室」與下列何者關係較為密切？①子宮 ②衝脈 ③肝臟 ④帶脈
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 60 38 歲吳女，妊娠 6 週，噁心嘔吐，甚則食入即吐嘔吐清涎，不思飲食，神疲思睡，舌淡苔白潤，脈緩滑無力。最宜下列何方治療？
(A)《備急千金要方》溫膽湯 (B)《內外傷辨惑論》生脈散合《溫病條辨》增液湯
(C)《名醫方論》香砂六君子湯 (D)《溫熱經緯》蘇葉黃連湯
- 61 《全生指迷方》白朮散加鉤藤、石決明、白蒺藜、丹參，最適合治療下列何種證型之先兆子癇？
(A)陰虛火旺 (B)肝陽上亢 (C)痰熱上擾 (D)脾虛肝旺
- 62 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：產後腹痛，血虛者，宜下列何方治療？
(A)失笑散 (B)當歸建中湯 (C)吳茱萸湯 (D)香桂散
- 63 治療一婦女產後至今六日才排便一次，且大便燥結，腹滿脹痛，手足心熱，舌質紅，苔薄黃，脈細數。下列何項最適宜？
(A)大黃、人參、枳殼、火麻仁、玄參、麥冬、生地
(B)當歸、牛膝、肉苁蓉、澤瀉、升麻、枳殼
(C)當歸、厚朴、枳實、熟地、大黃
(D)當歸、白芍、肉苁蓉、火麻仁、熟地、柏子仁、川芎
- 64 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：產後寒熱，若發熱型態為時寒時熱者，最有可能的病機為何？
(A)敗血不散，飲食停滯 (B)去血過多，汗出遇風
(C)陰陽相乘，榮衛不調 (D)血氣虛損，陰陽不合
- 65 南宋初，整理彙集宋以前各種有關兒科學術成就，為當時世界上內容最完備的兒科學專書為下列何書？
(A)《小兒藥證直訣》 (B)《幼幼新書》
(C)《小兒衛生總微論方》 (D)《小兒病源方論》
- 66 關於小兒的病理特點，下列何者錯誤？
(A)易虛易實 (B)易寒易熱 (C)肝常不足 (D)傳變迅速

- 67 小兒感冒的臨床辨證論治上，下列何者最不適當？
(A)熱多於寒，若有寒象，亦以寒包熱鬱居多
(B)咽喉紅腫，舌苔薄白而潤，為風寒證
(C)年齡愈小的兒童，感冒易出現挾痰、挾滯、挾驚之兼證
(D)小兒感冒高熱引起的驚厥，主要發生於 6 歲以前
- 68 7 歲孩童因平素肺虛喜啖生冷，出現咳嗽，面色晄白，痰多清稀，鼻流清涕等症狀，依《醫宗金鑑·幼科心法要訣》，下列何方最適宜？
(A)本事黃耆湯 (B)加味瀉白散 (C)聖惠橘皮散 (D)蘇子降氣湯
- 69 關於積滯的敘述，下列何者最不適當？
(A)積滯與傷乳、傷食、疳證有密切關係 (B)本病虛證多見，虛中夾實或實證者極少
(C)小兒「脾常不足」常因乳食不化而成積滯 (D)乳食不當，易致停蓄不消，形成脾虛夾積之候
- 70 關於疳證的命名和分類，若按病情來區分，下列命名何者最不合宜？
(A)疳氣 (B)疳虛 (C)乾疳 (D)腎疳
- 71 下列有關急驚風的治療四大基本方法，何者選項最為適宜？①清熱 ②理氣 ③化痰 ④息風 ⑤豁痰 ⑥鎮驚 ⑦疏風 ⑧疏肝
(A)①③⑤⑧ (B)①②③⑦ (C)①④⑤⑥ (D)④⑤⑥⑧
- 72 依《醫宗金鑑·幼科心法要訣·雜證門》小兒龜胸因肺積痰熱所致，治宜下列何方？
(A)先用寬氣飲，再用百合丹 (B)先用扶元散，再用松蕊丹
(C)先用百合丹，再用松蕊丹 (D)先用菖蒲丸，再用八正散
- 73 關於小兒尿頻臨床上分為急性與慢性兩類之敘述，下列何者錯誤？
(A)急性尿頻常併尿道灼熱疼痛
(B)急性尿頻多小便混濁、淋瀝不盡，慢性尿頻多頻數短赤
(C)急性期常伴有發熱畏寒
(D)慢性頻尿多因體質素虧或治療不當引起
- 74 下列何者為《疫疹一得》清瘟敗毒飲的藥物組成？①銀花 ②連翹 ③黃芩 ④黃連 ⑤黃柏
(A)①②③ (B)②③④ (C)②④⑤ (D)①③⑤
- 75 臨床以陣發性痙攣性咳嗽，咳後有特殊的吸氣性吼聲，雞鳴樣回聲，為下列何種疾病？
(A)痰癰 (B)哮喘 (C)百日咳 (D)白喉
- 76 5 歲小兒，發燒 1 日，體溫 39℃，惡風惡寒，頭疼身痛無汗，依《醫宗金鑑·幼科心法要訣》，治以下列何方最適宜？
(A)十神湯 (B)雙解通聖湯 (C)白虎湯 (D)涼膈散
- 77 5 歲女孩主訴發熱，出疹，咳嗽 4 日，現發熱漸退，咳嗽減，疹點僅發於耳後、髮際及頸部，皮膚呈鱗狀脫屑，並色素沉著，納進，舌紅少津，以下列何處方治療最適宜？
(A)桑葉、菊花、羚羊角、鉤藤 (B)升麻、葛根、防風、連翹、桑葉
(C)金銀花、葛根、連翹、桑葉、菊花 (D)桑葉、麥冬、玉竹、扁豆、沙參
- 78 依《醫宗金鑑·幼科心法要訣》，臨床上痰飲喘急，症見停飲喘急，不能平臥，治宜瀉飲降逆，應以下列何方治療最適宜？
(A)蘇子降氣湯 (B)蘇葶丸 (C)蘇葶滾痰丸 (D)定喘湯
- 79 依《醫宗金鑑·幼科心法要訣》，下列何項屬於「五軟」的項目？①頭項軟 ②手軟 ③腰軟 ④肌肉軟 ⑤膝軟
(A)①②③ (B)①②④ (C)①④⑤ (D)③④⑤
- 80 依《醫宗金鑑·幼科心法要訣·汗證門》，表虛自汗用玉屏風散，若惡寒甚者陽氣虛，應以下列何方治療最適宜？
(A)黃耆桂枝五物湯加附子 (B)桂枝湯合四逆湯
(C)桂枝龍骨牡蠣湯 (D)桂枝湯加附子