

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 關於肺癰潰膿期，症見咳吐大量膿血，或如米粥，腥臭異常，胸中煩滿而痛，舌苔黃膩，質紅，脈滑數，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)加味桔梗湯 (C)清燥救肺湯 (D)參蛤散
- 2 關於肺癆病的敘述，下列何者錯誤？
(A)症見咳嗽、咳血、潮熱、盜汗 (B)是具有傳染性的肺部疾患
(C)臨床上以腎陰虧損為多見 (D)治療當以補虛培元和治癆殺蟲為原則
- 3 關於咳血的診治原則，下列何者錯誤？
(A)咳血虛證者，由內傷所致，以陽虛最為常見
(B)咳血實火者，當涼血止血
(C)治療過程中，在止血的同時，必須考慮到避免瘀血停留
(D)血止後應考慮寧絡、補血，並針對出血原因治療
- 4 50 歲劉女士長期咳嗽，就診時症見乾咳、咳聲短促、痰中夾血、口乾、午後潮熱、神疲、身形消瘦，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)桑杏湯 (C)清金化痰湯 (D)清燥救肺湯
- 5 關於《丹溪心法·喘論》論述氣喘的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)未發以扶正氣為主 (B)既發以攻邪氣為急 (C)當用厚滋味 (D)專主於痰
- 6 關於導致心悸的病因，下列敘述何者錯誤？
(A)久病體虛，或熱病傷陰，或房室過度，均可導致腎陰虧損，心火妄動，形成心悸
(B)飲食不節，嗜食膏粱厚味，煎炸炙燂，均可生痰蘊熱化火，痰火擾心而致心悸
(C)大怒傷肝，大恐傷腎，均可動憾心神而發驚悸
(D)藥物過量，例如使用阿斯匹靈 (Aspirin) 過量或失當，容易引起「脈結代，心動悸」一類證候
- 7 60 歲男性患者，高血壓病史 30 年，主訴為心悸眩暈已半年，近 1 個月漸漸加重，並有嘔噁，嘔吐泛涎，胸脘痞滿，納差，渴不欲飲等症狀，視其舌淡苔滑，切其脈沉細而滑，以下列何方治療最適宜？
(A)天麻鉤藤飲加珍珠母、龍骨、牡蠣 (B)炙甘草湯加炮附子、黃耆、柏子仁
(C)半夏天麻白朮湯加代赭石、竹茹、白蔻仁 (D)苓桂朮甘湯加半夏、生薑、陳皮
- 8 關於中醫心痛的辨證要點及順逆判斷，下列何者最不適宜？
(A)若見心胸疼痛持續不止，達數小時者，須警惕是真心痛
(B)不少真心痛患者，在發生厥脫之前，先有舌質越變越胖，舌苔越來越膩的變化
(C)若四肢逆冷過肘而青紫者，表明病已垂危
(D)若脈象變大或越變越數，表示正氣來復，病情開始好轉

- 9 36 歲王小姐，子宮肌瘤病史，經來量大導致貧血，月經來容易心悸，身倦，頭暈，納差，大便軟散，診其舌淡紅，苔薄白，脈細弱，下列何方最適宜？
(A)當歸補血湯 (B)歸脾湯 (C)天王補心丹 (D)知柏地黃丸
- 10 有關缺血性心臟病患者飲食宜忌，下列禁忌何者錯誤？
(A)膏粱厚味 (B)鹹食 (C)酒菸 (D)黑木耳
- 11 關於噎膈的論述，下列何者錯誤？
(A)本證的病位在於食道，屬胃氣所主，又與肝、脾、腎密切有關
(B)噎膈初起以標實為主，根據氣結、痰阻、血瘀的不同，分別進行治療，但均需加入溫陽健脾和胃之品
(C)反胃是指食入之後，停留胃中不化，朝食者則暮吐，暮食者則朝吐，與噎膈之食不得入或食入即吐不同
(D)噎膈初起，尚須與梅核氣鑑別，後者惟自覺咽中如物梗塞不適，但進食並無妨礙
- 12 80 歲方女士中風多年，近日來診時主訴，大便有時乾，有時軟，但皆排出困難，小便清長，腰背痠冷，面色白，四肢不溫，舌淡苔白，脈沉遲，治以下列何方最適當？
(A)增液湯 (B)竹葉石膏湯 (C)六磨湯 (D)濟川煎
- 13 43 歲鞏先生為公司主管，來診主訴脘痞悶似痛，食慾差，大便黏黏，總覺解不乾淨，口苦而黏膩，口渴，舌紅，苔黃膩，脈滑數，下列何證型最適當？
(A)肝鬱脾虛 (B)濕熱中阻 (C)濕困脾陽 (D)肝胃鬱熱
- 14 22 歲莊同學，暑假時至墾丁渡假，夜遊經淋雨後，開始自覺頭很重，好像綁著毛巾一樣，發熱頭痛，惡寒無汗，全身疲倦，感覺千斤重般，胸悶腹脹，食慾差，口中黏膩，舌苔白膩，脈滑，治以下列何方最適當？
(A)甘露消毒丹 (B)新加香薷飲 (C)羌活勝濕湯 (D)荊防敗毒散
- 15 65 歲李先生，近日突覺大便瀝青色，飢則胃隱隱作痛、得食則減，大便溏薄，嘔吐清水，納呆，神疲乏力，四肢欠溫。診其舌淡，脈軟弱。治以下列何方最適合？
(A)四逆散合烏貝散、蒲黃、五靈脂 (B)黃耆建中湯、海螵蛸、瓦楞子
(C)一貫煎合烏貝散、白芨、三七 (D)六君子湯、三七、白芨
- 16 50 歲患者，男性，前曾有 B 型肝炎病史，近數月常熬夜，近 1 週出現目黃、身黃、尿黃等症狀，合併納差、噁心、眠差、脅痛、排便不暢等症狀，就診可見舌紅苔黃膩，脈滑。下列敘述何者錯誤？
(A)衛教患者須注意定期追蹤肝臟功能與腹部超音波
(B)可能為 B 型肝炎發作，可比照脅痛或黃疸診治
(C)患者脅肋脹痛，證型為瘀血阻滯，處方以旋覆花湯
(D)須注意後續黃疸與神志變化，可能會出現急黃諸證
- 17 關於 B 型肝炎病程，下列敘述何者錯誤？
(A)慢性 B 型肝炎可經由垂直傳染或血液、體液傳染，例如針扎
(B)B 型肝炎病程大致上可分為三期：免疫容忍期、病毒廓清期、病毒殘留期
(C)病毒廓清期表現為反覆發生黃疸與肝炎，初起辨證多以陰黃為主
(D)均需建議患者固定追蹤肝功能指數與肝臟超音波
- 18 35 歲林先生，最近胃鏡檢查發現胃食道逆流，下列關於胃食道逆流的證治之論述，何者錯誤？
(A)屬虛熱證者，可用左金丸 (B)屬寒證者，可用香砂六君子湯加吳茱萸
(C)屬食積者，用保和丸 (D)烏賊骨和煅瓦楞子等制酸劑，可隨證加入

- 19 陳先生主訴最近 3 日白睛發黃、面色發黃、發熱口渴、右脅下疼痛、食慾減退、大便秘，而面談時意志清楚，脈滑數、苔黃厚、舌紅，醫院檢查為膽結石阻塞膽管造成，治以下列何方最適當？
(A)柴胡疏肝散 (B)茵陳五苓散 (C)茵陳蒿湯 (D)茵陳朮附湯
- 20 45 歲男性肝硬化患者，由肝膽腸胃科要求會診，症見脘腹堅滿、脅腹刺痛，腹部脈絡怒張、面頸胸背有血痣，唇色紫褐，面色晦暗黧黑，舌紫紅兼有紫斑。下列有關證治之敘述，何者錯誤？
(A)有出血傾向者，加地鱉蟲、水蛭活血止血
(B)水脹滿過甚，脈弦數有力，體質尚可者，可暫用舟車丸以攻逐水氣
(C)大便色黑者，加三七、側柏葉化瘀止血
(D)癥積明顯者，以鱉甲煎丸軟堅散結
- 21 78 歲吳先生，罹患慢性腎炎，因全身浮腫就診，症見小便 1 日約剩 200CC，氣急不續，四肢冰冷，面色慘白，口中有尿味而鹹，舌苔黑，脈沉細欲絕，治以下列何法最適宜？
(A)滋腎益腎 (B)溫陽健脾，行氣化濁
(C)急溫命門之陽 (D)健脾滲濕，溫化痰飲
- 22 關於歷代醫家對遺精的敘述，下列何者錯誤？
(A)《證治要訣》：用心過度，心不攝腎，以致失精
(B)《類證治裁》：有夢為腎病，無夢為心病
(C)《景岳全書》：有值勞倦即遺者，此筋力有不勝，肝脾之氣弱也
(D)《丹溪心法》：精滑專主濕熱，黃柏、知母降火；牡蠣粉、蛤粉燥濕
- 23 30 歲男性，因性功能障礙前來求診，主訴勃起功能障礙，最近精神苦悶，常疑神疑鬼，失眠多夢，診其脈細，苔薄膩，舌質淡，下列何方最適宜？
(A)五子衍宗丸合贊育丹 (B)知柏地黃丸
(C)大補元煎加棗仁、遠志 (D)歸脾湯
- 24 15 歲男性，期中考時突發耳鳴，耳悶塞感，疲勞時症狀加重，休息後改善，就診時症見疲倦無力、頭暈及注意力不集中，納差，大便溏薄，舌淡紅，苔薄白，脈細弱。診斷為下列何種證型最適宜？
(A)肝膽火盛 (B)腎精虧虛 (C)風熱上擾 (D)清氣不升
- 25 關於各種尿路感染病症的治療，下列何者最不適宜？
(A)慢性期的腎陰虛型以銀翹石斛湯為主
(B)妊娠期的尿路感染陰虛津虧型以知柏地黃湯加味
(C)妊娠期的尿路感染下焦濕熱型以八正散為主
(D)慢性期的脾腎氣虛型以補中益氣湯加味
- 26 以三才封髓丹來治療遺精，下列何病機與證候最不適宜？
(A)君相火動，迫精妄泄 (B)心動則夢遺，煩躁眩暈
(C)食少噁心，口苦吐涎，心慌膽怯 (D)耳鳴易怒，口苦脇痛
- 27 50 歲許先生罹患慢性腎炎，出現小便不利和嘔吐不止之見症，常有咳嗽氣急，痰多，呼吸低微，需深呼吸，平時很怕冷，小便量少且不順，皮膚甲錯，脈沉細數，苔薄，舌淡，治以下列何方最適宜？
(A)生脈散 (B)甘草乾薑茯苓白朮湯 (C)止嗽散 (D)濟生腎氣丸

- 28 下列有關格治則之敘述，何者正確？
(A)關格之本為脾腎陽虛，故應使用大劑量峻補劑，才能救急
(B)降濁法用大黃，應讓大便出，以化濁邪，1日7~8次為佳
(C)半夏為化濁要藥，濁已重者，應製用以加強療效
(D)在脾腎陽虛階段，應以補為主，兼用化濁利水
- 29 40歲男性，嗜食肥甘厚味，適逢夏日飲水不足，右大趾紅腫痛三日，無外傷病史，西醫診斷為急性痛風發作，伴見發熱口渴，舌紅苔黃燥，脈滑數，治以下列何方最適宜？
(A)蠲痺湯 (B)白虎桂枝湯 (C)三痹湯 (D)薏苡仁湯
- 30 50歲女性，多處關節腫大，強直畸形，舌質暗，苔白膩，脈細澀，治以下列何方最適宜？
(A)荊防敗毒散 (B)身痛逐瘀湯 (C)疏經活血湯 (D)羌活勝濕湯
- 31 關節炎屬痺證之範疇，下列有關痺證之敘述，何者錯誤？
(A)歷節風屬痺證 (B)白虎風屬痛痺
(C)四彎風屬痺證之範疇 (D)濕痺亦名著痺
- 32 有關痺證與僵直性脊椎炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)金匱中風歷節病脈證并治中，以獨活寄生湯祛風除濕，溫陽散寒
(B)若患者之ESR偏高，代表處於發炎狀態
(C)醫林改錯痺證瘀血證，可用身痛逐瘀湯治療，擴充了痺證的方劑類型
(D)腎痺嚴重者，可以見到尻以代踵，脊以代頭
- 33 有關痺證辨證的敘述，下列何者錯誤？
(A)病程纏延日久，虛實夾雜，以邪實為主者也在所常見
(B)關節腫痛多為痰瘀交阻的病變
(C)痛處固定，拘引，疼痛劇烈，往往如刀割針扎，因寒而劇，得溫則痛減，苔白，脈緊者，為痰濕
(D)凡痺證日久，而治療上用一般常法止痛效果不顯時，都應考慮是否與痰瘀有關
- 34 關於「癭病」的病因病機：氣滯痰凝壅結頸前是癭病的基本病理，日久引起血脈瘀阻，以氣、痰、瘀三者合而為患；部分病例，由於痰氣鬱結化火，火熱耗傷陰精，而導致陰虛火旺的病理變化，其與下列何臟腑最相關？
(A)心、腎 (B)肝、腎 (C)肝、心 (D)胃、腎
- 35 43歲胡小姐，近來患有甲狀腺腫大，伴隨情緒易緊張、易激動、心煩、手細震顫、眼突、多汗、怕熱、食慾亢奮、消瘦乏力、心慌、運動後氣急的症狀；並有午後或夜間發熱，手足心熱，骨蒸潮熱，心煩，少寐、多夢、顴紅、口乾咽乾、便秘、尿少色黃，舌紅乾、少苔，脈細數。抽血其血中Free T4升高，TSH低下。以下列何方治療最適宜？
(A)酸棗仁湯 (B)丹梔逍遙散 (C)麻子仁丸 (D)知柏地黃丸
- 36 下列那一個消渴病的症狀表現最適合使用調胃承氣湯？
(A)心煩，渴而引飲，舌苔黃燥，脈洪大
(B)心煩口渴，咽乾鼻燥，潮熱盜汗，舌質紅少津，苔燥，脈細數
(C)飲食無度，渴飲喜冷，胃中痞滿嘈雜，口乾唇焦，牙齦腫痛，大便燥結，苔黃燥，脈滑數
(D)煩渴多飲，口乾舌燥，尿量頻多，舌邊尖紅，苔薄黃，脈洪數
- 37 65歲陳先生患有糖尿病已20年，飯前血糖175，糖化血色素7.6%，常覺腰膝痠軟，小便頻數，尿量多且有泡沫，偶有四肢浮腫，口不渴，舌淡嫩，苔白滑，齒痕，脈沉弱，下列診斷何者最適當？
(A)腎陰虛 (B)脾陽虛 (C)腎陽虛 (D)氣血虧虛
- 38 承上題，下列處方何者較適宜？
(A)六味地黃丸 (B)理中湯 (C)人參養榮湯 (D)金匱腎氣丸

- 39 33 歲患者，自訴眠差數年，問診可知心煩不寐，躁擾不安，口舌乾燥，口舌生瘡，舌尖紅，苔薄黃，治以下列何方最適宜？
(A)黃連、黃芩、梔子、黃柏
(B)黨參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、半夏、木香、砂仁
(C)川芎、茯苓、知母、甘草、酸棗仁
(D)知母、黃柏、山藥、熟地黃、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮
- 40 45 歲患者，平素工作壓力較大，情緒急躁，自訴失眠多年，近一個月因工作繁忙，失眠更甚，多夢，甚至徹夜不眠，頭暈頭脹，口乾口苦，便秘，舌紅苔黃，脈弦數，治以下列何方最適宜？
(A)天王補心丹 (B)龍膽瀉肝湯 (C)黃連阿膠湯 (D)黃連溫膽湯
- 41 45 歲患者，血壓為 180/100 mmHg，近壓力較大，主訴眩暈，併見耳鳴，平素易頭痛，每次開會或報告時頭暈頭痛加重，煩躁易怒，眠不佳，口苦，舌質紅，苔黃，脈弦數，合併胸悶胸痛感，活動時胸痛加重，以左胸為主，休息可減。下列敘述何者錯誤？
(A)可能與心肌缺血相關，眩暈只是次要症狀
(B)此證型為肝陽上亢
(C)治宜半夏天麻白朮湯
(D)在治療過程中，如出現劇烈頭痛，頭痛欲吐感，須注意腦部病變
- 42 47 歲林先生，半年前因車禍導致頭部外傷而致癲癇。近半年來偶發肢體抽搐，失神呆滯，兩眼發直，手中物件掉落，需數十秒後神識始恢復如常。並伴隨有乏力氣短，頭部與胸脅刺痛等症狀。望其舌色紫暗，口唇紫暗，眼眶發青，面色晦暗，脈弦澀。治以下列何方最適當？
(A)滌痰湯 (B)大定風珠 (C)龍膽瀉肝湯 (D)補陽還五湯
- 43 下列有關川芎用於頭痛的用量與注意要點之敘述，何者錯誤？
(A)頭痛劇烈時，可加重川芎劑量 (B)川芎辛溫升散走竄力強，為血中氣藥
(C)歸經為肝、膽、心包經，故膽經頭痛常用 (D)陰虛內熱、內風旋動者宜用
- 44 關於癌症引起虛損的調治法，下列何者正確？
(A)虛損病機單純者，應利用臟腑間多個生剋制化關係，進行重病輕藥治療法
(B)虛損病發生陰陽氣血耗損迅速時，宜用緩補法
(C)虛損病發生病勢遷延，進展緩慢或虛不受補時，處方要糾正偏虛，緩圖根治的方法
(D)虛損病常見虛中有邪，虛實夾雜，治要權衡標本輕重緩急，專方峻下法以期短期見效
- 45 在癌症治療過程中引起的虛勞，下列敘述何者正確？
(A)腫瘤所致臟腑元氣虧損，精血不足為主要病理過程的急性疾病
(B)因稟賦不足，後天失調，諸病失治，積勞內傷的虛衰性病證
(C)臨床表現症狀夾雜，病勢起變迅速，氣血陰陽皆過的勞損疾病
(D)因氣血生化快速，致元氣虧損，神形過耗的急性虛衰性疾病
- 46 一位 45 歲的上班族男性，最近一年來感覺腹脹有物，部位不定，時聚時散，食慾差，有時脹痛更影響食慾，脘腹痞滿，怕冷。經診察發現舌苔白膩，脈象弦緩。治以下列何方最適宜？
(A)加味逍遙散 (B)當歸四逆散 (C)木香順氣散 (D)黃連瀉心湯
- 47 清熱解毒中藥治療惡性腫瘤的作用機理，下列敘述何者錯誤？
(A)可能與抗菌抗病毒或抗發炎的作用相關 (B)可提高機體抗癌的免疫功能
(C)能減輕放化療副作用，而無直接抑瘤作用 (D)具有清除癌性毒素的作用

- 48 積聚證後期正氣大傷，應在培補氣血扶正基礎下，酌加攻法，下列何種攻法最不適當？
(A)下法 (B)消積 (C)軟堅 (D)化痰
- 49 關於劉完素的四物湯增損治病模式，下列何項錯誤？
(A)春防風四物 (B)夏黃芩四物 (C)秋門冬四物 (D)冬附子四物
- 50 《傳青主女科》定經湯的組成藥物，下列何者錯誤？
(A)柴胡、菟絲子 (B)熟地、茯苓 (C)當歸、芍藥 (D)地骨皮、山藥
- 51 26 歲女性，最近一年發現月經量明顯變少，月經往往只有一天就乾淨，經色淡，質稀如水，平常容易頭暈，手腳冰冷，舌質淡，苔薄白，脈虛細。下列關於此病患的證候分析，何者最適宜？
(A)寒濕凝滯胞宮 (B)腎虛衝任不固 (C)氣虛血凝胞脈 (D)血虛胞脈失養
- 52 30 歲女性，經行少腹脹痛，拒按，血塊排出後疼痛可減，經色暗有塊，胸脅脹滿，舌質暗有瘀點，脈弦。下列何項最適宜？
(A)當歸、川芎、白芍、熟地、艾葉、香附
(B)柴胡、陳皮、白芍、川芎、香附、枳殼、甘草
(C)當歸、川芎、白芍、麥冬、半夏、人參、牡丹皮、吳茱萸、阿膠、桂枝
(D)當歸、川芎、赤芍、桃仁、紅花、五靈脂、牡丹皮、延胡索、烏藥、枳殼、香附、甘草
- 53 某大學女學生就診，主訴平素鼻子無異常症狀，常於經行期間流鼻血，偶見鼻血從口中咯出，因課業壓力大，心煩，情緒不穩定，經行或排卵期常感兩脅脹痛，口苦，耳鳴，小便色黃，大便鞭結數日一行，脈弦數。下列何方最適宜？
(A)側柏葉、槐花、枳殼、芥穗炭
(B)當歸、生地、白芍、丹皮、梔子、黃芩、川棟、茜草、白茅根、甘草、牛膝
(C)澤瀉、丹皮、知母、茯苓、山茱萸、生地、黃柏、山藥
(D)牛膝、當歸、熟地、沙參、白芍、丹皮、茯苓、黑荊芥
- 54 一家庭主婦就診，主訴行經前及行經期間，全身發熱，兼見少腹刺痛，經血紫黯夾有較大血塊，舌色暗，舌面瘀斑，脈見沉弦微數，下列處方何者最適宜？
(A)《醫林改錯》血府逐瘀湯 (B)《傳青主女科》清經散
(C)《醫宗金鑑》三黃四物湯 (D)《傳青主女科》宣鬱通經湯
- 55 51 歲女性，於半年前停經，時或怕冷、時或烘熱汗出已 5 個月，頭暈耳鳴，腰膝痠軟，兩足欠溫，舌淡，苔薄，脈細。下列何項最適宜？
(A)女貞子、旱蓮草
(B)甘草、浮小麥、大棗
(C)仙茅、仙靈脾、知母、黃柏、當歸、巴戟天
(D)柴胡、當歸、白芍、茯苓、白朮、丹皮、梔子、薄荷、甘草、生薑
- 56 30 歲女性就診，被處以鮮生地 10 錢、當歸炭 3 錢、生白芍 3 錢、丹皮 3 錢、槐花 4 錢、旱蓮草 5 錢、仙鶴草 5 錢、炒蒲黃 4 錢、熟軍炭 1 錢半，服用三帖後立效，此患者之症狀，最可能為下列何者？①經血量多 ②舌質紅苔黃 ③滑數脈
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 57 31 歲患者因不孕來診，醫師處方：當歸五錢、白芍一兩、白朮五錢、茯苓三錢、天花粉二錢、牡丹皮三錢、香附三錢。下列何項為其治則？
(A)滋陰養血，調衝益經 (B)補氣養血，調補衝任
(C)舒肝解鬱，養血理脾 (D)養血通經，利濕健脾

- 58 傳青主之處方：易黃散與清肝止淋湯均可用於治療帶下病，下列有幾項是兩方相同的組成藥物？
①山藥 ②牡丹皮 ③黃柏 ④當歸
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 59 關於陰吹的敘述，下列何者正確？①指婦人穀道時時出氣，或氣出有聲，狀如矢氣者 ②《金匱要略·婦人雜病脈證并治》謂：「胃氣下泄，陰吹而正喧」 ③《醫宗金鑑·婦科心法要訣》謂：若氣血大虛，中氣下陷者，宜十全大補湯加升麻、柴胡以升提之
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 60 依《醫宗金鑑》所述，惡阻因於胃熱者，最宜下列何者治療？
(A)加味溫膽湯 (B)加味六君湯 (C)小半夏加茯苓湯 (D)香砂六君子湯
- 61 關於「滑胎」之診治，下列敘述何者錯誤？
(A)應注意先天稟賦是否不足 (B)應先排除「螺、紋、鼓、角、脈」等五種病症
(C)孕前治療，應預培其損 (D)孕後治療，應超過以往殞墮之妊娠月
- 62 下列選項何者為「產後三急」？①血量 ②瘧病 ③嘔吐 ④泄瀉 ⑤盜汗 ⑥鬱冒
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)④⑤⑥
- 63 王女士，產後 30 天仍惡露不絕，王醫師以補中益氣湯加鹿角膠、艾葉炭治療 5 天後收效。此病例的臨床症狀，下列幾項正確？①惡露量多 ②惡露質稀薄 ③兩脇脹痛 ④小腹空墜痛 ⑤惡露無臭味
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 64 一產婦自產後遍身關節疼痛，肢體麻木、痠楚，頭暈心悸、舌淡紅少苔，脈細無力。最宜下列何方治療？
(A)《醫林改錯》身痛逐瘀湯
(B)《金匱要略》黃耆桂枝五物湯加秦艽、當歸、雞血藤
(C)《傳青主女科》生化湯加秦艽、雞血藤
(D)《婦人大全良方》如神湯
- 65 下列何者把小兒的生理病理概括為「臟腑柔弱，易虛易實，易寒易熱」？
(A)董汲 (B)劉昉 (C)萬全 (D)錢乙
- 66 正常嬰兒的前囟門約於出生後幾個月內關閉？
(A) 6 (B) 9 (C) 18 (D) 24
- 67 關於小兒暑邪感冒的症狀，下列何者最適當？①發熱重，多汗 ②身重困倦，胸悶泛惡 ③食欲不振，或嘔吐、腹瀉 ④舌苔薄白或膩、質淡紅、脈浮數
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)①④
- 68 關於小兒肺炎喘嗽內陷厥陰證，下列何項症狀不符合臨床證型？
(A)煩躁 (B)譫語 (C)四肢抽搐 (D)潮熱盜汗
- 69 關於小兒嘔吐之預防護理，下列何者錯誤？
(A)哺乳不宜過急，以防吞進空氣，哺乳後，可抱正身體，輕拍背部，使空氣排出
(B)嘔吐輕者，可進食易消化或半流質食物，宜少量多次進食，嘔吐較重者應予禁食
(C)宜令患兒仰臥，以防嘔吐噎入氣管
(D)給藥時藥液不要太熱，可採少量多服法，必要時可服一口，停一下，然後再服

- 70 下列有關驚風的敘述何者正確？
(A)驚風病名，較早見於《和劑局方》
(B)驚風八候就是搐、搦、顫、掣、反、引、竄、視
(C)一般以 1~5 歲的小兒多見，年齡越大發病率越高
(D)《幼幼集成》進一步明確急慢驚風的病因證治，後世醫家皆循此立論
- 71 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》淋證門，「生地、梔子、木通、瞿麥、滑石、淡竹葉、茵陳蒿、黃芩、甘草、豬苓」，上述方劑適用於下列何種淋證？
(A)血淋 (B)氣淋 (C)熱淋 (D)石淋
- 72 7 歲洪小弟，近幾日遺尿，尿量不多但氣味腥臊色黃，平時性情急躁，夜間咬牙夢囈，唇紅苔黃，下列治療何者最適宜？①黃芩、梔子、澤瀉 ②木通、車前子、當歸 ③柴胡、甘草、生地黃 ④綿茵陳、淡竹葉、蘼蓄
(A)②③④ (B)①②④ (C)①②③ (D)①③④
- 73 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，有關瘟疫之描述，下列何者錯誤？
(A)瘟疫之傳變與傷寒無異，冬感於寒而即病者，名曰傷寒
(B)瘟疫冬傷於寒而未即病者，寒邪藏於肌膚之內，伏於榮衛之間，至春復感春風，發為溫病
(C)春夏應暖熱而反寒，秋冬應寒涼而反熱，此為四時不正之氣，名曰厲氣
(D)若逐戶闔門老幼相傳，乃天行瘟疫
- 74 現代病名為猩紅熱 (scarlet fever)，古代較相似的病名，下列何者正確？①爛喉痧 ②疫喉 ③顧驚瘟 ④野痧
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 75 6 歲男孩流鼻血，來到中醫兒科門診，症見鼻腔乾燥，身熱、頭痛、身有汗、不口渴，脈浮，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃湯 (B)桂枝湯 (C)升陽和血湯 (D)四物三黃瀉心湯
- 76 小兒行遲，血氣不榮，而見肌肉消瘦、骨節顯露、筋攣膝大者，古稱下列何種疾病？
(A)膝眼風 (B)歷節 (C)骨槽風 (D)鶴膝節
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，麻疹收沒證治，麻疹出透所需的時間為多少天？
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
- 78 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒過食生冷，引起腸鳴、腹痛、腹瀉、大便澄清、面白肢冷，不嗜飲食，溫中以理中湯，止瀉則以下列何方治療？
(A)訶子散 (B)胃苓湯 (C)七味白朮散 (D)參苓白朮散
- 79 小兒五遲當中髮遲，因少陰之血氣不能上榮於髮，可用芎勝丹。芎勝丹的組成下列何者錯誤？
(A)生地黃 (B)當歸 (C)白芍藥 (D)川芎
- 80 關於哮吼症 (Croup) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)病因以 B 型嗜血桿菌感染最多
(B)臨床症狀表現：聲音沙啞 (hoarseness)、狗吠咳嗽 (barking cough)、喘鳴聲 (stridor)
(C)頸部前側 X 光檢查可看到聲門下方氣道縮窄，出現尖塔徵象 (steeple sign)
(D)好發於 6 個月到 5 歲幼兒，一年中以較冷的季節發生率較高