

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。


- 1 瘡瘍的治療與經絡之氣血多寡有關，若瘡瘍發生在「多血多氣」之經絡上，下列何種治療方式最好？
(A)破血托補 (B)行氣滋養 (C)行氣活血 (D)滋陰養血
- 2 某 42 歲男性，主訴右臀部發現有一腫塊已 3 天，腫痛焮紅，右腿行走困難。依其病情，則下列敘述何者錯誤？
(A)此病成因乃膀胱經濕熱凝結而成 (B)此病灶處因肌肉堅厚，初起不宜艾灸
(C)本病也有可能因肌肉注射染毒引起 (D)初起內治可用仙方活命飲
- 3 下列關於「附骨疽」的敘述，何者錯誤？
(A)相當於西醫學的化膿性骨髓炎 (B)好發於四肢末梢，局部腫脹
(C)附筋著骨，推之不移，疼痛徹骨 (D)潰後不易收口，可形成竇道
- 4 關於疽的治療原則，下列何者錯誤？
(A)屬濕火為病者，以清熱利濕為主 (B)宜刺委中穴出黑血
(C)宜加開胃健脾之藥 (D)初起皆以清肝火，滋腎水治之
- 5 有關發生於頭面部之癰，下列敘述何者錯誤？
(A)牙癰乃因腎經虛火所致
(B)耳癰生於耳竅之內，治療時需分虛火或實火
(C)托腮癰生於兩腮畔頰下，乃因天時寒暖失常，感受風邪而成
(D)耳根癰生於耳垂之下，乃因風邪為病或肝膽遺熱所致
- 6 一位 46 歲農夫數日前赤腳至農田工作，右足趾為木刺所傷，近 1~2 日病人忽覺寒熱交替，全身無力，刺傷處紅腫，同時發現有一紅絲由小腿內側連及大腿，並在右側腹股溝觸及一腫塊如梅核，下列何者診斷較合適？
(A)血疔 (B)紅絲疔 (C)癰瘡 (D)癰瘻
- 7 下列何部位之疔最易走黃？
(A)頭頸 (B)腰腹 (C)顏面 (D)臍中
- 8 下列何疾，毒風客於脈而不去，其氣不清，致使患者鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰？
(A)白屑風 (B)面遊風 (C)油風 (D)癩風
- 9 有關四彎風的敘述，下列何者錯誤？
(A)常伴有哮喘等過敏性疾病
(B)屬風邪襲入腠理而成
(C)生於兩腿彎，腳彎，或兩臂彎，往往單獨而生
(D)形如風癬，其癢無度，搔破津水，又似濕癬
- 10 血管神經性水腫 (Angioedema) 屬於下列何種疾病？
(A)紫白癰風 (B)油風 (C)白屑風 (D)赤白遊風
- 11 下列何病多見於嬰兒初生，身熱皮紅，狀如湯潑火燒，因孕母過食辛辣熱物，脾胃積熱所致？
(A)鵝掌風 (B)漏底風 (C)火赤瘡 (D)胎赤
- 12 下列何種皮膚病名不是頭癬的別名？
(A)錢癬 (B)肥瘡 (C)髮際瘡 (D)禿瘡
- 13 有關《中醫外科講義》胎癰瘡的證治，下列敘述何者錯誤？
(A)發於嬰兒髮際或眉端
(B)乾者，癢起白屑，形如癬疥
(C)濕者，黃水浸淫，搔癢無度，可能延遍全身
(D)又有熱極皮膚火熱，紅暈成片，遊走狀如火丹，治則宜快速收斂以控制病情

- 14 依《中醫外科學》有關桃花癬的敘述，下列何者錯誤？
(A)多發於春月 (B)老年人多有之
(C)面上風疹，初如癰疹，漸成細瘡 (D)此由肺胃風熱，隨陽氣上升而成
- 15 7 歲男孩，面部皮膚出現多個碎點狀淡黃色小斑，根據中醫外科學最有可能為下列何種皮膚病？
(A)烏白癩 (B)雀斑 (C)黑頭粉刺 (D)痘風瘡
- 16 王先生臉上長滿青春痘（痤瘡），丘疹色紅，有點痛，無膿胞，舌質紅，舌苔薄黃，脈浮數，下列辨證用藥何者最適合？
(A)風寒束表，麻黃桂枝各半湯 (B)血虛風燥，當歸飲子
(C)肺經風熱，枇杷清肺飲 (D)痰濕凝結，海藻玉壺湯
- 17 小華的媽媽某日因整天忙碌，忘記幫小華換尿片，等到晚上解開尿片時，才發現小華的屁股附近皮膚整片通紅如圖所示。下列診斷何者最適宜？



- (A)狐水刺 (B)漏底風 (C)猴疳 (D)臀癰
- 18 發於項胸等處，若結核大小不一，推之移動，皮色不變者，診斷為下列何病名最不適宜？
(A)瘰癧 (B)失營 (C)乳痞 (D)痰核
- 19 關於乳痞的常見病因，下列何者正確？
(A)心脾毒火上升而成 (B)肝氣鬱結而成
(C)脾經風熱而成 (D)心火妄動，濕熱結聚而成
- 20 發於患者少腹之下，腿根之上摺紋縫處，形如鵝卵，潰後瘡口潰大，身立則口必合，身屈則口必張，此症最適宜診斷為下列何者？
(A)便毒 (B)馬口疳 (C)妬精瘡 (D)翻花下疳
- 21 輔骨與脛骨若遇跌打損傷，骨尖斜突，肉破血流，何者為較不相關之肌肉？
(A)股二頭肌 (B)股方肌 (C)脛前肌 (D)縫匠肌
- 22 關於下肢肌肉影響自腰椎神經根，下列何者正確？
(A) L4 影響伸趾長肌 (B) L5 影響腓骨短肌 (C) S1 影響腓骨長肌 (D) S1 影響伸趾短肌
- 23 患者摔車致肩部無法上舉，因病人肥胖，無法確定是否腫脹，如病患要求進行脫位整復，應如何施行治療？
(A)照 X 光檢查是否骨折脫位再進行整復
(B)採用唐代蘭道人在《仙授理傷續斷秘方》中之拔伸足蹬法進行復位
(C)用清代胡廷光在《傷科彙纂》之拔伸托入法，並由醫師與兩位助手操作
(D)依明代朱繡在《普濟方折傷門》所載之膝頂推拉法，以膝頂住腋窩進行整復
- 24 檢查患者疼痛的肩部時，發見患肩外展 60~120 度時疼痛比較明顯，超過 120 度以及未到 60 度時疼痛較輕，下列何種疾病比較符合？
(A)肩峰下滑囊炎 (B)棘上肌腱斷裂
(C)肱二頭肌長頭肌腱鞘炎 (D)棘上肌腱炎
- 25 患者主要表現第一至四指麻木疼痛，握力減退，端物偶有突然失手的情形。下列何者符合上述症狀描述？
(A)橈骨莖突狹窄性腱鞘炎 (B)網球肘
(C)腕三角纖維軟骨損傷 (D)腕隧道症候群

- 26 園藝工人因腕痛多日來院就診，檢查患者腕部因受傷後腫脹，尺側疼痛，握力顯著下降，持物掉落，背伸支撐及尺側旋前疼痛加重，下列何種診斷比較符合？
(A)尺骨莖突狹窄性腱鞘炎 (B)尺側伸腕肌腱周圍炎
(C)腕隧道症候群 (D)腕三角纖維軟骨損傷
- 27 有關傷科內傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)因為外力作用而引起人體內部氣血、經絡、臟腑遭受損傷而致功能紊亂的病症
(B)與勞倦、痰食等引起的內傷不同
(C)主要由喜怒哀思悲恐驚造成
(D)根據不同病理機制，可分為傷氣血、傷經絡、傷臟腑等不同類型
- 28 關於脊髓受傷發生截癱表現後的恢復，不同部位受傷會影響後續步行功能恢復，下列配對何者正確？
(A) T1-T4 可利用長腿支架（long leg brace）和腋杖自行走路
(B) T6 上肢和胸部運動具完整功能，但維持其胸帶（pectoral girdle）的穩定度出現困難
(C) T9-T12 在輪椅上操作較複雜的動作時會感到較困難
(D) L4-S2 可不必依靠輪椅，利用短腿支架（short leg brace）和前臂腋杖自行走路
- 29 騎機車時未保持安全距離而撞上緊急煞車的汽車後車廂，胸部因慣性撞擊機車龍頭，出現意識不清而送至醫院急診，僅能平躺拍攝胸部正面 X 光片，下列何者較能被診斷出？
(A)血胸 (B)連枷胸 (C)心肌梗塞 (D)心包填塞
- 30 俗稱媽媽手的 de Quervain 氏病，可能在提熱水瓶倒水出現無力感或加重疼痛，其主要病變所在屬於那一條經絡？
(A)手陽明經 (B)手少陽經 (C)手厥陰經 (D)手少陰經
- 31 關於肩關節的損傷，下列敘述何者最不適宜？
(A)鎖骨外三分之一骨折易合併肩鎖關節脫位
(B)無位移肱骨外科頸骨折初期外治法以三角巾懸吊為主
(C)肩關節脫位可能出現方肩畸形
(D)棘上肌斷裂時會出現肌力消失，無力執行肩內收的動作
- 32 有關扳機指的敘述，下列何者錯誤？
(A)好發位置為食指及小指之屈肌腱鞘，拇指、無名指與中指次之
(B)雖常與職業過勞有關，但也有先天性的可能
(C)臨床表現初起為掌指關節掌側痠楚不適，繼覺手指屈伸不利，出現屈伸嵌頓彈響
(D)醫師使用拇指甲於患側掌關節處做垂直肌腱之撥筋動作為可行之治療手法
- 33 下圖之①②③分別為不同神經支配部位之感覺檢查，關於其對應關係，下列何者正確？



- (A)①橈神經②尺神經③正中神經 (B)①橈神經②正中神經③尺神經
(C)①正中神經②橈神經③尺神經 (D)①尺神經②橈神經③正中神經
- 34 有關腰椎間盤突出症最容易發生的部位，下列何者正確？①L1-L2 ②L2-L3 ③L3-L4 ④L4-L5 ⑤L5-S1
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

- 35 有關傷筋的診斷，下列何者正確？①詢問受傷時間應區分是急性傷筋還是慢性傷筋 ②慢性勞損疼痛往往在夜間或休息後加重，且與天氣變化無明顯密切關係 ③X 光檢查對於肌腱鈣化、骨質增生、脫位錯縫及骨折有鑑別診斷的價值 ④筋膜組織損傷，疼痛由傷處向遠端沿經絡竄痛或放射痛
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 36 關於腰臀部不舒伴隨放射性疼痛至下肢的症狀，最有可能的診斷，下列共幾項正確？①腰部扭挫傷 ②腰椎間盤突出症 ③腰椎退化性關節炎 ④梨狀肌症候群
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 37 依《素問·宣明五氣》所述：「五勞所傷，久視傷①，久臥傷②，久坐傷③，久立傷④，久行傷筋，此五久勞所病也。」前文中①②③④文字依序為何，下列何者正確？
(A)血氣肉骨 (B)氣血骨肉 (C)血氣骨肉 (D)氣血肉骨
- 38 有關增生性腰椎脊椎炎與強直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis）之比較，下列何者正確？①前者多發生在 40 歲以上男性 ②兩者脊柱活動一般都受限 ③後者晚期 X 光檢查，椎體輪廓模糊呈竹節狀改變（Bamboo spine） ④兩者 X 光檢查，小關節骨質增生清晰 ⑤後者後期可見前縱韌帶鈣化 ⑥兩者急性期 ESR、ASLO（Anti-streptolysin O）增高
(A)僅②④⑥ (B)僅①③⑤ (C)僅①②③⑤ (D)①②③④⑤⑥
- 39 下列疾患病位與經穴相對位置的配對，何者正確？①橈骨莖突狹窄性腱鞘炎—列缺 ②奧斯古德氏病（Osgood's disease）—少海 ③胸廓出口症候群—期門 ④梨狀肌症候群—環跳
(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④
- 40 有關腰椎椎管狹窄症的敘述，下列何者正確？①臨床常見於 40~60 歲體力勞動者且女多於男 ②以 L4、L5、S1 為多見 ③80%病患有關節性跛行，如為中央型狹窄會有馬尾性間歇性跛行 ④腰部過伸試驗陽性或直腿抬高試驗（SLRT）為陽性 ⑤坐姿比站姿疼痛加劇
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤
- 41 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關於脅肋脹痛與肌肉作痛的治療，下列敘述何者正確？
(A)傷損脅肋脹痛，如大便通和，喘咳吐痰者，肝火侮肺也，用清心蓮子飲清之
(B)傷損脅肋脹痛，若大便不通，喘咳吐血者，乃瘀血停滯也，用復元活血湯通之
(C)傷損肌肉作痛者，乃榮衛氣滯所致，宜用復元通氣散
(D)傷損筋骨間作痛者，肝腎之氣傷也，宜用左歸丸
- 42 關於損傷昏厥，下列敘述何者正確？
(A)若患者頭部損傷後，出現意識改變、噁心嘔吐、肢體無力癱瘓等表現，可令患者休息片刻以觀察後續變化，無緊急處理之必要
(B)若患者頭部損傷後立即來診治療，評估其當下意識清楚且無其他異狀，就能判斷病情並不嚴重，囑其返家休養即可，不需要其他處置衛教
(C)氣閉類型的昏厥通常持續時間很長，多在數小時後才能甦醒，醒後也常會有頭暈頭痛等表現
(D)若患者表現為神智呆滯、面色爪甲蒼白、四肢厥冷、氣息微弱、舌淡唇乾、脈細微，可用參附湯合生脈散加減來治療
- 43 腹部受創後，可能出現內臟破裂並引起腹膜發炎，此為嚴重之疾病，應盡速轉診醫院治療。關於腹膜發炎之症狀，下列何者錯誤？
(A)反跳痛 (B)腹壁板硬 (C)腹部壓痛 (D)腹部皮膚瘀血

- 44 傷損後疼痛，其證發熱作渴，煩悶頭暈，日晡益甚，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，下列何方治療最適宜？
(A)二陳湯加白朮、芎、歸、山梔、天麻、鉤藤 (B)補中益氣湯加生薑、半夏
(C)小柴胡湯加青皮、山梔 (D)八珍湯加丹皮、麥冬、五味子、肉桂、骨碎補
- 45 依《傷科大成·跌打壓仆損傷者須用引經藥》，下列配對何者正確？
(A)手臂用青皮 (B)背脊用黃柏 (C)兩足用木瓜 (D)腰臀用牛膝
- 46 多處骨折患者，發熱、無汗、脈洪大而虛，重按全無，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》之分類，此乃：
(A)感染 (B)血虛發熱 (C)血脫 (D)血瘀發熱
- 47 患者傷後腹痛，按之反不痛，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，可選用下列何種方藥？
(A)加味承氣湯 (B)參附湯
(C)四物湯加參、耆、白朮 (D)復元活血湯
- 48 依《靈樞·邪氣藏府病形》所述：「有所擊仆，若醉入房，汗出當風」，則傷下列何臟腑？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 49 關於脊椎滑脫 (spondylolisthesis) 的敘述，下列何者正確？
(A)根據上下脊椎滑移相對位置達 2/3 為第二級滑脫
(B)腰椎 L3-L4 節段為最常發生的位置
(C)若 L4 向 L5 後方移位，則稱為 L4-L5 後滑脫
(D)脊椎滑脫不會直接壓迫神經根引起症狀
- 50 關於跟骨骨折敘述，下列何者錯誤？
(A)跟骨結節橫形骨折常為直接暴力造成 (B)固定蹠屈位 4 週即可
(C)固定時膝關節角度為屈曲 (D)復位重點在矯正跟骨體增寬
- 51 關於肱骨髁上骨折，下列敘述何者正確？①肱骨髁上骨折常見於兒童，多為間接暴力所致 ②肱骨髁上骨折會造成肘後三角形狀改變 ③拍攝X光以正位 (AP view) 與側位 (lateral view) 為主 ④肱骨髁上骨折神經損傷以正中神經最為常見
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 52 70歲男性騎機車自摔右手撐地，右上臂腫脹瘀青明顯無法用力，X光如附圖所示，下列敘述何者正確？
①X光顯示右側肱骨幹骨折 ②該處骨折為橫斷性骨折 ③該骨折易併發尺神經受損 ④該處骨折因容易發生骨折延遲癒合或不癒合




(A)①③

(B)②③

(C)①④

(D)②④

53 關於橈骨遠端骨折復位手法如附圖所示，下列敘述何者正確？



- (A)此復位手法為橈骨遠端屈曲型骨折復位手法
(B)整復起始擺位為肘部屈曲 90 度，前臂旋前位
(C)圖①術者兩拇指並列遠端背側，其餘四指扣緊大小魚際順勢拔伸
(D)圖②需藉牽引力，驟然猛抖同時迅速橈偏掌屈，完成復位
- 54 45歲男性接球不慎頂到左手無名指，當下疼痛明顯，無名指無法完全伸直，今天求診，X光檢查如附圖所示，下列敘述何者正確？①X光顯示左手無名指末端指節撕脫性骨折 ②左無名指日久失治外觀會呈現錘狀指 ③此受傷機轉主要由於屈指淺肌的拉扯所致 ④使用夾板固定時，左手無名指遠端指節需呈現些微屈曲（flexion）位做固定



- (A)①② (B)①④ (C)①③④ (D)②③④
- 55 某 38 歲慢跑選手被醫師診斷為「行軍骨折」，則其最有可能壓痛的部位會出現在下列何穴位附近？
(A)陷谷 (B)殷門 (C)京門 (D)前谷
- 56 肩關節脫位，以肩前脫位最常見，臨床上常用拔伸足蹬法復位。其操作過程：患者仰臥位，右肩脫位者，術者立於患者右側，術者握住患者患側手腕，一足抵於患者腋窩內，腋下墊有捲如拳大的軟絹，沿著患肢縱軸方向，用力緩緩拔伸，此時患肩、患肢的體位為何？
(A)內收、內旋 (B)內收、外旋 (C)外展、內旋 (D)外展、外旋
- 57 踝部骨折採用手法整復後，以小夾板固定治療時，下列敘述何者錯誤？
(A)外翻型將踝關節置於內翻、背伸位 (B)垂直壓縮型將踝關節置於中立 0 度位置
(C)用小腿超踝關節小夾板固定 (D)外旋型將踝關節置於外翻、外旋及背伸位
- 58 有關陳舊性髌關節脫位，下列敘述何者正確？
(A)脫位超過 10 天以上稱之
(B)以前下方脫位較為常見，後上方脫位較少見
(C)脫位後超過 6 個月以上者為手法施治的條件之一
(D)髌關節被動活動時股骨頭仍有活動度為手法施治的條件之一

- 59 受外力引起距骨全脫位，依據其脫出方向可知受傷當下的足部動作表現，下列敘述何者錯誤？
(A)距骨外後脫位—足極度內翻內旋 (B)距骨外脫位—足極度內翻
(C)距骨內前脫位—足極度外翻外旋 (D)距骨內後脫位—足極度外翻背屈
- 60 關於骨折引起的併發症之一脂肪栓塞敘述，下列何者正確？
(A)常見於脊椎骨折
(B)血液氣體分析無意義，須抽血驗膽固醇
(C)理學檢查常可發現患者的胸壁和結膜下有出血點
(D)輕者為呼吸困難，只要吸氧就可以緩解，重症需靠呼吸器治療，為高發生率低死亡率之併發症
- 61 胞瞼微癢微痛，近瞼弦部皮膚微紅微腫，形成限局性硬結，《諸病源候論》稱之為針眼，下列何者為其較合理的病因病機？
(A)七情內鬱化火，心火內盛 (B)肝氣鬱結，久鬱化火
(C)脾胃濕熱，復感外邪 (D)肺失宣降，大腸傳導失常
- 62 根據《內經》，「約束」為何精所形成？
(A)皮毛 (B)肌肉 (C)筋 (D)骨
- 63 患者上下胞瞼跳動，不能自控，下列相關敘述何者最不適當？
(A)血虛生風者，胞瞼振跳不休，可用當歸活血飲加減治療
(B)心脾血虛者，時疏時頻，心煩失眠，食少體倦，當用歸脾湯加減治療
(C)肺陰虛者，津液虧損，治當滋陰潤肺
(D)可局部按摩，或以梅花針點刺
- 64 患者兩眦赤脈粗大鮮紅，橫貫白睛，癢澀刺痛，眵多乾結，伴有頭痛煩熱，口乾咽燥，大便燥結，小便黃赤，舌尖紅，舌苔黃，脈數，其證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)此病診斷為赤脈傳睛 (B)此症屬心火上炎，壅於兩眦所致
(C)內治當以瀉心湯合導赤散加減治之 (D)此症常引起黑睛病變，故易影響視力
- 65 關於白珠俱青，其證治之敘述，下列何者正確？
(A)緣於肝肺熱盛者，內治當以菊花決明散加減治之
(B)緣於正虛邪衰者，治療應重於全身，不可使用散邪通絡，活血化瘀之品
(C)緣於肺陰不足者，內治當以養陰清肺湯加減治之
(D)緣於疫熱傷絡者，治療以清熱涼血，解毒散邪為主
- 66 有關蟹睛疼痛之敘述，下列何者錯誤？
(A)烏睛努出，如豆如珠，形似蟹睛，疼痛極甚，澀淚羞明
(B)初起為實，軟而不疼；久則為虛，鞭而極痛
(C)實者，宜瀉肝湯；虛者，用鎮腎決明丸
(D)與西醫之角膜穿孔，虹膜脫出類似
- 67 有關《證治準繩》中「眯目飛揚」之下列敘述何者錯誤？
(A)一般此疾可恢復正常 (B)若延誤失治，可加重眼睛損傷
(C)相當於西醫學的過敏性結膜炎 (D)嚴重時可發生凝脂翳等症
- 68 有關凝脂翳的敘述，下列何者錯誤？
(A)凝脂翳常易導致花翳白陷與聚星障等重病 (B)每易迅速毀壞黑睛，變生蟹睛惡候
(C)癒後視力受到嚴重障礙，甚至失明 (D)相當於化膿性角膜炎

- 69 五官科的檢查會使用到一些器具，關於額鏡和耳鏡的使用，下列敘述何者錯誤？
(A)檢查者頭戴額鏡，使鏡孔置於兩眼之間
(B)投照於額鏡的光源應置於被檢者的右後側，稍高於耳部
(C)用耳鏡檢查成人時，應將其耳廓上部牽向後上方
(D)用耳鏡檢查兒童時，應將其耳廓下部牽向後下方
- 70 耳部疾病可以使用顳骨 X 光檢查來協助診斷，關於乳突炎的 X 光判讀下列何者正確？
(A)急性乳突炎多顯示邊緣整齊的孔洞
(B)急性乳突炎多顯示鬆質或硬化型乳突
(C)有膽脂瘤的慢性乳突炎多顯示邊緣整齊的孔洞
(D)無膽脂瘤的慢性乳突炎多顯示氣房混濁或形成膿腔
- 71 關於膿耳之敘述，下列何者錯誤？①以耳膜流膿、耳膜無穿孔為主要表現 ②外因多為風熱濕邪侵襲 ③內因多為肝、膽、腎、脾等臟腑功能失調 ④好發於成人，小兒少見 ⑤小兒膿耳一般症狀輕，易於痊癒
(A)①②③ (B)②④⑤ (C)②③④ (D)①④⑤
- 72 耳鳴係因痰火鬱結時，治以下列何方最適宜？
(A)加味二陳湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)天麻鉤藤飲 (D)加味逍遙散
- 73 眩暈一證，與下列那個臟腑最不相關？
(A)肝 (B)脾 (C)肺 (D)腎
- 74 下列關於「鼻疳」之敘述，何者錯誤？
(A)鼻疳又名鼻瘡，鼻齰瘡，是指鼻前孔附近皮膚紅腫、糜爛、結痂、灼癢，有經久不癒、反覆發作特點
(B)病因病理：肺臟虧虛，鼻失養滋；脾氣虛弱，濕蘊生熱
(C)小兒主證可見啼哭躁擾，搔抓鼻部，以至血水淋漓
(D)濕熱鬱蒸者，宜清熱燥濕，解毒和中，可選用萆薢滲濕湯加減
- 75 鼻淵，因脾氣虛弱，內治方法，下列敘述何者錯誤？
(A)內治宜健脾益氣，清利濕濁為主 (B)可選用參苓白朮散或補中益氣湯加減治療
(C)若鼻塞甚者，加白芷、辛夷花芳香通竅 (D)若濕鬱化熱者，加白蔻仁、黃耆、鵝不食草
- 76 關於風熱乳蛾的敘述，下列何者錯誤？
(A)類似於急性扁桃體炎 (B)咽部白膜堅韌不易擦去
(C)證屬風熱外侵，治宜疏風清熱湯 (D)證屬邪熱傳裏，治宜清咽利膈湯
- 77 小明近日扁桃腺體周圍膿腫，疼痛難言，吞嚥困難，診察開方後，並給予適當衛教，下列相關護理與衛教何者錯誤？
(A)宜選用易於進食和消化的食物 (B)禁食燥熱及乾硬食物
(C)內服藥物不宜待涼服用 (D)多食清潤之品，忌食辛辣物
- 78 臨床上若見牙齦浮腫，不紅而痛，或牙齦微紅微腫，牙齒浮動，咬物時痛，午後痛加劇，辨證上應屬下列何證？
(A)胃火實熱 (B)陰虛火旺 (C)肝脾有熱 (D)痰涎濕濁凝聚
- 79 下列何者不是牙宣病的常見主因？
(A)心脾積熱 (B)胃火上蒸 (C)腎陰虛損 (D)氣血不足
- 80 口瘡是指口腔肌膜上發生的表淺、如豆大的小潰瘍點。臨床上虛證多由陰虛火旺而致；實證與阿弗他口炎（Aphthous stomatitis）相似，多為下列何因而致？
(A)心脾積熱 (B)陽明風火 (C)風熱邪毒 (D)肺胃熱盛