

114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(二)(包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 下列有關《金匱要略》三物備急丸之敘述，何者正確？

- A. 組成為大黃、貝母、桔梗
- B. 主治卒然心腹脹痛，痛如錐刺，氣急口噤，大便不通
- C. 可治寒與痰水互結上中二焦之寒實結胸之證
- D. 其名「備急」者，乃三藥可通便之急也

2. 依原立方者之敘述，判斷下列解表劑之煎煮法及將息法何者正確？

- A. 《傷寒論》桂枝湯煎煮時，香氣大出即取服，勿過煮
- B. 《傷寒論》麻黃杏仁甘草石膏湯，以水七升，煮麻黃去上沫，內諸藥，煮取二升，去滓，冷服一升
- C. 《溫病條辨》銀翹散服後，須多飲暖水，汗出則癒
- D. 《傷寒論》麻黃湯，服後，須溫覆取汗，但不須啜熱稀粥

3. 30歲女性，於清明時節，至門診就診，主訴為咳嗽一日，伴見輕微身熱、口微渴，苔薄白，脈浮數。下列敘述何者最不適宜？

- A. 此證候為外感風熱
- B. 治法上宜用辛涼解表
- C. 因邪在肺衛，故處方銀翹散較處方桑菊飲為合適
- D. 若咳嗽痰稠而黃，可酌加貝母、瓜蒌

4. 關於方劑學作者與其著作，下列何者最不適宜？

- A. 孫思邈《備急千金要方》
- B. 陳修園《長沙方歌括》
- C. 吳謙《湯頭歌訣》
- D. 汪昂《醫方集解》

5. 下列各方的功用，何者錯誤？

- A. 《和劑局方》三拗湯：宣肺解表
- B. 《傷寒論》大青龍湯：發汗解表，清熱除煩

- C.《金匱要略》麻黃加朮湯：發汗解表，散寒祛濕
- D.《金匱要略》越婢湯：辛涼宣泄，清肺平喘
- 6.有關《景岳全書》濟川煎之敘述，下列何者最適宜？
- A.大黃苦寒瀉熱，攻積通便為方中佐藥
- B.麻子仁滋脾潤腸，潤燥通便，為方中臣藥
- C.鎖陽溫腎益精，潤腸通便，為方中君藥
- D.枳殼寬腸下氣，與升麻配伍，能升清陽、降濁陰而通大便
- 7.關於《景岳全書》泰山磐石散之敘述，下列那些正確？①能益氣健脾，養血安胎 ②白朮、黃芩相配能健脾清熱安胎 ③茯苓能寧心安胎 ④續斷能補益肝腎 ⑤肉桂助陽氣固胎元
- A.①②③
- B.①②④
- C.①③⑤
- D.②③④
- 8.下列方劑何者最不適宜治療遺精？
- A.《柳州醫話》一貫煎
- B.《醫方集解》二至丸
- C.《丹溪心法》大補陰丸
- D.《小兒藥證直訣》六味地黃丸
- 9.關於《醫方集解》七寶美髯丹之敘述，下列何者正確？①治肝腎不足，鬚髮早白 ②治齒牙動搖，夢遺滑精 ③何首烏、熟地補腎養血固精 ④當歸與首烏、白芍、菟絲子並進，可補肝腎，益精血而烏鬚髮 ⑤補骨脂溫補腎陽
- A.①②③
- B.①②⑤
- C.②③④
- D.③④⑤
- 10.58歲女性，患咳喘病5年以上，被診斷有支氣管擴張症，咳嗽痰多色黃濃稠，有時咳血，稍有勞動則咳喘加重；近1個月較勞累，咳喘增劇，常覺胸中煩熱。望之身體消瘦，舌紫暗，苔薄黃膩，按診脈浮無力。上述病證以下列何方治療最適宜？
- A.《衛生寶鑑》人參蛤蚧散
- B.《攝生眾妙方》定喘湯
- C.《慎齋遺書》百合固金湯

D.《丹溪心法》大補陰丸

11.有關《和劑局方》四君子湯之敘述，下列何者最適宜？

A.其組成藥物，以君藥人參劑量最大

B.本方加半夏即為《小兒藥證直訣》異功散

C.本方加藿香、砂仁、木香即為《小兒藥證直訣》七味白朮散

D.依《醫方集解》，本方加黃耆、山藥，亦名：六君子湯

12.關於《慎齋遺書》百合固金湯之敘述，下列何者最不適宜？

A.本方適用於咳痰帶血、咽喉燥痛，舌紅少苔，脈細數

B.若喘咳甚者：加杏仁、款冬花、五味子

C.本方主治肺腎陰虧、虛火上炎證

D.本方與《統旨方》清金化痰丸的共同藥物組成有5項

13.下列藥物中有幾項為《景岳全書》右歸丸之組成？①當歸 ②菟絲子 ③龜板膠 ④鹿角膠

A.1

B.2

C.3

D.4

14.依方劑學教材與典籍內容所述，處方生附子五錢、乾薑三錢、炙甘草二錢，宜如何稱呼最恰當？

A.《傷寒論》四逆湯

B.《傷寒論》通脈四逆湯

C.《傷寒論》白通湯

D.《傷寒六書》回陽救急湯

15.《太平惠民和劑局方》黑錫丹的組成中，不含以下那一味中藥？

A.肉豆蔻

B.荔枝核

C.沉香

D.川楝子

16.下列那一組藥物不是《通俗傷寒論》蒿芩清膽湯的組成？

A.竹茹、半夏

B.廣皮、枳殼

C.青黛、滑石、甘草

D.柴胡、山梔

17. 24歲楊小姐來診時，主訴月經先後不定期，乳房脹，右脇肋痛，口苦，咽乾，診之脈細弦無力。治療處方以下列何者最適宜？
- A. 柴胡、枳實、炒白芍、炙甘草
 - B. 柴胡、枳殼、炒白芍、陳皮、川芎、香附、炙甘草
 - C. 柴胡、茯苓、炒白芍、當歸、炒白朮、生薑、薄荷、炙甘草
 - D. 柴胡、炒白朮、炒白芍、廣陳皮、香附、炙甘草
18. 下列那一個方劑的組成是以《傷寒論》小柴胡湯去柴胡、生薑，加黃連、乾薑而成？
- A. 《傷寒論》半夏瀉心湯
 - B. 《傷寒論》黃連湯
 - C. 《傷寒論》甘草瀉心湯
 - D. 《金匱要略》瀉心湯
19. 《丹溪心法》固經丸之組成，下列何者正確？①龜板、黃柏 ②椿根皮、白芍 ③木香、地黃
- A. 僅①②
 - B. 僅①③
 - C. 僅②③
 - D. ①②③
20. 關於《溫病條辨》安宮牛黃丸、《太平惠民和劑局方》至寶丹、《太平惠民和劑局方》蘇合香丸之比較，下列何者最不適宜？
- A. 皆有冰片
 - B. 皆有雄黃
 - C. 皆有麝香
 - D. 蘇合香丸為溫開，其餘為涼開
21. 關於《景岳全書》柴胡疏肝散之敘述，下列何者錯誤？
- A. 木香、陳皮，理氣行滯
 - B. 柴胡為主藥，疏肝理氣
 - C. 白芍、甘草二藥配伍，養血柔肝，緩急止痛
 - D. 香附、川芎二藥配伍，行氣止痛
22. 《金匱要略》橘皮竹茹湯、《症因脈治》丁香柿蒂散、《傷寒論》旋覆代赭石湯等方劑之比較，下列何者最不適宜？
- A. 皆有胃氣虛之證
 - B. 皆有胃失和降之病機

C.清胃熱可用橘皮竹茹湯

D.溫胃散寒降逆可用丁香柿蒂散、旋覆代赭石湯

23.《醫林改錯》血府逐瘀湯與《醫學發明》復元活血湯之比較，下列何者正確？

A.二者皆含柴胡、當歸

B.二者皆含桃仁、紅花、桔梗

C.復元活血湯以桔梗、枳殼配伍一升一降，開胸行氣，加速瘀血消散

D.血府逐瘀湯以桃仁、紅花、瓜蒌活血化痰止痛

24.22歲女性患者，日前因至餐廳吃到飽，冷飲多喝幾杯後，上腹脹疼痛；經過休息後仍上腹脹滿痛，吃不下，無打嗝，欲嘔無，四肢重倦，口不渴，苔白膩、舌淡紅，脈沉弦。下列何處方治療最適宜？

A.半夏、生薑、黃芩、黃連、甘草、大棗、人參

B.厚朴、陳皮、茯苓、草豆蔻、木香、乾薑、炙甘草

C.柴胡、半夏、生薑、黃芩、人參、甘草、大棗

D.烏藥、沉香、檳榔、人參、香附

25.《良方集腋》良附丸和《內外傷辨惑論》厚朴溫中湯皆常用於脾胃偏寒的腹痛證，下列敘述何者最適宜？

A.厚朴溫中湯中以草豆蔻、木香行氣燥濕以治療脾胃寒濕證

B.良附丸使用附子溫中暖胃止痛

C.厚朴溫中湯中的乾薑以酒洗加強其散寒之作用

D.高良薑與乾薑屬於不同科的植物

26.《攝生秘剖》天王補心丹組方之主（君）藥為何？

A.人參

B.生地黃

C.天門冬

D.酸棗仁

27.關於治風劑，下列組成分析何者錯誤？

A.川芎茶調散為疏散外風之方劑，主治外受風邪之頭痛，以川芎、白芷、羌活為主要藥物

B.雖然都可能會有肢體不利或是面部口眼歪斜，內風導致可用牽正散、大秦芎湯；外風導致可用鎮肝息風湯、天麻鉤藤飲

C.大定風珠用於熱病後期，陰液虧虛導致動風，故以滋陰藥為主要組成

D.鎮肝息風湯其中代赭石、龍骨、龜板皆用生品，不用煅品，期使潛陽力較強

28.關於《溫病條辨》杏蘇散與《太平惠民和劑局方》參蘇飲之比較，下列敘述何者錯誤？

- A.參蘇飲去人參、葛根、木香加杏仁即與杏蘇散組成相同
- B.杏蘇散的功用為清宣涼燥，宣肺化痰；參蘇飲功用為益氣解表，祛痰止咳
- C.兩方均能宣肺解表，但杏蘇散可滋潤肺腎之陰；而參蘇飲則可健脾益氣
- D.杏蘇散中的蘇葉、前胡有解表散邪，微發其汗的作用；參蘇飲中的人參有益氣扶正的作用

29.下列文獻節錄自汪昂《醫方集解》：「此足太陰藥也。脾虛故以白朮、苓、草補之；脾寒故以薑、附、草蔻溫之；脾濕故以大腹、茯苓利之；脾滿故以木香、厚朴導之。木香行氣、平肝、實腸，厚朴散滿、行水、平胃。然土之不足，由於木之有餘，木瓜酸溫，能於土中瀉木，兼能行水，與木香同為平肝之品，使木不剋土而肝和，則土能制水。」，請利用方劑學知識，判斷其所敘述之方劑為何方？

- A.《證治準繩》雞鳴散
- B.《內外傷辨惑論》厚朴溫中湯
- C.《重訂嚴氏濟生方》實脾散
- D.《丹溪心法》胃苓湯

30.有關《太平惠民和劑局方》平胃散的敘述，下列何者錯誤？

- A.《丹溪心法》將本方與五苓散合方，稱之「胃苓湯」
- B.《景岳全書》將本方與小柴胡湯合方，稱之「柴平湯」
- C.《太平惠民和劑局方》不換金正氣散為本方加藿香、茯苓
- D.本方為治濕滯脾胃之主方

31.下列那些為《傷寒論》真武湯之組成？①茯苓、赤芍 ②白芍、人參 ③茯苓、附子 ④白朮、生薑

- A.①②
- B.②③
- C.③④
- D.①④

32.有關《溫病條辨》增液湯的敘述，下列何者最不適宜？

- A.吳瑭認為若熱邪傷津，數日不大便，其人陰素虛，不可行承氣者，宜與本方
- B.《慎齋遺書》百合固金湯方中包含增液湯之所有組成藥物
- C.吳瑭認為本方各藥物需重用才能達到增水行舟的效果
- D.《醫學衷中參西錄》玉液湯方中包含增液湯之所有組成藥物

33.30歲患者，出現脘腹脹滿，噯氣吞酸，口淡無味，不思飲食，噁心嘔吐，肢體沉重，怠惰嗜臥，醫師檢查有腹脹，舌苔白厚膩，脈濡。下列何方治療最適宜？

- A.《丹溪心法》保和丸
- B.《和劑局方》藿香正氣散
- C.《和劑局方》平胃散
- D.《脾胃論引張元素方》枳朮丸
- 34.關於《和劑局方》二陳湯使用，下列何者最不適宜？
- A.因風致痰可加祛風藥
- B.加清熱藥物可用於治療痰熱之證
- C.咳聲濁，痰多氣喘或嘔吐痰涎者，可以宣肺藥物加強之
- D.氣滯而痰阻，可以補氣藥物加強之，如黃耆
- 35.暑天，身熱，口渴不甚，頭目不清，昏眩微脹，舌淡紅苔薄白，治以下列何方最適宜？
- A.《溫病條辨》清絡飲
- B.《內外傷辨惑論》生脈散
- C.《備急千金要方》溫膽湯
- D.《傷寒論》四逆湯
- 36.患者自訴胃脘脹悶，心下痞悶，不欲飲食，倦怠乏力，大便不調，下列何方最適宜？
- A.《傷寒論》大承氣湯
- B.《蘭室秘藏》枳實消痞丸
- C.《儒門事親》木香檳榔丸
- D.《醫方集解》香砂六君子湯
- 37.34歲患者，外感後出現發熱、下利之症狀，胸脘煩熱，口乾，口渴，喘而汗出，舌紅苔黃，脈數。下列何組成最適宜？
- A.葛根、黃芩、黃連、甘草
- B.麻黃、杏仁、石膏、甘草
- C.黃連、黃芩、黃柏、梔子
- D.柴胡、半夏、人參、甘草、黃芩、生薑、大棗
- 38.有關《太平惠民和劑局方》五積散之組成，下列選項何者正確？①麻黃、白芷 ②當歸、白芍、川芎 ③乾薑、肉桂 ④半夏、茯苓 ⑤白朮、厚朴 ⑥枳殼、神麴
- A.①②③④
- B.②③④⑤
- C.①②⑤⑥
- D.①③④⑥

39. 患者夏月身熱汗多，心煩口渴，小便短赤，體倦少氣，精神不振，脈虛數。下列治療何者最適宜？

- A. 《太平惠民和劑局方》香薷散
- B. 《溫熱經緯》清暑益氣湯
- C. 《太平惠民和劑局方》甘露飲
- D. 《傷寒論》小青龍湯

40. 有關《溫病條辨》清絡飲之敘述，下列何者最適宜？

- A. 本方組成有鮮銀花、西瓜翠衣、鮮扁豆花、鮮荷葉、絲瓜皮、鮮竹葉心
- B. 《溫病條辨》以本方用於太陽證後餘邪不解，為善後清理之劑
- C. 主治暑熱傷脾、耗氣傷津之證
- D. 本方諸藥皆辛溫發表之品

41. 祛風濕藥，兼能外用止癢，下列何者最不適宜？

- A. 蠶砂
- B. 海風藤
- C. 海桐皮
- D. 桑寄生

42. 下列何者祛風止痛、止癢，入湯劑最不宜久煎？

- A. 桑枝
- B. 徐長卿
- C. 五加皮
- D. 秦艽

43. 下列能祛風濕止痛，又能利尿消腫的藥中，何者因其毒性，目前不用？

- A. 南五加
- B. 豨薟草
- C. 秦艽
- D. 廣防己

44. 關於肉桂主治應用，下列敘述何者最不適宜？

- A. 命門火衰，體質衰弱、腎陽不足之滑精早泄，腰膝冷痛
- B. 虛陽上浮，面赤咽痛，口舌生瘡，下肢發冷，上熱下寒者，宜大量獨用，引火歸元
- C. 從治目赤腫痛，及脾虛惡食，濕盛泄瀉，補勞明目，通經墮胎
- D. 氣血虛寒之外科疾患，如陰疽流注

45. 有祛痰及散風熱之功效，下列何者最適宜？

- A.前胡
- B.浙貝母
- C.紫菀
- D.紫蘇子

46.夏季預防因脾胃濕濁引起的嘔吐，下列何藥最適宜？

- A.石菖蒲
- B.木瓜
- C.柿蒂
- D.藿香

47.治療胃寒嘔吐，下列何藥物最適宜？

- A.枇杷葉
- B.白豆蔻
- C.蘆根
- D.竹茹

48.停飲出現頭眩、心悸、咳嗽，還覺得心神不寧。下列何藥最適宜？

- A.車前子
- B.石菖蒲
- C.酸棗仁
- D.柏子仁

49.可以用於尿路感染，又可用於婦女瘀滯經閉，下列何藥物最適宜？

- A.海金沙
- B.瞿麥
- C.車前子
- D.金錢草

50.肝氣犯胃，脘脹噯氣，不思飲食等症狀，下列何藥最適宜？

- A.香附
- B.大腹皮
- C.藿香
- D.檳榔

51.玄參的功效，下列何者最不適宜？

A.散無根浮游之火

B.利咽喉

C.通二便

D.軟堅散結

52.關於知母的敘述，下列何者最不適宜？

A.上清肺金而瀉火

B.下潤腎燥而滋陰

C.苦寒傷胃而滑腸

D.補腎故能明目

53.土茯苓主治之敘述，下列何者最適宜？

A.腎虛久瀉及折傷

B.風寒濕痹，陰痿失溺

C.吐、衄、崩中，腸風血痢

D.筋骨拘攣，楊梅瘡毒

54.治熱病心煩，瘡瘍腫毒，涼血解毒，下列何者最適宜？

A.知母

B.梔子

C.金銀花

D.石膏

55.可入丸劑，下列何者最適宜？

A.巴豆

B.甘遂

C.商陸

D.大戟

56.用於氣滯血瘀所致的經閉腹痛及癥瘕積聚等證，而其行氣消積之力較為峻猛，且能止痛，亦可用於飲食不節，脾運失常所致的積滯不化、脘腹脹滿疼痛之證，下列何藥物最適宜？

A.鬱金

B.陳皮

C.莪朮

D.川棟子

57.具有活血調經，祛瘀止痛，涼血消癰，除煩安神的功效，下列何藥物最適宜？

- A.當歸
- B.川芎
- C.丹參
- D.延胡索

58.用於血滯經閉，散瘀止痛；其氣芳香而醒脾開胃，亦具消食化積之功效，下列何藥物最適宜？

- A.萊菔子
- B.琥珀
- C.劉寄奴
- D.佩蘭

59.用於濕熱黃疸，下列何者最不適宜？

- A.秦艽
- B.虎杖
- C.金錢草
- D.益母草

60.能清熱解毒，適用於瘡癰腫毒，用於活血調經，又能治療產後小便不利、水腫，下列何者最適宜？

- A.澤瀉
- B.益母草
- C.丹參
- D.凌霄花

61.用於胃、十二指腸潰瘍出血，白及與下列何藥配伍最適宜？

- A.仙鶴草
- B.茜草
- C.三七
- D.藕節

62.具有潤肺祛痰、緩急止痛、緩和藥性、調和諸藥之功效，下列何藥物最適宜？

- A.黃精
- B.甘草
- C.山藥
- D.阿膠

63.飴糖的功效敘述，下列何者最不適宜？

- A.補脾益氣

B.緩急止痛

C.潤肺止咳

D.滑腸通便

64.百合的應用，下列何者最適宜？

A.風寒咳嗽

B.虛煩失眠

C.脾胃虛寒

D.大便滑泄

65.具有補肝腎、強筋骨、安胎、降血壓之功效，下列何藥物最適宜？

A.鹿茸

B.杜仲

C.巴戟天

D.狗脊

66.有關黃耆的功效敘述，下列何者最不適宜？

A.補氣升陽

B.益衛固表

C.安神增智

D.利水退腫

67.有關鎖陽的功效敘述，下列何者最不適宜？

A.補腎助陽

B.溫肺定喘

C.益精血

D.潤腸通便

68.旋覆花的敘述，下列何者最不適宜？

A.用於虛勞所導致的咳嗽

B.降氣行水化痰

C.有絨毛易刺激咽喉

D.有降氣止嘔作用

69.珍珠的敘述，下列何者最不適宜？

A.苦、鹹，微寒。歸心、肝經

B.安神定驚，清肝明目消翳，解毒收斂生肌

C.外用：研細末，乾撒

D.病不由火熱者，勿用；無邪熱者，勿用

70.下列何藥可平肝潛陽，且具有止嘔、止血等作用？

A.爐甘石

B.天麻

C.代赭石

D.石決明

71.有開竅功效，最宜用於卒然昏迷、癲癇痰盛，關竅阻閉等病證；但有出血傾向者，下列何者最不適宜？

A.皂莢

B.天竹黃

C.枇杷葉

D.半夏

72.治煩躁不安、心悸失眠、頭痛暈眩；亦可以治胃痛泛酸，下列何者最適宜？

A.烏賊骨

B.珍珠

C.龜板

D.牡蠣

73.能開竅醒腦，且可治咽喉腫痛及口瘡，下列何者最適宜？

A.石菖蒲

B.蘇合香

C.冰片

D.乳香

74.性味：辛、苦，溫。具驅蟲、健胃、利尿消腫之功效，下列何藥物最適宜？

A.鴉膽子

B.苦楝皮

C.檳榔

D.蕪荑

75.具瀉腸止瀉、止血、驅蟲之功能，浸水時其汁黑如墨，下列何藥物最適宜？

A.禹餘糧

- B.訶子
- C.椿皮
- D.石榴皮

76.下列何藥除了具有消食化積的功效，亦可搭配當歸、川芎、益母草等藥應用於產後瘀阻腹痛，惡露不盡或血滯痛經，有活血散瘀的功效？

- A.山楂
- B.神麴
- C.麥芽
- D.雞內金

77.有關桑螵蛸和海螵蛸，下列何者最不適宜？

- A.兩者均有固澀作用，常用於遺尿、尿頻
- B.前者可用於腎虛陽衰的遺精、滑精
- C.後者可用於胃痛吐酸
- D.兩者均不適用於陰虛有熱者

78.雄黃之主治，下列何者最適宜？

- A.血虛眩暈
- B.噎膈癥瘕
- C.驚癇痰涎
- D.陽盛陰虧

79.有關鹿茸及相關藥材的敘述，下列何者最不適宜？

- A.鹿角膠為鹿角熬膏後所存殘渣
- B.功效為壯腎陽，益精血，強筋骨，調衝任，托瘡毒
- C.可用於瘡瘍久潰不斂、陰疽內陷不起等證
- D.不宜驟用大量，以免陽升風動，頭暈目赤或傷陰動血

80.下列敘述，何者最不適宜？

- A.蘇合香為金縷梅科植物蘇合香樹的心材
- B.降香有散瘀、止血、定痛之功
- C.甘松香能芳香健胃、開鬱醒脾
- D.丁香為溫中降逆之要藥