

115 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：1318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 依《傷寒論·辨瘥後勞復食復陰陽易病脈證并治》所述，患者大病剛痊癒，喜唾，久不了了，診斷為胸上有寒。最可能是疾病後或治療造成那個臟腑損傷？
 - A. 心
 - B. 肺脾
 - C. 腎
 - D. 三焦
2. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述，太陽病下之後的變證治療，下列何者錯誤？
 - A. 傷寒，醫下之，後身疼痛，清便自調者，宜桂枝湯
 - B. 下後，若汗出而喘，無大熱者，可與麻黃杏仁甘草石膏湯
 - C. 桂枝證，反下之，痢遂不止，脈促，喘而汗出，葛根黃芩黃連湯主之
 - D. 傷寒，醫下之，續得下痢清穀不止，身疼痛者，理中湯主之
3. 依《傷寒論》，有關三物白散證治之敘述，下列何者錯誤？
 - A. 可治寒實結胸
 - B. 病在膈上必吐
 - C. 巴豆生用
 - D. 病在膈下必痢，不痢，進熱粥一杯
4. 依《傷寒論》，有關桃核承氣湯之敘述，下列何者最不適當？
 - A. 熱結膀胱
 - B. 食後冷服
 - C. 其人如狂
 - D. 少腹急結
5. 依《傷寒論》，有關麻黃湯治喘的病因病機，下列何者最適當？
 - A. 寒邪犯肺，肺氣失宣

- B.下後表邪不解，肺氣上逆
- C.太陽病誤下，表裏邪熱迫肺，肺氣不利
- D.傷寒表不解，水飲內停，上逆於肺
- 6.依《傷寒論》所述：「發汗，病不解，反惡寒者，虛故也」，治以下列何方最適當？
- A.甘草乾薑湯
- B.茯苓四逆湯
- C.芍藥甘草附子湯
- D.桂枝去芍藥加附子湯
- 7.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》，服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，下列何方治療最適當？
- A.白虎湯
- B.桂枝附子湯
- C.桂枝加葛根湯
- D.桂枝湯
- 8.大柴胡湯由小柴胡湯去人參、甘草加減所組成，下列何者正確？
- A.加茯苓、枳實、大黃
- B.加白朮、枳實、大黃
- C.加乾薑、枳實、大黃
- D.加芍藥、枳實、大黃
- 9.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：柴胡加龍骨牡蠣湯組成及加減法之敘述，下列何者錯誤？
- A.桂枝通陽和表
- B.大黃瀉熱清裏
- C.甘草緩中，協和諸藥
- D.茯苓寧心安神
- 10.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述，陽明病發黃的治療，下列何者錯誤？
- A.傷寒七八日，身黃如橘子色，小便不利，腹微滿者，茵陳蒿湯主之
- B.傷寒，瘀熱在裏，身必黃，麻黃連軹赤小豆湯主之
- C.陽明病，發熱，但頭汗出，身無汗，劑頸而還，小便不利，渴引水漿，此為瘀熱在裏，身必發黃，抵當湯主之
- D.傷寒，身黃，發熱者，梔子柏皮湯主之

11. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述：「傷寒吐後，腹脹滿者，與調胃承氣湯」，遵原意該方如何服用比較合適？
- A. 白飲和方寸匕服之，日三服。多飲暖水，汗出愈
 - B. 稍稍溫服之
 - C. 平旦服。得快下痢後，糜粥自養
 - D. 溫頓服之，一宿乃下，如不下，更服，取下為效
12. 依《傷寒論》所述：「陽明病，若能食，名中風」，若不能食，則為下列何病？
- A. 除中
 - B. 蓄血
 - C. 瘀熱
 - D. 中寒
13. 依《傷寒論·少陽病篇》所述，傷寒四五日，出現三陽證，下列敘述何者錯誤？
- A. 太陽證為身熱惡風
 - B. 少陽證為脇下滿
 - C. 陽明證為大便難
 - D. 三陽證見，主用小柴胡湯
14. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：乾嘔，吐涎沫，頭痛者，治以下列何方最適宜？
- A. 柴胡桂枝湯
 - B. 桂枝人參湯
 - C. 當歸四逆加吳茱萸生薑湯
 - D. 吳茱萸湯
15. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：熱痢下重者，白頭翁湯主之。下列何藥並非白頭翁湯之組成？
- A. 秦皮
 - B. 黃芩
 - C. 黃連
 - D. 黃柏
16. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述，關於少陰病的治療，下列何者錯誤？
- A. 飲食入口即吐，心中溫溫欲吐，復不能吐，始得之，手足寒，脈弦遲者，當下之，宜桃花湯
 - B. 膈上有寒飲，乾嘔者，當溫之，宜四逆湯
 - C. 下痢，脈微者，與白通湯

D.吐痢，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之

17.依《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七》，關於肺痿的病機與證治，下列何者錯誤？

A.熱在上焦者，因咳為肺痿。重亡津液故，百合固金湯

B.寸口脈數，其人咳，口中反有濁唾涎沫者，為肺痿之病

C.肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遺尿，小便數，以上虛不能制下也

D.肺痿吐涎沫而不咳，其人不渴者，此為肺中冷，射干麻黃湯主之

18.依《金匱要略·腹滿寒疝宿食病脈證治第十》，使用大承氣湯的時機，下列何者最不適宜？

A.腹滿不減，減不足言

B.痛而閉者

C.下痢不欲食者，有宿食

D.脈數而滑，有宿食

19.依《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證并治第十二》，關於治眩的敘述，下列何者錯誤？

A.心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，苓桂朮甘湯主之

B.卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，己椒藶黃圓主之

C.心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之

D.瘦人臍下有悸，吐涎沫而癲眩，五苓散主之

20.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》所述，關於風濕病治療，下列何者錯誤？

A.病者一身盡疼，發熱，日晡所劇者，名風濕，可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

B.風濕，脈沉，身重，汗出不惡風者，防己黃耆湯主之

C.傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，大便堅，小便自利者，白朮附子湯主之

D.風濕相搏，骨節疼煩掣痛，不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，甘草附子湯主之

21.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，關於太陽中暈敘述，下列何者錯誤？

A.發熱惡寒，身重而疼痛，其脈弦細芤遲，小便已，洒洒然毛聳，數下之則淋甚

B.汗出惡寒，身熱而渴，白虎湯主之

C.身熱疼重，而脈微弱，一物瓜蒂湯主之

D.加溫鍼則發熱甚

22.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》：小便不利者，有水氣，其人若渴，下列何方主之？

A.豬苓湯

B.文蛤散

C.茯苓戎鹽湯

D. 枳實瞿麥丸

23. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注·嘔吐噦下痢》，下列敘述何者錯誤？

A. 乾嘔，吐逆，吐涎沫，理中湯主之

B. 食已即吐者，大黃甘草湯主之

C. 胃反嘔吐者，大半夏湯主之

D. 嘔而發熱者，小柴胡湯主之

24. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》條文與註解，關於黃疸病的敘述何者錯誤？

A. 趺陽脈數，是熱甚於濕，則從胃，消穀、能食，屬陽黃

B. 趺陽脈緊，是濕甚於熱，則從脾，食即滿、不能食，屬陰黃

C. 酒疸為病：心中懊憹而熱不能食，時欲吐，故屬陰黃，脈浮者，先吐之；沉弦者，先下之

D. 穀疸為病：寒熱不食，食穀即頭眩，穀氣不消，心胸不安，胃中苦濁，茵陳蒿湯主之

25. 依《金匱要略》所述，關於腸癰的治療，下列何者錯誤？

A. 其身甲錯，腹皮急，按之濡，如腫狀，腹無積聚，身無熱，脈數，薏苡附子敗醬散主之

B. 少腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，時時發熱，自汗出，復惡寒，其脈遲緊者，膿未成，不可下也

C. 脈洪數者，膿已成，不可下也

D. 腸癰可下之證，大黃牡丹湯主之

26. 依《金匱要略》所述，關於嘔的治療，下列何者錯誤？

A. 乾嘔，吐涎沫，頭痛者，茱萸湯主之

B. 嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之

C. 乾嘔而痢者，黃芩加半夏生薑湯主之

D. 嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者，四逆散主之

27. 依《金匱要略》所述，關於下痢的治療，下列何者錯誤？

A. 下痢腹脹滿，身體疼痛者，先攻其表，乃溫其裏，溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯

B. 下痢譫語者，有燥屎也，小承氣湯主之

C. 下痢清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之

D. 下痢後更煩，按之心下濡者，為虛煩也，梔子豉湯主之

28. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注·婦人雜病》所述：「婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者」，下列敘述何者最適當？

A. 此名轉胎

B. 不得溺

C.發汗則癒

D.桂枝湯主之

29.溫病中，著重在舌苔的辨證，患者表現為舌苔滑膩如積粉而舌質紫絳，下列敘述何者最正確？

A.氣分濕邪未化而胃津已傷

B.濕熱疫邪初入膜原未歸胃腑

C.素體陰虧而外感風熱者最易見到

D.胃中濕濁鬱伏及宿滯

30.溫病中講求脈證合參，在脈象上的表現，有時跟疾病的深淺有所相關，下列敘述何者最正確？

A.病後胃氣未復，脈多弦細而緩

B.脈弦勁而數，為濕邪偏重

C.脈沉細而澀，真陰耗損

D.脈濡緩而小，為腑實未除而津液虧虛

31.吳小姐感冒出現發燒、鼻水、乾咳等現象，服用西藥 3 日後開始出現全身無力及視覺模糊，至急診就醫後轉為意識不清及癲癇大發作，並發現血小板低於 $50,000/\mu\text{L}$ ，因此轉入加護病房住院治療。依據溫病的病機與相關治療，下列何者最正確？

A.屬於氣分大熱之證

B.因熱傷營血導致血小板下降，可能有出血風險，當以清營涼血法治之

C.因痰熱動風而出現癲癇，當以豁痰法治之

D.經治療後出院，當以調補氣血之法調理

32.「邪在氣分證」，下列何者最適宜？

A.氣分證屬於八綱中的表、熱、實證

B.臨床表現以發熱較高而不惡寒、口渴明顯、苔黃等為特徵

C.病理變化涉及內臟器官較多，如肺、胃、腸、膽、膜原等

D.治法可用清熱、吐下、和解、化濕等法

33.滋陰法之功能為滋補真陰、壯水增液。其藥理作用，下列何者最有可能？

A.增加胃腸蠕動、改進腸管血液循環和降低毛細血管通透性以及抑菌消炎、排除毒素等作用

B.興奮大腦皮質以蘇醒神志及鎮靜、止癢等作用

C.具有調節體液代謝，調整神經功能以及滋養強壯等方面的作用

D.具有抗感染、調整胃腸功能、利尿等作用

34.下列醫家何者最早以「衛氣營血」的完整概念為溫病進行辨證論治？

A. 吳又可

B. 葉天士

C. 吳鞠通

D. 王孟英

35. 黃小姐過年從上海工作返臺過節，回臺後發燒口渴，喜喝冷飲，飲水後又容易嘔吐，胸脘痞滿，按之疼痛，便秘但腹部無硬痛，舌苔黃滑，脈洪滑，治療以下列何方藥最適宜？

A. 麻黃，杏仁，石膏，甘草

B. 黃連，枳實，枳實，半夏

C. 杏仁，連翹，薄荷，桑葉，菊花，苦桔梗，生甘草，葦根

D. 生石膏，生大黃，杏仁，枳實皮

36. 戴小姐寒假全家出遊返家後出現身熱不甚，乾咳痰少而黏，口乾口渴，舌紅少苔，脈細，治療以下列何方藥最為合適？

A. 連翹，銀花，桔梗，薄荷，竹葉，甘草，荊芥穗，牛蒡子，淡豆豉，玄參

B. 麻黃，杏仁，石膏，甘草

C. 沙參，玉竹，甘草，桑葉，麥冬，扁豆，天花粉

D. 竹葉，石膏，半夏，人參，甘草，粳米

37. 夏月感邪患者症見惡熱心煩，頭痛且暈，面赤氣粗，口燥渴飲，汗多，背微惡寒，脈洪大而芤，用下列何方劑治療最適宜？

A. 白虎加人參湯

B. 王氏清暑益氣湯

C. 連梅湯

D. 新加香薷飲

38. 有關暑瘵的證候與治療，下列何者正確？

A. 其證候為驟然吐血、衄血，頭目不清，煩熱口渴，咳嗽氣喘，脈象浮取則空，中取則洪，沉取復有

B. 如初起體實者，可用雷氏卻暑調元法去半夏、粳米、加鮮生地、鮮石斛、鮮藕節、丹皮、旱蓮草

C. 體虛者，可用雷氏清宣金臟法加苦芩、黑梔

D. 如屬暑濕傷肺者，可用清絡飲加杏仁苡仁滑石湯

39. 關於吳又可對溫疫病的病機特點，下列敘述何者錯誤？

A. 指出：「氣屬陽而輕清，血屬陰而重濁」

B. 立氣分、血分以區別之，邪在氣分則易疏透，邪在血分恆多膠滯

C.傷寒通過發表而從汗解；溫疫通過自汗而頓解

D.邪在氣分病情好轉勝於在血分

40.依余師愚《疫病篇》所述，證見頭面頸喉諸腫辨治，下列敘述何者錯誤？

A.頭面腫大，此毒火上攻

B.唇腫灼熱色焦紅，此為脾胃熱灼，火邪上炎

C.熱毒入於少陽則頸腫

D.腮者肝腎所屬，不亟清解，必成大頭瘟

41.濕溫病係濕熱為患，病勢纏綿難解，若患者中氣實者，其病候特點，下列何者錯誤？

A.病多在胃，而為熱重於濕

B.口渴但不欲多飲

C.舌苔白膩甚或乾燥，脈象弦數

D.胸痞嘔惡，心煩溲赤，便秘或溏而不爽

42.關於秋燥病邪性質，有溫燥與涼燥之別，下列何者錯誤？

A.秋深初涼屬於涼燥

B.秋陽以曝屬於溫燥

C.西風肅殺屬於溫燥

D.久晴無雨屬於溫燥

43.下列關於「伏暑」之敘述何者正確？

A.較多發於秋冬的一種慢性熱病

B.宋《和劑局方》首載「伏暑」之名，但其所指係指病因而非病名

C.本病常因當令新邪而誘發，故歸類於新感溫病

D.本病屬溫熱類溫病，治療上與風溫有許多相似處

44.有關溫毒之敘述，下列何者錯誤？

A.是溫熱時毒疾患的總稱

B.多發生於夏季

C.具有一般外感見證

D.易合併出現局部紅腫熱痛，甚則潰爛等證

45.52 歲男性，發病前 3 日出現畏冷、頭痛、打噴嚏流鼻水等症狀，至診所就醫。雖有開立藥物治療，後續卻出現發燒攝氏 39 度、惡寒、咳嗽、胸悶痛、咳出鐵銹色痰等症狀，而被送至急診，胸部 X 光檢查發現右肺下葉片狀浸潤。望之苔薄黃，診之脈數。病人急診時的臨床辨證以下列何者最適宜？

- A.風寒外束，營衛失調
- B.風寒外束，痰熱壅肺
- C.風寒外束，痰飲
- D.風寒外束，溢飲

46.中醫在診斷上重視人體稟賦的強弱，關於稟賦強弱與疾病關係的敘述，下列何者最不適宜？

- A.病因相同者，其病變的發展不一定相同
- B.正強邪盛之人，發病多形成實證
- C.陰虛人患傷寒，多從陽化熱，化熱入裏循三陽經次第相傳
- D.陽虛人患傷寒，易從陰化寒，其發展較慢

47.嘔吐是胃氣上逆所致，不同病因之嘔吐物的形色質量有所不同，關於嘔吐物的敘述，下列何者最不適宜？

- A.清稀無臭多為寒嘔
- B.穢濁酸臭多為熱嘔
- C.黃綠苦水多為肝膽濕熱
- D.夾雜食物多為脾虛

48.有關「纏腰火丹」的敘述，下列何者最不適宜？

- A.常發於腰部
- B.常發於脅部
- C.多與肝火有關
- D.多為脾虛濕蘊皮膚而發

49.舌診中由於蕈狀乳頭增生或肥大所形成的舌象，下列何者最不適宜？

- A.點刺舌
- B.白星舌
- C.黑苔舌
- D.覆盆子舌

50.舌診中，紫舌在臨床上所代表的意義，下列敘述何者最不適宜？

- A.熱毒內蘊
- B.氣血兩虛
- C.寒邪直中
- D.酒毒

51.關於嘔吐的型態與證型，下列敘述何者最不適宜？

- A.吐勢較猛，聲音壯厲，吐出黏稠物，多為實熱
- B.吐勢徐緩，聲音微弱，吐出清稀液，多屬虛寒
- C.熱擾神明可出現噴射狀嘔吐
- D.食滯胃脘通常吐出物清淡無味
- 52.一位 35 歲女性主訴大便 2~3 日一行，問診發現她的糞便溏狀不成形，質黏，腹脹，先腹痛後排便，排出時不暢，散發出一股惡臭味。下列辨證何者最適宜？
- A.脾陽不振
- B.腎虛瀉泄
- C.脾虛寒濕
- D.氣滯濕熱
- 53.虛里為諸脈所宗，關於虛里之切診，下列敘述何者最不適宜？
- A.虛里動而應衣，為宗氣平和之象
- B.孕婦胎前出現虛里按之彈手，洪大而搏，當警惕為危重證候
- C.虛里按之動微而不顯，是宗氣內虛
- D.運動後虛里脈動劇烈，靜息後平復如常，屬正常現象
- 54.有關脈象的敘述，下列何者最適宜？
- A.一息四至，來去怠緩是遲脈的特徵
- B.脈來急疾，一息七至八至是動脈的特徵
- C.脈來急數而時一止，止無定數是疾脈的特徵
- D.脈來緩慢而時一止，止有定數，不能自還，是代脈的特徵
- 55.關於「血分證」中血分實熱之敘述，下列何者最不適宜？
- A.血熱迫血妄行而出血
- B.熱邪深入，引起耗血動血之變
- C.病機為氣不攝血
- D.出血常伴見紅絳舌
- 56.臨床上「鬱火」常由寒邪外束、加上痰濕互結所致，治療時不可純用寒涼清熱之劑，應掌握「火鬱發之」之大原則審慎用藥。以下各種治法與藥物，何者最不適宜？
- A.以蔥白、豆豉、薄荷、蟬衣等藥以「透達」
- B.以升麻、葛根、柴胡、羌活等藥以「升散」
- C.以麻黃、桂枝、荊芥、防風等藥以「溫通」

D.用杏仁、薏仁、橘皮、桔梗等藥以「開痰濕」

57.下列何者均可出現在陽明病與太陰病？ ①腹滿 ②腹痛 ③自利 ④口渴

A.僅①

B.僅①②

C.僅①③

D.①②③④

58.某 35 歲女性患者，因躁鬱症住院療養，主訴頭暈想吐，吃不太下，煩躁不安，口乾口苦，咽喉乾燥，左脇肋部位有明顯壓痛但無外傷史，舌苔薄黃，脈診為弦緊，其辨證以下列何者最適宜？

A.厥陰病證

B.少陰病熱化證

C.太陽中風證

D.少陽病證

59.臨床一患者就診時表現出脘腹墜脹感，食後尤甚，便溏肢倦，食少懶言，面色萎黃，下列診斷何者最適宜？

A.脾氣虛

B.脾腎陽虛

C.脾氣下陷

D.寒濕困脾

60.一高血壓患者，就診時表現為眩暈耳鳴，頭目脹痛，面紅目赤，失眠多夢，腰膝痠軟，舌紅，脈弦等表現，下列敘述何者最適宜？

A.肝火上炎

B.肝陽上亢

C.肝風內動

D.肝氣鬱結

61.關於淋證的預防與護理，下列敘述何者最不適當？

A.注意妊娠及產後衛生，對防止子淋的發生有重要意義

B.淋證應多喝水，飲食宜清淡，忌肥膩香燥、辛辣之品

C.積極治療消渴、癆瘵等腎虛疾患，多用導尿器械幫助排尿

D.淋證患者排尿疼痛，平時不該忍尿

62.48 歲男性，主訴尿血併小便頻數，納呆，神疲，便溏，面色萎黃，頭暈耳鳴，腰膝痠軟，舌質淡，脈細弱。治以下列何方最適宜？

A.小薊飲子

B.無比山藥丸

C.知柏地黃丸

D.加味逍遙散

63.有關癰閉的敘述，下列何者最適當？

A.若小便涓滴不利，兼見口渴欲飲、咽乾、氣促者，為熱壅於心

B.若尿線變細，時而通暢，時而不通，為腎虛命門火衰

C.若小便不利兼有小腹重脹下墜，為尿路阻塞

D.若小便不通或不爽，兼見脅腹脹滿者，為肝鬱氣滯

64.下列何者是「皮癢」的主要病因？

A.肝腎虧損

B.肺熱葉焦

C.濕熱浸淫

D.脾胃虧虛

65.唐·孫思邈《千金要方·論雜風狀第一》指出中風大法之風懿者，下列何者最適合？

A.半身不遂

B.身無痛，四肢不收

C.奄忽不知人

D.諸痺類風狀

66.30 歲男性，西醫診斷為思覺失調症，性情急躁，頭痛，面紅目赤，便秘尿赤，舌紅，苔黃厚膩，脈弦實。有關其診斷及治法之配對，下列何者最適當？

A.狂症；滋陰降火，安神定志

B.狂症；鎮心滌痰，清肝瀉火

C.癲症；理氣解鬱，化痰開竅

D.癲症；健脾益氣，養心安神

67.40 歲女性，無外傷史，主訴脅肋隱痛，勞動後加重，口乾咽燥，心中煩熱，頭暈目眩，舌紅少苔，脈細弦數。治以下列何方藥最適合？

A.旋覆花、蔥白、歸尾、桃仁、鬱金、延胡索

B.柴胡、陳皮、川芎、香附、枳殼、芍藥、甘草

C.人參、黃耆、白朮、茯苓、當歸、酸棗仁、桂圓、遠志、木香、甘草、生薑、大棗

D.北沙參、麥冬、當歸、生地黃、枸杞、川楝子

68. 45 歲男性，就醫時症見全身皮膚黃、鞏膜色黃，口渴，噁心嘔吐，便秘，小便量少，小便色黃赤，舌紅，苔黃膩，脈弦數。下列敘述何者最不適宜？
- A. 辨證為熱重於濕
 - B. 病機為濕熱薰蒸，膽汁外溢
 - C. 治則為清熱利濕，佐以瀉下
 - D. 處方為犀角散
69. 50 歲女性，失眠一年，急躁易怒，目赤耳鳴，帶下黃臭，小便可，舌紅，苔黃膩，脈弦數。治以下列何方藥最適宜？
- A. 生地、木通、甘草梢、竹葉
 - B. 黃連、阿膠、黃芩、白芍、雞子黃
 - C. 龍膽草、黃芩、梔子、澤瀉、木通、車前子、當歸、生地、柴胡、甘草
 - D. 知母、黃柏、生地、山萸肉、山藥、澤瀉、牡丹皮、茯苓
70. 45 歲女性，診斷為二尖瓣膜脫垂，長期頭暈，主訴胸悶心悸，氣短自汗，評估發現面色不華，脈細數。治以下列何方藥最適合？
- A. 桃仁、紅花、當歸、地黃、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳殼、甘草
 - B. 桂枝、甘草、龍骨、牡蠣、人參、附子
 - C. 桂枝、甘草、生薑、人參、地黃、阿膠、麥冬、麻仁、大棗
 - D. 地黃、山萸肉、山藥、澤瀉、丹皮、茯苓
71. 88 歲李爺爺，罹患巴金森症行動日益困難，平時面色蒼白，吞嚥功能逐漸退化，進食常噎咳，食量少、消化慢。其便秘近三年漸漸加重，腹中冷痛，小便清長，腰膝痠冷，四肢不溫。舌淡紅、苔薄白、脈沉遲。治以下列何方藥最適合？
- A. 黃耆、陳皮、火麻仁、白蜜
 - B. 沉香、木香、檳榔、烏藥、枳實、大黃
 - C. 杏仁、火麻仁、枳實、厚朴、大黃、芍藥、白蜜
 - D. 大黃、附子、乾薑、甘草、桔梗
72. 32 歲唐先生，體型瘦，上腹部隱隱作痛已數個月，局部揉按、熱敷較適，吃東西後較舒服，但平時消化慢，三餐均不易有飢餓感，偶爾嘔吐清水，四肢無力、冰涼，神色疲倦，舌淡紅，脈弱。治以下列何方最適合？
- A. 良附丸
 - B. 參苓白朮散
 - C. 黃耆建中湯合理中湯
 - D. 丁香散

73. 39 歲黃先生，昨天剛由高海拔登山攻頂之旅返家，山上氣候濕冷。今日腹痛暴作，蓋羽絨被、用暖暖包可減輕腹痛，離開保暖衣被腹痛加劇，腹部蜷縮較適。便秘、口不渴。舌淡紫、脈沉弦。治以下列何方藥最適合？

- A. 乾薑、紫蘇葉、烏藥、香附、陳皮
- B. 人參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、半夏、砂仁、木香、生薑
- C. 小茴香、乾薑、延胡索、沒藥、當歸、川芎、肉桂、赤芍、蒲黃、五靈脂
- D. 桂枝、白芍、飴糖、生薑、大棗、甘草

74. 82 歲謝先生，大便稀水易發已半年，上週在浴室滑倒後隔日，大便稀水色黑至今已 9 天，6 日前西醫就診後，近 3 日大便仍溏薄，色由紫黯漸轉為深褐。今日就醫主訴腹部隱隱作痛，吃溫熱米湯較適，面色蒼白，體力虛弱。舌質淡，脈細。治以下列何方最適合？

- A. 歸脾湯
- B. 黃土湯
- C. 槐花散
- D. 參苓白朮散

75. 有關哮喘的治法，提出「未發以扶正氣為主，既發以攻邪氣為急」治療原則的醫家為下列何者？

- A. 朱丹溪
- B. 許叔微
- C. 李用粹
- D. 戴元禮

76. 45 歲朱小姐，長年咳嗽病史，近日咳嗽痰少，痰中帶血，血色鮮紅，口乾咽燥，潮熱顴紅，盜汗，舌紅，脈細數。治以下列何方藥最適合？

- A. 沙參、麥冬、玉竹、甘草、桑葉、天花粉、扁豆、桑白皮、地骨皮、甘草、粳米
- B. 桑葉、杏仁、貝母、南沙參、梨皮、山梔、豆豉
- C. 桑白皮、地骨皮、甘草、粳米、青黛、海蛤粉
- D. 百合、麥冬、玄參、生地、熟地、當歸、白芍、貝母、桔梗、甘草、白芨、藕節、茜草、阿膠

77. 有關主要辨別風寒感冒與風熱感冒的依據，下列何者最不適當？

- A. 惡寒發熱的輕重
- B. 舌苔白或微黃
- C. 脈象浮與不浮
- D. 咽喉腫痛與否

78. 80 歲女性，患氣喘多年，合併心臟衰竭病史，近日喘促，動則喘甚，呼多吸少，氣不得續，咳痰無力，形瘦神疲，腳踝腫，汗出肢冷，面青唇紫，舌紅少津苔白，脈細弱。治以下列何方最適合？

- A. 六君子湯加減
- B. 桂枝加黃耆湯合生脈散加減
- C. 生脈散合補肺湯加減
- D. 金匱腎氣丸合參蛤散加減

79. 68 歲女性，因與家人爭吵後，突覺咽喉有異物感，咳不出，也吞不下，伴有胸脅悶脹，舌淡紅苔白膩偏厚，脈弦滑。治以下列何方最適合？

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹梔逍遙散
- C. 半夏厚朴湯
- D. 甘麥大棗湯

80. 有關汗證的敘述，下列何者最不適當？

- A. 《素問·宣明五氣論》提出五臟化液，心為汗
- B. 戰汗多見於虛人外感，而黃汗多屬濕熱
- C. 《千金要方》中提及牡蠣散自謂「止汗之驗無出於此方」
- D. 盜汗為陰虛，自汗為陽虛，雖是症狀，在疾病過程中不會伴見