

115 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 林先生日前發現右大趾生起黃泡一粒，周圍皮色焮紅，漸漸疼痛，繼發紅紫為黑腐，迅速蔓延，痛亦隨增，其痛徹骨，如湯之潑，如火之燒，接著乾黑侵腐至筋斷。根據上述病況，下列敘述何者錯誤？
 - A. 診斷應為脫疽
 - B. 初起宜服「解毒濟生湯」
 - C. 消之不應者，必施割法。且乘其未及延散時，宜早施行
 - D. 若割切之後，黑氣自退者，屬逆
2. 蛤蟆瘟，發熱、口渴、溲赤、舌微黃、脈浮數。除內服方劑治療之外，最宜以下列何藥用蜂蜜調敷？
 - A. 敗銅散
 - B. 九一丹
 - C. 陰毒內消散
 - D. 如意金黃散
3. 有關腫的辨證，下列敘述何者錯誤？
 - A. 漫腫，腫勢平坦、根盤散漫，為虛腫
 - B. 腫而色紅、皮薄光澤，焮熱疼痛，為風腫
 - C. 堅硬如石、或邊緣起稜角，或現青筋，為鬱腫
 - D. 腫而木硬、皮色不澤，不紅不熱，為寒腫
4. 依《中醫外科講義》關於辨痛之吉凶，下列何者最不適當？
 - A. 腫瘍若知痛比不痛為吉
 - B. 潰瘍若見膿出痛減為吉
 - C. 腫勢漫延而痛在一處為吉
 - D. 重按至骨節間方痛者為吉
5. 有關疽的部位，下列敘述何者錯誤？
 - A. 蠹疽，一名缺盆疽，又名鎖骨疽
 - B. 上搭手，亦名龍疽，位於膏肓穴

C.上發背，生天柱下，一名脾肚發

D.銳毒，生於右耳後一寸三分高骨之後

6.根據《中醫外科講義》關於大麻風的敘述，下列何者錯誤？

A.古名癘風，起因為天地癘氣，感受不覺，未經發泄，積久而發

B.表現為遍身麻木，次起白屑紅斑，蔓延如癰，形若蛇皮，脫落成片

C.所謂五死證表示敗惡不治之候

D.風毒入裏，化生為蟲，蟲蝕五臟，則形有五損，亦代表病情演變順序性

7.9歲張小妹妹，長期在兩腿彎、腳彎，或兩臂彎等處出現皮疹，形如風癬，其癢無度。根據《中醫外科講義》，下列敘述何者錯誤？

A.此為四彎風

B.若搔破津水，則又似濕癬

C.治宜大麥熬湯薰洗，次擦三妙散，緩緩取效

D.皮膚過於堅牢而諸藥不應者，可用萬應膏日擦數次，不可間斷

8.50歲男性工人，在工地跌倒受傷，右小腿有一傷口多月未癒合，現呈紫紅色瘡瘍，會流膿水，味臭，痛癢時作，依《中醫外科講義》，下列何者錯誤？

A.診斷為爛腿

B.辨證為濕熱下注

C.外用枯礬散

D.內服三妙散加減

9.長期在冷凍庫工作的張先生，有次工作時忘記戴手套，手指關節有一紅腫硬塊，感覺麻木，熱敷則舒緩，平素容易手腳冰冷，舌淡而黯，苔白，脈沉細。依《中醫外科講義》，下列何項為適宜的治療方式？①內服人參養榮湯 ②內服四妙勇安湯 ③外用可以「陽和解凝膏」蓋貼 ④受凍後應立即用火烘燙

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

10.某皮膚病，好發於肥胖病人的項後髮際，肉厚而多折紋，致病多因其髮反刺瘡內，因循日久不癒，又兼受風寒凝結，形如臥瓜，破爛津水，時破時斂，經年不癒。依《中醫外科講義》的敘述，下列何者是此病的診斷病名？

A.髮際瘡

B.燕窩瘡

C.牛皮癬

D.痘風瘡

11.依《中醫外科講義》所述，皮膚病的臨床表現是生於臀腿之間，初起形如黍豆，色紅作癢，甚則焮痛，延及谷道，勢如火燎，下列何項中醫病名最不適宜？

A.瘰癧

B.猴疳

C.風疳

D.臁瘡

12.有關肛門瘻管的分類，不包括下列那一類？

A.單純性肛瘻

B.複雜性肛瘻

C.暫時性肛瘻

D.馬蹄形肛瘻

13.依據《中醫外科講義》，便毒的外用藥方不包括下列那一項？

A.琥珀膏

B.萬應膏

C.鵝黃散

D.五虎丹

14.下列何者不是疔瘡的患處歸經？

A.肝

B.任

C.督

D.腎

15.根據《中醫外科講義》關於肺癰的敘述，下列何者最不適當？

A.指肺葉生瘡而成的膿瘍，近似於現代醫學描述的「肺膿腫」

B.本病主因於肺癆久嗽，虛熱內灼，耗傷陰津，蘊而成膿所致

C.成癰期表現為但熱不寒，咳逆上氣，甚而喘滿，胸悶疼痛，咳吐膿痰，腥臭帶血

D.多屬實熱之證，成癰期以清熱解毒，化瘀消癰為主，可用千金葦莖湯加減

16.疔瘡症候大抵可分輕重、順逆，下列敘述何者最不適當？

A.發於頭面以腫小疼痛，發於手足以初見白頭或水泡者屬輕候

B.初起瘡軟散漫，並向四周走散，或瘡色灰暗四邊平塌者皆屬重證

C.生於手足，若只癢不痛，釀膿破潰後末梢涼冷者，屬順證

D.未見疔而先有寒熱如瘧，噁心不食，然後瘡起軟綿，刺之不痛，為逆證

17.門診有位患者皮膚目前出現疙瘩滋生，搔癢流水為主的症狀。根據《中醫外科講義》諸多風病之中，下列敘述何者錯誤？

A.此屬風濕為病的表現

B.病灶可能蔓延增竄，病情纏綿不休

C.可用五苓散加減內服

D.外用可以豬脂塗之

18.根據《中醫外科講義》關於實證鶴膝風的敘述，下列何者錯誤？

A.由驟感風寒濕邪而成

B.初起膝中疼痛，數日後腿足不能屈伸，膝部周圍皆腫

C.有惡寒發熱等症，繼則膝部皮色微紅，焮熱光亮

D.宜用芙蓉葉、菊花葉研末，大麥米飯拌勻貼之

19.疥瘡，是透過接觸傳染而致的皮膚病，依據《中醫外科講義》對本病的臨床表現與預防治療，下列敘述何者錯誤？

A.疥蟲之蟲卵與毒液，可引起皮膚產生針頭狀或米粒狀水泡，泡液少而壁厚者可結痂而成「乾疥」，屬肺經濕盛

B.抓破後遭其他病原感染者，可生膿泡，俗稱「膿疥」，屬脾經濕熱

C.硫黃，為古今治療疥瘡的常用外用藥

D.染疥後，除病人須注意隔離與殺疥治療之外，病人的衣服與被褥均需陽光曝曬或充分消毒

20.林小姐全身皮損反覆發作多年，波及關節或指甲，初起形如疹疥，色赤而癢，搔起白皮，現皮損肥厚浸潤，顏色黯紅，經久不退，下列敘述何者錯誤？

A.診斷為蛇虱

B.辨證為瘀滯肌膚

C.可用桃紅四物湯

D.多數有家族遺傳史

21.有關彈響髌之敘述，下列何者錯誤？

A.是由於髌脛束移動經過大轉子而成

B.通常合併慢性泌尿道炎

C.與髌關節脫位基本機轉不同

D. 髖關節外旋偶誘發之

22. 關於 Ober's test for Contraction of the Iliotibial Band 之敘述，下列何者錯誤？

A. 又名 O ring test

B. 若大腿持續外展，試驗結果為陽性

C. 測驗時，膝蓋屈曲約 90 度

D. 脊髓灰質炎病患，有可能試驗結果為陽性

23. 足外觀的望診，依附圖所示，下列敘述何者錯誤？



A. 此為痛風無疑

B. 此為痛風好發關節之一

C. 鑑別診斷之一為足拇趾外翻

D. 足拇趾滑液囊腫亦常發生

24. 手指的扭挫傷常常伴隨傷口感染，其感染可能順著腱鞘蔓延，造成 Kanavel sign，其表現下列何者錯誤？

A. 手指維持伸展的姿勢

B. 手指均勻腫脹

C. 被動伸展手指會產生劇痛

D. 沿著腱鞘走向施行觸診會有敏銳感覺

25. 橈骨莖突腱鞘炎常因過度使用，導致那些肌腱在共同的腱鞘中過多地來回磨動，日久勞損？

A. 外展拇長肌及伸拇短肌

B. 外展拇短肌及伸拇長肌

C. 外展拇長肌及伸拇長肌

D. 外展拇短肌及伸拇短肌

26. 有關椎間盤突出的內治法，若患者出現腰 4、5 或腰 5 骶 1 單側有明顯壓痛點，雖無明顯外傷史，但遇天氣變化時疼痛加重，沒有畏寒肢冷、耳鳴耳聾的明顯表現，下列何證型最適宜？
- A. 血瘀型
 - B. 風濕型
 - C. 腎虛型
 - D. 血虛型
27. 有關「增生性脊椎炎」與「強直性脊椎炎」的鑑別診斷，下列敘述何者正確？
- A. 前者多在 40 歲以下，後者多在 40 歲以上
 - B. 前者椎體模糊成竹節狀改變，後者椎體輪廓清晰
 - C. 前者椎體邊緣有骨刺，後者無明顯骨刺
 - D. 前者前縱韌帶鈣化，後者韌帶無變化
28. 關於漏肩風的敘述，下列何者最適宜？
- A. 好發於年輕男性，因不良姿勢引發
 - B. 風寒濕邪侵襲為其外因，勞損為內因
 - C. 患肩被動外展時可觸得肩胛骨向外上轉動
 - D. 拉赫曼（Lachman）試驗可見陽性
29. 關於扳機指的敘述，下列何者最不適宜？
- A. 主要是伸指肌腱韌鞘發炎導致
 - B. 多發於拇指，亦可多個手指同時發病
 - C. 患指用力屈伸時疼痛，並出現彈跳動作
 - D. 熱敷後症狀多可減輕
30. 26 歲懷孕之女性，最近因右手指麻痛之症狀就診。患者表示該症狀在晨起及睡著時較嚴重，有時甚至半夜麻醒，甩動可緩解症狀。麻痛部位主要位於拇指、食指、中指及部分無名指，關於這位患者之狀況，下列何者正確？
- A. 俗稱媽媽手，理學檢查可見 Finkelstein 試驗陽性
 - B. 主要受影響的神經為尺神經
 - C. 若患病時間較長，可能出現大魚際肌之萎縮
 - D. 高機率出現垂腕之臨床表現
31. 45 歲女性，半個月前滑倒撞到頭部，其後就開始出現睡眠障礙。其表現為剛躺下不久就想起來，起來後又想睡，導致整夜難以入睡，且感心煩不安；頭部撞到處仍偶有輕度刺痛；其舌質黯紅，邊略有瘀，脈緊澀。治以下列何方最適當？

A. 知柏地黃丸

B. 血府逐瘀湯

C. 酸棗仁湯

D. 黃連阿膠湯

32. 關於遠端指骨撕脫性骨折，下列敘述何項正確？①通常會有錘狀指畸形 ②骨折發生在指骨基底部掌側 ③固定時近端指間關節屈曲，遠端指節過伸 ④骨折處為屈指肌腱的連接終點

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

33. 關於骨折墊的用法，下列敘述何者正確？①高低墊：做成一邊高一邊低的固定墊，適用於鎖骨骨折 ②大頭墊：做成蘑菇頭形狀的固定墊，用於肱骨外科頸骨折 ③葫蘆墊：兩頭大、中間小像葫蘆的固定墊，用於肱骨幹骨折 ④合骨墊：適用於尺骨鷹嘴突骨折

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

34. 關於髁關節的敘述，下列何者正確？

A. 髁關節脫位臨床上以前脫位比較常見

B. 多因直接暴力所引起

C. 髁關節屬於典型髁狀關節 (condyloid joint)

D. 髁關節脫位多見於活動力強的青壯年男性

35. 有關骨折功能復位的標準，下列何者正確？

A. 長骨幹骨折，對位至少應達 3/4 以上

B. 幹骺端骨折對位至少應達 1/3

C. 骨折成角移位與關節活動方向垂直，日後可有一定的矯正與適應，但成人不宜超過 10 度，兒童不宜超過 15 度

D. 兒童下肢骨折，若無骨骺損傷，可容許縮短 2 公分以內

36. 某位排球員在某次殺球後因肩部劇痛來院診治，檢查時發現「肩外展肌力消失，無法外展上臂，且肩愈外展，聳肩愈高」，由以上症狀，比較可能的診斷為何？

A. 棘上肌腱炎

- B.肩關節周圍炎
- C.肱二頭肌長頭肌腱炎
- D.棘上肌肌腱斷裂

37.關於網球肘主要起因於前臂伸肌群的肌腱勞損，下列何者包含在肌群內？

- A.旋後肌
- B.旋前圓肌
- C.掌長肌
- D.旋前方肌

38.關於腕部扭挫傷之診斷，其中下橈尺關節韌帶損傷，可捫及何處較為隆起，且按壓有鬆動感？

- A.尺骨小頭
- B.舟狀骨
- C.橈骨頭
- D.橈骨莖突

39.關於肘部扭挫傷之敘述，下列何者錯誤？

- A.嚴重的扭挫傷必須與骨折相鑑別，透過 X 光檢查，成人較兒童更易確定有無合併骨折
- B.早期患肢用三角巾懸吊於屈曲 60 度的功能位，以限制肘關節的屈伸活動，並督促患者多作手指屈伸握拳活動以利消腫
- C.肘部嚴重的扭挫傷要注意與骨折相區別，環狀韌帶的斷裂常使橈骨頭脫位併尺骨上段骨折
- D.肘部扭挫傷多因直接暴力打擊，或跌仆、失足滑倒，手掌著地，肘關節處於過度外展、伸直位置，導致肘關節扭傷

40.一位 23 歲大學生平日熱衷健身重訓，近一個月以來自覺左肩難以高舉，且伏地挺身時左肩胛骨成翼狀突起，最可能是何神經損傷？

- A.腋神經 (axillary nerve)
- B.肩胛下神經 (lower subscapular nerve)
- C.胸背神經 (thoracodorsal nerve)
- D.長胸神經 (long thoracic nerve)

41.垂臂檢查 (Drop Arm Test) 是指患者外展其手臂，然後令其緩慢將手臂降至身體側面，主要是為了測試下列何種病變？

- A.肱二頭肌長頭肌腱炎
- B.肩峰下滑囊炎
- C.胸廓出口症候群

D.旋轉袖套撕裂傷

42.關於測試股四頭肌功能，若見到病人一開始可以平穩伸展膝部，但在最後階段須暫緩動作且須使力才能完成，稱之為伸展遲滯（extension lag），所謂最後階段之角度，下列何者正確？

A.45 度

B.30 度

C.20 度

D.10 度

43.一年輕女性昨天晚上遭遇機車車禍，自後座摔出跌坐在地上，當下還能站起活動，但今天上午睡醒後，才發現局部疼痛腫脹感變多，起坐、站立和翻身等動作會引發不等程度的疼痛，下列何項檢查可用來鑑別骨盆骨折？


A.骨盆擠壓試驗

B.Thomas Test

C.Schober's Test

D.腹部超音波

44.如圖，在門診中進行如下之理學檢查：固定患者前臂，指導患者進行握拳伸腕之動作，當患者進行該動作時，醫師同時對其拳背進行按壓試圖使患者手腕變為屈曲姿，結果患者於伸腕肌之起始端出現劇烈疼痛，則患者最可能為下列何診斷？



A.肘關節尺側副韌帶損傷

B.肱骨內上髁炎

C.肱骨外上髁炎

D.尺骨鷹嘴滑囊炎

45. 40 歲患者公園跑步時，被人從右側腰部撞擊後，導致左側膝關節 varus stress 損傷，下列何處損傷最嚴重？
- A. 外側副韌帶
 - B. 內側副韌帶
 - C. 髌韌帶
 - D. 股二頭肌
46. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，下列手法配對何者正確？①接法 ②按者 ③拿法 ④或兩手一手捏定患處，酌其宜輕宜重，緩緩焉以復其位也 ⑤謂以手往下抑之也 ⑥謂使已斷之骨，合攏一處，復歸於舊也 ⑦謂以手推之，使還舊處也
- A. ①配⑤、②配⑥、③配④
 - B. ①配⑦、②配④、③配⑥
 - C. ①配④、②配⑦、③配⑤
 - D. ①配⑥、②配⑤、③配④
47. 26 歲女性下樓梯時不慎踩空，導致左腳踝扭傷，腳踝腫脹，至門診就醫，下列敘述何者正確？
- A. 依據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》內踝俗稱核骨
 - B. 依據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》外踝俗稱合骨
 - C. 外踝主要韌帶有三角韌帶、前距腓韌帶、後距腓韌帶協助穩定外側踝關節
 - D. 如果出現第五跖骨基底部疼痛、舟狀骨（navicular）疼痛或無法負重的症狀需拍攝 X 光排除骨折
48. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損腹痛之證，若發生既下而發熱、既下而惡寒，以及既下而惡寒發熱者，分別當以何方治之？
- A. 發熱：四物湯加參、朮；惡寒：十全大補湯；惡寒發熱：八珍湯
 - B. 發熱：黃連解毒湯；惡寒：四逆湯；惡寒發熱：小柴胡湯
 - C. 發熱：犀角地黃湯；惡寒：八珍湯；惡寒發熱：桂枝湯
 - D. 發熱：調胃承氣湯；惡寒：理中湯；惡寒發熱：加味逍遙散
49. 57 歲女性今日左手遭到墜落花盆壓到，左手前臂腫脹瘀青變形，X 光如附圖所示，下列敘述何項正確？①X 光顯示左手橈骨幹與尺骨幹骨折 ②該骨折機轉較為扭轉暴力造成 ③此患者骨折需優先整復橈骨 ④該骨折成人復位後固定至臨床癒合約 4 週



A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

50. 關於拔伸足蹬法整復肩關節脫位的敘述，下列何者正確？

A. 此法相似於亞里斯多德手法（Aristotle Maneuver）

B. 此為唐蘭道人在《仙授理傷續斷秘方》描述用椅背當槓桿支點來整復的方法

C. 若遇肱二頭肌長頭肌腱阻礙復位，先內、外旋轉患肢，使肱骨頭繞過肌腱

D. 若使用拔伸足蹬法而無法復位，不可再次重複復位

51. 關於髖關節後脫位的病因及臨床表現，下列敘述何者正確？①病因常為髖關節屈曲 90 度時，股骨幹過度內收、內旋，來自腿與膝前方的暴力使股骨頭衝出關節囊 ②髖部因強大外力而外展、外旋時，股骨頭被頂出髖臼 ③患肢呈屈曲、內收、內旋畸形 ④患肢外形較健側縮短

A. 僅②④

B. 僅①③

C. ①③④

D. ①②④

52. 下列何者不屬於蹠跗關節脫位的常見類型？

A. 第 2～5 蹠骨向內側脫位伴第 1 蹠骨基底骨折

B. 第 1 蹠骨向內側脫位伴第 1 蹠骨基底骨折

C. 第 2～5 蹠骨向外側脫位伴第 1 蹠骨向內側脫位，同時伴第 1 蹠骨基底骨折

D. 第 2～5 蹠骨向外側脫位

53. 當頸椎發生雙側小面關節脫位時，易造成前向脫位，多有神經學症狀，下列那兩個頸椎間因最常活動而最容易發生脫位表現？
- A. C3-C4
 - B. C4-C5
 - C. C5-C6
 - D. C6-C7
54. 肱骨幹骨折整復後，有關功能鍛鍊之敘述，下列何者錯誤？
- A. 損傷初期，先以手腕與手指活動為多
 - B. 損傷中期，再加入患肢上舉、背伸活動
 - C. 進行功能鍛鍊活動時，不應使骨折處感到疼痛
 - D. 損傷後期，再加入大雲手，使肩、肘、腰、腿、頸部均獲得鍛鍊
55. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》有關胸背部損傷外洗治法之敘述，下列何者正確？
- A. 髖骨損傷，輕者，或以海桐皮湯洗之
 - B. 胸骨損傷，外用艾醋湯洗之
 - C. 蔽心骨損傷，洗以八仙逍遙湯
 - D. 陰囊被人扯破者，洗用紫蘇葉煎水洗之
56. 有關肋骨骨折之敘述，下列何者最適當？
- A. 肋骨第 1～3 肋較短，且受鎖骨及肩胛骨保護，較不易發生骨折；第 11～12 肋骨是浮肋，為最容易發生骨折處
 - B. 多根雙處骨折後，胸廓可能失去支持，呼氣時因胸腔內負壓增加而向內凹陷，吸氣時因胸腔負壓減低而向外突出
 - C. 可以膠布固定法或寬繃帶固定法固定三至四週。重者臥床，輕者固定後症狀減輕應下床活動，練腹式呼吸
 - D. 若取八脈交會穴針灸治療，可取足臨泣穴
57. 5 歲男童，遊玩時向前跌倒，右手掌著地後不斷哭鬧，理學檢查發現右肘向後突出，局部壓痛腫脹明顯。下列何者最符合肘關節後脫位的表現？①肘前方摸到尺橈骨上端 ②多併發鷹嘴骨折 ③肘後三角關係正常 ④前臂前面較健側顯長 ⑤肘關節呈彈性固定在 45 度半屈位
- A. 僅⑤
 - B. 僅①③
 - C. ①②④
 - D. ①③④⑤

58. 51 歲風濕性關節炎患者，在過度用力彎曲手指時，感覺掌指關節旁側疼痛，且出現側方位移，下列敘述何者正確？①可能發生掌指關節側副韌帶（collateral ligament）的斷裂 ②掌指關節會因屈指深肌拉力而向背側脫位 ③若有鵝頸指變形（swan-neck deformity），可看到遠端指關節過度伸展 ④若有鈕扣狀變形（boutonnière deformity），可看到遠端指間關節伸展 ⑤風濕性關節炎可造成手指往尺側偏移變形（ulnar deviation）

A. ①②③

B. ①④⑤

C. ①②⑤

D. ②③④

59. 關於肩關節脫位的敘述，下列何者正確？①喙突下脫位多因患者側向跌倒，上肢外展外旋，手掌向下撐地，肱骨頭向前滑出至喙突下 ②當暴力向上作用使肱骨頭推至鎖骨下則形成鎖骨下脫位，最為多見 ③孟下脫位多因上肢過度高舉，外旋、外展向下跌倒，因槓桿作用力使肱骨頭向前下部滑脫 ④肱骨頭向前脫位最常見的是向後跌倒時以肩部著地，屬直接暴力作用 ⑤肩關節前脫位發生率遠多於後脫位

A. ①②③

B. ②④⑤

C. ③④⑤

D. ①③⑤

60. 依《正骨心法要旨》所述，下列何者屬於骨盆的結構？

A. 山角骨

B. 八髎骨

C. 下橫骨

D. 髌骨

61. 六淫之邪能趁人之虛，直接侵害眼部，以風邪為例，下列何者與其無關？

A. 風為陽邪，易於犯上，為外邪引起眼病之先導

B. 發病表現多為經脈拘急，氣血凝滯，赤脈紫暗

C. 眼部症狀常見目淚羞明，眼瞼腫脹，目澀作癢

D. 客於經絡，可致胞瞼下垂，口眼歪斜

62. 下列何者介紹名醫醫案、運氣學說，五輪八廓；附有治療要穴及詳細說明，並介紹 22 個外用藥方之配製與運用？

A. 傅仁宇《審視瑤函》

B. 黃庭鏡《目經大成》

C.顧錫《銀海指南》

D.孫思邈《銀海精微》

63.《內經》已初具眼的生理、解剖、病機等理論基礎，其中治療主要應用為何？

A.外敷

B.針刺

C.熨灸

D.湯藥

64.患者因眼部挫傷，損及晶珠，致晶珠混濁。下列何者為最可能的診斷？

A.驚震內障

B.花翳白陷

C.目筈

D.凝脂翳

65.瞳人乾缺內障，若其色為白，乃是腦脂流下為患，治療宜用何方？

A.瀉肝湯

B.鎮肝湯

C.洗肝湯

D.補肝湯

66.患者耳周皮膚成苔蘚化、增厚、粗糙、皸裂，上覆痂皮或鱗屑，患處癢而少疼痛，舌質淡苔白，脈緩細，該患者最宜以下列何方治療？

A.龍膽瀉肝湯

B.地黃飲

C.真人活命飲

D.桑菊飲

67.關於鼻淵之護理及預防，下列敘述何者錯誤？

A.禁食辛辣刺激食物，戒除菸酒

B.清潔鼻腔，去除積留的鼻涕

C.保持鼻道暢通

D.注意擤鼻方法，鼻塞甚者，強行擤鼻通暢

68.鼻鼽與現代醫學過敏性鼻炎相類似，其症狀突然發作，消失也很快，有反覆發作的病史，以鼻癢、打噴嚏、流清涕、鼻塞等為特徵。其病理變化與下列何臟腑較無關係？

- A.心
- B.脾
- C.肺
- D.腎

69.口齒唇舌病，若心火上炎，熏灼口舌，證見口舌潰爛，心中煩熱，面色紅，舌質紅，苔黃等，常用下列那一方劑治療？

- A.疏風清熱湯
- B.黃連解毒湯
- C.升陽散火湯
- D.加味涼膈散

70.關於流淚症之敘述，下列何者正確？

- A.因肝血不足，外感風邪，治療可用銀翹散加減
- B.如排淚竅道狹窄成阻塞，通常已無法通過，不宜再行淚道探插術
- C.冬月淚液較多，可將針用火燒熱，待溫後再針同側睛明穴
- D.因肝腎兩虛，約束無權，眼淚清冷而稀薄，可用甘露消毒丹加減治療

71.患者抱怨眼睛疼痛，羞明流淚，常視物不清，醫生發現其白睛結節大而隆起，周圍血脈紫赤怒張，且壓痛明顯，其病變多在瞼裂部位，患者常有口苦咽乾，呼出之氣熱，便秘溲赤，舌紅苔黃，脈數有力，其最有可能的診斷為何？

- A.土疳
- B.金疳
- C.火疳
- D.粟瘡

72.關於五風內障，下列敘述何者錯誤？

- A.青風內障臨證為觀燈火有虹暈，視物昏花等
- B.綠風內障急性發作時患側頭痛如劈，眼珠脹痛欲脫，但一般不影響視力
- C.綠風內障好發於 40 歲以上族群
- D.青風內障好發於男性

73.下列何本著作，為現存的第一部醫學專著，其奠定中國醫學的理論基礎，關於耳鼻喉科的論述也極為豐富？

- A.《黃帝內經》
- B.《神農本草經》

C.《難經》

D.《山海經》

74. 患者罹患鼻咽癌，檢查時發現腫瘤已擴散至鼻咽腔鄰近的軟組織，引起顛底骨質破壞，經觀察此患者有複視現象，雙側淋巴結腫大並有肝轉移。判別其腫瘤目前發展為鼻咽癌那一分期？

A. I

B. II

C. III

D. IV

75. 下列何者不屬於聽力檢查？

A. 偏過定位試驗

B. 語音試驗

C. Rinne 試驗

D. Schwabach 試驗

76. 相較於耳瘡而言，關於耳癬的敘述下列何者正確？

A. 耳癬疼痛較劇烈，以耳道侷限性紅腫為特徵

B. 耳癬疼痛較輕微，以耳道侷限性紅腫為特徵

C. 耳癬疼痛較劇烈，以耳道瀰漫性紅腫為特徵

D. 耳癬疼痛較輕微，以耳道瀰漫性紅腫為特徵

77. 鼻塞的主要症狀是鼻塞，若鼻塞持續無間，鼻甲腫脹黯紅，多屬於下列何種病理機轉？

A. 肺脾氣虛，邪滯鼻竅

B. 肺臟虧虛，鼻失養滋

C. 脾氣虛弱，濕蘊生熱

D. 邪毒久留，氣滯血瘀

78. 關於喉癰內治法，下列敘述何者最正確？

A. 初起邪在表，治宜疏風清熱，解毒消腫，可用清咽利膈湯加減

B. 若熱毒傳裏，裏熱壅盛，正在釀膿期，治宜清熱解毒，利膈消腫，可用仙方活命飲加減

C. 若熱毒傳裏，裏熱壅盛，膿已成，治宜清熱解毒，活血排膿，可用五味消毒飲加減

D. 若熱毒侵入營血，干擾心神，出現神昏譫語，應以清營涼血、解毒為主，可用犀角地黃湯加減

79. 關於風寒外襲所造成的急喉瘖，下列敘述何者錯誤？

A. 造成卒然聲音不揚，甚則嘶啞

B.有時兼有咽喉微痛，吞嚥不利

C.檢查見喉關及關外可無紅腫

D.檢查見聲帶緊閉，色淡白或淡紅

80.牙癰的臨床常見症狀，下列敘述何者錯誤？

A.病變在牙齦處

B.侷限性紅腫，初硬後軟

C.經常溢膿者，形成牙漏

D.潰口難癒，或有壞死碎骨流出