

114年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、114年專技人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試

代 號：5111

類科名稱：臨床心理師

科目名稱：臨床心理學特論（二）（包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療）

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

一、申論題

※本題為申論題，請使用鍵盤及滑鼠輸入作答內容，由左至右橫式作答。

- 1.請說明意動型失用症（Ideomotor Apraxia）的臨床表現與其評估方法。（15分）
- 2.請說明青少年期憂鬱症與成人憂鬱症的病徵有何相同與相異之處？（4分）並請舉出二種可能的心理病理機制，這二種機制如何影響你採取不同的心理社會介入策略。（16分）
- 3.志明是46歲的未婚男性，在公務單位已工作16年，工作表現中等，但人際關係較為淡薄和多疑，少主動與同事互動，但同事有事相求時，志明也會予以回應。目前與父母同住，因社會新聞不斷，他擔心居家安全而在自家門口加裝四台監視器。
近半年來，志明工作時略顯疲態、偶有出錯，尚不影響工作表現。但近一個月前開始，志明顯得易怒、工作出錯日益增加，在主管的關心下，志明忿忿地抱怨，家門口的監視器和盆栽都有被挪動的痕跡，他認為是鄰居故意破壞，目的是迫使自己搬離住家，好將房子買下。因而多次與鄰居衝突，並多次向地方法院提出訴訟，但法院均在鄰居否認與證據不足下不予受理，讓志明更加生氣，甚至懷疑法院已被鄰居買通，進而多次向高等法院提出訴訟，但也被退回。惟在此期間，志明仍可規律上下班。
期間父母也曾多次為鄰居澄清，志明氣憤地認為父母親也被鄰居買通，造成多次爭執，關係也變得緊繃。此次住院即因父親又替鄰居澄清，志明一氣之下動手攻擊，鄰居報警後將志明送至醫院住院。依據上述，志明最可能符合何種精神疾病診斷，並詳述理由？（15分）

二、測驗題

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.關於阿茲海默病（Alzheimer's disease）之病理，下列何者錯誤？
 - A.阿茲海默病病理與基因無關
 - B.澱粉樣斑塊（amyloid plaques）為澱粉樣蛋白beta-42（amyloid β -42， $A\beta_{42}$ ）異常累積造成
 - C.tau蛋白質的過度磷酸化常與神經纖維糾結的出現有關
 - D.患者腦中beta分泌酵素（ β -secretase）過高
- 2.依據DSM-5，有關神經認知障礙症（major neurocognitive disorders, major NCDs）之敘述，下列

何者錯誤？

- A.相對於DSM-5中其他疾患，major NCDs較明確有中樞神經系統的問題
- B.major NCDs可能為先天問題
- C.major NCDs有可能由不只一種病因造成
- D.創傷性腦損傷（traumatic brain injury）有可能造成major NCDs

3.有關輕度認知障礙（mild cognitive impairment, MCI）之敘述，下列何者錯誤？

- A.是一般老年人必經之過程
- B.可以是極早期失智症之一種診斷
- C.通常發生於初老期與中老期
- D.這些人有較高機會罹患Alzheimer's disease

4.下列何項neurocognitive disorder主要以知覺動作或處理速度緩慢，為早期的認知缺損？

- A.frontotemporal neurocognitive disorder
- B.Alzheimer's disease
- C.semantic dementia
- D.Parkinson's disease

5.有關譫妄的治療，下列敘述何者正確？

- A.雖然可以恢復，但患者通常難以回到病前的功能水準
- B.通常藉由開立典型抗精神病藥物來進行治療
- C.由於可以藉治療譫妄背後的醫學狀況來緩解病情，老年人的復原速度較年輕人快速
- D.約須一至四週的恢復期

6.有關譫妄之敘述，下列何者錯誤？

- A.入院後因停止飲酒是屬於物質誘發的譫妄
- B.暴露於毒素環境可能引起譫妄
- C.使用大量古柯鹼後可能引起譫妄
- D.臨床用藥的副作用可能引起譫妄

7.下列何者不屬於與記憶相關的巴貝茲迴路（Papez' circuit）中的結構？

- A.海馬迴（hippocampus）
- B.視丘前核（anterior thalamic nuclei）
- C.穹窿（fornix）
- D.殼核（putamen）

8.關於影響失語症患者預後因素的說明，下列何者錯誤？

- A.語言的學習能力，常會隨著年紀增加而明顯減低
 - B.以左手為慣用手的人，一般來說於失語症後的預後較佳
 - C.頭部外傷造成的失語症，較腦血管病變者之預後差
 - D.性別對於失語症預後的影響，結果仍分歧
- 9.針對執行功能障礙患者之「啟動（initiation）」困難，介入目標應著重在？
- A.自我覺察力的提升
 - B.行為動機的提升
 - C.制定行動目標能力的提升
 - D.制定行動計劃能力的提升
- 10.有關執行功能障礙，下列敘述何者錯誤？
- A.大量研究已證實額葉皮質損傷與執行功能障礙密切相關
 - B.大腦皮質下區域（subcortical regions）損傷亦可能造成執行功能障礙
 - C.執行功能障礙亦可能導致某些行為症狀
 - D.可能導致利用行為（utilization behavior），但不影響錯誤利用（error utilization）行為
- 11.下列那一腦部受傷或受侵擾，就必須進行執行功能障礙的檢查？
- A.後扣帶迴
 - B.Brodmann's areas 9 & 10
 - C.海馬迴
 - D.Brodmann's areas 20 & 22
- 12.一般而言，失用症最常出現在何處腦傷的患者？
- A.右側額葉
 - B.左側頂葉
 - C.右側枕葉
 - D.左側顳葉
- 13.下列何種測驗最可能偵測出患者胼胝體（corpus callosum）的受損？
- A.視覺命名測驗（Visual Naming）
 - B.線段角度判斷測驗（Judgment of Line Orientation）
 - C.普渡栓板測驗（Purdue Pegboard）
 - D.簡短智能狀態評估（Mini-Mental State Examination，MMSE）
- 14.李小姐因為腦血管病變而造成建構型失用症（constructional apraxia）。醫療團隊發現，她在進行相關神經心理測驗時，會傾向簡化所看到的視覺刺激，而所描畫出來的圖形，也常缺少細節。李

小姐最有可能是下列何處腦區受損？

- A.左腦半球 (left hemisphere)
- B.海馬迴 (hippocampus)
- C.小腦 (cerebellum)
- D.視丘 (thalamus)

15.下列有關注意力不足／過動症 (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) 常伴隨之共病不包括何者？

- A.動作協調發展障礙症 (developmental coordination disorder)
- B.焦慮症 (anxiety disorders)
- C.行為規範障礙症 (conduct disorder)
- D.失抑制社會交往症 (disinhibited social engagement disorder)

16.根據DSM-5，下列有關對立反抗症 (oppositional defiant disorder, ODD) 之敘述，何者錯誤？

- A.生氣／易怒情緒為ODD的主要核心症狀之一
- B.ODD症狀必需出現在兩種或兩種以上的情境（例如：家裏、學校）
- C.ODD症狀必需在與其他非手足的互動時被觀察到
- D.若出現懷恨或報復行為，在過去六個月中至少要出現兩次

17.下列何者不屬於兒童期注意力不足／過動症的主要治療方法？

- A.藥物治療
- B.父母處理訓練 (parent management training)
- C.教育介入 (educational intervention)
- D.辯證性行為治療

18.對於行為規範障礙症在學齡前 (preschool) 階段的發展過程，下列何者錯誤？

- A.在兒童早期他們具有困難的氣質
- B.常出現過動與衝動的行為
- C.常缺乏情緒調節技巧
- D.常有良好的同儕互動技巧

19.有關於區別嘗試教學法 (discrete trial training) 的說明，下列何者錯誤？

- A.主要是為了減少不當行為的教學方法
- B.要有一個明確的刺激
- C.需要對應刺激後有一個反應
- D.完成反應後需要立即的酬賞

20. 大腦造影研究中，與語音覺察（phonological awareness）缺損有關的大腦解剖位置為何？

- A. 右額葉
- B. 右頂葉
- C. 左顳葉
- D. 左頂葉

21. 有關自閉症兒童治療的敘述，下列何者錯誤？

- A. 治療目標在於減少其核心症狀，增進其獨立生活能力
- B. 每週訓練不宜超過15小時，以免超過兒童及家長的負荷
- C. 邀請父母一起參與治療，訓練父母也成為協同治療者
- D. 社交技巧訓練邀請同儕兒童引發互動遊戲，進而模仿學習

22. 下列何種染色體異常所導致的智能不足，容易與自閉症共病？

- A. 唐氏症（Down syndrome）
- B. X染色體易脆症（fragile-X syndrome）
- C. 普拉德威利症（Prader-Willi syndrome）
- D. 安裘曼氏症（Angelman syndrome）

23. 關於特定的學習障礙症（specific learning disorder）的敘述，下列何者錯誤？

- A. 一等親，罹患閱讀障礙4~8倍
- B. 一等親，罹患數學障礙5~10倍
- C. 遺傳率高於 .80
- D. 男女比2：1到3：1

24. 下列那種生理現象可解釋受虐後的內化問題？

- A. limbic irritability
- B. dopaminergic irritability
- C. norepinephrine irritability
- D. HPA irritability

25. 受虐兒童通常較易發展出那種依戀型態？

- A. secure attachment
- B. avoidant attachment
- C. ambivalent attachment
- D. disorganized attachment

26. 下列何者是兒童期最常見的焦慮症之一？

- A.分離焦慮症
- B.特定場所恐懼症
- C.恐慌症
- D.社交焦慮症

27.有關青少年憂鬱的藥物治療，下列何者錯誤？

- A.三環抗憂鬱劑也適用於治療青少年憂鬱
- B.SSRIs可增加血清素的濃度
- C.青少年使用SSRIs可能引發自殺和自傷的副作用
- D.SSRIs對青少年的長期影響，目前仍未有定論

28.基於神經可塑性與實際恢復可能的前提下，對思覺失調症患者進行某種認知技能訓練，依由下而上的模式逐漸進展，以加強或復甦神經連結與核心神經功能的治療方式，稱為：

- A.認知修復治療（cognitive remediation therapies）
- B.認知競爭治療（cognitive competing therapies）
- C.社交技巧訓練（social skills training）
- D.認知行為治療（cognitive behavior therapy）

29.有關短暫精神病症的敘述，下列何者錯誤？

- A.是突然發作、至少一項正性症狀
- B.一定會有前驅症狀→活躍症狀→殘餘症狀的病程
- C.症狀結束後，可以完全回復到病前功能的水準
- D.發作期至少一天，但少於一個月

30.關於幻覺（hallucination）的敘述，下列何者錯誤？

- A.幻覺是指，沒有外在刺激卻出現類似知覺（perception-like）的經驗，清晰生動，與正常知覺的效力與影響力相同，且不受意識控制
- B.只要是沒有外在刺激卻出現清楚的感官經驗，不管是將睡或將醒時出現，都是幻覺
- C.有文化背景下的宗教經驗（如：觀落陰、附身傳旨）屬於正常經驗的範圍
- D.幻覺的內容會伴隨出現相對應的情緒、行為與生理反應

31.關於增進思覺失調症患者的就業功能，下列何種治療取向最缺乏顯著的效果？

- A.社交技巧訓練
- B.認知提升治療
- C.心理衛教
- D.支持性就業

- 32.王先生有思覺失調症的病史，於交談時眼神空洞且毫無生氣，缺乏臉部的表情，很少注視著對方，語音平淡更缺少抑揚頓挫的語調。這應是下列何種症狀？
- A.無社交性 (asociality)
 - B.減少情感表達 (diminished emotional expression)
 - C.貧語 (alogia)
 - D.意志貧乏 (avolition)
- 33.根據DSM-5，思覺失調類群 (schizophrenia spectrum) 主要包括思覺失調症及下列那些疾病？
- A.schizoaffective disorder和schizotypal personality disorder
 - B.antisocial personality disorder和schizotypal personality disorder
 - C.schizoaffective disorder和mood disorders with psychotic features
 - D.bipolar disorder和delusional disorder
- 34.王先生持續一週出現心情高昂、精力旺盛、說話滔滔不絕、睡眠需求減少、參加很多活動，但旁人注意到王先生的社交與工作表現變很差，下列何者為最可能的診斷？
- A.類思覺失調症 (schizophreniform disorder)
 - B.第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder)
 - C.第二型雙相情緒障礙症 (bipolar II disorder)
 - D.循環型情緒障礙症 (cyclothymic disorder)
- 35.有關成人型循環型情緒障礙症 (cyclothymic disorder) 患者之診斷，下列敘述何者錯誤？
- A.若患者隨後出現鬱症發作，應改診斷為鬱症 (major depressive disorder)
 - B.若患者隨後出現躁症發作，應改診斷為第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder)
 - C.若患者隨後出現輕躁症發作，應改診斷為第二型雙相情緒障礙症 (bipolar II disorder)
 - D.此障礙症可以與睡眠障礙症 (sleep disorders) 共同發生
- 36.有關快速循環特徵 (rapid cycling) 的診斷敘述，下列何者錯誤？
- A.在最近兩年內至少出現4次情緒障礙發作
 - B.發作必須完全符合鬱症、躁症或輕躁症發作的準則
 - C.發作期間至少有2個月的部分緩解或完全緩解，或者轉移為相反的情緒發作 (例如：鬱症發作到躁症發作)
 - D.這些發作可以任何順序或組合出現
- 37.根據DSM-5，輕躁症發作與躁症發作之最主要鑑別診斷標準為何？
- A.臨床症狀項目的多寡
 - B.是否出現鬱症發作

C.社會或職業功能的受損程度

D.易怒心情的嚴重程度

38.根據Kieseppa et al. (2004) 的雙胞胎樣本研究，得到雙相情緒障礙症的遺傳估計值為何？

A.0.03

B.0.33

C.0.63

D.0.93

39.一位45歲的女性，在嚴重車禍後到醫院治療，她兩腿骨折，並且確診罹患愛滋病。她開始出現解構語言、相信有人要殺她，這些症狀持續了將近一星期後完全消失。她最可能的診斷是下列何者？

A.物質引發的精神病症

B.另一身體病況引起的精神病症

C.短暫精神病症

D.妄想症

40.思覺失調症患者保持一個不尋常的姿勢相當一段時間，但不會顯得不舒服。這是屬於何種症狀類別？

A.正性症狀 (positive symptoms)

B.負性症狀 (negative symptoms)

C.僵直行為 (catatonic behaviors)

D.靜止症狀 (vegetative symptoms)