

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述，下列何者非小青龍湯之主治症狀？
(A)惡寒、發熱、無汗 (B)大便難 (C)乾嘔 (D)咳
- 2 依《傷寒論》所述，下列何者為梔子厚朴湯之藥物組成？
(A)甘草 (B)生薑 (C)乾薑 (D)枳實
- 3 依《傷寒論》所述，太陽病，項背強几几，「無汗惡風」與「汗出惡風」之治法與治方，下列敘述何項正確？
(A)「無汗惡風」之治法，以麻黃湯加葛根發汗解表，升津舒經
(B)「汗出惡風」之治法，以桂枝湯加葛根解肌祛風，升津舒經
(C)「無汗惡風」之治法，以桂枝湯加葛根解肌祛風，升津舒經
(D)「汗出惡風」之治法，以桂枝湯加葛根麻黃發汗解表，升津舒經
- 4 依《傷寒論》所述：「少陰病，下利清穀，裏寒外熱，手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒，其人面色赤，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，或利止脈不出者」，宜用下列何方治之？
(A)生附子、乾薑、炙甘草 (B)生附子、乾薑、蔥白
(C)人參、白朮、生薑、炙甘草 (D)生附子、乾薑、蔥白、豬膽汁、人尿
- 5 依《傷寒論》所述，有關茯苓桂枝白朮甘草湯之主治證候，下列何者錯誤？
(A)心下逆滿 (B)身瞤動振振欲擗地 (C)起則頭眩 (D)脈沉緊
- 6 一位病者患了外感病之後，餘熱未盡，虛羸少氣，氣逆欲吐，依《傷寒論》記載以下列何方治之為最佳選擇？
(A)甘草、粳米、人參、半夏、石膏 (B)麥門冬、甘草、粳米、人參、半夏、大棗
(C)石膏、知母、甘草、人參、粳米 (D)石膏、麥冬、甘草、半夏、竹葉、粳米、人參
- 7 一病者大病差後，從腰以下有水氣者，依《傷寒論》的記載以選用下列何湯方為最佳？
(A)豬苓、茯苓、白朮、澤瀉、桂枝
(B)桂枝、茯苓、白朮、甘草
(C)生薑、附子、白朮、茯苓、白芍
(D)澤瀉、枯藁根、海藻、商陸根、牡蠣、蜀漆、葶藶子
- 8 關於烏梅丸與厥陰病「蚘厥」之敘述，下列何者正確？①烏梅丸酸、苦、辛並用，是因蛔蟲得酸則靜、得苦則下、得辛則伏 ②蚘厥之診斷應具「四肢厥冷、吐蛔史、時靜時煩，得食則煩減而嘔蛔」等特點 ③適用烏梅丸之蚘厥應屬上熱下寒證 ④烏梅丸應於進食之前服用
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 9 依《傷寒論》所述，桃核承氣湯之藥物組成，下列何者正確？①厚朴 ②枳實 ③桂枝 ④甘草
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 10 依《傷寒論》所述：「陽明病，譫語，發潮熱，脈滑而疾者，小承氣湯主之，……」，其服用法為先給一升，觀察變化後再如何處理？
(A)腹中轉矢氣者，更服大承氣湯 (B)腹中不轉矢氣者，更服一升
(C)腹中轉矢氣者，當更服一升 (D)腹中不轉矢氣者，更服大承氣湯

- 11 依《傷寒論》有關陽明病辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)陽明病，不能食，名中寒
(B)陽明病者，能食，名中風
(C)陽明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足澀然汗出
(D)陽明病，若胃中虛熱，不能食者，飲水則噦
- 12 36 歲張先生，身體壯實。今因陽明病，醫以下法治之，下之後仍身熱四肢溫，但見心中懊憹，飢不能食，但頭汗出。下列病機敘述何者錯誤？
(A)下之後身熱、四肢溫是屬無形邪熱散漫
(B)下之後身熱、四肢溫亦可說明未轉屬太陰虛寒證
(C)但頭汗出是因邪熱蒸騰於上
(D)心中懊憹，飢不能食是因宿食阻滯
- 13 依《傷寒論》所述，吳茱萸湯之敘述，下列何者最適宜？①「食穀欲嘔，屬陽明也。」治以吳茱萸湯是因中焦陽虛，濁陰上逆 ②組成：吳茱萸、乾薑、人參、大棗 ③少陰病，雖見吐利，手足逆冷，但陰寒內盛，濁陰上逆時亦可用本方 ④「乾嘔，吐涎沫，頭痛」屬肝寒犯胃者，亦以本方主之
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 14 依《傷寒論》有關太陰虛寒下利之治療，下列敘述何者正確？
(A)宜用四逆輩治之
(B)輕者宜用理中湯以補火生土
(C)重者宜用四逆湯以溫中祛寒
(D)宜用五苓散治之
- 15 依《傷寒論》所述，有關真武湯之敘述，下列何者正確？
(A)病機為脾陽虛水泛 (B)附子生用 (C)用乾薑佐附子 (D)多伴有少陰陽虛證候
- 16 依《傷寒論》所述：「少陰病，得之一、二日，口中和，背惡寒者」，應如何治之？
(A)當灸之，附子湯主之 (B)宜先與桂枝湯解其表 (C)宜白通湯，溫之 (D)宜麻黃湯
- 17 下列何者不是濕熱病邪的致病特點？
(A)初起多熱象不盛 (B)纏綿難解 (C)易傷肺胃之陰 (D)易困阻清陽
- 18 下列何書是中國醫學史上第一部溫病學專著？
(A)《溫病條辨》 (B)《濕熱條辨》 (C)《溫熱經緯》 (D)《溫疫論》
- 19 下列關於溫病「祛濕法」之敘述何者錯誤？
(A)祛濕法主要具有宣氣化濕、運脾和胃，通利水道等化濕泄濁作用
(B)若症見發熱，口渴不多飲，脘痞腹脹，泛噁欲吐，舌苔黃膩者，宜用宣氣化濕法，宣通氣機，透化濕邪
(C)若見濕熱鬱阻下焦，見熱蒸頭脹，小便不利，苔白口渴等，則宜以淡滲之品利尿滲濕
(D)若平素液虧者當慎用，病已化燥者當忌用
- 20 溫病與溫毒的區別，在於溫毒症見下列何項？
(A)發熱頭痛 (B)脈數口渴 (C)心煩譫語 (D)局部紅腫熱痛
- 21 葉醫師帶實習醫學生查房，時值一患者得溫病已數日，近日來「身熱夜甚，經常心煩，不能入睡，白日或神情困滯、或發譫語，身上有斑疹隱隱，見其舌質紅絳，脈數」。辨證後，最宜以下列何法治之？
(A)辛寒清氣法 (B)清營泄熱法 (C)氣營兩清法 (D)涼血散血法
- 22 承上題，治療該證型時，下列何方最適宜？
(A)白虎湯 (B)清營湯 (C)化斑湯 (D)犀角地黃湯
- 23 黃連阿膠湯的製服法，先將黃連、黃芩、芍藥加水八杯煮之，取三杯，其後之順序下列何者最為正確？①納膠烱盡 ②入雞子黃攪拌 ③去滓
(A)②→①→③ (B)③→②→① (C)③→①→② (D)①→③→②
- 24 風溫證邪在營分，肺熱發疹宜用銀翹散去荊芥、豆豉加下列何藥物，以宣肺泄熱、涼營透疹最正確？
①生地、玄參 ②丹皮、大青葉 ③生地、麥冬 ④丹參、黃連
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 25 暑厥不應有下列何症？
(A)猝然暈倒 (B)氣粗如喘 (C)身熱手足厥冷 (D)口眼歪斜

- 26 暑濕瀰漫三焦最不應出現下列何症？
(A)面赤耳聾 (B)下利稀水 (C)咳痰帶血 (D)嘔逆神昏
- 27 有關春溫與風溫、暑溫的發病季節及證候表現，下列敘述何者錯誤？
(A)風溫初起以邪在肺衛之表熱證為主 (B)春溫初起以裏熱傷陰證為主
(C)暑溫初起多見陽明裏熱熾盛證 (D)發於夏至之前者為暑溫
- 28 依吳又可《溫疫論》所述，溫疫的病因為下列何者？
(A)感四時不正之氣 (B)感天地之疠氣 (C)感六淫之氣 (D)感溫毒之邪
- 29 有關濕溫證的病候特點，下列何者正確？
(A)多伴有脘痞、苔膩等濕阻於中之證象 (B)中氣實者，病多在脾，而為熱重於濕
(C)中氣虛者，病多在胃，而為濕重於熱 (D)蘊蒸日久，必會損傷脾陽
- 30 下列何者最不屬於「濕熱困脾，氣機鬱阻」的臨床表現？
(A)身熱不暢，有汗不解 (B)痰涎壅盛，神識昏蒙
(C)胸脘痞悶，嘔惡欲吐 (D)身重肢倦，便溏尿濁
- 31 下列關於診斷「伏暑」要點之敘述何者錯誤？
(A)初起即見暑濕或暑熱內伏特性的證候，且兼有惡寒表證
(B)初發於氣分兼表證者，類似感冒，但裏有暑濕性質症狀
(C)在濕熱流連氣分階段，可以鬱發白痞
(D)邪在營分，結於腸腑時常見濕熱挾滯，鬱於胃腸之候
- 32 下列關於「秋季燥熱病邪，傳入肺經氣分，燥熱化火，耗傷陰液」證候之敘述，何者錯誤？
(A)身熱、乾咳無痰，甚則氣逆而喘是因肺為熱灼，失於清肅所致
(B)若見苔薄白而燥，應屬表未解而津傷
(C)胸滿脅痛應屬熱壅於肺，氣機失暢所致
(D)本證病機當是在氣而不在衛，亦不在營血
- 33 依《金匱要略》所述，與奔豚氣病相關的臟腑為下列何者？①肝 ②肺 ③脾 ④腎
(A)①④ (B)②③ (C)③④ (D)①③
- 34 依《金匱要略》所述，有關狐惑病的敘述，下列何者正確？①膿已成的主方為赤豆當歸散 ②蝕於肛者，升麻鱉甲湯主之 ③蝕於下部則咽乾，苦參湯洗之 ④以發斑、咽喉痛為主症
(A)①③ (B)②③ (C)②④ (D)①②③
- 35 依《金匱要略》所述，治療虛寒性肺痿的主方為下列何者？
(A)大青龍湯 (B)小青龍湯 (C)麥門冬湯 (D)甘草乾薑湯
- 36 依《金匱要略》所述：「咳而上氣，喉中水雞聲」，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃、芍藥、桂枝、細辛、甘草、乾薑、五味子、半夏
(B)射干、麻黃、生薑、細辛、紫菀、款冬花、五味子、大棗、半夏
(C)麻黃、石膏、生薑、大棗、甘草、半夏
(D)厚朴、麻黃、石膏、杏仁、半夏、乾薑、細辛、小麥、五味子
- 37 依《金匱要略》所述：「腎著之病，其人身體重，腰中冷，如坐水中，形如水狀，反不渴，小便自利，飲食如故，病屬下焦，身勞汗出，衣裏冷濕，久久得之，腰以下冷痛，腹重如帶五千錢」，治以下列何方最適宜？
(A)茯苓、桂枝、白朮、甘草 (B)白朮、附子、甘草、生薑、大棗
(C)甘草、白朮、乾薑、茯苓 (D)茯苓、甘草、乾薑、細辛、五味子
- 38 依《金匱要略》所述：「心下有支飲，其人苦冒眩」，治以下列何方最適宜？
(A)十棗湯 (B)澤瀉湯 (C)五苓散 (D)苓桂朮甘湯
- 39 病人出現小便如粟狀，小腹弦急，痛引臍中。依《金匱要略》所述，本症之診斷為何者？
(A)寒疝 (B)淋病 (C)腸癰 (D)奔豚

- 40 45 歲女性病患，依《金匱要略》所述，咽中如有炙饇之症狀，治以下列何方最適宜？
(A)桔梗湯 (B)清咽湯 (C)梔子豉湯 (D)半夏厚朴湯
- 41 依《金匱要略》有關瘡癰病之敘述，下列何者錯誤？
(A)區別癰腫以手掩腫上，熱者為有膿
(B)腸癰之為病，其身甲錯，腹皮急
(C)未成膿之腸癰實熱證用排膿湯
(D)浸淫瘡多因濕熱火毒所致，可用黃連粉內服或外敷
- 42 依《金匱要略》所述：「風濕，脈浮，身重，汗出惡風者」，治以下列何方最適宜？
(A)防己黃耆湯 (B)防己茯苓湯 (C)麻黃附子湯 (D)枳實白朮湯
- 43 依《金匱要略·嘔吐噦下痢》所述：「乾嘔吐逆，吐涎沫」，治以下列何方最適宜？
(A)文蛤湯 (B)大半夏湯 (C)半夏乾薑散 (D)大黃甘草湯
- 44 依《金匱要略·婦人妊娠》所述：「妊娠，嘔吐不止」，治以下列何方最適宜？
(A)乾薑、苦參、半夏 (B)生薑、人參、半夏 (C)乾薑、人參、半夏 (D)乾薑、人參、甘草
- 45 58 歲張先生，在主持開會時突然昏倒，不省人事，牙關緊閉，口噤不開，面白唇暗，四肢不溫，依據病況，下列病因病機的敘述何者正確？
(A)為腎陰虧虛，肝陽上亢，風痰走竄經絡所致 (B)為陽升風動，氣血上逆，挾痰火上蒙清竅所致
(C)為濕痰偏盛，風挾濕痰，上蒙清竅所致 (D)為元氣衰微，陰陽將離，心神頹敗所致
- 46 45 歲女性患者，自訴眩暈已半年餘，經醫師以「歸脾湯」加減治療二週後，眩暈未再發，連發病前的心悸、失眠都一併獲得改善。下列何證候最少見於本案例初就診時？
(A)眩暈因勞累加重或誘發 (B)胸悶噁心，食少多寐
(C)神疲懶言，飲食減少 (D)髮色不澤，舌淡，脈細弱
- 47 有關黃疸的臨床表現敘述及治療，下列何者錯誤？
(A)熱重於濕之陽黃病人，其病機為濕熱薰蒸，膽汁外溢，茵陳蒿湯主之
(B)陰黃的治療原則為健脾溫化，通利小便
(C)急黃之人，是濕熱毒盛，宜清熱解毒，涼血養陰為治
(D)面色發黃是黃疸最早出現而最晚消失的指徵
- 48 臟脹不同證型，處方用藥則不同，下列敘述何者最適宜？
(A)水濕困脾之臟脹，宜用胃苓湯合柴胡疏肝湯 (B)脾腎陽虛之臟脹，宜用附子理中湯
(C)肝腎陰虛之臟脹，宜用濟生腎氣丸 (D)肝脾血瘀之臟脹，宜用桃紅四物湯
- 49 形成不寐的原因很多，下列何者非其常見病因？
(A)思慮勞倦 (B)肝陽擾動 (C)中氣下陷 (D)心腎不交
- 50 心悸中，有關「心陽不足」和「水飲凌心」證型之敘述，下列何者錯誤？
(A)兩者均有形寒肢冷的症狀
(B)水飲凌心症見胸脘痞滿，渴不欲飲
(C)心陽不足主症常見小便短少或下肢浮腫的症狀
(D)心陽不足脈沉細無力
- 51 真心痛病情的順逆，關鍵在於防厥、脫，下列敘述何者錯誤？
(A)若四肢逆冷過肘而青紫者，表示病已垂危
(B)神萎和煩躁是真心痛常見的精神表現，若神識模糊不清則病已危重
(C)真心痛常動輒汗出，若汗出增多須防止厥脫之變
(D)真心痛病患陰虛者比陽虛者更容易發生厥脫的變化
- 52 有關陽癇的敘述，下列何者錯誤？
(A)《證治匯補》提出：先身熱掣癇，驚啼叫喊而後發，脈浮洪者，為陽癇
(B)發作後神志喪失約 5~30 秒即恢復如常
(C)癇證初發易見陽癇
(D)治以熄風滌痰瀉火為主

- 53 一患者，常見其精神抑鬱，表情淡漠，神志痴呆，不思飲食，舌淡紅苔白膩，脈弦滑。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者錯誤？
(A)證型—痰氣鬱結
(B)病機—思慮太過，脾氣不運，痰涎內生，蒙蔽神明
(C)治法—健脾益氣，化痰開竅
(D)主方—順氣導痰湯
- 54 腸內絞痛，欲吐不吐，欲瀉不瀉，煩躁悶亂，面色青慘，四肢逆冷，頭汗出，脈沉伏者，為下列何病？
(A)腸癰 (B)乾霍亂 (C)痙瘓 (D)寒疝
- 55 某患者患泄瀉，用葛根黃連黃芩湯治療效佳，下列敘述那些選項較適宜？①腹痛腸鳴，脘腹痞滿，瀉下痛減，糞便臭如敗卵 ②兼見惡寒發熱、鼻塞頭痛，肢體痠痛 ③苔黃脈滑數 ④此類型泄瀉發病急驟，屬於濕熱證，不可驟用補瀉
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②④
- 56 某患者嘔吐，多為清水痰涎，脘悶不食，醫者用半夏、生薑、茯苓、白朮、甘草、桂枝治療效佳，下列敘述那些選項最正確？①患者苔白滑、脈虛弦 ②患者兼見頭眩、心悸 ③病機為邪犯中焦，濁氣上逆 ④治法為溫中化飲，和胃降逆
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 57 鼻淵的辨證應分清虛實，下列敘述何者錯誤？
(A)暴起初病，體質壯實者屬實證 (B)黃膿涕表示感受風熱，或風寒化熱
(C)涕中挾血，多為燥火上干，應警惕癌變 (D)黏涕量多不斷表示脾胃俱虛，氣不攝津
- 58 68 歲男性，主述小便少，點滴而出，甚則閉塞不通，可能是下列何病？
(A)淋證 (B)尿濁 (C)遺尿 (D)癃閉
- 59 52 歲男性患者主訴陰莖痿弱不起，兼見面色㿔白，頭暈目眩，精神萎靡，腰膝痠軟，苔薄白，脈沉細。以下列何方治療最宜？
(A)五子衍宗丸 (B)香砂六君子湯 (C)歸脾湯 (D)六味地黃丸
- 60 下列敘述有關尿濁的治療，何者正確？①尿濁初起以火熱為多，治宜清熱為主 ②病久則脾腎虛弱，治宜補益脾腎，固攝下元為主 ③補益之劑中，亦可佐以清利，清利之劑中，又可兼以補益 ④初起多屬實證，久病多為虛證
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 61 下列有關「陽水」及「陰水」之敘述，何者錯誤？
(A)張景岳認為水腫病在氣分為「陽水」 (B)張景岳認為水腫病在水分為「陰水」
(C)「陽水」諸證多傷外感風寒水濕之邪 (D)「陰水」諸證多脾肺二臟氣結不行
- 62 虛勞證，病患證見潮熱、咽乾失音、五心煩熱、盜汗、脈細數，中醫辨證應屬於下列何者？
(A)心陰虛 (B)脾胃陰虛 (C)肺陰虛 (D)肝陰虛
- 63 56 歲男性，二週前曾有發燒、咳嗽、咽喉疼痛等症狀，後雖漸漸好轉，但五日前開始手腳麻木並逐漸出現手腳無力，走路困難。目前仍有咽乾、口渴、偶嗆咳，舌苔薄白而乾，脈細數。下列何者為其最佳方劑？
(A)清燥救肺湯 (B)麻杏甘石湯 (C)清燥湯《李東垣方》 (D)瀉白散
- 64 關於痹證敘述，下列何者最正確？
(A)痹證是感受風寒濕熱之邪為患，所以治療上不用補藥
(B)病邪由經絡而病及臟腑，而出現臟腑痹的症候，其中以心痹較為常見
(C)患者痹證授予烏頭湯，其鑑別診斷關鍵處是疼痛沉著，肌膚麻木
(D)個體體質強弱在痹證發病上往往佔有決定性的地位，陰血不足之體質患者，病之者多為風寒濕痹
- 65 中醫診斷學的三大原則不含下列那一項？
(A)審病論治 (B)審察內外 (C)辨證求因 (D)四診合參

- 66 中醫典籍中，下列那一本是最早具體闡明脈象原理，聯繫傷寒、熱病、雜病和婦兒疾病的脈證，並且分述三部九候、寸口、二十四脈等脈法的脈學專著？
(A)《瀕湖脈學》 (B)《脈經》 (C)《診家樞要》 (D)《重訂診家直訣》
- 67 某患者主訴咽喉痛反覆發作已三個月，經望診發現咽喉局部紅腫而爛，此證屬於下列何者最適宜？
(A)肺胃熱盛 (B)風熱犯肺 (C)虛火上炎 (D)氣鬱痰結
- 68 食指絡脈診法始見於唐代王超《水鏡圖訣》，對三歲以內的小兒，在診斷上有重要的意義。下列敘述何者錯誤？
(A)三關部位：食指的第一節部位為風關，依序則第二節為氣關，第三節為命關
(B)診絡脈手法：從風關向氣關、命關之方向直推數次，絡脈愈推愈明顯，便於觀察
(C)絡脈浮露者，主病在表，多見於外感表證，絡脈沉滯者，主病在裡
(D)色紫紅的，主內熱；色鮮紅的，主外感表證
- 69 有關《靈樞·五色篇》的面診方法，下列何者錯誤？
(A)年壽候肝 (B)準頭候脾 (C)面王以下候腎 (D)方上候胃
- 70 舌與臟腑之聯繫是通過經絡和經筋的循行聯繫起來，下列敘述何者正確？
(A)足太陰脾經挾舌本 (B)手厥陰心包經之別繫舌本
(C)足少陰腎經連舌本，散舌下 (D)足厥陰肝經絡舌本
- 71 臨床辨別呃逆的寒熱虛實，下列何者錯誤？
(A)苔白、脈遲、手足冷、口中和，是屬寒呃 (B)伴暴渴屬熱呃
(C)呃聲低而長，多屬實呃 (D)久病聞呃，屬危重之候
- 72 若醫師對某感冒患者下了一個「陽虛體質之風寒外感」診斷，則下列症狀出現的先後順序何者最為可能？①惡寒 ②畏寒 ③發熱 ④作嘔流涕 ⑤咽癢作咳
(A)①②③④⑤ (B)②③①④⑤ (C)③②①⑤④ (D)①③②⑤④
- 73 關於診脈的「指法」，下列何者最適宜？
(A)重手取脈曰「按」，中取曰「尋」，輕手循之曰「舉」
(B)十二歲以內均宜一指定三關
(C)醫師宜用左手按病人右手脈，用右手按病人左手脈
(D)三指宜呈弓形，但指頭不可平齊，平齊則無法獨取
- 74 林小姐夏天即易發低熱，胸悶、納呆、泛惡、腹脹、全身困倦，口膩渴不欲飲、小便短赤、舌苔黃膩，其病證以下列何者最適宜？
(A)虛熱 (B)暑濕 (C)寒瀉 (D)暑熱
- 75 下列關於「真陽不足」的敘述，何者錯誤？
(A)脈大而無力 (B)四肢倦怠 (C)口燥舌焦 (D)肌冷，便軟或水瀉
- 76 關於「痰濁上擾」主要症狀之敘述，下列何者最適宜？
(A)眩暈 (B)神志昏迷 (C)癲癇 (D)癰瘰
- 77 下列關於「六經病」的敘述何者正確？
(A)發病時即見少陽病或陽明病者稱為「直中」 (B)陽經病和陰經病同時出現者稱為「兩感」
(C)一經病未罷，又見他經病證的稱為「合病」 (D)兩經病或三經同時發病者稱為「併病」
- 78 關於風溫病氣分證的特點，當見「高熱、咳嗽、氣急、口渴、舌苔黃」等症時，下列何者最適宜？
(A)氣分初熱 (B)肺胃熱盛 (C)氣分大熱 (D)熱結陽明
- 79 某 32 歲女性患者，主訴在連續加班一星期後，開始出現胸口悶，心臟跳動得很厲害，稍微走動就上氣不接下氣，面色無華，舌淡苔白，脈虛，其辨證以下列何者最適宜？
(A)寒凝心脈 (B)心陰虛 (C)心陽虛 (D)心氣虛
- 80 某男性患者平素嗜食膏粱厚味，好飲濃烈醇酒，體胖而痰多，就診時主訴胸口悶痛甚，伴見心悸，痛甚引上腹部，時發時止，身體困重，察其舌苔白膩，脈沉而滑，經醫師診為胸痹，則其病因病機以下列何者最適宜？
(A)肝胃氣滯 (B)陰寒凝滯 (C)痰濁停聚 (D)瘀血內阻