

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者不是一般慢性支氣管炎常見的中醫病名範疇？
(A)喘證 (B)咳嗽 (C)肺癆 (D)痰飲
- 2 60 歲患者有慢性支氣管擴張病史多年，主訴咳嗽痰少、質黏、色白約一個月，並自覺傍晚有潮熱感，夜晚睡眠會出汗，望其身形消瘦、神色疲怠，聲音嘶啞，舌質紅、苔少，脈細數。下列辨證何者最適宜？
(A)風熱犯肺 (B)痰熱壅肺 (C)肺氣虧虛 (D)肺陰虧耗
- 3 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)補中益氣湯 (B)杏蘇散 (C)沙參麥冬湯 (D)麻杏石甘湯
- 4 一患者症狀有乾咳無痰，鼻塞鼻乾，咽喉乾癢，口乾渴，脈浮數，舌紅、苔薄白，治以下列何方最適宜？
(A)止嗽散 (B)桑杏湯 (C)杏蘇散 (D)定喘湯
- 5 35 歲患者就診主訴支氣管擴張已多年，反覆性早晨咳嗽並有黃膿痰、偶夾血絲已多年，近來仍咳吐膿痰，胸滿作痛，身熱，口乾，見其舌質紅、苔黃膩，脈滑數。X 光片顯示右下肺葉浸潤但無開洞。下列治法何者最適宜？
(A)清肺解表 (B)清肺消癰 (C)宣肺化痰 (D)養陰清肺
- 6 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)沙參清肺湯 (C)《千金》葶苈湯 (D)麻杏石甘湯
- 7 王小姐罹患冠心病，除胸悶心悸外，併見胸痛如刺，身倦疲乏，氣短氣促，舌暗有瘀斑，脈弱、細、結代。此診斷以下列何證型最宜？
(A)氣滯血瘀 (B)氣陰兩虛 (C)氣虛血瘀 (D)陽氣虛弱
- 8 60 歲男性冠心病患者，主訴為胸悶痛近 1 月，發作時輕時重，疼痛持續約 5 分鐘，近日寒流來侵胸痛發作較頻繁，並伴見肢體沉重，痰多，咳喘氣促等症，舌紫暗有瘀斑，苔白膩，脈濡滑，以下列何種治療方式最適宜？
(A)炙甘草湯合橘枳薑湯 (B)栝蒌薤白半夏湯合桃紅四物飲
(C)生脈散合四逆湯 (D)血府逐瘀湯合失笑散
- 9 40 歲男性患者，主訴高血壓病近數月，平素自測血壓約為 160/100 mmHg 左右，症狀並有頭眩暈，肌膚麻木不仁，胸悶，納呆，惡心，倦怠，肢體沉重，脈濡滑，舌淡胖苔白膩，治以下列何方最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)半夏天麻白朮湯 (C)血府逐瘀湯 (D)龍膽瀉肝湯
- 10 53 歲男性患者高血壓、高血脂症 5 年，主訴心悸不安伴隨陣發心悸已 2 年，運動心電圖檢查心肌缺血反應(+)，自覺多在飽食後發作心悸，發作時多先覺胸悶，而後感呼吸不順，才開始心悸。患者平時壓力大，常胸悶不舒，心痛時作，唇甲青紫。診其舌質紫黯、瘀斑舌，脈澀。下列病機何者最適宜？
(A)心氣虧虛，胸陽不振 (B)心脈瘀阻，心失所養
(C)寒邪阻絡，胸陽不振 (D)血脈瘀阻，痰濁阻絡
- 11 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (B)參附湯
(C)桃仁紅花煎 (D)栝蒌薤白半夏湯
- 12 42 歲男性患者胃鏡檢查診斷為表淺性胃炎，症見上腹脹滿不舒，但又喜溫喜按，欲嘔、噯氣、吞酸，口乾喜飲，溲黃。診其苔白中微黃膩質偏紅，脈弦帶滑。以下列何方治之最適當？
(A)柴胡疏肝湯 (B)四逆散 (C)半夏瀉心湯 (D)平胃散

- 13 50 歲男性患者，主訴胸痛已 1 月，呈刺痛，固定不移，入夜更甚，並伴有心悸不寧，舌質暗紅，脈結代，下列何者是最適合的診斷？
(A)痰濁壅塞 (B)心血瘀阻 (C)心腎陰虛 (D)陽氣虛衰
- 14 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)栝蒌薤白半夏湯 (B)血府逐瘀湯 (C)左歸飲 (D)參附湯
- 15 43 歲女性患者罹患胃潰瘍，經檢查 HP 陽性反應，開始服用西藥後上腹隱隱作痛，經胃鏡及細菌培養 HP 已轉為陰性反應，轉至中醫門診治療，症見身倦乏力，空腹時胃脘不舒隱隱作痛，喝水及冷物後症加重，大便軟日一行，溲平。診其苔薄白、質淡紅、微嫩，脈沉細緊。以下列何方治之最適當？
(A)黃耆建中湯 (B)安中散 (C)胃苓湯 (D)補中益氣湯
- 16 60 歲男性患者，有吸菸與吃檳榔多年的個人史，最近 3 個月出現吞嚥困難，吞嚥時梗塞而痛，固體食物難入，但湯水可下，形體逐漸消瘦，口燥咽乾，大便乾結。診其舌紅而乾，脈弦細數，其診斷下列何者最宜？
(A)痰氣交阻 (B)瘀血內阻 (C)津虧熱結 (D)氣虛陽微
- 17 解剖學中所謂的食道，在中醫辨證中屬下列何臟腑？
(A)胃 (B)脾 (C)心 (D)肝
- 18 41 歲男性聾啞患者抱著肚子進入診間，隨行親友說他肚子不舒服約數日，下列敘述何者錯誤？
(A)若觸診痛在上腹部者，需考慮胃炎
(B)若伴有心悸，短氣，汗出，脈結代者，需考慮心臟疾病
(C)若痛在左上腹部，伴噁心，口苦者，需考慮肝膽疾病
(D)若痛在右下腹部者，需考慮闌尾炎
- 19 林先生昨晚參加同學會聚餐後，清晨即腹痛泄瀉多次，大便氣味臭穢，肛門灼熱，小便短黃，煩熱口渴。診其苔黃膩，脈滑數。下列處方何者最宜？
(A)保和丸 (B)葛根芩連湯 (C)藿香正氣散 (D)四神丸
- 20 梁先生胃痛暴作，惡寒喜暖，得溫痛減，遇寒加重，口淡不渴，喜熱飲，苔薄白，脈弦緊。此屬下列何證型？
(A)胃寒 (B)脾濕 (C)肝胃不和 (D)虛寒
- 21 黃疸發病迅速，伴有神昏譫語，衄血便血，肌膚瘀斑，舌質紅絳，舌苔黃燥者，宜歸類為下列何者？
(A)陰黃 (B)陽黃 (C)急黃 (D)黃汗
- 22 67 歲男性患者，主訴臃脹，症見腹大堅滿，脘腹撐急，摸之灼手，煩熱，口苦，渴不欲飲，大便秘結。診其舌紅，苔黃膩灰黑，脈弦數。治以下列何方最適合？
(A)實脾飲 (B)茵陳蒿湯合中滿分消丸
(C)調營飲 (D)胃苓湯合柴胡疏肝散
- 23 王先生為無黃疸性 C 型肝炎患者，症見脅肋疼痛，噯氣太息，脘腹脹滿，脈弦。以下列何方治之最適宜？
(A)小柴胡湯 (B)柴胡疏肝散 (C)茵陳蒿湯 (D)大柴胡湯
- 24 37 歲女性患者，有紅斑性狼瘡合併腎病變病史，醫檢見腎功能不良及明顯蛋白尿。患者長期頻尿，口渴，髮質乾枯，易掉髮，常感焦慮煩躁，夜晚精神亢奮難以入眠，眠淺多夢，月經先期而量少。門診時患者面紅、唇乾，下肢輕度水腫，脈細數，舌紅、少津，苔薄少。治以下列何方加減最適合？
(A)溫膽湯 (B)歸脾湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)知柏地黃丸
- 25 63 歲男性糖尿病患者近日開始小便減少，症見少氣乏力，面色無華，唇甲蒼白，肢冷，腹脹，納差，泛惡，嘔吐，苔薄、質淡，脈濡細。治以下列何法最適合？
(A)溫腎益腎 (B)和胃降逆化濁 (C)急溫命門之陽 (D)健脾溫中
- 26 有關「關格」病的氣分、血分辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)若兼有外邪，而出現肺及脾胃症狀，則病多在氣分
(B)若兼有外邪，而出現心及肝腎症狀，則病多在血分
(C)無論有無外邪，若有出血症狀，則可判定病變在血分
(D)在早期階段，即可見到血分見證，如牙宣、鼻衄等
- 27 通常水腫分陽水與陰水，下列何方主治陰水？
(A)越婢加朮湯 (B)實脾飲 (C)疏鑿飲子 (D)五皮飲

- 28 淋證，若見咽乾口渴，少腹急滿，小便短數、灼熱刺痛，治以下列何方最宜？
(A)八正散 (B)五苓散 (C)豬苓湯 (D)知柏地黃丸
- 29 下列何書最早記載中醫用導尿術治療小便不通？
(A)《內經》 (B)《傷寒論》 (C)《千金要方》 (D)《諸病源候論》
- 30 50 歲女性，已停經，就診時主訴西醫診斷為不穩定膀胱症候群，平時小便時不順暢，雙側上腹部脹滿感，最近心情不佳，常常對家人發脾氣，並見舌質淡紅、苔薄白，脈弦，治法以下列何者最適合？
(A)清利濕熱 (B)行瘀散結 (C)疏利氣機 (D)溫陽益腎
- 31 46 歲女性，雙手指節處出現紅斑（Gotttron's papules），雙眼眼皮上有紫色斑（Heliotropic sign），多處關節疼痛，雙手無力上舉，合併有落髮，口舌潰瘍等症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)最有可能診斷為皮膚炎
(B)要衛教病人不可擅自停用正在使用的類固醇及免疫調節藥
(C)可以使用中藥輔助中西合併治療
(D)衛教病人充足睡眠，多運動，多曬太陽，以減少紅斑性狼瘡合併發生的可能性
- 32 55 歲男性患有肌肉關節紅腫熱痛，但局部有畏寒，自覺發熱而觸之不熱；關節屈伸不利、得溫則舒，甚則關節僵硬、變形，但發熱惡寒，小便黃，大便乾，舌紅苔白，脈弦緊數，宜處以下列何方？
(A)小活絡丹 (B)清瘟敗毒飲 (C)桂枝芍藥知母湯 (D)身痛逐瘀湯
- 33 紅斑性狼瘡屬毒熱熾盛型的臨床症狀，下列何者最為少見？
(A)自汗、盜汗 (B)臉部及皮膚紅斑 (C)關節痛 (D)舌紅、脈數
- 34 某 70 歲男性患僵直性脊椎炎（ankylosing spondylitis）已數十年，深受腰膝冷痛所苦，近來肢體關節重著，倦怠，肌膚麻木，舌質淡紅，苔白膩，脈濡緩。診斷以下列何者最宜？
(A)風濕熱痹 (B)風寒濕痹 (C)痰瘀互結 (D)氣血虧虛
- 35 承上題，治以下列何方最宜？
(A)三妙散 (B)薏苡仁湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)獨活寄生湯
- 36 65 歲江男糖尿病已 20 年，下肢易痠痛麻，偶腰痠，口乾不喜飲，口黏、口淡，易身倦，眠淺，舌紅、苔白膩，脈滑數。治以下列何方最適宜？
(A)獨活寄生湯 (B)八味地黃丸 (C)補陽還五湯 (D)當歸拈痛湯
- 37 白虎加人參湯最適合下列那一種消渴的病證？
(A)肺胃並熱 (B)熱傷肺陰 (C)金水兩虛 (D)心氣耗損
- 38 58 歲高膽固醇血症男性患者，症見膚色偏淡暗，冬天肢冷易手發麻，熬夜少動，口乾少飲，胸脅刺痛，腰痠，大便偏乾，夜間頻尿，尿清色淡，舌質暗紅有瘀斑，舌下絡脈青紫曲張，舌苔薄白，脈弦澀、兩尺沉弱。診以下列何證型最適宜？
(A)肝鬱脾虛 (B)胃熱腑實 (C)肝膽濕熱 (D)腎虛血瘀
- 39 42 歲方小姐因糖尿病就診，其症狀有口乾渴喜飲，胸悶脘痞，大便黏膩不爽，舌紅苔黃膩，脈滑數，診斷以下列何者最宜？
(A)胃火消中 (B)燥熱傷肺 (C)濕熱中阻 (D)陰虛火旺
- 40 63 歲女性患者患「梅尼爾氏症」數年，近來因事煩心，症復發，就診時主訴頭暈目眩，且嚴重健忘，經常耳鳴如蟬，不易入睡，眠淺多夢，手心熱，久坐後腰痠，起立時尤甚。診其舌質偏紅，苔薄少，脈細數而弦。治以下列何方最適宜？
(A)左歸丸加菖蒲、郁金、麥冬、五味子
(B)左歸丸加知母、黃柏、地骨皮、牡丹皮
(C)右歸丸加酸棗仁、柏子仁、麥冬、五味子
(D)右歸丸加天麻、鉤藤、半夏、白朮
- 41 30 歲女性患者，主訴精神恍惚近 1 年，其餘症狀尚有眠差多夢，心悸易驚，善悲欲哭，肢體困乏，飲食減少，舌色淡，脈細無力。診斷以下列何者最適宜？
(A)痰氣鬱結 (B)心脾兩虛 (C)痰火上擾 (D)火盛傷陰
- 42 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)順氣導痰湯 (B)歸脾湯 (C)生鐵落飲 (D)二陰煎

- 43 對於年過四旬以上，若經常出現下列那一個症狀較少見於中風先兆？
(A)肢麻 (B)眩暈 (C)肉瞤 (D)失眠
- 44 24 歲王先生於中學時便個性急躁，於 7 年前便出現亂罵人，亂丟東西，或打人情形，且常晚上不睡覺。就診時見其面紅目赤，舌紅絳，脈弦滑數，治以下列何方最適宜？
(A)順氣導痰湯 (B)千金定志丸 (C)養心湯 (D)生鐵落飲
- 45 65 歲病患近 3~4 個月以來，經常咳嗽，咯痰帶血，胸部悶疼、燥熱，口渴咽乾少飲。舌質紅、少苔，脈弦細弱，經診斷為肺癌。治以下列何方最適宜？
(A)麻杏石甘湯 (B)蘇子降氣湯 (C)《千金》葶苈湯 (D)百合固金湯
- 46 下列有關以清熱解毒法治療癌症之敘述，何者錯誤？
(A)本類藥物多有抗菌、消炎、退熱、散腫等作用
(B)對於腫瘤細胞有直接的殺滅作用
(C)用於術後表現出機能減退者
(D)脾胃虛弱患者宜慎用，當輔以健脾藥
- 47 44 歲許先生因肺癌第四期化學治療後胸口疼痛，乾咳少痰，身體倦怠無力神疲，納差，身體消瘦。其順證和逆證以下列何者最適合？
(A)順證：呼吸氣仍短促，咳嗽的力量減弱。逆證：身體更瘦，胃口不佳
(B)順證：會有身熱發乾咳，仍會胃口不佳，身體變瘦。逆證：咳嗽的力量減弱，呼吸變短促
(C)順證：大便稀軟產生，仍會胃口不佳，食後即圓，皮疹有增多。逆證：身體仍倦怠無力，發熱頻率減少
(D)順證：心煩易罵人聲音大聲，對家中大小事仍是思慮清晰。逆證：身心不安，喘息變多，咳血增加
- 48 在日本福島及蘇聯車諾比核災後，研究發現受災區的居民不分成人或孩童皆有高比率的甲狀腺癌的出現，致大家人心惶惶。在《雜病源流犀燭·頸項病源流》也說：西北方依山聚澗之民，其間婦女，往往生結囊如癭。依上列敘述疾病模式，和下列何種因素有密切關係？
(A)食用營養豐富的蔬菜及海帶，針對食物因素預防會有幫助
(B)保持精神的愉快，針對情志內傷的調節一定會有幫助
(C)應多爬山，呼吸新鮮空氣，以及戒菸一定有幫助
(D)應瞭解病患生長環境，針對水土因素預防一定有幫助
- 49 《證治準繩》的先期湯應使用在何種類型之月經先期？
(A)血熱先期，經量過多，或兼陰血不足 (B)血虛先期，經量過少，或兼陽氣不足
(C)氣虛先期，經量過多，經色淡紅 (D)血瘀先期，經量中等，經色暗紅
- 50 32 歲上班族女性，時常熬夜加班，最近一年發現月經量比之前明顯增多，經色深紅，有小血塊。面紅，口乾，小便黃，大便硬，舌質紅，苔黃，脈滑數。下列關於此病患的證候分析以何者最宜？
(A)氣機阻滯，瘀血內停 (B)熱鬱血分，血熱妄行
(C)肺腎陰虛，虛火上炎 (D)氣津兩虧，衝任失養
- 51 承上題，治療此病患的處方，以下列何者最宜？
(A)補中益氣湯《脾胃論》 (B)順經湯《傅青主女科》
(C)先期湯《證治準繩》 (D)血府逐瘀湯《醫林改錯》
- 52 45 歲女性出現月經週期紊亂，煩躁易怒，潮熱多汗，頭暈耳鳴，眠差，舌紅，脈細數，醫師處以仙茅、仙靈脾、巴戟天、當歸、黃柏、知母各三錢治療後，其轉歸與診治思路，下列敘述何者最為適當？
(A)宜續以十全大補湯，陰陽雙補收功
(B)可解除腎陰虛肝火旺的臨床表現
(C)宜更以知母、黃柏、丹皮、茯苓、山藥、山萸肉、澤瀉、生地等藥組方治之
(D)若僅點滴出血，因屬更年期症狀，不需轉介西醫婦產科進一步檢查
- 53 對於經前乳脹之相關敘述，下列何者最不恰當？
(A)於行經前或正值經期出現乳房脹滿疼痛或乳頭癢痛，甚至痛不可觸衣者，可能於乳房摸到結節或腫塊
(B)屬於西醫學中的「經前緊張症候群」，易有乳房局部功能性和器質性症狀，同時又伴有神經精神症狀
(C)主要病機是肝氣鬱結或肝胃氣滯，其次是衝任失調，肝腎陰虛
(D)若合併月經提前，經量少，身倦，腰膝痠軟，口乾，目乾澀與五心煩熱，脈弦細數，宜用柴胡疏肝散治療

- 54 某 38 歲女性患者主訴月經數月不行，其人煩躁易怒，胸脅脹滿，少腹脹痛，舌邊紫黯，脈沉澀，最宜下列何方治療？
(A)芩連四物湯 (B)血府逐瘀湯 (C)溫經湯 (D)歸腎丸
- 55 一婦人月經稀發，婚久不孕，量少色淡，腰痠腿軟，性慾淡漠，小便清長，大便不實，舌淡苔白，脈沉細，其辨證診斷下列何者正確？
(A)腎虛不孕 (B)痰濕不孕 (C)肝鬱不孕 (D)血虛不孕
- 56 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》中對於濕熱帶下用清白散治療，清白散是下列何方加薑炭、甘草、黃柏及椿皮所組成？
(A)三妙散 (B)四物湯 (C)五苓散 (D)六味地黃丸
- 57 38 歲患者每逢行經期則陰戶痠脹墜痛，久站加劇，平躺則舒。平素易頭暈氣短，診其脈細軟，望其舌淡紅苔薄白，其中醫辨證何者最適宜？
(A)寒邪客於下焦 (B)肝氣鬱結 (C)肝血虧虛 (D)氣虛下陷
- 58 下列關於「熱入血室」發病時機之敘述，何者正確？①經行前後發熱 ②適值經期發熱 ③產後惡露未淨之際發熱 ④不在經期而熱迫經行
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③④
- 59 懷孕 16 週時小腹冷痛，面色㿔白，四肢冰冷，納少，大便稀軟，舌淡苔薄白，脈沉弱，治以下列何方最為適宜？
(A)逍遙散《和劑局方》加蘇梗 (B)膠艾湯《金匱要略》加杜仲、巴戟天、補骨脂
(C)當歸芍藥散《金匱要略》去澤瀉 (D)保陰煎《景岳全書》加延胡索
- 60 妊娠小便不通，古稱：
(A)子淋 (B)轉胞 (C)子閉 (D)子滿
- 61 下列關於「產後三病」的敘述，何者正確？
(A)新產婦人有三病，一者病瘧，二者病鬱冒，三者小便難
(B)產後三病之敘述首出於《黃帝內經》
(C)三病之證雖然不同，但都是在產後腎氣虛弱情形下發生
(D)產後發瘧主要是因產後失血傷津，心肝血虛，筋脈失於濡養所致
- 62 關於產後血暈，下列何者正確？
(A)《傳青主女科》中提到產後血暈有氣虛血暈與敗血攻心之分，其中正產敗血攻心暈狂，治法當大補心中之血
(B)《景岳全書·婦人規》提到「產時胞胎既下，氣血俱去，忽爾眼黑頭眩，神昏口噤，昏不知人」，景岳認為此證有二，一為血暈，一為血虛也
(C)產後血暈皆為虛證，乃陰血暴亡所致
(D)產後血暈因血虛氣脫者，急用生脈散
- 63 下列那些是《金匱要略》當歸芍藥散的部分組成？①澤瀉 ②陳皮 ③白朮 ④川芎 ⑤茯苓 ⑥熟地
(A)①③⑥ (B)②④⑤ (C)①③④⑤ (D)②③④⑥
- 64 下列那些是《達生篇》保產無憂方的組成藥物？①蘼艾、川芎、白芍 ②羌活、厚朴、生薑 ③菟絲子、當歸、桑寄生
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 65 有關變蒸學說，下列敘述何者正確？
(A)二十八日為一變 (B)三十日為一變 (C)三十二日為一變 (D)六十日為一變
- 66 關於指紋診法之敘述，下列何者錯誤？
(A)滯主實 (B)沉主裏 (C)紅主熱 (D)淡主虛
- 67 6 歲孩童，最近兩天出現體溫 38~38.5℃，鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、喉嚨癢，醫師檢查咽喉不紅、觸摸身上無汗、舌苔薄白滿佈、脈浮緊。下列何方最為適宜？
(A)《溫病條辨》新加香薷飲 (B)《肘後備急方》蔥豉湯
(C)《溫病條辨》桑菊飲 (D)《溫病條辨》銀翹散

- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒症見咳嗽面色皸白，痰多清稀，鼻流清涕，屬於下列何種證候咳嗽？
(A)濕痰 (B)肺寒 (C)風寒 (D)食積
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒腹痛，食痛者，宜先以小承氣湯下之，若下後仍痛者，以下列何方消導？
(A)香砂六君子湯 (B)香砂平胃散 (C)保和丸 (D)枳實導滯丸
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，一捻金可治痰癰，亦可治不乳，下列何者為一捻金的組成之一？
①巴豆 ②大黃 ③檳榔 ④天竺黃
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①④
- 71 水腫臨床以肌膚浮腫及小便短少為主症。下列敘述何者正確？①水腫先從四肢開始，繼而延及全身，伴有咳嗽等症，是後世所謂陽水 ②全身水腫明顯，病程較長，是後世所謂陰水，由於脾腎二臟俱虛所致 ③陽水病程短預後較好，陰水病程長，且反覆發作，預後較差 ④水腫的發生，外因為感受風邪、水濕或瘡毒入侵，內因主要是肺脾腎三臟功能失調
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 72 關於小兒遺尿之敘述，下列何者正確？①學齡兒童白日遊戲過度、或精神疲勞，偶發作遺尿，是病態應予治療 ②遺尿症多自幼發病，可以為一時性、也有持續數月後消失 ③遺尿若長期不癒，致使兒童遭受精神上的威脅而產生自卑，對小兒智力體格發育都會受影響 ④後世醫家對於小兒遺尿大多認為是腎與膀胱虛冷所致
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 73 白喉是咽喉鼻等部位黏膜上形成灰白色假膜，伴有咽痛或犬吠樣咳嗽、氣喘、發熱和煩躁等症狀。下列敘述何者錯誤？
(A)一年四季都有發病，以秋冬兩季為多見
(B)白喉主要病位在肺胃，假如邪毒攻注經脈，可見頸脖腫脹疼痛，甚至連及胸背，形如牛頸者
(C)白喉假膜由白色轉為灰白色、灰黃色，顏色越深表示病情在進展
(D)治療一般採用發散解表之藥，禁忌養陰留邪
- 74 疰夏主要表現為全身倦怠、飲食不振、大便不調為特徵。下列何者正確？
(A)本病無明顯發熱口渴、多飲、多尿等特徵
(B)《丹溪心法》云疰夏屬氣虛，元氣不足
(C)《證治準繩》提出疰夏是由肺脾之氣不足，胃受夏令之暑氣，熱傷元氣所致
(D)臨床上濕困脾胃得病者，宜使用清暑益氣湯
- 75 6歲孩童，發燒一天，兩側下肢與臀部出現數個紅色斑點，色澤鮮紅，大小不一，至急診檢查發現血小板 4000/uL，白血球 8000/uL，紅血球 420 萬/uL。西醫診斷為特發性血小板缺乏紫斑症。症見唇紅、面赤、膚熱、口渴欲飲，伴有鼻衄，舌質紅，脈洪數有力。下列何方最為適宜？
(A)六味地黃丸 (B)清瘟敗毒飲 (C)歸脾湯 (D)大補陰丸
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒痰飲作喘者，因痰壅塞氣逆也，若其音如潮響，聲如拽鋸者，須急攻痰壅，應以下列何方治療最適宜？
(A)導痰湯 (B)蘇葶丸 (C)滌痰湯 (D)蘇葶滾痰丸
- 77 6歲女童因盜汗前來中醫兒科就診，症見身體消瘦，汗出較多，神萎不振，低熱，口乾，手足心灼熱，形體虛弱，口唇淡紅，舌質淡，苔少併見剝苔，脈細弱。治療以下列何方最適宜？
(A)玉屏風散合牡蠣散 (B)黃耆桂枝五物湯 (C)甘麥大棗湯 (D)生脈散
- 78 下列何者為五遲之一？①語遲 ②項遲 ③髮遲 ④齒遲
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 79 下列何者為小兒最常見的感冒病原？
(A)流感病毒 (B)副流感病毒 (C)鼻病毒 (D)呼吸細胞融合病毒
- 80 兒童黴漿菌肺炎（*Mycoplasma pneumoniae*）的敘述，下列何者錯誤？
(A)是學齡兒童呼吸道感染的主因
(B)黴漿菌肺炎感染後不具有終生免疫保護能力
(C)常見併發症如中耳炎、頸部淋巴腺炎、扁桃腺炎
(D)診斷以實驗室培養（culture）為主