

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者並非中醫外科油膏所使用的油類？
(A)白蠟 (B)松脂 (C)麻油 (D)黃丹
- 2 下列有關中醫外科論脈之敘述，何者錯誤？
(A)患部已潰之後為邪去正衰之際，應見不足之脈
(B)外瘍患部未潰已潰之時，見結代脈，為氣血衰弱
(C)患部在未潰之前，正屬邪盛之時，應見有餘之脈
(D)患部未潰時見不足之脈，則為氣血有餘、毒深邪盛
- 3 一名外瘍病患，患部腫勢硬如結核，不紅不熱，此腫屬於下列何者？
(A)風腫 (B)濕腫 (C)痰腫 (D)氣腫
- 4 下列何者由心脾火毒結聚而成？
(A)牙疔 (B)舌疔 (C)合谷疔 (D)手丫疔
- 5 有關梅核氣之敘述，下列何者錯誤？
(A)一名梅核膈 (B)治宜涼膈散
(C)不因腸胃，故不礙飲食二便 (D)不因表邪，故無骨疼寒熱
- 6 下列何項不是中醫外科清熱法的適應症？
(A)疔瘡 (B)皮損色紅灼熱
(C)流痰初起，骨骼隱痛，漫腫不突 (D)乳癰初起時
- 7 手指生瘡，整個患指紅腫疼痛，並有以下特點：患指成均勻腫脹，且呈半屈曲狀，做被動伸直運動時，強烈疼痛，而且指腹有壓痛感，則最可能的診斷為下列何者？
(A)蛇頭疔 (B)蛇腹疔 (C)蛇背疔 (D)托盤疔
- 8 婦女內吹乳癰，大部分好發於下列何期？
(A)懷孕初期 (B)懷孕末期 (C)哺乳期 (D)更年期
- 9 關於百會疽的證治，下列何者錯誤？
(A)氣實者初起如粟，或頭白堅硬而疼痛，或身熱口渴，或唇燥便秘煩悶，脈洪數
(B)陽虛者漫腫平塌，紫暗堅硬，掀痛根散，惡寒便瀉，脈細數
(C)陽虛浮泛者面赤過煩，口乾不渴唇潤
(D)氣實者宜服桂附地黃丸，引火歸元。更用生附子餅，置兩足心湧泉穴
- 10 小兒 2 週前於右側腋下摸到一個如桃核狀的腫塊，質地堅硬，外觀如正常膚色，近 2~3 日局部疼痛，膚色紅，同時微有熱感。根據上述病況，下列敘述何者錯誤？
(A)最可能的診斷為腋疽 (B)起因多由肝脾二經憂思悲怒，氣結血滯而成
(C)宜內服柴胡清肝湯 (D)宜內服托裏透膿湯

- 11 患者病生於耳前及耳根腮頰之間，初起症見牙關腫痛，憎寒壯熱，腫及腮頰。數日後於盤牙盡處出膿，外腫漸消而頰車腫硬不退，日久復在外腮頰腐潰流膿，甚則臭穢，且牙齒動搖。此病名稱為何？
(A)癰風 (B)骨槽風 (C)繡毬風 (D)面遊風
- 12 某患者皮膚出現如雲片、色赤、浮腫焮熱、痛癢相兼、高累如粟的病灶，此病患最可能的診斷為下列何者？
(A)紫白癰風 (B)赤白遊風 (C)面遊風 (D)厲癰
- 13 承上題，下列何項治療最適宜？
(A)初起宜服「萬靈丹」，次以「胡麻丸」常服
(B)初起宜服「荊防敗毒散」，次服「四物消風散」
(C)初起宜服「萬靈丹」，次服「獨活寄生湯」
(D)初起宜服「仙方活命飲」，次服「人參養榮湯」
- 14 有關葡萄疫的敘述，下列何者正確？
(A)起於腠理不密，落草受風纏綿
(B)頭面周身皆可發，耳項為甚
(C)多因感受癰疫之氣，鬱於皮膚，凝結而成
(D)發於遍身，惟胸臂居多
- 15 某年夏天，讀小學的小強罹患一種皮膚疾病如圖示。症狀是頭皮搔癢，患部覆蓋灰白色鱗屑，頭髮乾枯而且自動斷裂，參差不齊，連根拔落也不覺疼痛，其最恰當的中醫臨床診斷為下列何者？



- (A)禿瘡 (B)油風 (C)鬼剃頭 (D)白駁風
- 16 承上題，下列相關敘述何者錯誤？
(A)本病重局部治療
(B)本病又名「斑禿」
(C)外治可用「掃雪散」、「肥油膏」擦患部
(D)若脾胃積熱或濕重風甚者，可以「防風通聖散」加減內服
- 17 關於婦女陰瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)陰腫因腎經濕熱下注而得 (B)陰蝕可由胃虛積鬱，肝脾風濕下注而得
(C)陰蝕可由房事不潔而得 (D)陰蝕可由產後失慎而得
- 18 下列有關「梅瘡」的敘述，何者錯誤？
(A)又名「梅毒」 (B)又名「廣瘡」
(C)屬於飛沫傳染 (D)可造成多發性器官的感染

- 19 蛇串瘡類似現代醫學的何種疾病？
(A)血管炎 (B)濕疹 (C)蜂窩組織炎 (D)帶狀疱疹
- 20 有關「癰疹」的敘述，下列何者正確？
(A)只會發作在四肢 (B)飲食不潔，毒邪內侵而發是起因之一
(C)俗名痘風瘡 (D)病情消退後通常會留下疤痕
- 21 某女性患者產後右手腕疼痛，觸診發現橈骨莖突部明顯壓痛，微腫脹，皮膚微熱，尺側偏不利，則下列那一條肌腱損傷最有關？
(A)伸拇長肌 (Extensor pollicis longus)
(B)外展拇長肌 (Abductor pollicis longus)
(C)橈側伸腕長肌 (Extensor carpi radialis longus)
(D)橈側伸腕短肌 (Extensor carpi radialis brevis)
- 22 關於肱骨內上髁炎敘述，下列何者錯誤？
(A)上肢屈肘屈腕旋前位時，尺側屈腕肌群過度用力而導致
(B)常見如丟擲手榴彈受傷所致
(C)尺澤穴常見壓痛
(D)常見合併尺神經刺激
- 23 有關肩峰下衝擊症候群 (Impingement syndrome)，下列敘述何者錯誤？
(A)可能與棘上肌 (Supraspinatus) 有關 (B)可能產生疼痛弧
(C)胸廓出口症候群可列入鑑別診斷 (D)第一肋骨異常變大也可造成
- 24 關於梨狀肌症候群 (Piriformis syndrome) 的敘述，下列何者正確？①梨狀肌之起點為薦骨骶前孔外側 ②梨狀肌支配的神經為臀上神經 ③急性期可內服桃紅四物湯加牛膝、乳香、沒藥、製香附、青皮 ④梨狀肌作用是內收髖關節 ⑤利用針刺瀉法，取阿是、環跳、殷門、承扶、陽陵泉、足三里等穴 ⑥梨狀肌之止點在股骨小轉子
(A)①③⑤ (B)①④⑤ (C)②③⑤ (D)②④⑥
- 25 關於膝關節之敘述，下列何者錯誤？
(A)中醫稱膝為筋之府 (B)髌韌帶斷裂多發於 45 歲以上的人
(C)膝關節內側有半膜肌、半腱肌、縫匠肌等 (D)膝關節後側有股二頭肌、腓肌、髂脛束等
- 26 關於下肢損傷之敘述，下列何者錯誤？
(A)髌關節滑膜炎可由於下肢長期過度外展外旋所致
(B)用力踢球或猛然伸小腿，可引起股四頭肌損傷
(C)股內收肌群損傷後，髌關節會呈現稍屈曲內旋跛行
(D)坐骨結節滑囊炎患者，建議坐在較軟的座位上
- 27 某腰痛病人，症狀時好時壞。半個月前腰部疼痛加重，並出現右下肢放射疼痛，大便咳嗽時加劇，休息時減輕，坐姿比站立疼痛，經檢查直腿抬高試驗陽性。膝反射減低，其病灶最常見於那一神經學階層？
(A) L2~3 (B) L3~4 (C) L4~5 (D) L5~S1
- 28 關於膝關節損傷的敘述，下列何者正確？①側副韌帶部分撕裂者，屈伸膝關節手法不宜多做，有可能加重損傷 ②側副韌帶有部分斷裂者，應固定膝關節屈曲 20°~30°的功能位 6~8 週 ③外側副韌帶完全斷裂，多用非手術療法 ④內側副韌帶完全斷裂，可建議患者應儘早作修補手術
(A)②③④ (B)①③④ (C)①②④ (D)①②③

- 29 關於髕前滑囊炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)膝關節損傷中有很高的發病率 (B)和患者所從事的職業有關
(C)在髕骨上緣出現局限性腫脹 (D)小的創傷或潮濕刺激是重要的誘發因素
- 30 有關急性腰肌筋膜炎扭傷臨床症狀的敘述，下列何者錯誤？
(A)受傷時患者可感到腰部有「格答」聲響，隨即產生腰部劇烈疼痛，俯仰屈伸，轉側坐起均感困難
(B)腰脊柱多向健側傾斜，如扭傷在左側，身體向右側傾斜時疼痛減輕
(C)腰肌常有明顯痙攣，深呼吸，咳嗽等均能加重疼痛；患者常以手扶住腰部，防止因活動而產生更劇烈的疼痛
(D)部分患者合併坐骨神經痛
- 31 關於髕部的敘述，下列何者正確？①髕關節周圍的肌肉和韌帶比較堅實穩固，傷筋的發生率一般較低
②胯骨，即髕骨 ③《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中，胯骨又名髀骨 ④胯骨脫位以前脫位最常見
⑤屬於杵臼關節形態
(A)僅③⑤ (B)①②④ (C)①③④ (D)①②③⑤
- 32 關於坐骨結節滑囊炎的敘述，下列何者最適當？
(A)多發於久坐工作的瘦弱中老年人 (B)多發於久坐工作的肥胖中老年人
(C)多發於久坐工作的瘦弱年輕女性 (D)多發於久坐工作的肥胖年輕女性
- 33 下列何者不是參與髕關節屈曲運動之主要肌肉？
(A)髂腰肌 (B)半膜肌 (C)縫匠肌 (D)股直肌
- 34 關於膝膕窩囊腫的敘述，下列何者正確？
(A)絕大多數是膝關節的疝狀物，常見多發性病變
(B)表面光滑，質地較軟，壓痛不明顯
(C)多次按摩後其囊壁可變薄而軟
(D)囊腫位置較表淺
- 35 關於踝關節解剖生理特點的敘述，下列何者錯誤？
(A)是以背伸及蹠屈為主的屈戌關節
(B)內踝有三角韌帶，不易撕裂而常發生內踝撕裂性骨折
(C)外踝有三條韌帶，呈扇形向下放射而較易扭傷
(D)韌帶完全斷裂時活動度會明顯增大
- 36 患者俯臥屈膝呈 90 度，醫者一屈曲跪壓於患者大腿屈面，雙手用力沿患者小腿縱軸向膝關節加施壓力，同時作外展、外旋，或收內旋活動，以上操作，臨床上屬下列何種試驗？
(A)阿普萊（Apley）氏試驗 (B)梯布瑞爾－費舍（Timbrill-Fischer）氏試驗
(C)麥克馬瑞（Mc Murray）氏試驗 (D)愛來（Ely）氏試驗
- 37 下列何者與股骨頭缺血性骨壞死無關？
(A)股骨頸囊內骨折 (B)潛水夫病 (C)地中海貧血 (D)酗酒

38 下列何者為如意金黃散的組成藥物之一？



39 「外治之理即內治之理；外治之藥即內治之藥，所異者法耳。」出自下列那一本書？

- (A)《聖濟總錄》 (B)《太平聖惠方》 (C)《理瀉駢文》 (D)《仙授理傷續斷秘方》

40 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》指出：「跌撲損傷，雖用手法調治，恐未盡得其宜，以致有治如未治之苦，則未可云醫理之周詳也。……，則正骨之道全矣。」其中所謂的「正骨之道」並不包括下列何者？

- (A)製器以正之 (B)施以藥餌之功 (C)用針灸治之 (D)示以調養之善

41 林先生騎自行車跌倒頭部外傷後，心悸心煩不寐，頭暈目眩，手足心熱，耳鳴腰痠，舌質紅脈細數。下列何方劑治療較適宜？

- (A)歸脾湯 (B)炙甘草湯 (C)知柏地黃丸 (D)血府逐瘀湯

42 有關傷科四診的敘述，下列何者錯誤？

- (A)望診著重於形態，可通過五官的異常表現瞭解傷情
(B)聞診包括聽聲音與聞氣味兩方面，可借助擺動、叩擊、捶擊、聽診等方法來實現
(C)問診則是對損傷的暴力大小、身體位置、跌仆姿勢及患者的職業等進行詳細詢問
(D)切診只需對損傷的部位進行觸摸，以熟悉傷情即可

43 《醫宗金鑑·正骨心法》記載，傷損作渴，如胃火熾盛者，宜用下列何方？

- (A)導赤散 (B)玉女煎 (C)竹葉石膏湯 (D)甘露消毒丹

44 就損傷疼痛而言，若其疼痛逐漸開始，冷重著，或痠或濡，陰雨天發作或加重，喜熱畏冷，得熱則減，雖經治療，好轉甚慢，即使治癒，也易復發，則此種疼痛屬於下列何種類型？

- (A)氣滯痛 (B)瘀血痛 (C)傷筋痛 (D)寒濕痛

45 患者常抬舉重物，覺胸腹脹滿，納少，不欲食，依《醫宗金鑑·正骨心法》，宜處以下列何方？

- (A)四君子湯加川芎、當歸、柴胡、山梔 (B)六君子湯加柴胡、川芎、當歸
(C)二陳湯加白朮、川芎、當歸、山梔 (D)小柴胡湯加青皮、山梔


46 有關損傷的敘述，下列何者錯誤？

- (A)移位骨折與傷筋的疼痛容易混淆
(B)損傷早期，血瘀滯於肌表為青紫腫痛，故氣滯與血瘀痛常難以分開
(C)邪毒痛起病較急，局部腫痛漸增，並見高熱惡寒
(D)局部痠痛重著，固定不移，屈伸不利，肌膚麻木不仁，是因為傷後受風寒或居住濕地

47 有關損傷嘔吐的原因，下列敘述何者錯誤？

- (A)頭部內傷，瘀血阻滯，氣血壅塞，致開降失司，發為嘔吐
(B)胸脅損傷，肺氣不降，氣逆而上，發為嘔吐
(C)跌撲打擊，跳躍舉重，閃腰岔氣，致肝氣鬱滯，橫逆犯胃，胃氣上逆，作嘔欲吐
(D)素體肥胖，脾胃不健，運化失司，加之傷後氣血凝滯，痰聚，瘀凝，發為嘔吐

- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法》，若患者因登高墜下，撞打等傷，瘀血積於下焦，宜用下列何方治之？
(A)犀角地黄湯 (B)桃仁承氣湯 (C)抵當湯 (D)復元通氣湯加當歸
- 49 根據《醫宗金鑑·正骨心法》傷損少腹引陰莖作痛，乃瘀血不行，兼何經鬱火？
(A)心 (B)腎 (C)肝 (D)膀胱
- 50 下頷關節脫位《醫宗金鑑·正骨心法要旨》稱為「吊下巴」。脫臼復位時，骨傷科老大夫一定會應用拔伸牽引法，有人稱之為「扣」法。其使力方向，下列何者正確？（↑表示向上使力，↓表示向下使力）
(A) (B) (C) (D)



- 51 關於足蹠骨骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)肌肉牽拉造成撕脫骨折，以第三蹠骨基底部發生率最高
(B)疲勞骨折，又名行軍骨折，多發生於第二蹠骨
(C)第五蹠骨基底部骨折，骨性癒合較緩慢，骨折線消失時間較長
(D)無明顯移位骨折，可外敷中藥，用足底托板加足背扇面形夾板固定
- 52 下列何者為肩關節脫位，常伴有之骨折？
(A)肱骨外科頸 (B)肱骨解剖頸 (C)肱骨大結節 (D)肱骨小結節
- 53 處理陳舊性肘關節脫位，復位前要拍 X 光片，下列何者不是它之目的？
(A)排除骨折 (B)排除骨化性肌炎 (C)確定脫位類型 (D)確定關節黏連程度
- 54 關於橈骨幹骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)橈骨幹中、下 1/3 段交界處肌肉較少，且是應力上的弱點，較易發生骨折
(B)橈骨幹下 1/3 段骨折，骨折遠段因受旋前方肌的牽拉而向前旋轉移位
(C)橈骨上 1/3 骨折者，手法復位後，須將前臂固定於中立稍旋前位或旋前位
(D)兒童多為青枝骨折或骨膜下骨折
- 55 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》曰：「抱膝者，有四足之竹圈也。以竹片作圈，較膝蓋稍大些須，再用竹片四根，以麻線緊縛圈上，作四足之形，將白布條通纏於竹圈及四足之上。用於膝蓋，雖拘制不致痛苦矣。」如圖所示，該器具主要使用在下列何處骨折之固定？



- (A) 胫骨 (B) 連骸 (C) 大槓骨 (D) 輔骨

- 56 下列那幾項運動不是頸項功？①回頭望月 ②前伸探海 ③左右開弓 ④羅漢伏虎
(A)①③ (B)②④ (C)①② (D)③④
- 57 有關骨骼的敘述，下列何者錯誤？
(A)尻骨是骶椎 (B)玉梁骨是顳骨 (C)缺盆骨是鎖骨 (D)髑骨是肩峰
- 58 關節內或關節附近骨折脫位後，因損傷嚴重、急救固定不良、反覆施行粗暴的整復手法和被動活動，致使血腫擴散或局部反覆出血，可能併發下列何種症狀？
(A)創傷性關節炎 (B)關節僵硬 (C)骨化性肌炎 (D)缺血性肌攣縮
- 59 下列何者不是顳頷關節脫位之病因病理？
(A)過度張口 (B)心脾兩虛 (C)暴力打擊 (D)肝腎虧損
- 60 接球時指端被球撞擊而致骨折，不能主動伸直，又稱槌狀指，屬於下列何種骨折？
(A)中段指骨頸骨折 (B)近節指骨基部骨折
(C)近端指骨幹骨折 (D)遠端指骨基底背側撕脫骨折
- 61 關於六淫侵害眼部造成眼病的敘述，下列何者正確？
(A)六淫所致眼病一般以內障眼病為多見
(B)六淫對眼的危害以燥邪對眼危害較大
(C)風為陽邪，易於犯上，常為外邪引起眼病的先導。風邪致病可表現為流淚羞明，目澀作癢，眼瞼腫脹
(D)火邪致病表現多為眼瞼糜爛，腫痛麻木，濕癢並作，眵淚膠黏
- 62 中醫名稱為「瞳神」即水輪，又稱瞳子、瞳人，在西醫應指何部位？
(A)角膜 (B)鞏膜
(C)狹義指瞳孔，廣義泛指瞳孔及其後之眼內組織 (D)脈絡膜
- 63 患者常覺眼睛澀痛，流淚，羞明，如異物入目般，醫者翻轉胞瞼，見瞼內面有數個狀如碎粟米的黃白色小顆粒，其周圍略顯紅赤，觸之堅硬，其最有可能的診斷為何？
(A)金疳 (B)瞼內結石 (C)火疳 (D)粟瘡
- 64 關於赤脈傳睛，下列敘述何者錯誤？
(A)較少引起黑睛病變，故一般不影響視力
(B)兩眦赤脈粗大鮮紅，橫貫白睛，為心經實火，可以瀉心湯合導赤散加減治療
(C)合併胞瞼腫癢，皮色紅赤，出現皮疹是脾肺風熱，以除風清脾飲加減治療
(D)兩眦赤脈淡紅，細小稀疏，治宜補心湯加減，滋陰清熱
- 65 下列何者不屬於胞瞼疾病？
(A)土疳 (B)霰粒腫 (C)金疳 (D)風赤瘡癢
- 66 關於椒瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)多因外感風熱邪毒，內有脾胃積熱，內熱與邪毒相結，上壅胞瞼，脈絡阻滯，氣血失和所致
(B)本病因瞼內面顆粒壘壘，色紅而堅，狀若花椒而得名
(C)本病不具傳染性，不易有併發症或後遺症
(D)本病治療，當內外兼施；輕症可以局部點藥為主，重症則宜配合內治，必要時還須手術治療
- 67 關於胬肉攀睛，下列敘述何者錯誤？
(A)恣嗜五辛酒漿或過度勞欲者多患此症
(B)眼珠暴露於外，易於感邪，使經絡瘀滯，胬肉脹起
(C)若以手術治療，術後仍易復發，宜認真對待
(D)平日頭昏耳鳴，腰膝痠軟，屬流金凌木

- 68 下列何種眼疾常伴黃液上衝，是一種急重眼病？
(A)凝脂翳 (B)火疳 (C)胬肉攀睛 (D)風赤瘡癢
- 69 有關「疳積上目」，下列何者錯誤？
(A)病位局限於黑睛 (B)相當於角膜軟化症
(C)又名小兒疳眼 (D)小兒患寄生蟲感染易罹此疾
- 70 依《靈樞·憂恚無言篇》對音聲的描述，下列何者正確？
(A)會厭者，音聲之窗也 (B)口唇者，音聲之扇也
(C)舌者，音聲之關也 (D)懸壅垂者，音聲之機也
- 71 某患者因用衛生紙清潔耳朵，損傷耳道造成紅腫、癢痛、糜爛，用何方治之？
(A)加味逍遙散 (B)六味地黃丸 (C)柴胡疏肝湯 (D)五味消毒飲
- 72 耳殼流痰發病急，常於夜間睡醒發現，下列相關敘述何者錯誤？
(A)脾胃虛弱，痰濕內生 (B)風邪兼挾痰濕上竄所致
(C)腫處皮色不變，按之柔軟，疼痛劇烈 (D)宜祛痰散結，疏風通絡
- 73 有關膿耳病之敘述，下列何者錯誤？
(A)是指耳膜穿孔，耳內流膿的疾病 (B)內因多屬肝、膽、腎、脾等臟腑功能失調
(C)耳疳者，係耳內流出膿水臭穢 (D)流黃膿者多為脾虛
- 74 患者來診，主訴噴嚏、流涕、鼻塞、惡風發熱，鼻內肌膜淡紅或鮮紅而腫，起病急，病程短，醫師確診為下列何病？
(A)鼻淵 (B)鼻槁 (C)傷風鼻塞 (D)鼻軌
- 75 鼻淵，是因鼻流濁涕，如泉下滲，量多不止為主要特徵。根據《素問·氣厥論》論述，下列何臟腑移熱於腦，則辛頰鼻淵？
(A)肝 (B)肺 (C)膽 (D)小腸
- 76 患者脾氣虛弱，脾不統血，血不循經，則會引起下列何種鼻病？
(A)鼻塞 (B)鼻軌 (C)鼻疳 (D)鼻衄
- 77 患者風熱乳蛾，因風熱外侵，肺經有熱所致，內治宜選用疏風清熱湯治療，方中牛蒡子、桔梗、甘草等，取其下列何作用？
(A)散結解毒，清利咽喉 (B)祛其在表之風邪
(C)清肺化痰 (D)疏風解表
- 78 「咽喉病」證見咽喉淡紅不適，講話音低，氣短懶言，自汗，體倦乏力，多屬下列何者？
(A)肺臟虛損 (B)邪毒侵襲 (C)肝氣鬱結 (D)腎陰虧損
- 79 骨槽風若邪熱熾盛者宜祛風散火，清熱解毒；此時處方以下列何者最為恰當？
(A)用清陽散火湯加殭蠶 (B)清胃散加石膏
(C)黃連解毒湯加生地 (D)導赤湯加牛蒡子
- 80 有關口瘡的敘述，下列何者錯誤？
(A)口瘡又稱口疳 (B)是指口腔肌膜上發生的表淺、如豆大的小潰瘍點
(C)實證多由肝脾積熱而致 (D)虛證多由陰虛火旺而致