

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 王女士，產後第 2 天，孕產史為 G₁P₁，為越南籍配偶，由婆婆陪伴照顧，婆婆堅持產後一定要喝生化湯，此時護理師該如何處置？
(A)接受其傳統習俗，但囑咐其需服藥後 1 小時再喝
(B)採不批判的態度，與王女士討論其想法及決定
(C)為避免衝突，建議等婆婆回去時，再把生化湯倒掉
(D)尊重其習俗，假裝沒看見
- 有關現今產科照護發展趨勢的敘述，下列何者正確？
(A)提升專業人員的衛教能力，並以電腦網絡達成資源共享
(B)鼓勵女性醫師從事婦產科醫療業務
(C)應該挑戰各國的傳統習俗
(D)主張延長住院天數
- 許女士，懷孕 30 週，這兩週血壓上升，尿液檢查也有異常反應，醫師給予胎兒生理活動評估 (BPP)，有關此評估之敘述下列何者正確？
(A)包括胎兒身體張力、胎動與羊膜腔穿刺術等項目
(B)為自我檢查胎動的紀錄方法
(C)4~6 分表示有胎兒窒息，需立即引產
(D)包括胎兒呼吸運動、羊水容積與無壓力試驗等項目
- 下列何者為懷孕之確實徵候？①聽診到胎心音 ②月經未現 ③觸診到胎兒四肢的活動 ④超音波掃描到妊娠囊 ⑤觸摸到胎兒的外形輪廓
(A)①④⑤ (B)①③④ (C)②④⑤ (D)②③④
- 有關妊娠期婦女胃腸系統平滑肌鬆弛所產生之生理變化，下列何者正確？
(A)胃酸分泌減少 (B)流涎症 (C)腸胃蠕動加速 (D)膽汁排出量減少
- 有關妊娠期泌尿系統的變化情形之敘述，下列何者正確？
(A)腎絲球的過濾率增加，使腎臟對糖分吸收閾值升高
(B)腎小管的再吸收速度增加，以代償腎絲球活動的減少
(C)腎臟對葡萄糖的再吸收作用速率是不變的
(D)腎絲球的過濾率增加，使得血液中尿素氮 (BUN) 含量增加
- 陳女士，妊娠 32 週，接受腹部超音波掃描發現胎兒身長體重與 1 個月前相同，估算約為 28 週，胎盤功能正常，所有檢查數值均在正常範圍，但陳女士體重並未增加。對此結果陳女士因焦慮而哭泣，下列何項敘述正確？
(A)這是正常的誤差，請陳女士不要著急可不予理會
(B)鼓勵陳女士正常飲食及充足睡眠，並接受進一步檢查
(C)只要胎兒沒有外觀上畸形，發育遲滯沒有關係
(D)胎兒體重小於妊娠週數較有利於自然生產

- 8 有關胎兒呼吸系統發育之敘述，下列何者正確？
(A)受孕 15 至 17 週已有氣管及支氣管形成
(B)肺泡管的發育開始於受孕第 7 個月
(C)卵磷脂（Lecithin）與抱合髓磷脂（Sphingomyelin）的比值小於 1 表示肺部已成熟
(D)胎兒出生前肺臟在子宮內已具有部分呼吸功能
- 9 王女士，33 歲，目前懷孕 9 週，有貧血的現象。下列何種食物可幫助鐵質的吸收？
(A)麥片 (B)牛奶 (C)橘子汁 (D)熱可可
- 10 陳女士，懷孕 26 週，下列何項血液變化為正常？
(A)纖維蛋白原減少 (B)血比容上升 (C)白血球減少 (D)血紅素下降
- 11 一位產婦入院待產，子宮頸口開 6 公分，因產痛難耐而要求醫護人員提供針灸止痛的措施時，下列有關護理師的反應何者較為合適？
(A)針灸並無法減輕生產疼痛，建議產婦使用硬腦膜下腔麻醉方式來止痛
(B)針灸有利減輕生產疼痛，因此可協助產婦照會中醫師
(C)產房護理師可針對穴位進行針刺以減輕產痛
(D)針灸只能減輕第二產程的產痛，建議產婦可先行使用其他減痛處置
- 12 蘇女士，G₂P₁，懷孕 39 週，因現血與陣痛而入院待產。現子宮頸口開 4 公分，主訴宮縮時下腹部及下背疼痛難忍，導致其疼痛的原因為何？
(A)因子宮韌帶伸張、陰道及會陰肌肉伸展所致
(B)因待產時經常採用同一種臥位而導致背部與腰部神經受壓迫所致
(C)因子宮體下段伸展、子宮頸擴張與子宮收縮時肌肉細胞缺氧所致
(D)因子宮收縮，神經衝動由第 2~4 尾椎神經傳入脊髓所致
- 13 承上題，護理師提供蘇女士背部按摩以減輕疼痛，此護理措施是根據那一種疼痛理論？
(A)認知控制理論（cognitive control theory）
(B)壓力因應理論（stress-coping theory）
(C)害怕－緊張－疼痛理論（fear-tension-pain theory）
(D)門閥或路徑控制理論（gate control theory）
- 14 胎兒以面產式，胎頭完全仰伸進入骨盆時，呈現的徑線為下列何者？
(A)枕額徑（OF） (B)額下前凶徑（SMB） (C)枕額徑（OM） (D)枕下前凶徑（SOB）
- 15 張女士待產時胎心率發生變異性減速（variable deceleration），此時護理師應最先執行的護理措施為下列那一項？
(A)協助張女士左側臥 (B)測量生命徵象 (C)觀察陰道有無出血 (D)抬高張女士頭部
- 16 王女士，46 歲，因子宮肌瘤接受子宮切除手術，有關術後出院照護指導內容，下列何者適當？
(A)每日執行溫水坐浴，促進分泌物排除
(B)術後 6 週內每日做踩單車運動，促進骨盆腔血液循環
(C)術後 6 週內應避免性生活，促進傷口癒合
(D)術後 1 個月內，陰道持續有中量血色分泌物是正常的
- 17 林女士因破水進入產房待產，護理師協助陰道內診，摸到胎頭前凶門，胎頭高度在-3。胎頭高度在-3 意義為何？
(A)胎兒頭部尚未固定 (B)胎兒高度在坐骨棘連線上 3 公分
(C)胎兒高度在坐骨棘連線下 3 公分 (D)胎兒頭部已逐漸下降接近生產
- 18 使用 Bishop 評估引產成功的可能性，須包括之項目為何？①子宮頸擴張 ②懷孕週數 ③子宮頸變薄 ④胎位 ⑤子宮頸位置
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①③⑤

- 19 張女士，產後 2 小時自恢復室返室，惡露呈鮮紅色，1 小時內即浸溼整片產墊，下列敘述何者正確？
①此為早期出血 ②此為晚期出血 ③可能與子宮收縮不良有關 ④可能與胎盤組織殘留有關
(A)僅①③ (B)僅②④ (C)①③④ (D)②③④
- 20 產後純母乳哺餵的婦女，坐月子期間最好的避孕方法為：
(A)口服避孕藥 (B)測量基礎體溫 (C)子宮內避孕器 (D)保險套
- 21 黃女士，G₂P₂，陰道產後 6 小時尚未排尿，她表示：「我從生產到現在只喝一點水，沒什麼尿液感」，下列護理處置何者最適宜？
(A)因個案水喝得少，繼續觀察有無尿液感情形
(B)鼓勵個案多喝水，增加尿液感
(C)若個案超過 8 小時仍未排尿，則協助導尿
(D)評估膀胱，解釋產後膀胱脹滿的敏感度減低，並協助排尿
- 22 有關奶水不足的主要原因，下列何者錯誤？
(A)寶寶含乳姿勢不正確 (B)母親自信不足使催產素反射減弱
(C)母親身體的疼痛抑制催產素反射 (D)未限制哺餵的時間及次數
- 23 黃女士，G₁P₁，陰道生產，想在寶寶 1 歲前離奶（斷奶），下列何者錯誤？
(A)採漸進式的方式以奶瓶餵食來替代母乳哺餵 (B)排空乳房以減輕乳房腫脹不適
(C)穿戴合身且具支托性的胸罩 (D)指導攝取小麥汁或韭菜
- 24 有關 Rubin 提出之產後心理適應中的緊執期（Taking-hold phase）之敘述，下列何者正確？
(A)是產後介於依賴與獨立間的一段時間
(B)話多，喜歡談論懷孕生產過程，以幫助確認孩子已與她分離
(C)接受孩子是一獨立個體，也很注重自己的生理需求
(D)確認孩子的個性及需求，重新設定為人母的角色
- 25 預防產後血栓靜脈炎發生的護理措施，下列何項錯誤？
(A)鼓勵產婦產後早期下床活動 (B)產後第 1 天即可執行產後運動
(C)產後每日評估霍曼氏徵象（Homan's sign） (D)若有血栓病史者，不宜早期下床活動
- 26 哺餵母乳使月經較延後之原因為何？
(A)刺激泌乳激素分泌，抑制動情素與黃體生成激素
(B)刺激動情素與黃體生成激素，進而刺激泌乳激素
(C)刺激泌乳激素與動情素分泌，抑制黃體生成激素
(D)刺激黃體生成激素與泌乳激素，抑制動情素分泌

情況題：江女士，G₁P₁，妊娠 40 週，以 Vacuum 協助自然產下一體重 3,580 公克男嬰。請依上文回答第 27 題至第 29 題：

- 27 新生兒出生 5 分鐘時，護理師評估 Apgar score，除評估心跳、呼吸、膚色及刺激反射外，尚須評估新生兒的那一部分？
(A)外觀是否完整 (B)大小便有無解出 (C)肌肉張力是否有力 (D)身高體重的數值
- 28 產後第 1 天，江女士詢問寶寶的胎頭腫塊（Caput），下列何種解釋最適宜？
(A)這是接生時使用器械產生的，可以去問醫生 (B)這腫塊出生後數天會自行消失，不用擔心
(C)這腫塊柔軟、局部，界限清楚，新生兒常發生 (D)這腫塊可能有顱內出血、黃疸等合併症
- 29 有關江女士的表現，下列何者為潛在適應不良的徵兆？
(A)看寶寶時皺著眉，哭著對護理師說「他看起來好可怕！」
(B)與友人談論其生產之過程
(C)抱在胸前哺餵母乳時，不時的撫摸寶寶有胎頭腫塊的部位
(D)喜歡觸摸寶寶身體及與之輕聲說話

- 30 黃小妹採純母乳哺餵，食慾不錯，出生第 3 天媽媽發現黃小妹臉上膚色黃黃的，測得血清膽紅素為 12 mg/dL，護理師的相關解釋何者正確？
(A)可能是血型不合所導致的病理性黃疸（Pathologic jaundice），要趕快通知醫生做後續治療
(B)可能是核黃疸（Kernicterus）的前驅表現，容易造成黃小妹腦部損傷及智力傷害，最好先照光治療
(C)可能是餵母乳造成的母乳性黃疸（Breast milk jaundice），暫時停止哺餵母乳就會改善
(D)可能是一般的生理性黃疸（Physiologic jaundice），持續注意黃小妹食慾狀況及膚色變化即可
- 31 妊娠早期之孕婦若感染下列何種疾病，容易導致胎兒先天性心臟病、耳聾、白內障等不良後果？
(A)梅毒（syphilis）
(B)風濕性心臟病（rheumatic heart disease）
(C)傷寒（typhoid fever）
(D)德國麻疹（rubella）
- 32 沈女士，21 歲，懷孕 30 週產檢時發現血壓 150/100 mmHg，經診治與追蹤 1 個月後，血壓仍維持在 150/100~160/110 mmHg 之間，34 週產檢時血壓 160/100 mmHg 合併尿蛋白(+)及水腫(+)情形，根據這些臨床徵候，沈女士可能罹患下列何項合併症？
(A)腎性高血壓
(B)子癇前症
(C)妊娠惡化性高血壓
(D)腦中風前症候群
- 33 承上題，沈女士住院安胎，依醫囑予 MgSO_4 2 gm 稀釋於 5% D/W 500 c.c.，以 5 mL/min 靜脈滴注，下列護理措施何者正確？
(A)注意孕婦是否有 MgSO_4 中毒現象，如深部肌腱反射增強、呼吸受抑制
(B) 50% Calcium gluconate 應置於床邊，以備 MgSO_4 中毒時解毒之用
(C)須監控每小時尿量宜少於 25 mL，以避免水分攝取過多導致肺水腫
(D) MgSO_4 可能造成呼吸抑制現象，應監控呼吸速率，宜大於 12 次/分
- 34 形成妊娠中期心灼熱感（heart burn）的荷爾蒙為下列何者？
(A)人類絨毛膜促性腺激素
(B)人類胎盤泌乳激素
(C)黃體素
(D)雌性素
- 35 王女士，52 歲，最近感到下腹部有沉重感，診斷為第一度的子宮脫垂，此與下列何種骨盆腔韌帶無力有關？
(A)闊韌帶、圓韌帶
(B)子宮薦骨韌帶、主韌帶
(C)圓韌帶、主韌帶
(D)輸卵管骨盆韌帶、闊韌帶
- 36 服用口服避孕藥的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)有血栓性疾病史者
(B)已有懷孕可能者
(C)有高血壓病史者
(D)有子宮外孕史者
- 37 王先生與太太結婚 3 年一直沒有孩子，醫師請他接受精液分析檢查，有關收集精液之護理指導，下列何者正確？
(A)須先禁慾 7~10 天
(B)以保險套收集精液
(C)以手淫方式收集精液
(D)精液在運送過程需冷藏
- 38 有關更年期婦女變化之敘述，下列何者正確？
(A)因雌性素減少，使得體內低密度脂蛋白（LDL）增加，易有心血管疾病
(B)因黃體素減少，造成骨母細胞活動力減少，而易有骨質疏鬆症
(C)因雄性素減少，導致陰道容易發炎，而有性交困難
(D)所有的更年期婦女均可接受荷爾蒙補充療法（HRT）
- 39 有關經前症候群的敘述，下列何者正確？
(A)在月經週期的黃體期，產生生理、心理及行為的週期性變化
(B)子宮內膜分泌之前列腺素、黃體素及留鹽激素過多所導致
(C)與是否有潛在性婦科疾病有關
(D)因催乳激素分泌不足所引起

- 40 下列何者為子宮頸癌的危險因子？
(A)糖尿病 (B)單一性伴侶 (C)未生育 (D)較早有性經驗
- 41 下列何者不是 16 歲青少年神經性厭食症的表徵？
(A)進食時會玩弄食物 (B)自覺身體外型太瘦 (C)超過 3 個月沒來月經 (D)四肢冰冷且較怕冷
- 42 林小弟，1 歲 6 個月，護理師使用丹佛 II 發展篩檢測驗林小弟目前的發展情形，下列那一項測驗結果需懷疑林小弟發展有延遲現象？
(A)無法通過倒退走路 (B)無法通過向前踢球
(C)無法通過單腳平衡站立 (D)無法通過以腳跟接腳趾行走
- 43 小明，5 歲，因上呼吸道感染住院，基於以家庭為中心的照護理念，下列何者錯誤？
(A)鼓勵病童其家庭成員，表達對病童罹病的想法
(B)需要時評估病童家人，不能參與照顧病童的原因
(C)教導父母，共同參與病童所需的照護知識及技巧
(D)為賦權父母照顧能力，要求須在院執行病童的照護
- 44 小亮，8 歲，於野外露營時被雨傘節咬傷左小腿，下列何項處置最為適宜？
(A)以夾板固定患肢且保持低於心臟位置 (B)建議儘快沖洗傷口並將傷口切開
(C)可於傷口的遠心端用彈性繃帶綁住 (D)常因革蘭氏陽性桿菌感染需使用抗生素治療
- 45 下列何種藥物可能與雷氏症候群 (Reye syndrome) 有關，不建議兒童使用？
(A) Acetaminophen (B) Ibuprofen (C) Ketorolac (D) Aspirin
- 46 有關兒童肌肉注射部位的考量，下列敘述何者正確？
(A)股內側肌神經血管少，適合為 0~2 歲病童注射
(B)腹臀肌神經血管少，適合為 0~2 歲病童注射
(C)背臀肌吸收最迅速，但 6 歲以下兒童儘量避免使用
(D)上臂三角肌吸收最迅速，適合國小學童預防注射
- 47 下列為 2 歲幼兒滴耳藥的護理步驟，那一個環節出現錯誤？
(A)使用耳藥前，先注意藥物溫度，以接近體溫為宜
(B)協助病童側臥或向健側半側臥，使患耳向上
(C)將病童耳垂往上往後輕拉，以使耳道拉直
(D)沿耳壁滴注藥物，以手指輕微按摩耳部
- 48 小馨，20 個月，身體檢查評估時，一般而言，下列那顆乳齒尚未長出？
(A)犬齒 (B)側門齒 (C)第一大臼齒 (D)第二大臼齒
- 49 王小弟，10 歲，頭部外傷住加護病房治療，因病情穩定轉出至兒科病房，然病童仍躁動不安，欲拔除鼻胃管及靜脈注射留置針，經護理評估為了病人安全需給予約束，下列護理措施何者正確？
(A)配合翻身，每隔 2 小時觀察約束肢體的循環狀態
(B)可採用手臂約束法，將固定帶綁在床欄杆上
(C)可採用雙套結約束法，用棉墊保護雙手，固定於床架上
(D)可採用木乃伊約束法，固定雙手雙腳外，維持頭頸部自由活動
- 50 小強，15 個月大，被診斷有輕微的腦性麻痺 (cerebral palsy)。小強爸爸是個食品公司全職行銷人員，媽媽則在電腦公司上班，家中有請外傭照顧小強，外傭每週一次帶小強去醫院做復健，下列何者為主要的護理措施？
(A)盡力保護避免傷害 (B)解釋腦性麻痺的病因 (C)改善身體心像 (D)促進成長及發展
- 51 小維，足月兒，體重 2,800 公克。出生後的第 3 天，血液檢驗報告其總膽紅素值 (Total Serum Bilirubin) 為 16 mg/dL，醫囑照光治療，下列何者是最重要的護理目標？
(A)準備家屬居家照光療法的護理指導 (B)提供眼罩及確保小維有足夠的水分攝取
(C)每小時執行採腳跟血測量小維的膽紅素值 (D)說明照光療法對小維不會造成任何副作用

- 52 李太太患有妊娠糖尿病，懷孕 38 週，自然娩出一女嬰，出生體重 3,800 公克，有關李小妹出生後的照顧，下列敘述何者錯誤？
(A)需評估李小妹可能會有盜汗、呼吸喘、嗜睡情形
(B)出生後 4 小時應測第一次血糖
(C)當李小妹血糖低於 36 mg/dL 應採取措施
(D)應儘早餵食母乳或配方奶
- 53 翰翰，剛出生，發現有吸入胎便，有關胎便吸入症候群，下列護理評估與判斷何者正確？
(A)會導致腸阻塞或腹瀉
(B)會導致呼吸性鹼中毒
(C)會導致肺栓塞及肋膜積水
(D)會導致缺氧及小氣道阻塞
- 54 劉小妹，妊娠週數 25 週又 5 天出生，體重 680 公克，現住在保溫箱中，目前體溫 36°C，有關維持正常體溫之措施，下列敘述何者錯誤？
(A)維持保溫箱濕度 40%，以避免體熱流失
(B)使用呼吸器加熱潮濕器，以維持氧氣的溫度
(C)給予乾淨的塑膠膜覆蓋，以免對流熱喪失
(D)給予頭部戴帽及毛毯包裹，以保持體溫
- 55 依據娜姬（Nagy）死亡概念理論，下列何者不是 6 歲兒童對死亡的概念？
(A)死亡是一種自然現象
(B)死亡是可以避免的
(C)只有被抓到的人才會死
(D)只有老人才會死掉
- 56 下列何種腸病毒感染的致病原最容易引起神經系統的併發症？
(A)克沙奇 A9 型病毒 (B)克沙奇 B5 型病毒 (C)腸病毒 70 型 (D)腸病毒 71 型
- 57 有關出血性登革熱（dengue hemorrhagic fever）敘述，下列護理措施何者錯誤？
(A)需小心注意觀察病童可能出現腹水、肋膜積水、低血壓等臨床變化
(B)病童會發高燒及全身肌肉關節疼痛，建議使用水楊酸類解熱鎮痛
(C)衛教家人居家預防之道，為撲滅埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊
(D)因其屬於第二類法定傳染疾病，發現新病例需報告當地衛生主管機關
- 58 小瑛，出生時體重為 3 Kg，有關其體重的發展之評估標準，下列何者正確？
(A)足 6 個月時，體重約為 4.5 Kg
(B)12 個月大時，體重約為 6 Kg
(C)2 歲半時，體重約為 9 Kg
(D)4 歲時，體重約為 15 Kg
- 59 小華，5 歲大，疑似細菌性支氣管炎，使用脈衝式血氧分析法（Pulse Oximetry）偵測脈動血氧，下列敘述何者錯誤？
(A)為非侵入性偵測血氧的方法，可單次或連續測量血氧飽和度（SpO₂）
(B)可於耳垂、手指或腳趾放置紅外線掃描感應器來監測動脈血流脈動
(C)感應器的光源探測器位置應固定，避免更換，以增加數值之正確性
(D)儀器顯示的心跳速率與病童實際的心跳相符時，測得的數值才準確
- 60 有關嬰兒及兒童接受氧氣治療之相關敘述，下列何者正確？
(A)使用鼻套管時，氧氣流量不可超過 2 L/min，以免黏膜乾燥
(B)使用氧氣面罩時，氧氣流量不可超過 6 L/min，以免氧氣濃度過高
(C)使用氧氣頭罩時，氧氣流量約調為 5 L/min，以免二氧化碳滯留
(D)使用氧氣帳時，氧氣流量約調為 3 L/min，以免發生火花
- 61 小英，6 歲大，診斷為肺炎，目前痰分泌物黏稠，胸部聽診發現左肺上葉前節有明顯的濕囉音，為小英執行胸腔物理治療，下列護理措施何者正確？
(A)為有效去除痰分泌物，可先行噴霧治療，再行姿位引流與叩擊
(B)執行胸部物理治療的時間，最好是在飯前或飯後半小時
(C)超音波噴霧器底部水槽需加入生理食鹽水，以避免機械受損
(D)引流左肺上葉前節，最好的姿勢是俯臥及拍背部

- 62 吳小弟，2 歲，因持續發燒 5 天以上，且出現嘴唇發紅乾裂及草莓樣舌，診斷為川崎氏症，下列何者不屬於川崎氏症兒童的重要症狀觀察項目？
(A)肛門周圍皮膚脫皮 (B)呼吸喘促 (C)眼結膜充血 (D)四肢末梢紅腫
- 63 有關大動脈轉位(Transposition of the Great Arteries; TGA)的新生兒之護理評估，下列表徵何者錯誤？
(A)紅血球增多 (B)低血氧及發紺症狀
(C)上下肢血壓相差約 20 mmHg (D)心臟聽診時，第二心音加重
- 64 下列何者不是兒童急性風濕熱會出現的臨床表徵？
(A)心臟炎 (B)皮下結節 (C)四肢末梢脫皮 (D)多發性關節炎
- 65 霏霏，2 個月，罹患心房中膈缺損 (Atrial Septal Defect; ASD)，下列護理指導何者不恰當？
(A)一般不會出現發紺現象 (B)1 歲以內將近一半會自動閉合
(C)需小心照護，減少呼吸道感染 (D)按時服用前列腺素 E₁ (Prostaglandin E₁)
- 66 有關血友病病童的運動建議，下列敘述何者正確？
(A)籃球 (B)網球 (C)游泳 (D)跳馬
- 67 有關兒童感染人類免疫缺乏病毒 (HIV) 的症狀，下列何者錯誤？
(A)淋巴間質性肺炎 (Lymphoid interstitial pneumonitis)
(B)肝脾腫大 (Hepatosplenomegaly)
(C)慢性便秘 (Chronic constipation)
(D)口腔念珠菌病 (Oral candidiasis)
- 68 有關苯酮尿症 (Phenylketonuria) 病童飲食指導之敘述，下列何者錯誤？
(A)於確定診斷後，即開始終身飲食控制
(B)嬰幼兒時，餵食特殊配方奶 Lofenalac 和 Phenyl-Free
(C)長大後可以多補充水果、蔬菜、根類或澱粉類食物
(D)應限制麵粉製品、肉類、魚類、牛奶及豆類等食物
- 69 小樺，7 歲，最近因持續發燒、易流鼻血而求診，診斷疑似急性淋巴性白血病，下列那一項檢查結果可以確定其診斷？
(A)周邊血液白血球數量 15,000/mm³ (B)周邊血液血小板數量 20,000/mm³
(C)腦脊髓液色澄清，葡萄糖減少 (D)骨髓中未成熟白血球細胞有 85%
- 70 有關化學治療藥物的副作用與護理措施，下列敘述何者正確？
(A) Cyclophosphamide (Cytoxan) 易造成聽神經毒性，因此需監測聽覺功能
(B) Cisplatin (Platinol) 易造成出血性膀胱炎，應鼓勵病童多喝水
(C) Methotrexate (MTX) 易造成心臟毒性，因此需監測心臟功能
(D) Vincristine (Oncovin) 易造成便秘，應視需要依醫囑使用軟便劑
- 71 有關接受 Port-A 導管植入病童的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)需限制與導管植入處同側的手臂之活動 (B)定期以含 heparin 的生理食鹽水沖洗管路
(C)注射化療藥物前需先反抽，看有無回血 (D)插入角針不易回血時，可請病童抬高手臂

- 72 小明，1 個月大，罹患膽道閉鎖，因發燒、呼吸喘、脾腫大而住院治療，接受鼻胃管灌食，每餐灌食量為 150 mL，護理師灌食前反抽出胃殘餘量 50 mL，下列護理措施何者正確？
(A)應暫時停止餵食，並通知醫師 (B)倒掉反抽的胃殘餘量，再灌入 150 mL
(C)將反抽的胃殘餘量灌回，再灌入 100 mL (D)將反抽的胃殘餘量灌回，再灌入 150 mL
- 73 王小弟，9 歲，將進行腸道手術前的清潔灌腸 (cleansing enema)，下列護理技術之執行，何者正確？
(A)準備蒸餾水 600 mL，溶液溫度為 40~43°C
(B)協助兒童安靜平躺床上後，採右側臥、屈曲雙膝姿勢
(C)將灌腸筒掛於點滴架上，使液面與兒童肛門距離 45~60 公分
(D)請兒童張口深呼吸，潤滑 14 Fr.肛管後，推入兒童肛門內 7.5 公分
- 74 小芸，1 歲半，因罹患克隆氏症 (Crohn's disease) 而接受人工結腸造瘻口手術。小芸母親第一次參與學習腸造瘻口居家護理技巧，下列護理措施及指導何者錯誤？
(A)手術後造瘻口會有暫時性腫脹情形，持續約 3~6 週後，造瘻口會漸漸縮小開口
(B)好的造瘻口呈紅色，若呈現黑色或深色，表示可能因扭轉、脫出或黏連造成血液循環不佳
(C)將保護膜剪成如造瘻口大小或比造瘻口大約 0.5 公分，貼在造瘻口的周圍皮膚上
(D)造瘻口黏膜需比周圍皮膚低，以保護周圍皮膚及造瘻口的完整，促進傷口癒合
- 75 有關沙門氏菌 (*Salmonella*) 感染引致的兒童急性腸胃炎，其大便型態之敘述，下列何者正確？
(A)水樣無臭味 (B)含膿樣分泌物 (C)含有黏膜 (D)含有血絲
- 76 李小妹，9 歲，剛被診斷為惡性腦瘤，母親擔心李小妹知道病情之後會傷心，所以不僅隱瞞病情，還整天面帶笑容，而李小妹卻說：「我這麼不舒服，我媽還笑嘻嘻，她有愛我嗎？」下列護理措施何者較適當？
(A)鼓勵母親將病情告知李小妹，讓李小妹知道母親很愛她
(B)鼓勵醫師將病情告知李小妹，讓李小妹知道母親很愛她
(C)鼓勵母親和李小妹分享彼此的感受，共同面對疾病挑戰
(D)鼓勵母親和李小妹學習病友的經驗，共同面對疾病挑戰
- 77 小華，7 歲，搭乘母親的摩托車上學途中，被轎車撞傷，頭部嚴重撞傷，轉入兒科加護病房，現昏迷指數 3 分，給予疼痛刺激時，手臂和腳均呈僵直和內轉的姿勢，有關這些症狀及受傷部位的描述，下列何者正確？
(A)呈現去皮質僵直姿勢，延腦功能異常 (B)呈現去皮質僵直姿勢，腦幹功能異常
(C)呈現去大腦性僵直姿勢，小腦功能異常 (D)呈現去大腦性僵直姿勢，中腦功能異常
- 78 小敏，出生 6 天，罹患脊髓脊髓膜膨出，有關其手術後的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)觀察神經功能的狀態，以評估腦膜炎徵象 (B)給予被動運動及按摩，以預防肢體攣縮
(C)提供安靜與昏暗的環境，以減少視聽覺刺激 (D)監測哭聲與頭圍，以早期發現合併症
- 79 張小弟，罹患腦性麻痺，有咀嚼及吞嚥困難問題，有關幫助其吞嚥的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)頭部維持後仰位置 (B)食物置於舌頭後方 (C)肩膀稍微向後傾斜 (D)保持雙腳自然下垂
- 80 小玲，1 歲，診斷為單純性熱性痙攣 (simple febrile convulsion)，小玲的媽媽詢問護理師：「小玲未來是否會再發作？」有關護理師的回答，下列敘述何者較適當？
(A)小玲的痙攣與發燒有關，只要避免其發燒，就較不會發作
(B)小玲的痙攣與年齡有關，只要年紀大於 2 歲，就較不會發作
(C)小玲的痙攣與腦波有關，只要腦波檢查正常，以後就不會發作
(D)小玲的痙攣與缺氧有關，只要維持呼吸道通暢，就較不會發作