

113年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、113年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：2317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(二)(包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於《小兒藥證直訣》敗毒散與《太平惠民和劑局方》參蘇飲之異同處，下列敘述何者正確？

- A.兩者皆屬於扶正解表劑
- B.兩者組成中均有人參、柴胡、桔梗、枳殼、茯苓
- C.前者煎服時需加生薑同煎；後者需加薄荷同煎
- D.前者化痰力較強；後者散寒祛濕的力量較強

2.關於辛涼解表劑，下列敘述何者錯誤？

- A.《溫病條辨》桑菊飲解表力強，適用於風溫襲肺，氣分熱甚，熱重寒輕，咳嗽咽痛等證
- B.《傷寒論》麻黃杏仁甘草石膏湯為辛涼重劑，清泄肺熱之功尤著
- C.《傷寒六書》柴葛解肌湯辛涼解肌，適用於風寒漸化為熱，初犯陽明經或三陽合病
- D.《通俗傷寒論》蔥豉桔梗湯解肌清裏，適用於風溫初起，肺氣失宣，身熱而微惡風寒

3.有關《傷寒論》三種承氣湯之煎煮法，下列何者最不適宜？

- A.大承氣湯先煮厚朴、枳實，次大黃，芒硝後下
- B.小承氣湯大黃、厚朴、枳實三味同煎，朴、枳用量亦減
- C.調胃承氣湯大黃、甘草同煎，後納芒硝
- D.大承氣湯、小承氣湯為酒洗大黃，調胃承氣湯之大黃則為生用

4.30歲男性患者昨日受寒後，並伴有鼻塞，惡寒、無汗諸症。兩寸浮微緊，舌淡紅苔薄白，下列處方何者最適宜？

- A.桂枝三錢，芍藥三錢，炙甘草兩錢，生薑三錢，大棗六枚
- B.麻黃三錢，杏仁三錢，桂枝三錢，炙甘草兩錢
- C.麻黃三錢，杏仁三錢，石膏五錢，炙甘草兩錢
- D.麻黃三錢，附子三錢，細辛兩錢

5.下列各方的功用，下列何者最不適宜？

- A.《傷寒論》小承氣湯：瀉熱導滯，消積除滿
- B.《外臺秘要》葱白七味飲：養血解表

- C.《傷寒六書》再造散：補肺益氣，助陽納氣
- D.《金匱要略》三物備急丸：攻逐寒積
- 6.下列各方的功用，何者最不適宜？
- A.《傷寒論》十棗湯：攻逐水飲
- B.《景岳全書》舟車丸：行氣逐水
- C.《傷寒論》大陷胸湯：瀉熱逐水
- D.《傷寒六書》黃龍湯：滋陰通便
- 7.關於《太平惠民和劑局方》四君子湯之敘述，下列何者最適宜？
- A.加葛根、陳皮、木香為《小兒藥證直訣》七味白朮散
- B.方中白朮能健脾燥濕為君藥
- C.加藿香為《小兒藥證直訣》異功散
- D.加陳皮、半夏可治咳嗽痰多稀白之證
- 8.關於《傷寒論》炙甘草湯之敘述，下列何者最適宜？
- A.炙甘草為君藥，用量最大
- B.芍藥可養血斂陰
- C.桂枝、生薑溫心陽，通血脈
- D.可用於陽明腑實證，下之後，證見「脈虛大，手足心熱甚於手足背者」
- 9.《和劑局方》人參養榮湯組成為《和劑局方》十全大補湯去川芎，再加幾味藥物？
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
- 10.關於清熱藥劑，下列敘述正確的有幾項？①黃芩、黃連屬於清虛熱藥物 ②石膏、天花粉、竹葉適用於治療暮熱早涼，盜汗骨蒸之證 ③生地、丹皮、赤芍適用於出血發斑、舌絳起刺之症 ④梔子、連翹、竹葉屬於清心經熱之藥物
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- 11.關於《醫方集解》龍膽瀉肝湯，下列敘述正確的有幾項？①方中生地、當歸之作用主要是清熱涼血 ②具有清下焦濕熱之功用 ③可治耳聾，見舌紅苔黃膩，尿短赤者 ④方中車前子、澤瀉、黃柏之作用主要是清熱

利濕 ⑤可治帶狀疱疹，證見口苦、目赤，脈弦滑有力者

A.1

B.2

C.3

D.4

12. 下列何方的組成中含有冰糖？

A. 《溫病條辨》益胃湯

B. 《醫門補要》復脈湯

C. 《慎齋遺書》百合固金湯

D. 《小兒藥證直訣》補肺阿膠湯

13. 下列藥物組合中有幾項為《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散之組成？①當歸、柴胡 ②地骨皮、知母 ③青蒿 ④胡黃連

A.1

B.2

C.3

D.4

14. 《傷寒論》吳茱萸湯主治胃中虛寒，濁陰上逆。臨床使用時，下列那組症狀最不適合使用本方？

A. 食穀欲嘔，胸膈滿悶

B. 少陰吐利，手足逆冷，煩躁欲死

C. 太陽、少陽合病，惡寒發熱，胸膈滿悶，口苦

D. 厥陰頭痛，乾嘔吐涎沫

15. 關於溫經散寒方劑的組成與應用的敘述，下列何者最不適宜？

A. 《傷寒論》當歸四逆湯主治陽虛血虛，手足厥寒，脈微欲絕

B. 血痹多因勞後汗出受風，邪凝血脈，遂致肌膚麻木不仁，狀如風痹，而脈見濡緩

C. 《金匱要略》黃耆桂枝五物湯主治血痹，乃於桂枝湯方中去甘草，倍生薑，加黃耆而成

D. 臨床若見《傷寒論》當歸四逆湯證，其人內有久寒者，可加吳茱萸、生薑等藥以增加溫中散寒之功效

16. 關於汗證的診療，下列何者最不適宜？

A. 營衛不和之自汗，可治以《傷寒論》桂枝湯

B. 陰虛有火盜汗，可治以《蘭室秘藏》當歸六黃湯

C. 多汗不止，導致心氣、心陰受損者，可以浮小麥配合黃連治之，以清心除煩止汗

D. 表虛自汗，治以《丹溪心法》玉屏風散

17. 關於五更瀉的證治，下列何者最不適當？

- A. 常伴腰酸肢冷，是為寒證。汪昂曰：「久瀉皆由腎命火衰，不能專責脾胃。」
- B. 腎陽虧虛者，黎明之前陽氣當至不至，陰氣極而下行，故為泄瀉
- C. 主治宜以《證治準繩》四神丸。方中以補骨脂壯火益土為君，肉豆蔻溫脾腎，瀉腸止瀉為臣
- D. 《證治準繩》四神丸，乃由《本事方》的二神丸與《聖濟總錄》吳茱萸散組合而成

18. 關於《本草衍義》桑螵蛸散的組成與證治，下列何者最不適宜？

- A. 主治心腎兩虛所致的小便頻數、遺尿、滑精
- B. 桑螵蛸為君藥，龍骨與龜板並為臣藥
- C. 遠志與菖蒲安神定志，交通心腎，是佐而兼使藥
- D. 黃耆補氣，當歸養血，茯神安心神

19. 下列藥物（製附子一枚，乾薑一兩半，葱四莖）共同組成下列那個方劑？

- A. 《傷寒論》白通湯
- B. 《傷寒論》乾薑附子湯
- C. 《傷寒論》四逆湯
- D. 《傷寒論》小建中湯

20. 所謂「氣血不生，一有拂鬱，諸病生焉」。而氣機阻滯，導致臟腑功能失調，下列何臟腑較不相關？

- A. 肺
- B. 脾
- C. 胃
- D. 心

21. 關於《醫林改錯》補陽還五湯之敘述，下列何者最不適宜？

- A. 因氣虛行血無力，故以黃耆、當歸為方中主藥（君藥）
- B. 以川芎、赤芍、桃仁、紅花、地龍為方中佐使藥
- C. 可治半身不遂，口眼歪斜，苔白，脈緩之證
- D. 陰虛血熱者，忌用

22. 58歲男性患者，因覺牙齦不舒，自服草藥（味苦寒）後，呃逆不止，胸悶，上腹悶脹不舒，苔白、舌淡，脈沉遲。下列何處方治療最適宜？

- A. 黃連、吳茱萸、厚朴、茯苓、半夏、紫蘇葉、甘草
- B. 人參、白朮、茯苓、砂仁、山藥、甘草、薏苡仁、陳皮
- C. 紫蘇子、萊菔子、白芥子、肉桂、前胡、當歸、半夏、炙甘草
- D. 丁香、柿蒂、生薑、人參、紫蘇梗、厚朴

23. 45歲女性患者，1月初因受風寒而咳嗽就醫，醫師處方小青龍湯後，痰轉黃黏稠，咳嗽後喘，仍畏風寒，苔黃膩、舌偏紅，脈滑數。下列何處方治療最適宜？
- A. 《攝生眾妙方》定喘湯
 - B. 《傷寒論》小青龍湯加石膏
 - C. 《溫病條辨》桑菊飲
 - D. 《備急千金要方》葶苈湯
24. 下列何者為《丹溪心法》咳血方的主藥？
- A. 青皮
 - B. 梔子
 - C. 瓜蒌
 - D. 訶子
25. 《金匱要略》黃土湯使用下列何藥養血、止血？
- A. 伏龍肝
 - B. 阿膠
 - C. 龍眼肉
 - D. 白芍
26. 46歲婦女因睡眠障礙求診，診察發現虛煩不得眠，兼有虛熱盜汗、心悸健忘，平時容易倦怠，舌淡、苔薄白，脈細弱。下列何方治療最適宜？
- A. 《濟生方》歸脾湯
 - B. 《脾胃論》補中益氣湯
 - C. 《攝生總要》天王補心丹
 - D. 《金匱要略》酸棗仁湯
27. 關於《醫學衷中參西錄》鎮肝息風湯之應用，下列何者最不適宜？
- A. 熱盛者：可加清熱藥物，如黃連、石膏
 - B. 痰多者：可加祛痰藥物，如貝母、膽星
 - C. 頭痛、眩暈、口苦口乾者：為肝腎陰虛重，可加強滋補肝陰藥物，如熟地、吳茱萸等
 - D. 可用於肝陽上亢、肝風內動之類中風證
28. 43歲女性病患，上週外感發熱，經治療後已無發熱等表證。但出現大便乾結，口乾口渴。無腹脹腹滿等症。其脈沉而無力，舌乾紅少津。下列處方何者最適宜？
- A. 《金匱要略》大黃附子湯
 - B. 《傷寒論》麻子仁丸

C.《蘭室秘藏》潤腸丸

D.《溫病條辨》增液湯

29.由香豉一錢、沙參二錢、貝母一錢、杏仁一錢五分、梔皮一錢、桑葉一錢、梨皮一錢等所組成方，下列何者為其功用？

A.養陰清肺

B.輕宣溫燥

C.清燥潤肺

D.輕宣涼燥

30.《重訂嚴氏濟生方》實脾散的組成中，下列何者為君藥？

A.附子、乾薑

B.白朮、木瓜

C.草果、大腹皮

D.厚朴、木香

31.下列那些藥物為《備急千金要方》獨活寄生湯之組成？

A.細辛、秦艽、茯苓、白朮

B.杜仲、牛膝、狗脊、陳皮

C.肉桂心、防風、川芎、黃耆

D.防風、當歸、芍藥、乾地黃

32.有關《醫門法律》清燥救肺湯的敘述，下列何者最不適宜？

A.為明末清初喻昌的創方

B.主治溫燥傷肺之重證，出現氣陰兩傷之證

C.方中以黃耆、甘草益氣和中，使土旺金生

D.桑葉是全方劑量最大的藥物，取其輕宣之性

33.有關薏苡仁的敘述，下列何者最不適宜？

A.為《備急千金要方》葶苈湯的組成之一

B.《神農本草經》記載：「主筋急拘攣，不可屈伸。」

C.《醫學正傳》三妙丸中，薏苡仁有利水滲濕的效果

D.炒用，可益脾止瀉

34.關於二陳湯，下列敘述何者錯誤？

A.其組成為製半夏、陳皮、茯苓、炙甘草。二陳指陳皮、半夏，其中以半夏為主藥藥物

B.二陳湯適用於燥痰，證見咳嗽、痰多色白易咳，胸膈痞悶，噁心嘔吐，肢體困倦或頭眩心悸

C.方中茯苓可健脾滲濕化痰，為方中佐藥

D.因食作痰：可加山楂、麥芽、神麴

35.關於潤燥化痰劑，下列敘述何者正確？

A.燥痰證主要病位在肺，以痰熱壅肺為主要病機，與陰虛無關

B.《醫學心悟》瓜蒌貝母散為潤燥化痰主要方劑之一

C.燥熱傷肺、灼傷津液、痰哮氣喘亦可使用

D.燥邪較重，咳痰帶血，可加杏仁、枇杷葉以滋肺陰

36.30歲男性，暑天求診，自訴身熱、心煩口渴，小便不利，嘔吐泄瀉，治以下列何方最適宜？

A.《和劑局方》參苓白朮散

B.《傷寒直格》六一散

C.《傷寒論》葛根芩連湯

D.《小兒藥證直訣》導赤散

37.下列何者非寒熱並用之劑？

A.《蘭室秘藏》枳實消痞丸

B.《傷寒論》半夏瀉心湯

C.《和劑局方》五積散

D.《傷寒論》甘草瀉心湯

38.下列何者為《丹溪心法附餘引王隱居方》礞石滾痰丸與《溫熱經緯》甘露消毒丹的共同組成藥物？

A.沉香

B.大黃

C.黃芩

D.滑石

39.下列何者為《濟生方》導痰湯之方證？

A.濕痰內阻，氣機不暢

B.脾虛失運，飲停心下

C.食滯痰多

D.痰熱互結

40.有關《傷寒論》大柴胡湯之敘述，下列何者最適宜？

A.本方係由《傷寒論》小承氣湯與《傷寒論》小柴胡湯化裁而成

B.本方以太陽、陽明合病為主證

C.本方重用生薑的原因，是由於證見胸脇苦滿

D.本方與《金匱要略》厚朴七物湯方中，均有芍藥

41.關於小茴香的敘述，下列何者最不適宜？

A.陰虛火旺者，慎服

B.小茴香為繖形科植物茴香的乾燥葉，本品多做食物佐料

C.治虛寒腹痛：可配肉桂，溫補肝腎，散寒止痛

D.溫腎祛寒，而能止痛，可用於寒疝疼痛

42.宜包煎，以避免刺激咽喉，下列何藥物最適宜？

A.車前子

B.辛夷

C.浮萍

D.石膏

43.能祛風濕、通經絡、清熱解毒，還有降血壓的作用，下列何藥物最適宜？

A.豨薟草

B.防風

C.松節

D.海桐皮

44.用於疹發不暢、熱毒或氣虛下陷等證，下列何藥物最適宜？

A.蔓荊子

B.紫蘇

C.葛根

D.升麻

45.能祛風止痛及治療風熱所致的頭昏頭痛、目赤腫痛、多淚等證，下列何藥物最適宜？

A.蔓荊子

B.紫蘇

C.藁本

D.秦艽

46.治療尿路感染及肝膽結石，下列何藥物最適宜？

A.車前子

B.金錢草

C.苦楝皮

D.瞿麥

47.關於玫瑰花的功效應用敘述，下列何者最不適宜？

A.行氣解鬱，和血散瘀。用於肝鬱脇痛、胃脘痛

B.行氣解鬱，和血散瘀。用於月經不調、損傷

C.理氣化痰，用於痰氣交阻的梅核氣

D.性味：酸、苦，寒，直折火氣；中焦虛寒，泄瀉久痢，忌用

48.下列關於佛手的功效應用，何者最不適宜？

A.降氣止呃，兼有溫腎助陽

B.燥濕化痰之力較緩和，不似陳皮之偏於苦燥，但有舒肝行氣之功

C.舒肝，理氣，和中，化痰

D.用於咳嗽痰多之證

49.下列何藥具有益脾滲濕、清熱排膿、除痺止瀉，可用於肺癰、腸癰等證？

A.蒼朮

B.薏苡仁

C.魚腥草

D.敗醬草

50.具有理氣調中，散寒止痛的功效，下列何者最適宜？

A.川烏

B.枳實

C.檀香

D.附子

51.瀉下藥物，兼具驅蟲作用，下列何藥物最適宜？

A.檳榔

B.蘆薈

C.火麻仁

D.芒硝

52.苦，寒，微辛，有毒，具瀉下、利尿、殺蟲之功能，下列何藥物最適宜？

A.牽牛子

B.甘遂

C.大黃

D.商陸

53. 瀉心肺之邪熱，使屈曲下行，從小便出，下列何藥物最適宜？

- A. 黃柏
- B. 黃芩
- C. 丹皮
- D. 梔子

54. 善清透陰分伏熱，亦善清虛熱，用於溫熱病後期，熱邪伏陰分，無汗骨蒸等證，下列何藥物最適宜？

- A. 知母
- B. 生地黃
- C. 牡丹皮
- D. 地骨皮

55. 瀉下逐水消腫，同時配伍用於破血、消癥，下列何者最適宜？

- A. 千金子
- B. 巴豆
- C. 牽牛子
- D. 甘遂

56. 關於生蒲黃的敘述，下列何者最適宜？

- A. 溫經止血
- B. 收斂止血
- C. 行瘀止血
- D. 為木蘭科植物的乾燥花粉

57. 關於花蕊石的敘述，下列何者最適宜？

- A. 化瘀止血
- B. 涼血止血
- C. 養血止血
- D. 溫經止血

58. 關於紅花的描述，下列何者最適宜？

- A. 活血祛瘀，利尿消腫
- B. 少用養血，多則行血
- C. 活血止痛，化瘀止血
- D. 破血逐瘀，消積止痛

59. 下列何藥能破血，又能殺蟲？

- A.王不留行
- B.仙鶴草
- C.乾漆
- D.澤蘭

60.牛膝功擅引血下行，可用治下列何者？

- A.吐衄
- B.便血
- C.崩漏
- D.痔瘡

61.用於痛經、血滯經閉，還可用於肺癰、腸癰初起，腸燥便秘，下列何者最適宜？

- A.火麻仁
- B.桃仁
- C.冬瓜仁
- D.杏仁

62.具有補氣生津、調肺潤燥之功效，下列何藥物最適宜？

- A.天門冬
- B.女貞子
- C.太子參
- D.扁豆

63.具有滋陰潛陽、軟堅散結、退熱除蒸之功效，下列何藥物最適宜？

- A.墨旱蓮
- B.紫河車
- C.女貞子
- D.鱉甲

64.當歸的敘述，下列何者最不適宜？

- A.補血和血
- B.活血調經止痛
- C.益胃生津
- D.潤腸通便

65.狗脊的應用，下列何者最適宜？

- A. 腎虛有熱
- B. 寒濕帶下
- C. 小便不利
- D. 口苦舌乾

66. 具有補脾養胃、生津益肺、補腎澀精之功效，下列何者最適宜？

- A. 白朮
- B. 黃耆
- C. 山藥
- D. 人參

67. 具有補肝益腎，養血生津之功效，下列何者最適宜？

- A. 黃精
- B. 桑椹
- C. 玉竹
- D. 沙參

68. 胖大海的應用，下列何者最不適宜？

- A. 風寒咳嗽
- B. 大便乾結
- C. 肺燥咳嗽
- D. 咽痛聲啞

69. 白果的敘述，下列何者最不適宜？

- A. 大量生食，易引起中毒
- B. 為銀杏的果實
- C. 咳嗽痰稠不利者，慎用
- D. 未經硫黃薰蒸，不易保存

70. 能治熱痰與風痰，治熱痰常與瓜蒌、黃芩等配伍，下列何藥最適宜？

- A. 杏仁
- B. 半夏
- C. 百部
- D. 蘇子

71. 地龍的敘述，下列何者最不適宜？

- A. 鹹，寒。歸肝、脾、膀胱經

- B.清熱息風定驚，平喘，通絡，利尿
- C.可用於血虛氣滯、經絡不利的半身不遂
- D.脾胃虛寒者，過量易引起嘔吐

72.冰片的敘述，下列何者最不適宜？

- A.辛、苦，微寒。歸心、脾、肺經
- B.開竅醒神，清熱止痛
- C.入煎劑適量；外用撒敷
- D.孕婦慎服。氣血虛弱者忌服

73.白果大量與生食易引起中毒，毒性與下列何者相同？

- A.洋金花
- B.凌霄花
- C.半夏
- D.杏仁

74.訶子用於瀉腸止瀉時，下列何炮製方法最適宜？

- A.煨製
- B.醋製
- C.生用
- D.煎濃湯

75.內服：研末，溫湯化服，探吐，限服一次，下列何藥物最適宜？

- A.瓜蒂
- B.硼砂
- C.皂角
- D.膽礬

76.關於萊菔子的敘述，下列何者最不適宜？

- A.應用於痢疾腹痛，裏急後重，可配伍木香、大黃以利氣化滯
- B.應用於大便秘結，可單用本品炒研內服或煎湯加蜂蜜調服
- C.應用於尿路結石，常配伍海金沙、石韋使用
- D.應用於咳嗽痰多，氣逆喘促，常用炒萊菔子配伍紫蘇子、白芥子以降氣祛痰

77.下列何藥具有消食和胃的功效；並可單用為末服，應用於婦人回乳？

- A.王不留行

- B.神麴
- C.萊菔子
- D.雞內金

78.破癥瘕，發斑痘，化骨哽，殺三蟲，下列何者最適宜？

- A.漏蘆
- B.續隨子
- C.貫眾
- D.射干

79.關於以下藥材的藥用部位，何藥與其他三者不同？

- A.牛蒡子
- B.五倍子
- C.地膚子
- D.蘇子

80.有關苦楝皮的敘述，下列何者最不適宜？

- A.功效為殺蟲、療癬
- B.有一定毒性，不宜持續和過量服用
- C.性味：苦，寒
- D.為楝樹的樹皮