

112年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、112年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試
代 號：2315

類科名稱：臨床心理師

科目名稱：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

一、申論題

※本題為申論題，請使用鍵盤及滑鼠輸入作答內容，由左至右橫式作答。

- 1.何謂環境基因學 (epigenetics)？請舉臨床案例加以說明。(15分)
- 2.在相關法的研究設計中，橫斷式研究的缺點是無法決定方向性問題 (directionality problem)，試問在相關法的其他研究設計中何種研究設計可以解決此問題？請舉二種研究設計說明之。(15分)
- 3.請以創傷後壓力疾患病因為例，說明學者強調整合性派典 (integrative paradigm) 的重要性及其意義。(20分)

二、測驗題

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.DSM-5英文版由下列何者所出版？
 - A.英國精神醫學會
 - B.世界衛生組織
 - C.美國精神醫學會
 - D.國際精神醫學會
- 2.DSM-5中之拔毛症 (trichotillomania, hair-pulling disorder) 屬於下列何者？
 - A.他處未分類之衝動控制疾患
 - B.強迫症與其相關障礙症
 - C.焦慮症
 - D.性偏好症
- 3.下列何者不是DSM-5對精神疾病的定義？
 - A.造成認知上的顯著困擾
 - B.造成情緒調節障礙
 - C.嚴重影響社交活動
 - D.導致個人與社會的衝突
- 4.有些臨床症狀被認為是比較具有跨文化的、無明顯文化差異的，但不包括下列何者？

A.焦慮症狀

B.憂鬱症狀

C.幻覺

D.妄想

5.下列何者不是最常使用的行為遺傳研究法？

A.家族法（family method）

B.雙胞胎研究法（twin method）

C.領養研究法（adoptees method）

D.個案研究法（case study method）

6.最能夠強調未經操弄前的兩變項關係之研究方法是：

A.使用控制組

B.縱貫性研究設計

C.相關法

D.個案研究法

7.下列有關科學的敘述，何者錯誤？

A.科學取向要求清楚且準確的陳述

B.無論理論多麼合理，檢驗的結果也可能否定科學家的預期

C.科學的可重複性與可驗證性，必須藉由使用高效度與高信度的評估工具

D.心理病理學的研究較難達到可重複性與可驗證性

8.探討每天寫日記是否可幫助人們抒發情緒，60位疑似有憂鬱症狀的大學生隨機分派至兩組，一組每日針對生活中令其困擾之事，撰寫一篇深入描述自己想法及感覺的日記，需連續寫7天。另一組則針對當日所知道的社會事件，撰寫一篇文章，亦是需連續寫7天。研究結果發現被分派至日記組，其在貝克憂鬱量表的分數，在研究前後有明顯改變，另一組則無。此效果，在臨床心理學研究方法中，可稱為：

A.類化效果（generalized effect）

B.實驗效果（experimental effect）

C.安慰劑效果（placebo effect）

D.練習效果（practice effect）

9.下列對雙盲設計（double-blind design）的描述何者錯誤？

A.實驗者（experimenter）需要完全掌握有關該實驗的所有訊息

B.可減少研究結果受到研究參與者偏誤（participant bias）所影響

C.可防止研究結果受到安慰劑效果（placebo effect）所影響

D.可提升該實驗結果的效度（validity）

10.下列何者研究概念，通常發生在學術場域中，並以隨機臨床試驗研究來進行。主要是要確定治療在理想情況下或是純淨的條件下，是否能夠達到預期的療效？

A.治療效能（treatment efficacy）

B.治療效果（treatment effectiveness）

C.治療效率（treatment efficiency）

D.治療影響（treatment impact）

11.下列關於個案研究法（case study method）的敘述何者錯誤？

A.可以用來評估新穎的治療方式

B.可以用來分析臨床上極少見的個案

C.可以用來否證某些臨床現象與關聯性

D.可以作為流行病學最常使用的研究方法

12.某甲罹患了恐慌症，但是引起症狀發作的原因不明。欲採用「個案研究（case study）」的方式深入了解在他身上造成恐慌症的機制。下列何者不是採用個案研究的優點？

A.能夠形成多種不同的假設

B.能夠對現象或機制有豐富的描述

C.能夠驗證因果關係

D.能夠探索特殊性或新奇的影響因子

13.依據DSM-5，下列有關流行病學盛行率研究結果之敘述，何者正確？

A.異食症（pica）可能發生在懷孕期的女性

B.勃起障礙症（erectile disorder）的盛行率與年齡無關

C.病態偷竊症（kleptomania）的比例男性顯著高於女性

D.夜間遺尿（nocturnal enuresis）在男性和女性身上一樣普遍

14.延長暴露法（prolonged exposure）被廣泛應用於治療害怕或畏懼症，此技術基本上是依據何項學習原則？

A.負向增強（negative reinforcement）

B.正向處罰（positive punishment）

C.觀察學習（observational learning）

D.消弱（extinction）

15.下列何者不是世界衛生組織失能評估量表第二版（The World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0, WHODAS 2.0）評估的個案功能領域？

A.自我照顧

B.家事活動

C.運動習慣

D.站立和行走

16.素質－壓力模型（Diathesis-stress model）是解釋心理疾病的整合模型。其中，Caspi等人（2003）探討血清素轉運子基因（serotonin transporter gene）與兒童受虐經驗對憂鬱症發生機率的預測力，被認為是互動模式（interactive model）的經典例子。下列關於互動模式的敘述，何者最不恰當？

A.素質（diathesis）一定要在壓力之前就出現，才會產生效果

B.不論壓力多大，若無某種特定的素質，個體發病的機率即大為降低

C.無論是否有特定素質，發病機率與壓力程度之間都呈現正相關，只是相關程度不同

D.即使具有特定素質，在沒有壓力的狀況下，發病機率也很低

17.在DSM-5中，針對創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder）所涵蓋的診斷準則，下列何者不是「文化相關診斷議題」上所須考慮的症狀性質？

A.痛苦的夢（distressing dreams）

B.身體症狀（somatic symptoms）

C.認知症狀（cognitive symptoms）

D.逃避和麻木症狀（avoidance and numbing symptoms）

18.下列何者最符合描述焦慮疾患患者的問題解決之脆弱性歷程？

A.其問題解決歷程包括那些步驟

B.影響其問題解決品質的機制有那些

C.成功與失敗的問題解決經驗各是什麼

D.從小到大所採用的問題解決方式

19.張同學的室友最近時常自笑自語、疑似有聽幻覺，張同學這學期剛學過DSM-5，他認為同學的行為很像是思覺失調症的典型病徵，張同學的判斷，最可能運用了下列何種策略？

A.可得性經驗法則（the availability heuristic）

B.解釋性推論（interpretation reasoning）

C.代表性經驗法則（the representativeness heuristic）

D.情緒性推論（emotion reasoning）

20.下列何種神經傳導素的增加在自閉症類群障礙兒童患者最常被發現？

A.多巴胺

B.正腎上腺素

C.血清素（5-HT）

D. 氟苯丙胺 (fenfluramine)

21. 讓害怕髒污的強迫症病患接觸髒東西時，該病患腦部何區域血流量會明顯增加？

A. 頂葉 (parietal lobe)

B. 前扣帶迴 (anterior cingulate)

C. 背外側前額葉 (dorsolateral prefrontal cortex)

D. 藍斑核 (locus coeruleus)

22. 如果在腦中發現類澱粉蛋白沉積 (beta-amyloid protein deposits)，則足以診斷個案為下列何者？

A. 阿茲海默病 (Alzheimer's disease)

B. 思覺失調症

C. 智能缺損

D. 此資料不足以診斷任何心智疾病

23. 下列關於思覺失調症 (Schizophrenia) 的神經生理特徵之敘述，何者錯誤？

A. 思覺失調症患者之腦結構，在頂葉 (parietal lobe) 體積較健康腦來的小

B. 思覺失調症患者之腦結構，海馬迴 (hippocampus) 的體積較健康腦來的小

C. 思覺失調症患者的腦室常較健康對照組之腦部來的大

D. 在扣帶迴皮質區 (cingulate cortex) 有明顯增加的GABA結合位置 (GABA-binding sites)

24. 腦中的灰質 (gray matter) 主要是由下列何者組成？

A. 神經元 (neurons)

B. 腦溝 (sulci)

C. 腦裂 (fissures)

D. 腦膜 (meninges)

25. 從基因的典範來看，魏氏智力測驗的結果，由下列何種概念來解釋最為恰當？

A. 基因型 (genotype)

B. 表現型 (phenotype)

C. 共享環境 (shared environment)

D. 非共享環境 (nonshared environment)

26. 行為主義 (Behaviorism) 對心理病理的看法，下列敘述何者錯誤？

A. 問題行為的持續，主要是因為它們被增強 (reinforced)

B. 「獲取注意力 (getting attention)」是問題行為持續常見的增強物

C. 行為治療的方式是相當個人化 (tailored)，因為每個人的「行為—增強物」間的聯結不同

D. 暫時隔離法 (Time out) 是利用「負性增強 (negative reinforcement)」的方式來減少問題行為

27. Lorber (2004) 針對心理病態 (psychopathy) 的病人，進行威脅刺激的研究並測量膚電反應，下列結果何者正確？
- A. 在休息狀態下，病人之膚電反應較一般人高
 - B. 在威脅刺激下，病人之膚電反應較一般人高
 - C. 在休息狀態下，病人之膚電反應較一般人的變異大
 - D. 在威脅刺激下，病人之膚電反應較一般人低
28. 關於強迫型人格障礙症的敘述，下列何者最不適宜？
- A. 堅持自己做事方式，並拒絕與他人共事
 - B. 過度謹慎、反覆檢查細節
 - C. 強迫型人格障礙症與強迫症本質上類似
 - D. 對道德、倫理或價值觀過度嚴苛
29. 研究發現，把大量飲酒視為正常行為的文化或社會氛圍下，下列何種狀況最可能發生？
- A. 酒癮患者的盛行率會下降
 - B. 飲酒率會增加
 - C. 有酒癮的女性比例會降低
 - D. 低社經地位的男性更有可能變成酒癮患者
30. 具有對立反抗症 (oppositional defiant disorder) 診斷的孩童，比起患有注意力不足及過動症 (ADHD) 的孩童，下列敘述何者正確？
- A. 比較衝動
 - B. 男性所占比例更高
 - C. 對於不守規矩的行為故意的成分較高
 - D. 注意力損傷程度更大
31. 有關厭食症的性格特徵，不包括下列何者？
- A. 自我導向的完美主義
 - B. 他人導向的完美主義
 - C. 高強迫性
 - D. 高開放性
32. 針對鬱症病人的認知實驗之相關研究結果，下列敘述何者較不適當？
- A. 觀看負向情緒臉孔的時間比正向情緒臉孔短
 - B. 記得負向生活事件多於正向生活事件
 - C. 記得研究中的負向字詞比正向字詞多約10%

D.會將注意焦點集中在自我相關的負向訊息

33.心理病理學中以行為主義的觀點來解釋時，下列敘述何者正確？

A.偏差行為可能與神經系統功能失調有關

B.病態性格特徵是造成行為病理的主因

C.可以用內在心理衝突來解釋症狀

D.大部分的偏差行為是習得的

34.對於大部分被診斷為性格疾患的病人而言，下列描述何者最貼切？

A.其實病人更適合用第一軸的診斷來描述之

B.病人往往也具有廣泛性發展上的疾患（pervasive developmental disorder）

C.病人只會有一種性格疾患的診斷

D.病人具有一個以上的性格疾患診斷

35.依據 Ingram & Price（2010）一書，下列何者為兒童及青少年憂鬱在認知層面的脆弱性因子？

A.失功能的認知評估（dysfunctional cognitive appraisals）

B.執行功能缺陷（executive functioning deficits）

C.工作記憶力差（poor working memory）

D.病前言語和語言障礙（premorbid speech and language impairments）

36.依據 Ingram & Price（2010）一書，有關物質使用障礙症的基因遺傳，下列敘述何者錯誤？

A.在各種物質使用中，酒精的遺傳率高於菸草和大麻

B.宗教信仰和家庭功能可調節基因對物質使用障礙症的影響

C.MAO-A基因與物質使用障礙症有關

D.物質使用障礙症與多個基因有關

37.研究數據指出「老年人罹患心理疾病的盛行率比其他年齡層都低」，下列何者最不適合用來探討此結果的方法學議題？

A.反應偏誤

B.世代效應

C.選擇性死亡率

D.雙盲設計缺失

38.依據精神疾病診斷及統計手冊第五版（DSM-5），下列有關疾患之敘述何者正確？

A.平均而言，思覺失調症患者的整體功能高於妄想疾患患者

B.有一定比例的妄想疾患患者，後來會發展成符合思覺失調症的診斷

C.妄想疾患常與思覺失調症、類思覺失調症相共病

D.妄想疾患與思覺失調症的亞型皆包括有被害妄想型（persecutory type）

39.Linehan（1987）認為邊緣型人格障礙症可能是個體具有生物易感性、在不被認可的家庭環境中成長，以及長期被父母忽略或處罰等因素有關，此看法符合下列何種理論？

A.認知行為理論

B.素質－壓力模式

C.基因脆弱性模式

D.客體關係理論

40.李同學與王同學是高三學生，兩人對於即將到來的大學學測都嚴陣以待。李同學的母親為重鬱症患者，家族中也有多位親人有情感疾患病史，下列何者最可能是臨床心理師對兩位學生目前心理健康狀態的預測？

A.李同學比王同學較可能出現心理健康問題

B.李同學與王同學出現心理健康問題的可能性是相同的

C.李同學比王同學更具有因應心理健康問題的技巧

D.李同學比王同學擁有更良好的社會支持