

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 有關婦嬰生命統計資料的敘述，下列何者錯誤？
(A)總生育率係依當年年齡別生育率，每千位育齡婦女所生育的子女數
(B)粗出生率係指一年內每千名人口的平均活產嬰兒數
(C)孕產婦死亡率係指一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕中止 42 天之婦女死亡數
(D)嬰兒死亡率係指每年一千個活產嬰兒中未滿 28 天的死亡數
- 下列那些是準父親擬娩症候群 (couvade syndrome) 的症狀或行為？①焦慮、沮喪 ②食慾不振、噁心、嘔吐 ③疲累、失眠 ④逃避學習父親角色
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 有關治療不孕症藥物的敘述，下列何者錯誤？
(A) Clomiphene Citrate 是常使用的口服排卵藥
(B) Human menopausal gonadotropin (HMG) 可促進卵泡的發育
(C) Progesterone 可促進受精卵著床
(D) hCG 注射後 12 小時內會排卵，此時應進行取卵手術
- 孕前 BMI 為 24 的懷孕婦女，建議其整個孕期體重增加的範圍，下列何者最適當？
(A)小於 7 公斤 (B) 7~10 公斤 (C) 11~15 公斤 (D) 16~18 公斤
- 懷孕 12 週婦女，G₂P₁，前一胎為 18 週流產，諮詢有關孕期性生活，下列護理師回應，何者最適當？
(A)沒有性生活禁忌 (B)性交活動時，避免女性在下平躺姿勢
(C)出現破水，才需要禁止性交活動 (D)避免性交活動，但可有擁抱、親吻動作
- 有關卵子形成過程，下列何者正確？
(A)初級卵母細胞於青春開始形成 (B)初級卵母細胞內含有單套染色體
(C)受精的卵子會經過 2 次減數分裂 (D)一個卵細胞可發育成 4 個成熟的卵子
- 孕婦接受無壓力測試 (NST) 20 分鐘後，胎兒的胎心變異性為 3~6 bpm，此時最適當的措施為：
(A)暫不做任何處置，繼續監測 (B)輕搖動婦女的腹部
(C)給予婦女 3 L/min 氧氣導管使用 (D)請婦女深呼吸數次
- 李女士，妊娠 28 週，有 1 個女兒及 1 對雙胞胎，曾於妊娠 8 週自然流產 1 次，孕產史的紀錄為：
(A) G₄P₂A₁ (B) G₃P₃A₁ (C) G₄P₃A₁ (D) G₃P₂A₁
- 陳女士，G₂P₁，妊娠 10 週，已育有一名 2 歲的脊髓性肌肉萎縮症患者，下列敘述何者錯誤？
(A)脊髓性肌肉萎縮症為體染色體隱性遺傳疾病
(B)此胎有 50%機率为脊髓性肌肉萎縮症患者
(C)此胎有 25%機率为不具脊髓性肌肉萎縮症基因的健康小孩
(D)應即刻接受產前胎兒基因診斷

- 10 有關子宮內膜的敘述，下列何者正確？①子宮內膜的發育受雌性素與黃體素影響 ②懷孕後子宮內膜可發育為底蛻膜、包蛻膜及真蛻膜 ③受精卵著床於真蛻膜 ④受精卵著床後的子宮內膜稱為絨毛膜
- (A)①③ (B)①② (C)③④ (D)②④
- 11 朱女士採陰道生產，目前已進入第二產程，使用 Valsalva 長時間閉氣用力技巧，可能出現下列何種生理反應？
- (A)胸內壓降低 (B)肺部靜脈回流降低
(C)母血二氧化碳濃度降低 (D)心輸出量上升
- 12 有關會陰切開術的敘述，下列何者錯誤？
- (A)產婦的會陰部較短，較常使用正中會陰切開術
(B)正中會陰切開術的失血量較少
(C)實證不建議例行性施行會陰切開術
(D)側斜會陰切開術不易縫合，癒合時間長
- 13 李女士第二胎，胎盤娩出後血壓為 170/98 mmHg、脈搏為 78 次/分、呼吸 20 次/分，有關促進子宮收縮措施，下列何者不適宜？
- (A)按摩子宮底 (B)依醫囑肌肉注射 Methergine 0.2 mg
(C)刺激乳房 (D)確認膀胱不脹
- 14 許女士，G₁P₀，入院時子宮頸口開 4 公分，先露部位高度為-1，於待產 5 小時後，子宮頸口開 6 公分，先露部位高度仍為-1，護理師發現其子宮收縮開始呈不規則，且恥骨聯合上方呈膨出狀，此時護理師宜優先評估：
- (A)膀胱脹的情形 (B)子宮收縮的頻率與強度
(C)腹部觸診確定胎位 (D)陰道出血量
- 15 有關待產婦施行灌腸的禁忌，下列何者錯誤？
- (A)已破水胎頭未固定 (B)陰道大量出血 (C)規則宮縮 (D)胎兒窘迫
- 16 下列何者為婦女真陣痛的特徵？
- (A)內診時沒有子宮頸變薄 (B)走路時肚子緊縮感消失
(C)胎兒活動時就宮縮 (D)規則性宮縮且頻率愈來愈密集
- 17 張女士第二胎，子宮頸開 9 公分，胎頭高度+1，此時胎頭高度的意義為何？
- (A)坐骨棘連線 (B)坐骨棘連線上 1 公分
(C)坐骨棘連線下 1 公分 (D)坐骨棘連線下 2 公分
- 18 待產時 Pitocin 使用之監測，下列何者正確？
- (A)開始用藥的劑量為每分鐘 10 IU/c.c. (B)2~3 分鐘宮縮一次才可使用
(C)間歇性使用胎兒監測器 (D)胎心率於 100 bpm 時應停止給藥
- 19 有關授乳母親營養需求之敘述，下列何者正確？
- (A)完全素食者，應補充維生素 B₆ (B)正常飲食之外，每日增加 800 大卡的熱量
(C)增加豆類與堅果類的攝取 (D)攝取 3,500 c.c. 以上的水分
- 20 徐女士產後入住產後護理機構並遵循坐月子習俗，詢問月子餐為何要吃麻油雞？下列何者是護理師最合宜的解釋？
- (A)就中醫的觀點，麻油雞可補氣血 (B)這是欠缺科學性依據，建議不要吃
(C)這是月子餐的生意人行銷的方式 (D)坐月子期間每天進食麻油雞有助身材恢復

- 21 有關緩解剖腹生產傷口疼痛的護理措施，下列何者適當？
(A)給予環形中空坐墊，以防傷口受到壓迫 (B)維持俯臥的姿勢，提供背部按摩
(C)避免床上擦澡，以防傷口受到牽扯 (D)教導呼吸放鬆技巧
- 22 張女士採陰道生產，預計 3 年後再生育，未母乳哺餵，有子宮外孕的病史，懷孕前月經不規則。下列何種避孕方式較為適當？
(A)子宮內避孕器 (B)口服避孕藥 (C)月經週期法 (D)結紮
- 23 產後 1 週的健康婦女，下列生命徵象何者為正常？
(A) TPR：38.5°C、80 次/分、24 次/分，BP：118/78 mmHg
(B) TPR：36.8°C、60 次/分、18 次/分，BP：110/68 mmHg
(C) TPR：37.0°C、78 次/分、32 次/分，BP：128/80 mmHg
(D) TPR：36.5°C、72 次/分、16 次/分，BP：150/92 mmHg
- 24 有關預防產後便秘的護理措施，下列何者最適宜？
(A)早期下床活動 (B)建議飲水量每天不超過 2,000 c.c.
(C)持續使用托腹帶以促進腸蠕動 (D)減少排便次數以防痔瘡產生
- 25 有關親子同室的注意事項，下列敘述何者不適當？
(A)早期接觸有助於親子關係的建立 (B)讓較大的兄姐撫摸新生兒
(C)可提高母乳哺餵成功率 (D)餵母乳的媽媽才能執行親子同室
- 26 吳女士產後第 3 天，主動學習新生兒沐浴的技術，依據魯賓（Rubin）對產後婦女行為態度之研究結果判斷，她此時的心理狀態是處於：
(A)接受期（Taking-in phase） (B)緊執期（Taking-hold phase）
(C)放手期（Letting-go phase） (D)恢復期（Recovery phase）
- 27 有關新生兒評估之敘述，下列何者錯誤？
(A)頭血腫為界線不明顯的腫脹，腫脹通常是單側或雙側
(B)產瘤為胎頭受壓產生，於出生 12 小時至數天可被吸收
(C)新生兒的軀幹長而四肢短
(D)前凶門較後凶門晚關閉
- 28 有關新生兒尿布疹之護理措施，下列何者錯誤？
(A)勤於檢查尿布，如有潮濕應立即更換 (B)新生兒排便後應以清水清洗臀部
(C)距離臀部約 25~30 公分使用烤燈 (D)擦氧化鋅藥膏減少患部滲液，以保持臀部乾燥
- 29 有關預防新生兒體熱散失之方法，下列何者錯誤？
(A)以溫熱過的毛毯包裹新生兒為傳導作用 (B)勿在新生兒體溫穩定前洗澡為預防對流作用
(C)避免將嬰兒床置於牆壁附近為預防輻射作用 (D)立即擦乾身上的羊水為預防蒸發作用
- 30 下列那一種疫苗不是所有的嬰兒都需要接種？
(A)卡介苗 (B) B 型肝炎免疫球蛋白
(C)白喉百日咳破傷風混合疫苗 (D)小兒麻痺口服疫苗
- 31 有關減緩懷孕期下背痛的運動，下列何者錯誤？
(A)凱格爾氏運動 (B)腹肌強化運動 (C)骨盆傾斜運動 (D)腰背伸展運動

- 32 有關產後子宮復舊的過程，下列何者正確？
(A)子宮肌細胞因自體溶解，細胞數目會逐漸減少
(B)產程延長會加快復舊的速度
(C)產後 1 週，子宮重量約 1 公斤
(D)產後第 10 天，無法於腹部觸摸到子宮底
- 33 有關心臟病孕婦之生產及產後護理措施，下列何者錯誤？
(A)產後採半坐臥或左側臥
(B)產後 48 小時需密切監測心臟功能
(C)產後以口服避孕藥避孕
(D)第二產程避免長時間閉氣用力
- 34 林女士，妊娠 36 週，血壓 160/110 mmHg，下列那些徵候及症狀表示可能發展成子癰症之危險？
①尿量增加 ②深部肌腱反射過度 ③噁心、嘔吐
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③
- 35 某高中學生對於性病有偏差的認知，護理師提供其性病傳染的相關知識，是運用安濃（Annon）的 PLISSIT 性諮商模式之那一個階段？
(A)允諾（Permission）
(B)訊息限制（Limited information）
(C)特定建議（Specific suggestions）
(D)加強治療（Intensive therapy）
- 36 有關子宮頸癌之敘述，下列何者正確？
(A)高社經地位的婦女為罹患子宮頸癌之高危險群
(B)性交疼痛及陰道異常出血為子宮頸癌的早期病徵
(C)65 歲之後的婦女無需做子宮頸抹片檢查
(D)人類乳突病毒疫苗建議僅施打於成年女性
- 37 白小姐，25 歲，未曾生育，無器質性骨盆腔疾病，因痛經影響生活和工作而就診，下列敘述何者錯誤？
(A)連續 6 個月服用口服避孕藥以抑制排卵減輕不適
(B)建議可以進食溫熱飲品以減輕不適
(C)鼓勵痛經時可採下腹局部熱敷以減輕不適
(D)依照醫囑服用前列腺素製劑以減輕不適
- 38 有關陰道滴蟲感染的敘述，下列何者正確？
(A)滴蟲只會透過直接接觸而感染
(B)停經後婦女較少受到感染
(C)Metronidazole（Flagyl）為最有效的治療藥物
(D)性伴侶不需一起治療，除非有龜頭紅腫或搔癢症狀
- 39 有關導致經前症候群的可能因素之敘述，下列何者正確？
(A)缺乏鈉和維生素 B₆ (B)缺乏泌乳素 (C)前列腺素過多 (D)血管加壓素減少
- 40 下列何者為罹患骨質疏鬆症的高危險群？
(A)停經婦女
(B)不喝酒、咖啡，且不抽菸的婦女
(C)每日鈣攝取量為 1,500 毫克者
(D)運動員
- 41 王小弟，7 歲，因車禍疑似頸椎損傷而出現心跳停止，有關心肺復甦術（CPR）的敘述，下列何者錯誤？
(A)立即採壓額抬下巴法，以維持呼吸道的通暢
(B)在胸部兩乳頭連線中央，執行心外按摩
(C)按壓深度約 1/3～1/2 胸廓深
(D)單人急救時，心外按摩與人工呼吸比率為 30：2

- 42 下列何種行為對促進認知障礙兒童的發展有幫助？
(A)不需考慮兒童的年齡，而選擇適合兒童認知發展的遊戲及玩具
(B)不要對兒童的任何行為加以限制，以增加多樣發展的機會
(C)為減少兒童被歧視的機會，儘量減少其參與社會性的活動
(D)除非兒童有聽障，否則避免使用非語言的溝通，以增加語言技巧發展的機會
- 43 有關遊戲發展過程的描述，下列何者正確？
(A)嬰兒喜歡旁觀者遊戲，從旁觀他人的遊戲中分享到快樂
(B)幼兒喜歡平行式遊戲，並肩而坐，各自玩著自己的玩具
(C)學齡前兒童喜歡合作式遊戲，會將玩具拿出來和別人一起玩
(D)青少年喜歡單獨遊戲，各玩各的，不重視玩伴
- 44 有關幼兒被熱水燙傷的處置步驟，下列何者正確？
(A)脫→沖→泡→蓋→送
(B)沖→脫→泡→蓋→送
(C)沖→蓋→送→泡→脫
(D)沖→蓋→泡→脫→送
- 45 為 7 個月大嬰兒執行肌肉注射時，下列何者為最適當的處理方式？
(A)告訴嬰兒可以哭，但不可以亂動
(B)請母親離開治療室，以避免母親害怕
(C)握住嬰兒的手，並儘速完成注射過程
(D)用鼓勵的方式，答應注射後給予牛奶喝
- 46 有關「以家庭為中心的照護」，下列敘述何者正確？
(A)為了避免家人過於擔心，與家屬溝通病情時應先過濾訊息
(B)為了減少交互感染的機率，應儘量避免病童之手足來探病
(C)為了病房環境管理，應嚴格執行病房會客時間之規定
(D)為了增強照護能力，鼓勵父母或手足一起參與照護病童的計畫
- 47 王小弟，2 個月大，接受腹部手術，下列敘述何者為手術後第 1 天進行疼痛評估的指標？
(A)臉部扭曲、皺眉
(B)保護疼痛部位
(C)將疼痛刺激推開
(D)咬緊牙關、握緊拳頭
- 48 下列新生兒視覺評估結果，何者為不正常現象？
(A)出現斜視現象
(B)對光不會反應
(C)哭泣時沒有眼淚
(D)會產生眨眼反射
- 49 足月男嬰泌尿生殖系統之評估，下列何者為異常？
(A)兩側睪丸已下降
(B)陰囊表面光滑少皺褶
(C)陰莖長度約 2~3 公分
(D)出生後 24 小時內已解尿
- 50 有關嬰兒脊柱彎曲發展之敘述，下列何者正確？
(A)新生兒時，薦椎彎曲完成
(B)3 個月時，頸椎續發彎曲完成
(C)5 個月時，腰椎續發彎曲完成
(D)7 個月時，胸椎續發彎曲完成
- 51 有關 4 歲兒童對死亡概念的發展，下列敘述何者正確？
(A)沒有死亡概念，但對「失落」有反應
(B)死亡被認為是短暫的分離，可以再活過來
(C)死亡被視為一件遙遠的事，不可逆轉
(D)將死人擬人化，躲過魔鬼就可以避免死亡
- 52 謝小弟，妊娠週數 41 週又 1 天，出生體重 4,600 公克，自然產娩出，出生第 2 天，左手臂活動少，X 光顯示鎖骨骨折，有關骨折之生產損傷，下列敘述何者錯誤？
(A)沿左鎖骨觸摸，會有骨磨擦及裂開的感覺
(B)驚嚇反射表現不對稱的手臂上舉
(C)為其執行圍巾徵象（Scarf signs）之評估
(D)抱起時，支持後背及臀部，避免自手臂處抱起
- 53 關於末期病童的臨終階段照護，下列敘述何者正確？
(A)補充營養，按時餵食，以維持體力
(B)補充液體輸液，以維持其血壓
(C)持續給予抗生素，以免再次感染
(D)維持皮膚清潔乾燥，以增進舒適

- 54 林小弟妊娠 42 週出生，出生時發現羊水有胎便。有關護理師維持林小弟呼吸道通暢之護理措施，下列敘述何者正確？
- (A)胎頭娩出時即用導管（DeLee's tube）對新生兒的鼻咽及口腔進行抽吸
 - (B)新生兒完全產出時，應立即使用甦醒球（ambu bag）加壓給氧
 - (C)到嬰兒室時於鼻咽及口腔注入生理食鹽水清洗
 - (D)做完新生兒護理後，插入氣管內管給予正壓氧氣
- 55 關於新生兒黃疸照光療法的副作用，下列何者錯誤？
- (A)易形成化膿性結膜炎
 - (B)皮膚會出現廣泛紅疹
 - (C)體溫不穩定
 - (D)便秘
- 56 比較早產兒與足月兒的臨床特徵，下列何者正確？
- (A)抓握反射（grasp reflex）：早產兒比足月兒明顯
 - (B)躺姿：早產兒呈放鬆伸展，而足月兒呈彎曲姿勢
 - (C)足跟碰觸至耳朵間的測量：早產兒較足月兒不易完成
 - (D)肌肉張力評估：早產兒手肘比足月兒不容易越過胸部
- 57 有關麻疹與德國麻疹的比較，下列何者錯誤？
- (A)麻疹恢復期皮膚不會脫屑
 - (B)德國麻疹不會留下色素沉著
 - (C)麻疹有結膜炎、鼻炎症狀
 - (D)德國麻疹會出現淋巴結腫大
- 58 下列何者為水痘（Chickenpox; Varicella）之臨床表徵？
- (A)在同一個時間內可以觀察到紅斑、水疱及膿疱疹
 - (B)疹子集中在手、腳，軀幹少見，呈离心性的分布
 - (C)體溫恢復正常後，出現紅疹，出疹時會感到刺痛
 - (D)恢復期疹子消退，皮膚上呈現黑色色素沉著（pigmentation）現象
- 59 王小弟，9 個月，診斷為肺炎，右腋下區聽到有明顯的爆裂音（Crackle），下列姿位何者較能有效引流痰液？
- (A)右側臥，抬高臀部 20 公分
 - (B)左側臥，抬高臀部 20 公分
 - (C)俯臥，頭放低 30 度
 - (D)仰臥，頭抬高 30 度
- 60 有關細菌性肺炎（Bacterial pneumonia）之敘述，下列何者錯誤？
- (A)最常見的病原為黴漿菌
 - (B)通常病童會出現高燒（ $>39^{\circ}\text{C}$ ）情形
 - (C)血中顆粒性白血球數值升高
 - (D)通常需給予抗生素治療
- 61 有關氣喘兒童使用吸入型藥物之說明，下列何者正確？
- (A)短效型氣管擴張劑，是需要每日使用的保養性吸入型藥物
 - (B)乾粉吸入劑型不需要手口協調，較適合 5 歲以下的兒童
 - (C)定量噴霧吸入器（Metered dose inhaler）加上吸藥輔助器（spacer），較適用於嬰幼兒
 - (D)醫囑早晚各吸 2 次（2 puffs）時，是指每次用藥須直接連續深吸藥物 2 次
- 62 有關兒童細支氣管炎（Bronchiolitis）的敘述，下列何者錯誤？
- (A)呼吸道融合病毒（RSV）是最常見致病因
 - (B)是 1 歲以內嬰兒常見的下呼吸道感染疾病
 - (C)臨床典型的症狀是流鼻水、發燒、似狗吠聲的咳嗽
 - (D)一般最常發生於冬、春兩季（1~5 月）

- 63 小英，2 歲，罹患嚴重主動脈瓣狹窄（Aortic stenosis），下列那個臨床表徵不會發生？
(A)脈搏微弱、心跳加快 (B)出現發紺、杵狀指
(C)出現收縮性心雜音 (D)血氧不足，容易疲倦
- 64 1 歲的小明診斷為法洛式四重畸形（tetralogy of fallot），因抽血時哭鬧不安，抽血後發紺厲害，且呼吸困難，下列護理措施，何者應優先進行？
(A)讓小明採膝胸臥姿（Knee-chest position）休息
(B)測量小明的生命徵象
(C)以鼻導管給 2 L/min 氧氣
(D)請媽媽餵小明喝些牛奶
- 65 有關充血性心衰竭（Congestive heart failure）嬰兒的臨床徵象，不包括下列何者？
(A)心輸出量減少，心跳速率變慢 (B)周邊靜脈充血，肝腫大，下肢水腫
(C)肺水腫，咳嗽，呼吸困難，呼吸速率增快 (D)臉色、指甲蒼白，四肢冰冷，血壓低，經常盜汗
- 66 有關特發性血小板減少紫斑症（idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP）幼兒的護理指導，下列何者錯誤？
(A)此類紫斑症的病因可能與自體免疫有關，僅能長期以藥物控制病情
(B)要非常注意居家活動環境的安全，可於床欄邊與地板上鋪設保護墊
(C)當血小板減少至 $20,000/\text{mm}^3$ 以下時，宜觀察自發性出血現象
(D)需避免使用含有 aspirin 的藥物，以預防影響血小板的凝集功能
- 67 垂直感染 AIDS 之嬰兒，不可接種下列何種疫苗？
(A) B 型肝炎疫苗 (B)白喉百日咳破傷風三合一疫苗
(C)沙賓口服小兒麻痺疫苗 (D) b 型流行性感胃嗜血桿菌疫苗
- 68 有關為嬰兒執行輸血之敘述，下列何者正確？
(A)全程使用精密點滴輸液套（Microdrip set）
(B)輸血前須先用生理食鹽水沖洗點滴管道
(C)開始輸血 15 分鐘內，輸液速度要快，以觀察是否有過敏反應
(D)輸血時可將抗生素加入血液中一起滴注
- 69 有關副甲狀腺功能低下症病童之照護，下列何者錯誤？
(A)監測抽搐症狀，避免抽搐造成二次傷害
(B)減少病童周圍環境之聲光刺激
(C)監測呼吸型態，避免因喉頭痙攣引發呼吸困難
(D)鼓勵攝取高纖食物，改善便秘症狀
- 70 有關腸病毒群感染的敘述，下列何者正確？
(A)其併發症之一的手足口病，主要侵犯 5 歲以上的孩童
(B)散播途徑主要是飛沫及接觸傳染
(C)傳染高峰期在冬末春初
(D)病毒在 40°C 以上的溫度，會很快的失去活性及死亡
- 71 檢驗結果顯示白血病（Leukemia）病童有貧血現象，護理師解釋此結果最可能的導因為：
(A)葉酸攝取不足 (B)紅血球製造減少
(C)骨髓逐漸由疤痕組織取代 (D)淋巴細胞對紅血球的破壞增加

- 72 嘉佳，13 歲，被診斷為第 1 型糖尿病，有關其居家護理指導，下列敘述何者正確？
(A)正餐以外的時間避免攝取點心
(B)建議退出學校羽球隊
(C)最好由嘉佳的媽媽來執行血糖監測及胰島素注射
(D)上體育課前可以先吃 1 片花生醬麵包或 2、3 顆牛奶糖
- 73 小勇，3 週大，因罹患幽門狹窄入院備行幽門切開術（pyloromyotomy），有關幽門狹窄手術前後的護理，下列敘述何者不適當？
(A)術前記錄輸出入量、嘔吐物的性狀以及尿比重
(B)術前協助矯正嚴重嘔吐造成的代謝性酸中毒
(C)術前需協助矯正脫水及電解值不平衡情形
(D)術後 4~8 小時即可開始給予少量葡萄糖水
- 74 呂小弟因尿量減少診斷為急性腎衰竭，有關急性腎衰竭的照護，下列敘述何者錯誤？
(A)注射碳酸氫鈉，矯正代謝性鹼中毒
(B)以少量多次給予水分，控制水分攝取
(C)聽診呼吸音，以評估肺水腫狀況
(D)服用 Kayexalate，降低鉀離子
- 75 謝小弟，6 個月大，因尿道下裂（hypospadias）接受尿道重建術，有關手術後之護理處置，下列何者不恰當？
(A)手術後使用床上拱型護架，避免手術部位加壓
(B)讓病童包雙層尿布，將引流管拉到外層尿布上
(C)勿限制病童活動，鼓勵照顧者讓病童活動肢體
(D)監測尿量、顏色、性質及引流管的通暢度
- 76 小玲，1 歲，因頭部外傷自急診入院，依據兒童適用之葛氏昏迷量表（Glasgow coma scale, GCS）評估其意識程度，結果發現其躁動不安無法安撫，對痛有收縮與睜眼反應，其昏迷指數為幾分？
(A) 7 分
(B) 8 分
(C) 9 分
(D) 10 分
- 77 有關橫膈疝氣（Diaphragmatic hernia）臨床表徵與醫療措施之敘述，下列何者錯誤？
(A)需插入鼻胃管以減輕胃壓力
(B)胸腔可聽見腸蠕動聲，聽不到呼吸聲
(C)當嬰兒呈現呼吸窘迫現象時應立即以甦醒球（Ambu bag）擠壓急救
(D)X 光片顯示胸腔內有充滿氣體的腸道和塌陷的肺
- 78 有關學齡兒童罹患癲癇的護理指導，下列運動何者較不適當？
(A)騎腳踏車
(B)著救生衣游泳
(C)打羽毛球
(D)在操場跑步
- 79 小莉，1 歲，因中耳炎而發高燒 40°C，在家時突然兩眼上吊、四肢抽動持續 2 分鐘，送醫診斷為熱性痙攣，下列出院護理指導何者不恰當？
(A)高燒時，可提供酒精拭浴以降低體溫
(B)抽搐時，協助側臥並維持呼吸道通暢
(C)痙攣時，移除床上易造成傷害的物品
(D)發作時，不可強將物品塞入口中，以免造成受傷
- 80 陳小弟，5 歲，頭部創傷後，合併無菌性腦膜炎（viral meningitis），作腰椎穿刺，有關其腦脊髓液檢查之結果，不會呈現下列何者？
(A)壓力為 60 mmH₂O
(B)淋巴球 100 個/mm³
(C)蛋白質 50 mg/dL
(D)葡萄糖 30 mg/dL