

112年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、112年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試
代 號：3312

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.病患可在俯臥姿勢下，完全伸展肘關節，但無法對抗阻力，則此個案肘關節伸展肌力訓練的短期目標設定為何？
 - A.4
 - B.2+
 - C.3+
 - D.3
- 2.一名腦外傷個案進行拼圖遊戲時，第一週讓個案於安靜無人的小房間進行；第二週改於中型治療室，約有三位個案及家屬在旁邊做其他治療與交談；第三週改於大型治療室，且室內播放流行音樂。此活動難易分級的依據，下列何者最符合？
 - A.主題／背景區辨
 - B.社交互動
 - C.定向感
 - D.注意力
- 3.有關病歷紀錄，下列何者描述最適當？
 - A.病歷書寫攸關法律責任，但與專業發展無關
 - B.電子病歷的優點是安全性很高，完全不用擔心病歷外洩
 - C.治療師不會因為病歷撰寫錯誤或問題而喪失執照
 - D.撰寫病歷紀錄時需確保時效性
- 4.依據跨理論模式（Transtheoretical Model），促使個案由precontemplation stage進入contemplation stage，運用下列何項改變策略最為適合？
 - A.幫助關係（helping relationships）
 - B.意識提升（consciousness raising）
 - C.社會釋放（social liberation）
 - D.增強管理（reinforcement management）

- 5.健康促進包含健康保護（health protection）與疾病預防（disease prevention），下列何者敘述錯誤？
- A.食安的抽檢屬於健康保護的策略之一
 - B.政府制定空污法規是屬於一種健康保護的策略
 - C.建議民眾每天多蔬果、規律運動是屬於第一級預防策略
 - D.早期癌症篩檢是屬於第三級預防策略
- 6.下列何者不屬於動機面談（motivational interviewing）的引導原則？
- A.賦權個案（empower the patient）
 - B.模仿典範（role model）
 - C.以同理心傾聽
 - D.瞭解個案動機
- 7.依據Brunnstrom的動作恢復觀點，在手肘屈曲90度的姿勢下，能做出pronation與supination，此動作屬於下列那一個階段的評估動作？
- A.第二階段
 - B.第三階段
 - C.第四階段
 - D.第五階段
- 8.一名腦外傷個案學習操作洗衣機時，職能治療師一步一步地告知個案操作的步驟，於過程中給個案大量的回饋與指引，個案也十分注意治療師的口語和視覺提示，並口中依序複誦治療師教導的步驟，深怕遺漏。請問此個案的學習狀態最符合費滋與波斯納（Fitts & Posner）的學習三階段論的那一個階段？
- A.連結期（associative stage）
 - B.自主期（autonomous stage）
 - C.認知期（cognitive stage）
 - D.固化期（fixation stage）
- 9.個案在治療室內使用沙包進行漸進式阻力運動（progressive resistive exercise），此活動最符合下列那一種活動類型？
- A.職能（occupation）
 - B.模擬（simulated）活動
 - C.附屬性（adjunctive）治療媒介
 - D.目的性（purposeful）活動
- 10.下列何者不是生物力學治療手法（biomechanical approach）主要使用的治療技巧？
- A.漸進式阻力運動（progressive resistive exercise）

- B.節律性啟動 (rhythmic initiation)
- C.被動關節活動 (passive range of motion)
- D.牽拉運動 (stretching exercise)

11.下列何者有助於瞭解個案在從事職能時的主觀意義 (meaning) ?

- A.個案從事日常活動時最關心的事
- B.個案職能表現的品質
- C.個案無法從事的職能活動
- D.個案從事職能活動的地點

12.在個案無關節活動度受限的情況下，以下那些關節活動度的測量，量角器的固定臂及移動臂一開始的擺放應呈90度？①髖關節外展 (hip abduction) ②踝關節背屈 (ankle dorsiflexion) ③踝關節外翻 (ankle eversion)

- A.僅①
- B.僅①②
- C.僅②③
- D.①②③

13.測量手臂旋前及旋後 (forearm pronation and forearm supination) 的主動性關節活動度時，一般建議個案採取何種姿勢較佳？

- A.仰躺或俯臥
- B.側躺或仰躺
- C.坐姿或站姿
- D.坐姿或俯臥

14.個案在中樞神經系統受損後，姿勢控制的能力很可能會受到影響，治療師應針對有姿勢控制問題的中風個案，優先評估以下那些主要的項目，以確認個案姿勢控制機制？①翻正反應 (righting reaction) ②正支持反應 (positive supporting reaction) ③平衡反應 (equilibrium reaction) ④聯合反應 (associated reaction) ⑤保護反應 (protective reaction)

- A.①②③
- B.②③④
- C.①③⑤
- D.②④⑤

15.有關正常老化現象，下列敘述何者正確？

- A.淚液分泌量減少，造成白內障
- B.老年性黃斑部退化，主要造成中央視力的喪失

- C.老化改變使長者對低頻率聲音的區辨能力下降
- D.味覺閾值（threshold）隨著年齡愈大愈下降
- 16.有關臉部失認症（prosopagnosia）之敘述，下列何者錯誤？
- A.無法辨認熟識的親朋好友和常見的公眾人物的臉
- B.透過臉部表情的特徵可協助辨認熟人的臉
- C.透過聲音或髮型等特徵可協助辨認熟人的臉
- D.透過說話的口音可協助辨認熟人的臉
- 17.下列那一項知覺能力的評估，需要先確認該物件是個案認識的物件，方可選定作為評估物件？
- A.stereognosis
- B.body schema
- C.position in space
- D.right-left discrimination
- 18.有關失用症（apraxia）之敘述，下列何者最適切？
- A.要求個案模擬刷牙的動作，ideomotor apraxia個案經常無法做到
- B.ideational apraxia個案無法模擬刷牙動作，但於自然情境下可完成拿牙刷刷牙的日常活動
- C.錯拿湯匙來寫字，可見於ideomotor apraxia個案
- D.要求個案模擬拿筆寫字的動作，屬於評估動作中的不及物動作
- 19.一般而言，痙攣（spasticity）與高張（hypertonus）這兩種不正常的肌肉張力，最主要的不同點為何？
- A.前者通常會伴隨協同動作模式（synergy pattern）的出現，後者則無
- B.前者指的是主動肌與拮抗肌的張力同時增加，後者指的是主動肌張力增加與拮抗肌的張力減少
- C.前者主要是因為前運動皮質（premotor cortex）受損所產生，後者主要是因為錐體系統（pyramidal system）受損所導致
- D.前者的發生通常有彈簧刀現象（clasp-knife phenomenon），後者則無此現象
- 20.有關肌肉張力的評估，下列敘述何者正確？
- A.測量肌肉張力之後，建議須緊接著測量關節活動度，以獲得較為準確的評估結果
- B.測量上肢張力時，並沒有要求個案須保持特定姿勢，只要能方便治療師抓握欲量測的肢體即可
- C.為了提高評估結果的信度，建議在前後測時應選擇同一時間測量，如：同在早上施測
- D.測量個案痙攣（spasticity）時，治療師應在關節活動度的範圍內，以慢速移動個案的肢體，避免個案受傷
- 21.關於跳視（saccades）之評估，下列敘述何者錯誤？
- A.個案面對無干擾物的牆面，治療師坐個案後面提供視覺指令以避免視覺干擾
- B.治療師可不給與「頭的動作」的相關指令

- C.治療師兩手各持頂端有紅／綠標記的兩根小棒子，紅綠兩棒間距約8英吋
- D.治療師兩手各持頂端有紅／綠標記的兩根小棒子，紅綠兩棒距個案約16英吋
- 22.關於眼球動作缺失（oculomotor dysfunction）之敘述，下列何者最為適切？
- A.左滑車神經受傷，則往左側看時複視最嚴重
- B.滑車神經受傷時會同時引起水平和垂直複視
- C.右滑車神經受傷者常將頭傾向右側以代償眼睛無法做內轉的動作
- D.滑車神經受傷時會引起垂直複視
- 23.有關視覺搜尋（visual scanning）能力之敘述，下列何者錯誤？
- A.反射層級是指眼球反射性地將中央視野內移動之物件聚焦於上視丘
- B.自主層級主導閱讀英文文章時常使用由左而右、由上而下的閱讀策略
- C.反射層級由腦幹控制
- D.自主層級由皮質前額葉控制
- 24.有關減敏感技術（desensitization techniques），下列敘述何者錯誤？
- A.持續性（constant）接觸刺激優於間歇性（intermittent）接觸刺激
- B.先從最敏感的区域給予刺激，之後再向外擴散
- C.一開始可於敏感部位穿戴副木給予保護
- D.須確定個案能忍受目前階段之刺激後，才可開始挑戰下一個階段之刺激
- 25.有關單纖測驗（Semmes-Weinstein monofilaments），下列敘述何者正確？
- A.評估固定兩點辨識（static two-point discrimination）
- B.評估本體覺，最細編號3.61，顏色記錄為綠色
- C.評估輕觸覺的閾值（threshold of light touch sensation）
- D.評估指尖快速適應纖維神經分布密度
- 26.腦中風個案出現對側臉部、手、腳的感覺受損，下列何者為最不可能的損傷部位？
- A.前大腦動脈（anterior cerebral artery）
- B.中大腦動脈（middle cerebral artery）
- C.丘腦（thalamus）
- D.小腦（cerebellum）
- 27.有關工作記憶（working memory），下列敘述何者錯誤？
- A.與注意力相關的資訊處理過程
- B.有意識的主動思考和認真的調度認知資源

- C.經過工作記憶處理超過30秒的感覺資訊，才能夠儲存至長期記憶
- D.資訊處理的容量沒有限制
- 28.當記憶缺失個案較容易記住自己所犯的錯誤，而不容易記住治療師指正的內容時，下列介入方式何者最適合？
- A.無錯誤學習（errorless learning）
- B.內隱學習（implicit learning）
- C.間時提取學習（spaced retrieval learning）
- D.事件學習（episodic learning）
- 29.有關記憶階段和其相對應的神經解剖區域，下列組合何者錯誤？
- A.注意階段（attention stage）－ 腦幹（brainstem）
- B.編碼階段（encoding stage）－ 額葉（frontal lobes）
- C.儲存階段（storage stage）－ 頂葉（parietal lobes）
- D.提取階段（retrieval stage）－ 額葉（frontal lobes）
- 30.治療師建議家屬將家中整理清潔，減少環境的複雜度，將個案常用的物品用彩色膠帶標明的代償作法，最適用於具有下列何種知覺障礙的個案？
- A.主題／背景分辨困難
- B.空間概念障礙
- C.身體基模（body schema）障礙
- D.失用症
- 31.對於手腕扭傷（wrist sprain）且嚴重腫脹之患者，除先進行水腫控制外，可再提供下列那個副木給患者穿戴？
- A.手腕橈側豎腕副木（radial wrist cock-up splint）
- B.手腕背側豎腕副木（dorsal wrist cock-up splint）
- C.手腕尺側豎腕副木（ulnar wrist cock-up splint）
- D.手部固定副木（resting hand splint）
- 32.有關製作副木時，使用專業高溫加熱槍時機的敘述，下列何者最為適當？
- A.調整手腕固定副木的角度從手腕彎曲20度到伸直30度
- B.順滑局部副木的邊緣
- C.修改穿戴起來過緊的副木
- D.加熱大面積的副木材料以利副木遠端外翻
- 33.有關製作副木須考量手部雙重斜度（dual obliquity）的解剖概念，下列敘述何者正確？

- A.手部尺側的掌骨較長且較高
- B.前臂尺骨較長且較高
- C.雙重斜度之現象在手指抓握時比手指伸展時更為顯著
- D.前臂橈骨較長且較高

34.有關活動式裝具（mobilization orthoses）之敘述，下列何者錯誤？

- A.可矯正變形
- B.可提供控制性動作
- C.高負荷與持續長時間穿戴是製作活動式裝具之概念
- D.可提升組織癒合與膠原纖維之重塑

35.當手指彎曲時，環形滑車（annular pulley）的功能包含以下那些？①防止弓弦（bowstringing）變形 ②支撐關節 ③限制肌腱滑動

- A.僅①
- B.僅②
- C.①②
- D.②③

36.根據human interface assessment（HIA）模式，若個案的能力與所欲完成任務的能力要求產生落差（gap），此時可透過下列那一項來彌補此差距？

- A.治療師的介入
- B.輔助性科技
- C.治療性的活動
- D.人機界面評估

37.有關輪椅座墊的選擇的考量，下列那些敘述最恰當？①氣囊（air-filled）座墊的缺點是容易產生剪力（shear force） ②液態凝膠（gel-filled）座墊的缺點是易漏 ③交替充氣型（alternating pressure systems）座墊的優點是可定時進行減壓 ④海綿（foam）座墊的優點是價位便宜，容易清理

- A.①②
- B.②③
- C.③④
- D.①④

38.使用具空中傾倒（tilt-in-space）功能的輪椅時，並不會改變下列那一個角度？

- A.向後傾倒角度（tilt angle）
- B.座面－背靠角度（seat to backrest angle）

C.座面角度 (seat-plane angle)

D.背靠角度 (backrest angle)

39.輪椅兩側腳踏板離地高度若調整太高，輪椅使用者最可能出現下列那一種現象？

A.膝蓋會低於椅面

B.骨盆容易過度後傾

C.利於使用單腳操作推進輪椅

D.提高座面高度

40.訓練右側偏癱患者自行推動輪椅的策略，下列敘述何者最不恰當？

A.適當的降低坐椅高度以便腳可以輕鬆構得著地面

B.建議移除左側的腳踏板，以提供較大的操作空間

C.教導使用左側的手腳來操作輪椅的前進與轉向

D.輪椅採用較大的後輪尺寸來增加穩定性

41.有關電動輪椅的說明，下列敘述何者錯誤？

A.適用於因體力有限無法操作手推輪椅的個案

B.大致可分類為前輪驅動、中輪驅動、後輪驅動類型

C.中輪驅動類型一般而言迴轉時需要較大的旋轉半徑，故較適合在戶外使用

D.部分類型提供可拆卸功能，以方便外出攜帶

42.在小學中常見到「無障礙坡道」兩側設置單層扶手，依內政部營建署建築物無障礙設施設計規範，此單層扶手上緣與地板面之距離最低應為多少公分？

A.55

B.65

C.75

D.85

43.有關供行動不便者使用之無障礙升降機設計規範，下列敘述那些符合內政部營建署建築物無障礙設施設計之規範？①若供集合住宅使用，升降機機廂深度不得小於125公分 ②若供集合住宅使用，升降機門淨寬最小不得小於90公分 ③升降機門出入口正下方之地板應作30公分×60公分之不同材質處理以利盲人導引 ④機廂內至少兩側牆面應設置扶手

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

- 44.有關無障礙廁所盥洗室設置，下列何者不符內政部營建署建築物無障礙設施設計之規範？
- A.洗面盆上緣距地板面為80公分
 - B.鏡子之鏡面底端距離地板面為90公分
 - C.洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿為35公分
 - D.環繞洗面盆設置扶手，此環狀扶手高於洗面盆邊緣6公分
- 45.針對複雜性局部疼痛症候群（CRPS）患者製作手部固定副木以減輕疼痛，其掌指關節（MP）與指間關節（IP）應固定於下列那一個角度最理想？
- A.MP與IP均完全伸展
 - B.MP固定於彎曲 70 度，IP完全伸展
 - C.MP固定於彎曲 40 度，IP固定於彎曲 30 度
 - D.MP完全伸展，IP固定於彎曲 30 度
- 46.有關職能治療專業對於休息與睡眠之評估與介入，下列何者錯誤？
- A.職能剖面圖（occupational profile）中，須包含評估個案睡眠與休息模式、常規和習慣
 - B.圓餅圖不適用於呈現個案重要的職能、參與時間及休息與睡眠之資訊
 - C.介入形式包括治療性自我運用、治療性運用職能與活動、諮詢、教育等作法
 - D.治療性運用職能與活動可促進職能平衡與常規，以確保擁有足夠休息與睡眠
- 47.關於參與休閒活動之益處，下列何者正確？①增進自我價值感、肌力、身體耐受度、心理調適與因應技巧等 ②促進分享自我與對環境的掌控 ③促進建立生活型態與習慣
- A.僅①②
 - B.僅①③
 - C.僅②③
 - D.①②③
- 48.關於年齡、文化、性別於休閒功能之影響，下列何者錯誤？
- A.休閒活動可用以教育、啟發且反映文化的價值與信仰
 - B.老年人為較少參與休閒體能活動的族群
 - C.因性別角色的刻板印象、缺乏來自家人的支持，皆使婦女較少從事休閒活動
 - D.在各種不同的文化中，男性較少參與休閒體能活動
- 49.關於特定功能缺損的調適原則，下列何者錯誤？
- A.對於有協調困難的個案，建議可增進肢體近端的穩定、減少自由度
 - B.對於感覺部分或完全缺損之個案，建議使用輕量型的物品或電動產品
 - C.對於下背痛的個案，建議使用加長把柄的物品

- D.教導全盲的個案學習以結構化或固定的方式擺放物品，且養成物歸原位的習慣
- 50.關於盥洗及個人清潔活動的代償調適原則，下列何者最不適切？
- A.抓握能力受限的個案適合使用電動牙刷、噴水潔牙器
 - B.上肢單側偏癱個案可使用加裝吸盤的假牙刷清潔假牙
 - C.僅上肢單側偏癱個案適用固定於牆壁之吹風機，協調能力不佳個案不適用
 - D.對協調能力不佳個案而言，使用液態肥皂搭配洗澡手套為佳
- 51.有關各種個案之開車合適性評估考量，下列何者錯誤？
- A.多發性硬化症個案視力可能受影響，須評估視力
 - B.C6頸髓損傷個案無開車潛力，不須評估合適性
 - C.腦性麻痺個案認知能力可能受影響，須評估注意力及問題解決等能力
 - D.一般老年人能力退化的影響有限，但仍須評估認知、視覺、動作等因素對開車合適性之影響
- 52.有關手部抗變形的擺位（antideformity position），下列敘述何者錯誤？
- A.又稱作intrinsic-plus擺位
 - B.即手部功能性擺位
 - C.能維持掌指關節的側韌帶（collateral ligaments）足夠的長度
 - D.將腕關節擺為neutral或extension的位置
- 53.有關類風濕性關節炎之晨起僵硬症狀及處置，下列何者正確？
- A.通常少於30分鐘，不用處理，很快就可解除僵硬
 - B.超過30分鐘，少於1小時，建議保持休息，靜待僵硬消除
 - C.超過1個小時，但大多不會超過2小時；此時執行關節活動運動亦無法解除僵硬
 - D.至少維持1小時，多會超過2小時；洗熱水澡可協助緩解僵硬
- 54.有關全髖關節置換採前側開（anterolateral approach）與後側開（posterolateral approach）兩種手術方式，術後6～8週內均要禁止的動作為何？
- A.髖關節內收超過中線
 - B.髖關節外轉
 - C.髖關節外展
 - D.髖關節伸展動作
- 55.關於多發性硬化症（multiple sclerosis）症狀，下列何者最不適切？
- A.吞嚥困難
 - B.共濟失調（ataxia）
 - C.疲倦

D.動作徐緩（bradykinesia）

56.關於肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis）職能治療介入原則，下列何者最為適當？

A.在第三期及第四期宜以高強度的運動介入以預防肌肉萎縮

B.在第四期宜以主動關節活動介入，減低關節活動度的喪失

C.第三期的介入焦點為靜脈栓塞及褥瘡預防

D.第二期時可以考慮使用平板瀏覽網頁

57.有關複雜手肘關節骨折（complex elbow fracture）之術後處置，下列何者正確？

A.2~3週後才可安全進行肘關節屈曲與伸展之主動關節運動

B.術後製作肘關節固定副木於伸展位置，可減少後遺症

C.前臂內外旋的關節活動建議於肘關節屈曲90度姿勢下進行

D.合併福爾克曼氏缺血（Volkmann's ischemia）是常見現象，適當調整擺位即可

58.有關下肢燒燙傷住院病人的疼痛問題處理，下列何者正確？

A.疼痛問題僅由醫師透過藥物來處理

B.訓練病人站起時，若在下肢纏上彈性繃帶會增加疼痛

C.疼痛會讓病人抗拒運動或參與活動，應等疼痛問題減緩後再開始職能治療

D.非藥物的治療，如放鬆治療、呼吸運動及音樂治療等也可減緩病人疼痛

59.關於頸髓損傷患者急性期的職能治療介入，下列何者最適當？

A.提供複雜多功能的環境控制系統，以增進病人獨立性

B.在加護病房提供一次長達一小時的介入，以免錯過治療黃金期

C.預防肢體水腫及關節變形

D.鼓勵病人參與支持團體，以期順利回歸社會

60.關於中央脊髓症候群（central cord syndrome），下列敘述何者正確？

A.起因為脊髓的左或右半邊受傷，症狀為受傷同側的運動功能喪失，受傷對側痛覺、溫度覺喪失

B.該症候群較為少見，特徵為運動覺、痛覺、溫度覺喪失

C.若在頸椎受傷，則有四肢輕癱現象，而上肢較下肢嚴重

D.成因可能為腰椎的第三、四節壓迫到脊椎神經根叢

61.有關上、下肢骨折後癒合的階段與所需時間，下列何者正確？

A.形成骨痂（callus）：上肢約需2~3週，下肢約需4~6週

B.癒合（union）：上肢約需4~6週，下肢約需8~12週

C.穩固（consolidation）：上肢約需6~8週，下肢約需8~12週

D.上下肢癒合過程與各階段所需時間相同

62.有關掌指關節（MP）相關的結構說明，下列那一項正確？

- A.屈指肌腱側A1滑車（pulley）位置在其下方
- B.側韌帶（collateral ligament）在掌指關節伸直時是被拉緊的
- C.伸指肌腱側的中央帶（central slip）位置在其上方
- D.屬於鞍狀關節（saddle joint）

63.有關腦中風感覺評估之原則，下列那項錯誤？

- A.若病人無法口語回答刺激的位置，可請其用肢體動作表示
- B.刺激給與的方向須由近端到遠端
- C.眼睛睜開的情形下給指導語，並用健側先示範
- D.輕微中風可以考慮使用Moberg Pick-up Test

64.關於腦中風的評估工具，下列何者正確？

- A.National Institutes of Health Stroke Scale是可作為治療成果的測量指標
- B.Assessment of Motor and Process Skills為常用於腦中風個案基本日常生活功能的評估工具
- C.Arnadottir Occupational Therapy Neurobehavioral Evaluation為晤談型的評估工具，評估腦中風個案神經功能缺損如何影響日常生活表現及移動能力
- D.Functional Test for the Hemiplegic/Paretic Upper Extremity為職能治療師發展的標準化評估工具，內含17種任務，並分成7種功能性程度

65.對於上肢電動義肢（electrically powered prosthesis）的控制，下列敘述何者錯誤？

- A.常見的典型為兩點（two-site）控制系統，由兩處不同的肌肉群來控制
- B.肘下電動義肢常用的控制肌肉群是屈指肌（finger flexors）及伸指肌（finger extensors）
- C.肘上電動義肢常用的控制肌肉群是二頭肌（biceps）及三頭肌（triceps）
- D.截肩的電動義肢常用的控制肌肉群是胸肌（pectoralis）及棘下肌（infraspinatus）

66.75歲的楊婆婆不慎跌倒以手撐地造成骨折，下列敘述何者正確？

- A.老人跌倒常發生橈骨近端骨折
- B.最可能是橈骨遠端骨折往掌側（volar side）移位的柯雷氏骨折（Colles fracture）
- C.若摔倒時手腕屈曲以手背觸地，則最可能造成舟狀骨（scaphoid）骨折
- D.腕部粉碎性骨折經骨科醫師選用外固定器（external fixation）方法處置後，患者就可以進行手指主動關節運動

67.有關燒傷面積的評估，下列何者錯誤？

- A.九分法不適用於評估兒童的燒傷面積
- B.Lund & Browder chart 比九分法評估精確

- C.依據九分法，一整隻腿的面積占18%
- D.成人頭部占身體的體表面積（TBSA%）比例，比嬰幼兒的比例大
- 68.有關大面積燒傷病人送到醫院後的緊急處置，下列何者最優先？
- A.輸液復甦（fluid resuscitation）
- B.肢體擺位（positioning）
- C.清創（débridement）
- D.心理支持（psychological support）
- 69.下列面談的提問，何者最能使治療師瞭解關節炎如何影響個案的日常生活，並分析執行者與情境的因素？
- A.「關節炎帶給你最大的困擾是什麼？」
- B.「請說一下你典型一天的活動安排？並比較關節炎病情狀況較好與較差時的活動情況。」
- C.「從事哪件事情時，關節炎對你的限制最大？」
- D.「你最希望治療師可協助解決關節炎帶來的哪項問題？」
- 70.有關複雜性局部疼痛症候群（complex regional pain syndrome, CRPS）之敘述，下列何者錯誤？
- A.急性期除紅腫、疼痛外，關節活動度也會減少
- B.又稱反射性交感神經失養症（reflex sympathetic dystrophy, RSD）
- C.發病兩週內即可在X光檢查發現典型的骨質疏鬆變化
- D.進展有3個階段，且可能持續至少3個月以上
- 71.要訓練一位50歲病患之心肺耐力，設定70%最大攝氧量層級的活動是危險閾值，則活動時只要病人心跳一到達下列那一個數值時，便應警戒停止？
- A.119次／分鐘
- B.126次／分鐘
- C.133次／分鐘
- D.153次／分鐘
- 72.針對多發性硬化症（multiple sclerosis）患者，下列何者為職能治療師須介入處理的症狀？①共濟失調（ataxia） ②動作徐緩（bradykinesia） ③認知異常 ④疲勞
- A.①③④
- B.①②④
- C.①②③
- D.②③④
- 73.下列那種疾病診斷最有可能出現共濟失調步態（ataxic gait）？
- A.吉蘭－巴瑞症候群（Guillain-Barré syndrome）

B.失智症（dementia）

C.帕金森氏症（Parkinson's disease）

D.多發性硬化症（multiple sclerosis）

74.下列手部功能性抓握型態，若依拇指對掌動作（opposition）的需求程度由大至小排列，其順序為何？①勾狀抓握（hook grip） ②圓球狀抓握（spherical grip） ③側狀抓握（lateral grip） ④指尖抓握（tip-to-tip pinch）

A.②①③④

B.③④②①

C.④②③①

D.④③①②

75.槌狀指（mallet finger）在急性期時可用下列何種副木給予固定？

A.腕掌關節置於對掌動作之thumb spica splint

B.遠端指間關節稍微過度伸展之finger gutter splint

C.近端指間關節完全伸展之finger ring splint

D.手掌置於自然位置之MacKinnon splint

76.下列那一項測試方式是為確認個案正中神經（median nerve）是否受損？

A.要求病患以手掌朝下，手指外展（abduction）方式置於桌面，要求病患做出手指內收（adduction）動作

B.要求病患手腕與手指同時作出伸展（extension）的動作

C.要求病患做出拇指以對掌（opposition）方式碰觸其他手指

D.要求病患迅速握拳後再立刻放開

77.關於重症肌無力（myasthenia gravis）之敘述，下列何者正確？

A.大腦皮質病變引發

B.平滑肌及骨骼肌皆會受到影響

C.較少使用的肌肉較不易出現異常性疲勞

D.易影響控制眼睛及口咽部的肌肉

78.下列何種疾病，不會有認知問題？

A.亨丁頓氏症（Huntington's disease）

B.多發性硬化症（multiple sclerosis）

C.後天免疫不全症候群（AIDS）

D.吉蘭巴瑞症候群（Guillain-Barré syndrome）

79.關於截肢患者以彈性繃帶塑形的敘述，下列何者錯誤？

A.主要以螺旋環狀包紮為主

B.壓力要由遠端向近端漸降

C.8字型包紮法每層繃帶要重疊覆蓋約1/3到1/2繃帶寬

D.極短肘下截肢者要包到肘關節以上

80.針對手部燒燙傷之患者，下列各時期手部固定副木（resting hand splint）之穿戴時程表或擺位何者正確？

A.在急性期為避免阻礙組織之修復，建議一日穿戴時間不超過3次，每次時間不超過40分鐘

B.在植皮期應讓患者的手部固定在一舒服不受力之姿勢，以避免植皮皮膚受牽扯而使植皮失敗

C.在植皮期患者應全日穿戴副木3～10日，將依外科醫師植皮方式特殊考量決定穿戴時間

D.在復健期，建議日間活動時穿戴副木，而夜間休息時則應限制副木之使用