

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：4103
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 吳謙《訂正仲景全書傷寒論注》，桂枝湯證的病機為下列何者？
(A)風邪入侵太陽體表，與衛氣交爭，衛氣為風邪所客
(B)寒邪入侵太陽體表，與榮氣交爭，榮氣為風邪所客
(C)風寒邪氣入侵太陽體表，與衛氣交爭，衛氣為風邪所客
(D)風寒邪氣入侵太陽體表，與榮衛之氣交爭，榮氣為風寒之邪所客
- 2 「太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者」的原因及治法，下列何者正確？
(A)表邪太盛，先刺風池風府，再與桂枝湯汗解
(B)餘邪未盡，宜桂枝湯汗解
(C)病仍屬表，可發汗宜麻黃湯
(D)病仍屬表，可發汗宜桂枝麻黃各半湯
- 3 依《傷寒論》，桂枝加附子湯證的病因病機為下列何者？
(A)太陽傷寒發汗過度，致表陽虛弱，衛外不固
(B)太陽中風發汗過度，致心陽虛弱，衛外不固
(C)太陽病發汗過度，致心陽虛弱及陰津耗傷
(D)太陽病發汗過度，表邪未解並表陽虛及陰津耗傷
- 4 依《傷寒論》，傷寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，治以下列何者最適宜？
(A)茯苓、豬苓、澤瀉、阿膠、滑石
(B)茯苓、桂枝、白朮、炙甘草
(C)炙甘草、生薑、茯苓、桂枝
(D)茯苓、白朮、白芍、生薑、大棗、炙甘草
- 5 傷寒十日以上過經的轉歸，脈浮細而嗜臥者，為下列何者？
(A)病仍在表
(B)病傳少陰
(C)病傳少陽
(D)表已解
- 6 依《傷寒論》，有關旋覆代赭湯之敘述，下列何者正確？①有寒熱之邪，故用乾薑、黃芩、黃連以辛開苦降 ②治法為和胃降逆，化痰下氣 ③人參、炙甘草、大棗以益中虛 ④可治痰氣交阻之痞
(A)①②③
(B)①②④
(C)②③④
(D)①②③④
- 7 依《傷寒論》，「熱實結胸」證若邪結偏於上，最宜治以下列何者？
(A)黃連、半夏、瓜蒌實
(B)大黃、芒硝、杏仁、葶藶子、甘遂
(C)大黃、芒硝、甘遂
(D)大黃、黃芩、黃連
- 8 依《傷寒論》，甘草瀉心湯治下列何種痞證最適宜？
(A)痰氣痞
(B)脾胃氣虛痞利俱甚
(C)胃虛不化水氣之痞
(D)熱痞兼陽虛

- 9 依《傷寒論》，下列何項是柴胡加龍骨牡蠣湯證之症狀？①一身盡重 ②頭汗出 ③胸滿煩驚 ④小便不利
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 10 有關少陽小柴胡湯或然證，下列敘述何者正確？①若胸中煩而不嘔，加枳實芍藥之作用為除熱蕩實 ②若渴，加栝實根之作用為清熱生津 ③若腹中痛，去黃芩之原因為黃芩苦寒，不利脾陽 ④若不渴，外有微熱，加桂枝之作用為幫助膀胱氣化
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 11 有關「陽明病，發熱，汗多者，急下之」，下列相關敘述何者正確？①陽明病，無形熱邪充斥三焦 ②陰液有枯竭之虞 ③以大承氣湯瀉陽救陰 ④此等急下，為救陰而設，不在奪實
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 12 有關小柴胡湯，下列敘述何者正確？①煎煮法為去滓再煎 ②黃芩、人參、柴胡之劑量相等 ③柴胡之作用為疏少陽之鬱滯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 13 關於「少陰病，欲吐不吐，心煩，但欲寐，五六日自利而渴者，屬少陰也。」之敘述，下列何者正確？①「欲吐」是因下焦陽氣衰微，寒邪上逆，影響胃氣 ②「心煩」是因虛熱擾心 ③「自利」是因腎陽虛甚，不能溫養脾土 ④「渴」是因津液不能上承
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 14 關於「少陰咽痛證治」之敘述，下列何者錯誤？①客寒上犯者，宜半夏散及湯 ②客熱上干者，宜苦酒湯 ③虛火上炎者，宜甘草湯或桔梗湯 ④咽傷生瘡者，宜豬膚湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 15 關於「少陰病，下利，便膿血」與「桃花湯」之敘述，下列何者正確？
(A)桃花湯中赤石脂用法為一半先煎，另一半篩末，於藥液煎好後加入
(B)桃花湯方後註明，若一服癒，餘勿服，是恐留邪為患
(C)此處「便膿血」應兼「腹痛綿綿，喜溫喜按，口淡不渴，裏急後重」等症
(D)桃花湯煮法為三藥一起煮，煮至米熟後去滓
- 16 「少陰病，吐利，手足逆冷」兼見下列何證候時，可以推論具「陰盛陽虛，正邪劇爭」之病機？
(A)頭眩，時時自冒 (B)嘔而汗出 (C)煩躁欲死 (D)時自煩，欲去衣被
- 17 下列何者為血分證的病機？
(A)熱灼營陰，心神被擾 (B)熱陷心包，機竅阻閉
(C)熱盛迫血，熱瘀交結 (D)邪熱亢盛，真陰耗傷
- 18 下列那一項不是衛氣營血和三焦辨證的主要意義？
(A)歸納證候類型、分析病理變化 (B)明確病變部位
(C)掌握病勢輕重、認識病理傳變 (D)指出發病類型
- 19 關於溫病治法中的「息風法」之敘述，下列何者錯誤？
(A)息風法總的作用就是平息肝風
(B)溫病的療法中，主要有涼肝及滋陰兩種息風法
(C)小兒患溫病之初，即因高熱而引起之抽搐，其治法當以滋陰息風為主，以免損及稚陽
(D)涼肝法主要是針對熱盛動風，其代表方如羚角鉤藤湯

- 20 下列關於「斑疹之臨床意義」的敘述，何者正確？
 (A)欲透未透之際，往往有灼熱、煩躁、口渴、舌絳苔黃、脈數等症
 (B)欲透未透之際，如兼見悶瞀、耳聾等症，則為出疹之徵
 (C)欲透未透之際，如兼見胸悶、咳嗽等症，則為發斑先兆
 (D)斑疹一旦透發，代表邪氣內陷
- 21 風溫後期，多表現下列何種陰傷證候？
 (A)低熱，乾咳不已或痰少而黏，口舌乾燥而渴 (B)虛煩躁擾，氣息短促，手足蠕動
 (C)乾咳不已或痰少而黏、腰膝酸軟 (D)失眠、心悸、口乾舌燥
- 22 關於風溫邪熱傳入中焦氣分，陽明腑實引起肝風內動的治法，下列何者最適宜？
 (A)攻下腑實，涼肝息風 (B)清泄胃熱，涼肝息風
 (C)清心開竅，涼肝息風 (D)豁痰開竅，涼肝息風
- 23 有關宣白承氣湯，下列敘述何者錯誤？
 (A)有宣肺通腑功效，為臟腑合治法 (B)取白虎、承氣二方之意而變其制
 (C)組成包括石膏、大黃、杏仁、芒硝四味 (D)本方以痰涎喘促，潮熱便秘為辨證要點
- 24 風溫，邪入血分，心營熱盛，引動肝風之證，治以下列何者最適宜？
 (A)白虎湯加羚羊、鉤藤 (B)調胃承氣湯加羚羊、鉤藤
 (C)紫雪丹 (D)牛黃承氣湯
- 25 暑溫病，症見身熱面赤耳聾，胸悶脘痞，下利稀水，小便短赤，咳痰帶血，不甚渴飲，舌紅赤，苔黃滑。其辨證以下列何者最適宜？
 (A)暑兼寒濕 (B)暑穢之證 (C)暑濕困阻中焦 (D)暑濕瀰漫三焦
- 26 濕溫病若辨證為濕熱中阻證，則其濕熱偏盛情況應為何？
 (A)濕重於熱 (B)濕熱並重 (C)熱重於濕 (D)濕熱化燥
- 27 關於秋燥之病候特點，下列敘述何者錯誤？
 (A)溫燥多見於秋深初涼，西風肅殺之時
 (B)初起邪犯肺衛，在病變過程易出現津氣耗傷見證
 (C)病變重心在肺，以衛氣分見證為主
 (D)病情較輕，危重病例較為少見
- 28 有關「春溫」見熱盛動血、迫血妄行，或斑疹、出血的治則，下列敘述何者正確？
 (A)清營解毒，透熱外出 (B)清熱涼血解毒
 (C)苦寒清泄裡熱 (D)涼肝息風
- 29 下列有關爛喉痧的敘述，何者錯誤？
 (A)與大頭瘟同是感受溫熱時毒而引起的溫熱疾患
 (B)皮膚起紅疹後會出現糠屑狀脫皮
 (C)本病初起急宜清火解毒
 (D)多發生於冬春二季
- 30 下列關於涼燥與溫燥的敘述，何者錯誤？
 (A)涼燥性質近於風寒，溫燥性質近於風溫
 (B)二者初起即有唇燥咽乾口渴之象
 (C)涼燥化熱之後，其病機演變及治則與溫燥相同
 (D)涼燥侵襲肺衛用杏蘇散（《溫病條辨》），溫燥侵襲肺衛則用桑杏湯（《溫病條辨》）

- 31 下列有關伏暑的敘述，何者錯誤？
(A)發病初期類似感冒
(B)繼而形似瘧疾，寒熱規則
(C)以後則但熱不寒，夜間熱甚，至天明得汗身熱稍減，而胸腹灼熱不除
(D)大便可見溏而不爽
- 32 某患者在中秋節出外賞月，不慎感冒，初起時發熱惡寒，咽癢乾咳，口乾渴。在服藥後，咳嗽已改善，但火氣卻更大，口乾唇燥且口渴，身體發熱，煩躁不安，還常流鼻血。望其舌苔黃，舌質絳。依中醫辨證，以下列何方治療最適宜？
(A)桑杏湯（《溫病條辨》）
(B)白虎湯（《傷寒論》）
(C)加減玉女煎（《溫病條辨》）
(D)清燥救肺湯（《醫門法律》）
- 33 依《金匱要略》，下列何者為下瘀血湯的組成藥物之一？①大黃 ②丹參 ③桃仁 ④蟅蟲
(A)①②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- 34 依《金匱要略》，澤瀉湯主治下列何者？
(A)膈上病痰，滿喘咳吐
(B)心下有痰飲，胸脅支滿，目眩
(C)短氣有微飲，當從小便去
(D)心下有支飲，其人苦冒眩
- 35 依《金匱要略》，「百合病，不經吐、下、發汗，病形如初者」，宜治以下列何者？
(A)百合、生地汁
(B)百合、滑石、代赭石
(C)百合、雞子黃
(D)百合、滑石
- 36 依《金匱要略》，「病歷節不可屈伸，疼痛」，宜治以下列何者？
(A)麻黃、芍藥、黃耆、甘草、川烏
(B)桂枝、甘草、白朮、附子
(C)桂枝、生薑、附子、甘草、麻黃、芍藥、白朮、知母、防風
(D)薏苡仁、杏仁、甘草、麻黃
- 37 依《金匱要略》，下列何者為大黃硝石湯的組成藥物之一？①黃芩 ②黃柏 ③梔子 ④枳實
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 38 依《金匱要略》，下列何方具有治療頭眩的功效？①小半夏加茯苓湯 ②甘遂半夏湯 ③澤瀉湯 ④五苓散
(A)①② (B)③④ (C)①③④ (D)②③④
- 39 依《金匱要略》，下列敘述何者正確？①胸痹，胸中氣塞，短氣，桂枝生薑枳實湯主之 ②心中痞，諸逆心懸痛，烏頭赤石脂丸主之 ③心痛徹背，背痛徹心，栝蒌薤白半夏湯主之 ④胸痹緩急者，薏苡附子散主之
(A)② (B)④ (C)①② (D)③④
- 40 依《金匱要略》，小建中湯主治下列何者？
(A)裏急、腹中痛、夢失精、四肢酸疼等陽虛有寒的虛勞病證
(B)虛勞裏急、諸不足等脾胃虛寒偏氣虛的虛勞病證
(C)裏急、悸、衄、腹中痛、夢失精、四肢酸疼、手足煩熱、咽乾口渴等寒熱錯雜、陰陽兩虛偏於陽虛的虛勞病證
(D)悸、衄、手足煩熱、咽乾口渴等陰虛有熱的虛勞病證

- 41 某 16 歲女性患者，主訴全身水腫已 4 日，發病前全身痠痛，發熱惡寒，自服感冒成藥後症狀減輕，但仍全身水腫。現有症狀為口乾渴喜飲，小便量變少，大便平，納尚可，pitting edema(+)，發熱惡寒已無。視其舌紅、苔白有津，脈沉。治以下列何方最適宜？
(A)豬苓散 (B)越婢加朮湯 (C)五苓散 (D)防己黃耆湯
- 42 某 29 歲女性患者，主訴月經淋漓不淨已 3 個月經週期，每次月經來都需 12、13 日才停；量少色淡，無血塊；月經週期尚規則，約 30 日 1 行，經來第 2 日小腹隱痛；喜溫喜按，納尚可，二便平，口不乾渴；舌淡紅嫩、苔白，脈細無力。治以下列何方最適宜？
(A)吳茱萸、當歸、川芎、芍藥、人參、桂枝、阿膠、生薑、牡丹皮、半夏、麥門冬、甘草
(B)乾地黃、川芎、阿膠、艾葉、甘草、芍藥、當歸
(C)芍藥、川芎、當歸、茯苓、白朮、澤瀉
(D)黃芩、白朮、當歸、芍藥、川芎
- 43 有關《金匱要略》水氣病的敘述，下列何者正確？①肺水者，其身腫，小便難，時時鴨溇 ②皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者，防己茯苓湯主之 ③風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢加朮湯主之 ④心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作，桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)②③④
- 44 有關《金匱要略》中驚悸吐衄下血的敘述，下列何者正確？①寸口脈動而弱，動即為悸，弱則為驚 ②夫脈浮，目睛暈黃，衄未止，暈黃去，目睛慧了，知衄今止 ③夫吐血，咳逆上氣，其脈數而有熱，不得臥者，死
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 45 肝硬化的病人，臨床上出現腹水，痞脹不舒、蜘蛛痣、青筋暴露，心煩失眠易醒，容易出鼻血及牙齦出血，咽乾口燥，舌紅絳、少苔，脈弦細數。根據其病機，治則以下列何者最適宜？
(A)行氣利水、活血化癥 (B)涼血化癥、滋養肝腎
(C)行濕散滿、疏肝理氣 (D)攻下逐水、清熱利濕
- 46 下列關於「黃疸」證治之敘述，何者錯誤？
(A)黃疸隨著濕熱、寒濕和瘀血內阻的病機不同，黃色可有鮮明、晦暗之差異
(B)萎黃則兩目和小便均微黃，肌膚呈淡黃而無光澤，常伴有眩暈耳鳴，心悸少寐等，當與黃疸鑑別
(C)黃疸治則，屬陽黃者宜清熱化濕，屬陰黃者宜溫中化濕
(D)若因砂石，蟲體阻滯膽道而致黃疸者，其表現常以熱證為主，屬陽黃範圍
- 47 中風之發生，病機較為複雜，歸納起來不外虛、火、風、痰、氣、血六端，其中以何種證型為其根本？
(A)肝腎陰虛 (B)脾腎陽虛 (C)痰濕阻絡 (D)氣血兩虛
- 48 某 19 歲患者利用暑假和同學出遊，趁著艷陽高照外出，傍晚淋一場大雷雨後，當晚出現發燒，略畏寒，雖出汗，但覺汗出不暢，胸悶、口渴，隔日因頭痛甚就診。就診時神倦，舌淡紅偏紅、苔白，脈濡而數。治以下列何方最適宜？
(A)羌活勝濕湯加蒼朮、厚朴、陳皮、枳殼 (B)川芎茶調散加藿香、吳茱萸、生薑
(C)黃連香薷飲加藿香、荷葉、竹茹、佩蘭 (D)芎芷石膏湯去羌活、加知母、石斛

- 49 某 78 歲女性患者，胸口悶痛，心悸氣短，頭昏乏力，脈沉細數，舌質紅。心電圖顯示心跳每分鐘 98 次，心跳規則，無心肌梗塞。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型—氣滯血瘀型 (B)病機—陽微陰弦
(C)治法—辛溫通陽 (D)主方—生脈散
- 50 某患者常熬夜思考事務，當事情完成，覺得非常疲倦；但是想睡覺時又不易入睡，且睡間易醒，醒後則不易再睡，如此反覆。病人面色少華，食少納呆，偶而會心悸，舌淡，脈細。治以下列何方最適宜？
(A)黃連阿膠湯 (B)歸脾湯 (C)酸棗仁湯 (D)半夏秫米湯
- 51 某 24 歲女性患者，平素眠淺多夢，稍有聲響即受驚嚇。近日因發生小車禍而心悸不安，其脈動數，則下列診治何者正確？
(A)證屬痰火擾心、心神不安，治以黃連溫膽湯
(B)證屬心脾兩虛、血不養心，治以歸脾湯
(C)證屬心虛膽怯、心不藏神，治以安神定志丸
(D)證屬氣陰不足，心神失養，治以炙甘草湯
- 52 某患者被診斷為大腸激躁症，服西藥已數年，症狀未好轉。其主訴為大便時溇時稀，稍進油膩則大便次數增加，脘腹脹悶，飲食減少，望面色萎黃，肢倦無力，舌質淡，苔白，脈細弱。治以下列何方最適宜？
(A)痛瀉要方 (B)參苓白朮散 (C)藿香正氣散 (D)逍遙散
- 53 關於呃逆的敘述，下列何者錯誤？
(A)漢·張仲景治療呃逆提出用橘皮竹茹湯來通陽和胃
(B)呃逆在宋以前多稱為噦，明末以後統稱呃逆
(C)正虛患者出現呃逆續斷不繼，乃為危象
(D)呃逆初起，聲響有力，連續發作，多為實證
- 54 那一部中醫典籍提出「病痰飲者，當以溫藥和之」之大法，堪為後世準繩？
(A)《內經》 (B)《傷寒論》 (C)《金匱要略》 (D)《景岳全書》
- 55 某 23 歲女性患者，昨天氣喘突然發作，喘促上氣，胸悶脹痛，咳痰稠黏不爽，形寒身熱，煩渴身痛。舌邊紅、苔薄白，脈浮數。該患者之辨證分型最可能為下列何者？
(A)痰熱鬱肺 (B)風寒襲肺 (C)痰濁阻肺 (D)表寒裏熱
- 56 承上題，治療主方選用下列何者最適宜？
(A)華蓋散 (B)麻黃湯 (C)桑白皮湯 (D)麻杏石甘湯
- 57 某 69 歲男性患者，主訴嘔吐，少尿。症見神疲腰酸，面色㿠白而晦滯，四肢不溫，膝軟，足跟疼痛，遍身浮腫。診其脈沉細，苔薄、質淡白。治以下列何方最適宜？
(A)金匱腎氣丸 (B)實脾飲 (C)苓桂朮甘湯 (D)理中湯
- 58 某 45 歲男性患者，素有糖尿病史，就診時症見眼瞼浮腫，小便不利，咽喉腫痛化膿已一週，惡風發熱，鼻塞、微惡風寒，舌紅、苔薄黃，脈浮數。治以下列何方最適宜？
(A)麻黃連翹赤小豆湯合五味消毒飲 (B)銀翹散合金匱腎氣丸
(C)清心蓮子飲合清瘟敗毒散 (D)疏鑿飲子合五皮飲
- 59 某 29 歲男性患者，主訴遺精，勞甚輒發。近半年來食少便溇，失眠健忘、心悸怔忡。望其面色萎黃、舌淡、苔薄，脈弱。治以下列何方最適宜？
(A)清心蓮子飲 (B)萆薢分清飲 (C)妙香散 (D)平胃散

- 60 某患者原眼瞼浮腫，繼則延至全身，小便不利、身發瘡瘍潰爛、惡風發熱。診其舌質紅、苔薄黃，脈浮數或滑。治以下列何法最適宜？
(A)散風清熱，宣肺利水 (B)散風解毒，利水消腫
(C)發汗利水，行氣健脾 (D)外散內利，分解濕熱
- 61 汗證的治療當以汗證之不同病機，而有所區別。下列所述汗證治療原則，何者錯誤？
(A)自汗多因營衛不和、肺脾氣虛、熱淫於內等引起，在治療上應分別給以調和營衛、益氣固表、清裏泄熱
(B)盜汗多由於陰虛火旺、心血不足所致，在治療上應滋潤降火、補血養心
(C)絕汗主要為陰陽離決之危象，應從速投予益氣固脫、回陽斂陰之劑
(D)戰汗多因濕熱內蘊，治療以清熱利濕為主
- 62 關於消渴的敘述，下列何者錯誤？
(A)消渴的病機以陰虛為本，燥熱為標
(B)消渴的臟腑病位，上焦在肺，中焦在脾，下焦在腎
(C)「鬲消」應屬上消
(D)葉天士《臨證指南醫案》提出：「心境愁鬱，內火自燃，乃消症大病。」
- 63 某 50 歲男性患者，四肢肌肉均痿軟無力，身體困倦沉重，有時會肢體麻木，四肢關節疼痛，下肢微有水腫，脛前自覺有熱氣上蒸，小便短赤，身熱不揚，胸脘痞悶。治以下列何方最適宜？
(A)獨活寄生湯 (B)虎潛丸 (C)羌活勝濕湯 (D)二妙散
- 64 某患者右膝關節痛、屈伸不利，投予防風湯效佳。下列何者為鑑別診斷之關鍵？
(A)疼痛游走不定 (B)疼痛遇寒劇痛，得熱則緩
(C)疼痛沉著肌膚麻木 (D)局部紅腫熱痛
- 65 某 40 歲男性患者，主訴三個月來常常頭痛，每天都感覺疲倦，每到下午就會覺得身體發熱。醫師診察時，發現病人神態疲乏，手心熱於手背，兩顴紅、唇紅、舌質深紅，脈細數。其診斷以下列何證最可能？
(A)外感風寒化熱入裏 (B)氣血凝滯化熱
(C)內傷陰虛 (D)氣虛
- 66 某 32 歲女性患者自訴月經來後數年，即開始由原來烏黑頭髮漸變為偏黃。其辨證最可能為下列何者？
(A)肝腎陰虛 (B)血氣不足 (C)血燥 (D)腎氣衰
- 67 有關五色與疾病證型的關係，下列何者正確？
(A)黃色主熱，咳嗽黃痰屬於熱咳 (B)黑色主寒，黑而焦黑是為寒燥
(C)白色主虛，白而色淡是肺胃虛寒 (D)青色主風，青而黑多虛風
- 68 若舌色青、苔滑，則下列何者為最可能之辨證？
(A)陰寒 (B)瘀血鬱阻 (C)酒毒 (D)熱入營血
- 69 下列敘述何者非危候？
(A)重病不能食，突然暴食 (B)久病臥床不起，突然呃逆
(C)久病突見大汗淋漓或汗出如油 (D)久病之人，突然作嘔
- 70 有關「汗」的敘述，下列何者正確？
(A)「戰汗」，汗出如油，汗珠淋瀝不止，是一種危候
(B)病人外感，汗出，即可診斷為太陽中風
(C)汗出皆為表虛之徵
(D)自汗與盜汗若同時伴有虛熱之象者，多為陰虛所致；若同時伴有虛寒之象多為陽虛所致

- 71 某病患主訴咳嗽，痰多易咳出，咳聲低。在談話的過程中，發現其說話聲音低怯，前重後輕。此患者之診斷最可能為下列何證？
(A)外感濕邪咳嗽 (B)內傷濕盛咳嗽 (C)外感風邪咳嗽 (D)內傷痰熱咳嗽
- 72 張醫師帶學生進行「脈診」實習時，請學生說明「脈象主病」。下列何者錯誤？
(A)「疾脈」是真陰竭於下，孤陽亢於上，而氣短已極之象
(B)「促脈」為陽盛陰實，陰不和陽；而「結脈」為陰盛而陽不和
(C)「濡脈」輕取可知，重取反不明顯；熱證、濕證均可出現
(D)「緊脈」多因寒邪而致，劇痛、宿食見緊脈，也多是寒邪積滯與正氣相搏的緣故
- 73 有關診婦人脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)婦人左關、尺脈，忽洪大於右手，口不苦，身不熱，腹不脹，是月經將至
(B)月經正常與否的脈象診察部位，主要出現在尺脈
(C)手少陰脈動甚者，是懷孕的徵象
(D)孕婦已足月者將臨盆時常出現弦脈
- 74 下列關於「體表按診」之敘述，何者錯誤？
(A)輕觸肌表，察其潤燥可別有汗無汗
(B)凡身熱，按之皮毛之分而熱重，按之久而不熱者，是熱在表、在肺，又是勞倦虛熱之象
(C)若按之血脈肌肉之分而熱，重按之而不見熱者，是熱在下焦，邪已入裏
(D)按之筋骨之分而熱者，為陰虛骨蒸，或濕熱深入骨髓
- 75 下列關於「真陰不足」的敘述，何者錯誤？
(A)脈數而無力 (B)口燥舌焦 (C)內熱便秘 (D)飲食不化
- 76 下列何者不屬於「內風」？①肝陽升動化風 ②痺症 ③血虛生風 ④破傷風 ⑤熱極生風
(A)②④⑤ (B)①⑤ (C)②④ (D)③④⑤
- 77 在一般血虛的證候之外，有較明顯的目花目糊、手足發麻、肢體拘攣、睡眠不安、月經不調等症狀時，其臨床病機以下列何者最正確？
(A)心脾血虛 (B)肝血虛 (C)心血虛 (D)脾陰虛
- 78 下列關於「三陽病辨證」的敘述，何者錯誤？
(A)區別太陽病表虛或表實，可依「有汗或無汗、惡風或惡寒、脈浮緩或浮緊」，尤以脈象為重點
(B)陽明腑證的病機是邪熱傳裏與腸中糟粕相搏而成燥屎內結之證
(C)依八綱分類而言，少陽病屬半表半裏之熱證
(D)三陽病中，邪氣與正氣抗爭最烈的應屬陽明病
- 79 某 63 歲女性患者有冠心病、糖尿病多年。來診時主訴一年前接受心導管氣球擴張術，術後雖有西藥控制，仍反覆發生心悸與胸悶重壓感，以空腹時最明顯，飲熱水與用餐後症狀自動緩解。下午以後常陣發性身體發熱、出汗已多年。平時容易目乾澀、目糊，後項酸，腰膝酸軟。納可，便暢。苔少、舌淡紅，脈沉細。本病的臟腑辨證，以下列何者最適當？
(A)腎陽虛，水氣凌心 (B)心腎氣陰兩虛
(C)心肺氣虛，宗氣不足 (D)心陽虛
- 80 某 45 歲男性患者經胸腔科診為慢性支氣管炎，雖以西藥控制但仍反覆咳嗽已多年。來診時自訴咳嗽發作不定，多乾咳，常陣發咳甚面紅耳赤，痰色淡黃，質黏量少不易出，咽喉乾黏常有梗滯感，口乾喜飲水。苔薄黃、舌紅，脈細弦數。依中醫辨證原則來分析本病證，以下列何者最適當？
(A)痰濕蘊肺咳嗽 (B)肝火夾陰虛咳嗽 (C)肺陰虧虛咳嗽 (D)風熱犯肺咳嗽