

105年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、形成成人期憂鬱症 (depression in adulthood) 的脆弱性 (vulnerability)，可分從生活壓力 (life stress) 與人際關係 (interpersonal) 等兩個方向來看，請就這兩個方向，各列舉三個脆弱性因子，並說明其內涵。(25 分)

二、有位 23 歲的男性，大學畢業一年，賦閒在家，有人際關係問題，被轉介進行心理治療，而轉介單上的臨床印象 (clinical impressions) 為社會焦慮症 (social anxiety disorder) 與自閉症類群障礙症 (autism spectrum disorder, ASD)。臨床心理師第一次晤談時，行為觀察個案有良好的視線接觸與適當的情緒反應。於是，臨床心理師在第二次晤談時進行社會焦慮症與 ASD 的鑑別診斷。如果這個個案是社會焦慮症患者，請舉例說明個案的心理病理 (亦即個案概念化，case conceptualization)，也說明鑑別診斷的相關心理病理概念。(25 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：2104

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 現今對心理疾病的概念中，下列何者並非定義偏差行為的方式？
(A)形成污名反應 (B)個人主觀苦惱 (C)功能障礙缺損 (D)偏離社會常模
- 有關使用失能 (disability) 作為偏差行為的定義原則，下列何者正確？
(A)強調個人感受 (B)強調生理功能 (C)強調社會功能 (D)強調內在機制
- 若某項研究結果顯示：「社會經濟地位 (SES) 與精神疾病的罹患率，兩者間並無關係 (no relationship)」，下列何種類型的研究，會獲致如此結果？
(A)流行病學與單一個案實驗法 (B)流行病學與相關研究法
(C)相關研究法與混合設計 (D)個案研究法與實驗設計
- 下列物質何者不會造成物質中毒譫妄？
(A)安非他命 (B)吸入劑 (C)苯環利定 (D)菸草
- 拔毛症在 DSM-5 被歸在那個類別？
(A)侵擾行為、衝動控制及行為規範障礙症 (B)身體症狀及相關障礙症
(C)焦慮症 (D)強迫症及相關障礙症
- 多重認知功能缺陷是阿茲海默型失智症的臨床特徵，下列何者是核心障礙？
(A)記憶障礙 (B)語言障礙 (C)執行功能障礙 (D)動作技能障礙

- 7 「臺灣大約有 2%的成人患有強迫症」，這句話是在說明有關強迫症的什麼？
(A)發生率 (B)盛行率 (C)風險因子 (D)相關係數
- 8 下列何者不是相關法（correlational method）的特徵？
(A)研究兩個以上變項間的關係
(B)能提供特殊案例的訊息
(C)因果關係較難由此研究方法確定
(D)流行病學家常用此研究方法研究疾病的發生率或危險因子
- 9 相關法（correlational method）與實驗性研究（experimental research）最主要的差異為何？
(A)實驗性研究的樣本通常較大 (B)相關法的樣本通常較大
(C)相關法通常需要操弄特定變項 (D)實驗性研究通常需要操弄特定變項
- 10 有關個案研究法的敘述，下列何者正確？
(A)有利於驗證造成個案改變的假設 (B)可以提供因果關係上的直接證據
(C)可以用來產生新假設 (D)有利於治療效果的推廣應用
- 11 關於橫斷研究（cross-sectional）的敘述，下列何者錯誤？
(A)相較於縱貫性研究，較容易執行 (B)可以解決世代效應的問題
(C)難以確認變項間的因果關係 (D)缺乏個人的發展性資訊
- 12 下列研究作法中，何者不屬於類擬實驗法（analogue experiment）？
(A)以白鼠為對象，透過動物實驗來了解人類行為
(B)透過注射乳酸（lactate）來誘發參與者恐慌發作，以了解身體敏感度對恐慌症狀的影響效果
(C)在雙胞胎被不同家庭收養十年之後，再評估兩者的情緒與智力功能
(D)以貝克憂鬱量表對大學生進行施測，根據總分區分高分組與低分組，比較兩組在面對情緒刺激時的注意力表現
- 13 下列何者不屬於在單一受試者設計（single-subject designs）中，用重複測量（repeated measurement）分析各階段的目標行為表現要項？
(A)趨向（trend）的變化
(B)敏感度（sensitivity）
(C)目標行為改變的程度（level/degree of behavior change）
(D)變化度（variability）
- 14 有關類擬實驗法（analogue experiment）之敘述，下列何者錯誤？
(A)可提高研究倫理的考量 (B)可考慮研究對象的相似性
(C)可考慮由實驗操弄誘發相似的症狀 (D)可具有較好的外效度
- 15 關於評估外傷性腦傷（traumatic brain injury, TBI）的嚴重度，下列敘述何者錯誤？
(A)意識喪失（loss of consciousness）大於 24 小時屬於重度損傷
(B)創傷後失憶（posttraumatic amnesia）小於 24 小時屬於輕度損傷
(C) Glasgow 昏迷量表分數（Glasgow Coma Scale Score）為 9-12 分屬於中度損傷
(D)若 TBI 為神經認知疾患（NCD）的原因，診斷 NCD 時需評估個案 TBI 的嚴重程度
- 16 下列何者是一非自主性的行動，雖然該行動本身看起來相當複雜，個體的動作協調性也佳，看似具有目的性（purposeful），但個體當時的意識狀態明顯不佳，事後也常無法回憶起當時的情況？
(A) automatism (B) mannerism (C) stereotype (D) echopraxia
- 17 腦部受損的患者有時會出現 Akinetic mutism 的現象，此現象與那部分腦區病變最有關？
(A) the frontal lobe (B) the temporal lobe (C) arcuate fasciculus (D) corpus callosum
- 18 會減低神經傳導物質受體活性的藥物類型，稱之為：
(A) agonist (B) antagonist (C) inhibitor (D) stimulant

- 19 根據神經科學的典範，下列何者正確？
(A)大多數精神病理的形成都與單一基因有關 (B)多巴胺異常與大多數精神病理的形成有關
(C)精神病理的出現與腦功能異常有關 (D)精神病理的出現與環境因素有關
- 20 下列何者不屬於大腦的邊緣系統？
(A)下視丘 (B)前扣帶迴 (C)海馬迴 (D)腦島
- 21 corpus callosum 為大腦內神經聯結的重要構造，它主要是由下列何者負責供給血液？
(A) posterior communicating artery (B) anterior cerebral artery
(C) anterior choroidal artery (D) anterior inferior cerebellar artery
- 22 下列何者是抑制性質的神經傳導物質？
(A)正腎上腺素 (norepinephrine) (B)血清素 (serotonin)
(C)多巴胺 (dopamine) (D)伽瑪氨基丁酸 (GABA)
- 23 根據 Steketee & Frost (2003) 的認知行為模式，囤積行為 (hoarding) 與下列何者無關？
(A)組織能力有缺損 (B)對於所擁有的事物具有異於常人的想法
(C)計畫能力有缺損 (D)迴避行為 (avoidance behaviors)
- 24 關於系統減敏感法 (systematic desensitization) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)其原理主要是根據操作制約的原則
(B)必須在引發焦慮的情境下進行
(C)進行暴露 (exposure) 階段時，若使用真實事物或情境，效果會比以想像的方式來得好
(D)雖然放鬆技術可以降低個案的生理激發，但並沒有證據顯示放鬆是產生療效的必要因素
- 25 依據 Harvey 等人 (2004) 的整理，下列記憶力歷程何者與雙極性憂鬱症 (bipolar depression) 較為無關？
(A)外顯選擇性記憶 (explicit selective memory)
(B)迴避性登錄與提取 (avoidant encoding and retrieval)
(C)過度一般化記憶 (overgeneral memory)
(D)重複侵入性記憶 (recurrent intrusive memory)
- 26 臨床心理師想對病患進行認知行為派典之個案構念化 (case formulation)，下列敘述何者最恰當？
(A)患者的憂鬱、焦慮較與其負向基模有關
(B)患者的憂鬱、焦慮較與其幼年的不安全依附經驗有關
(C)患者不穩定的客體關係較與其對事物的負向基模有關
(D)患者不穩定的客體關係較與其幼年的不安全依附經驗有關
- 27 從 Harvey 等人 (2004) 的實證研究結果來看，下列何種疾患最常發現來源監控 (source monitoring) 功能異常？
(A)強迫症 (obsessive-compulsive disorder) (B)憂鬱症 (depression)
(C)解離症 (dissociative disorder) (D)精神病症 (psychotic disorder)
- 28 下列何者為譫妄 (delirium) 而非 AD 型失智症會有的特徵？
(A)發病速度緩慢 (slow onset) (B)認知混淆 (confusion)
(C)病症每天起伏不定 (fluctuation) (D)判斷力減損
- 29 依據 Kring 等人 (2013) 談及臨床工作者對於 DSM-IV-TR 中人格疾患診斷分類的疑義，下列那個不是主要原因？
(A)約一半的病人會同時符合兩種或兩種以上的人格疾患診斷
(B)人格疾患不論是在社區或是門診都太常見了，因此與正常人之間缺乏區辨力
(C)有些人雖然有嚴重的人格方面問題，但卻無法符合人格疾患中的任一診斷
(D)高比例的病人可能在某時期符合診斷，但另一時期卻又不符合診斷

- 30 王小明常過度關注規則和瑣碎的細節，他平常沒有特別的休閒娛樂，很難放鬆或從事念書以外的活動，同學常說他有完美主義。王小明最有可能是下列那一種人格障礙症？
- (A) avoidant personality disorder (B) obsessive-compulsive personality disorder
(C) dependent personality disorder (D) paranoid personality disorder
- 31 依據 Ingram 與 Price (2010) 之觀點，有關情緒調節 (emotion regulation) 在形成個體強烈、不穩定、不恰當之情緒 (intense, unstable, and inappropriate emotion) 上的角色，下列敘述何者正確？
- (A) 情緒強烈、不穩定的個體的情緒調節較差，其情緒之受激發閾值也較情緒穩定者高
(B) 由於個體在青春期末常展現強烈的情緒起伏，情緒調節是個體自青春期末開始萌生的心智能力
(C) 情緒調節與個體先天的氣質特徵有關，因此不穩定、不恰當的情緒難以因環境因素而改變
(D) 在嬰兒期由照顧者主導的情緒調節，是兒童能自我調節強烈情緒的基礎
- 32 畏避性人格障礙症最可能與下列何者共病？
- (A) 強迫症 (B) 特定畏懼症 (C) 社交焦慮症 (D) 廣泛性焦慮症
- 33 某臨床心理師認為人的心理病理與其行為受到增強或處罰息息相關，此臨床心理師最可能依據下列何種人格理論？
- (A) 認知理論 (B) 行為理論 (C) 人本理論 (D) 精神分析理論
- 34 娟娟兒時曾遭受性侵害，但她在成年後完全無法憶起此遭遇，她所運用的防衛機制最可能是：
- (A) 否認 (denial) (B) 投射 (projection)
(C) 合理化 (rationalization) (D) 反向作用 (reaction formation)
- 35 依據 Kring 等人 (2013) 之說明，宣洩法 (catharsis) 是由誰首先發展出來？
- (A) 布魯爾 (J. Breuer) (B) 阿德勒 (A. Adler) (C) 佛洛伊德 (S. Freud) (D) 克萊恩 (M. Klein)
- 36 依據 Kring 等人 (2013) 所整理的回溯性研究 (retrospective studies) 發現，下列何者不是思覺失調症在早期發展所被討論的危險因子？
- (A) 較低的智商 (IQ)
(B) 老師的評量紀錄發現，女性較被動，男性較難相處
(C) 較低的腦部白質含量 (white matter volumes)
(D) 行為較退縮 (withdrawn)
- 37 依據 Reich 與 Znaniecki (2001) 的研究，邊緣型人格障礙症在發展階段與那一項心理社會危險因子最有關？
- (A) 好朋友搬家 (B) 很多生活瑣事 (C) 父母言語虐待 (D) 失戀
- 38 依據 DSM-5，有關智能不足 (intellectual disability) 的敘述，下列何者正確？
- (A) 所有的智能不足患者，皆能在 2 歲前被診斷出來
(B) 所有的智能不足患者，皆能在 5 歲前被診斷出來
(C) 輕度的智能不足患者，可能要到學齡期才會被診斷出來
(D) 中度的智能不足患者，可能要到學齡期才會被診斷出來
- 39 研究發現「某個與血清素調控功能有關的基因，其在型態上憂鬱症患者與一般健康的人有顯著的不同」。此結果支持下列何種致病因素？
- (A) 壓力 (B) 心理 (C) 情境 (D) 素質
- 40 有關素質壓力模式的敘述，下列何者正確？
- (A) 凡具有某疾病素質者，不論所面對的壓力大小，皆必然會罹病
(B) 雖具有某疾病素質，但未必會罹病，乃視所面臨之壓力的大小而定
(C) 若不具有某疾病素質，則不論所面對的壓力大小，皆不會罹病
(D) 思覺失調症患者患病前所面臨的生活壓力，必然大於非思覺失調症患者