

105年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、在腦部心智功能中，何謂執行功能 (executive function)？請說明可能引發執行功能障礙之腦部受損路徑與部位，以及衡鑑執行功能障礙之方法。(20 分)
- 二、雙極疾患 (bipolar disorder) 之復發風險因子 (relapse risk factors) 為何？假設您是臨床心理師，對一位雙極疾患患者進行以降低復發風險為目標之心理治療，共完成 12 節心理治療後結案，請挑選一項復發風險因子作為心理治療主題，並依據心理報告格式，書寫一份完整之心理治療結案報告。(20 分)
- 三、請依據 DSM-5 特定的學習障礙症 (specific learning disorder) 之內容，說明如何進行此障礙症之診斷衡鑑。(10 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：5104

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依據 DSM-5，Huntington's disease 的發病平均年齡為何？
(A) 65 歲 (B) 50 歲 (C) 40 歲 (D) 20 歲
- 2 依據 DSM-5，針對 Neurocognitive disorder 在社會認知方面的心理衡鑑，不包括下列何項？
(A) 心智推理作業 (Theory of Mind)
(B) 佛羅里達情緒測驗 (The Florida Affect Battery Test)
(C) 同理心評估 (Empathy)
(D) 威斯康辛卡片分類測驗 (Wisconsin Card Sorting Test)
- 3 根據 DSM-5，有關 Neurocognitive disorder with Lewy bodies 的病徵敘述，下列何者正確？
(A) 是突然發病，認知功能卻緩慢退化 (B) 亦俗稱狂牛病，有相似致病原
(C) 發病初期以執行或語言功能退化為主 (D) 出現視幻覺是其核心症狀之一
- 4 阿茲海默型失智症早期最常出現的徵兆為何？
(A) 空間功能受損 (B) 口齒不清
(C) 近期記憶 (recent memory) 的問題 (D) 遠期記憶 (remote memory) 的問題
- 5 依據 DSM-5，譫妄若加註為持續性 (persistent)，症狀必須持續多久？
(A) 每天傍晚特別嚴重，連續 3 天 (B) 3 天至 7 天
(C) 數週或數月 (D) 超過 24 小時即可

- 6 關於譫妄患者常見的臨床問題，下列敘述何者錯誤？
(A)自我報告無助感和失望感 (B)心智功能變化很大
(C)注意力無法專注 (D)情緒調節功能不佳
- 7 依據 DSM-5，有關解離性失憶症的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要準則為無法記住重要的個人訊息
(B)必須有壓力來源且造成器質性受損的事實存在
(C)並非出於普通的遺忘歷程
(D) DSM-5 將 DSM-IV-TR 的解離性失憶症與解離性漫遊症合併
- 8 醫師轉介某患者，要求進行執行功能衡鑑。當完成威斯康辛卡片分類測驗（Wisconsin Card Sorting Test）之後，發現和常模比較，患者的持續錯誤（perseveration error）太高，這時下列那項資料的蒐集最能協助撰寫完整的報告？
(A)查其智力分數，若落在正常範圍（85 以上），顯現其合作動機不良
(B)詢問患者家屬該患者前一日之生活作息，考量是否因為睡眠不足而影響施測
(C)查其智力分數，若落在低下範圍（70 以下），顯現其情緒障礙過高
(D)查問其目前生活方式，是否產生固著反應
- 9 虛談現象（confabulation）是指個案編造故事情節來回答他人所詢問的問題，此現象與下列何種臨床疾患較無關係？
(A)失讀症（alexia）
(B)前交通動脈瘤（anterior communicating artery aneurysms）
(C)額葉受損（frontal lobe damage）
(D)失憶症候群（amnesia）
- 10 感覺型失語症的患者，常會說出一些錯誤的名詞，例如：將「鎖」說成「鑰匙」，或將「鉛筆」說成「橡皮擦」。這個現象是下列何者？
(A) Alexia (B) Dysarthria
(C) Semantic Paraphasias (D) Phonemic Paraphasias
- 11 動作失用症（motor apraxia）意指「失去對於技巧性動作的動作記憶型式」，最早是由下列那位學者所提出？
(A) N. Geschwind (B) H. Liepmann (C) K.M. Heilman (D) P. Broca
- 12 執行功能障礙，常會造成患者多重性的神經行為異常表現，包括認知、行為控制與情緒動機等部分。其中認知部分的異常，與下列何處腦區受損的關聯性最高？
(A)上邊緣迴（supramarginal gyrus） (B)背外側前額葉（dorsolateral prefrontal cortex）
(C)腹內側前額葉（ventromedial prefrontal cortex） (D)眶前額葉（orbitofrontal cortex）
- 13 就讀國小四年級的學生，因為摩托車車禍事故而昏迷多日。清醒後，一直無法獨立下床進行日常生活活動，父母說小孩的脾氣變壞了、能力也變差了。下列那項臨床假設和評估最為適宜？
(A)懷疑是溝通功能有障礙，可以選擇額葉失語型的語言功能測驗來檢查
(B)懷疑是理解功能有障礙，可以選擇頂葉失語型的非語言測驗來檢查
(C)懷疑是執行功能有障礙，可以選擇額葉功能的非語文工作記憶測驗來檢查
(D)懷疑是情緒功能有障礙，可以選擇頂葉失算型的智能測驗來檢查
- 14 47 歲的年輕中風患者，病發前為高階工程師，終身都是右利手，病後被發現有身體和手腳左癱的現象。他最可能同時也有下列那些認知障礙後遺症？
(A)原發型失算症（anarithmia）、自我覺察（anosognosia）下降
(B)建構能力受損、執行功能受損
(C)建構能力受損、自我覺察下降
(D)計算型失算症、執行功能受損

- 15 ADHD 被許多研究證實常有衝動問題，這可能與大腦那個功能系統較有關？
(A)語言概念系統 (B)聽覺儲存系統 (C)視覺辨識系統 (D)工作記憶系統
- 16 有一位 15 歲的 CD 個案，來自於低社經地位的家庭，用那一種介入方式其治療效果會最佳？
(A)父母管教訓練 (Parent Management Training, PMT)
(B)問題解決技巧訓練 (Problem-Solving Skills Training, PSST)
(C)多重系統治療 (Multisystemic Treatment, MST)
(D)提前介入方案 (preventive interventions)
- 17 父母教養方式與 CD 的關聯性高，但是在那一群人中，父母教養品質與 CD 沒有太大的關聯性？
(A)兒童期發展類型的 CD
(B)青少年期發展類型的 CD
(C)具有麻木不仁與情緒淡漠 (callous and unemotional, CU) 特質的 CD
(D)具有困難氣質的特質的 CD
- 18 有關 ADHD 的病程，下列何者正確？
(A)很多 ADHD 成人患者在孩童時期並沒有被診斷出來
(B)大多數 ADHD 的兒童至其青少年期就會自行痊癒
(C) ADHD 相關症狀在學齡期才會出現
(D)注意力缺損的症狀通常較過動／衝動症狀出現時間早
- 19 相較於 ADHD 的男孩，患有 ADHD 的女孩主要出現的可能症狀為何？
(A)過動症狀 (B)執行功能失調 (C)攻擊性 (D)注意力缺損症狀
- 20 在 DSM-5 的敘述中，下列何者可能不是 ODD 的神經生物的標記 (neurobiological marker)？
(A)低的心跳速率和膚電反應 (B)基礎可體松 (basal cortisol) 的反應增加
(C)前額葉 (prefrontal lobe) 的異常 (D)杏仁核 (amygdala) 的異常
- 21 下列那一種疾患，不包括在 DSM-5 的自閉症類群障礙症 (autism spectrum disorder)？
(A)自閉性疾患 (autistic disorder)
(B) Asperger's disorder
(C)兒童期崩解疾患 (childhood disintegrative disorder)
(D) Rett's disorder
- 22 第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder) 個案的大腦那一區域的活化降低？
(A)杏仁核 (amygdala) (B)前扣帶迴膝下區 (anterior cingulate)
(C)海馬迴 (hippocampus) (D)紋狀體 (striatum)
- 23 AAIDD 提出智能不足四個因素，包括：生物化學、社會、行為及教育，下列那一項不屬於產前的 (prenatal) 行為因素？
(A)家庭暴力 (B)家長酗酒 (C)家長抽菸 (D)家長使用藥物
- 24 Manji, Chen, Shimon, et al (1995) 的研究發現，鋰鹽在躁症上的療效來自於下列何者？
(A)調節突觸後細胞蛋白激酶 C (protein kinase C)
(B)刺激海馬迴多巴胺接受器 (dopamine receptor) 神經元生長
(C)調節突觸後細胞 G 蛋白 (G-protein)
(D)改善突觸後細胞血清素接受器 (serotonin receptor) 敏感度
- 25 根據 DSM-5，關於語言障礙症的敘述，下列何者錯誤？
(A)語言障礙症通常有家族史 (B)語言障礙症 4 歲以後診斷比較穩定
(C)2 歲時的語言表達內容，80% 可以被大人理解 (D)通常語言表達障礙高於語言理解障礙
- 26 DSM-5 妄想症 (delusional disorder) 之病程特別註記 (course specifier)，只適用於妄想症發病多久之後？
(A)3 個月 (B)6 個月 (C)1 年 (D)2 年
- 27 DSM-5 對下列那種障礙症新增 6 歲以下的診斷標準？
(A)憂鬱症 (B)焦慮症 (C)創傷後壓力症 (D)適應障礙症
- 28 下列何者是兒少憂鬱症最常共病的疾患？
(A)焦慮症 (B)行為規範障礙症 (C)注意力不足過動症 (D)創傷後壓力症

- 29 下列何種心理社會介入方案，是針對兒童及青少年焦慮症設計的？
(A) Coping Cat (Kendall et al, 2003)
(B) Problem-Solving Skills Training (PSST, Kazdin, 2003)
(C) Primary and Secondary Control Enhancement Training (PASCET, Weisz et al, 2003)
(D) The ACTION program (Stark et al, 2006)
- 30 雙生子研究顯示，同卵雙生子中若有一人罹患思覺失調症，則另一人罹病的風險約達 44.3%。下列何者正確？
(A) 若兩者都罹病，則兩者的臨床症狀會一樣嚴重
(B) 一致發生率 (concordance) 未達 100%，遺傳不是重要的病因
(C) 同卵雙生子間的基因型 (genotype) 依然可能有差異存在
(D) 思覺失調症不完全是由基因遺傳所致
- 31 有關第二代抗精神病藥物 (antipsychotic drugs) 之作用的敘述，下列何者正確？
(A) 其所引發的副作用與第一代類似
(B) 其對於思覺失調症正性症狀的緩解效果較傳統的藥物快
(C) 多數的藥物會作用於血清素 (serotonin) 與多巴胺 (dopamine) 系統
(D) 多數的藥物僅作用於血清素系統
- 32 有關 Goering 等人在 2006 年的研究發現，思覺失調症自助團體 (self-help group) 的效果如何？
(A) 對於防止參與患者症狀復發的效果有限
(B) 僅對提升參與患者社交功能的效果較為顯著
(C) 必須與家族治療一起進行才能彰顯效果
(D) 會因為患者本身的特性致使較難推論其效果
- 33 思覺失調症患者中是否會出現攻擊行為與何者的關係較密切？
(A) 初次發病年齡較早者
(B) 妄想的嚴重度較高者
(C) 較年輕的男性
(D) 負性症狀較嚴重者
- 34 根據 DSM-IV-TR，有關焦慮性疾患中，下列何種疾患，較少出現在 10 歲以下？
(A) 社會焦慮疾患 (social anxiety disorder)
(B) 選擇性緘默症 (selective mutism)
(C) 特定對象恐懼症 (specific phobia)
(D) 創傷後壓力疾患 (posttraumatic stress disorder)
- 35 關於閱讀障礙兒童之缺陷敘述，下列何者錯誤？
(A) 缺陷可能與處理視覺訊息之功能有關
(B) 其處理語音訊息的能力與一般兒童無異
(C) 核心缺陷為解碼困難，無法將完整的字詞拆解成容易理解的部分文字
(D) 閱讀障礙者可能合併注意力不足過動症
- 36 DSM-5 雙相情緒及其相關障礙症 (bipolar and related disorders) 的快速循環特性說明 (rapid cycling specifier) 之定義為，一年內出現情感性發作 (鬱症、躁症、輕躁症) 至少要幾次？
(A) 二次
(B) 三次
(C) 四次
(D) 五次
- 37 根據 DSM-5，嚴重度特性說明 (severity specifier) 不適用在下列何種雙相情緒及其相關障礙症 (bipolar and related disorders)？
(A) 第一型雙相情緒障礙症，目前或最近一次發作非特定 (bipolar I disorder, current or most recent episode unspecified)
(B) 第一型雙相情緒障礙症，目前或最近一次屬躁症發作 (bipolar I disorder, current or most recent episode manic)
(C) 第一型雙相情緒障礙症，目前或最近一次屬鬱症發作 (bipolar I disorder, current or most recent episode depressed)
(D) 第二型雙相情緒障礙症 (bipolar II disorder)
- 38 下列何者不是 DSM-5 輕躁症發作 (hypomanic episode) 之診斷準則？
(A) 注意力分散 (distractibility)
(B) 易怒的心情 (irritable mood)
(C) 體重明顯減少
(D) 此發作引起明確的情緒和功能改變，且可被旁人觀察到
- 39 根據 Vahia & Cohen (2009) 研究，妄想症 (delusional disorder) 病人第一次住院精神醫療機構的平均年齡為：
(A) 20~29 歲
(B) 30~39 歲
(C) 40~49 歲
(D) 50~59 歲
- 40 短暫精神病 (brief psychotic disorder) 與類思覺失調症 (schizophreniform disorder) 的最主要鑑別診斷標準為何？
(A) 出現妄想與否
(B) 發作時間的長短
(C) 出現幻覺與否
(D) 社會功能的受損程度