

109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述：「太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下」，治以下列何方最適當？
(A)桂枝湯 (B)麻黃湯 (C)白虎湯 (D)葛根湯
- 2 依《醫宗金鑑·傷寒論》，下之後，復發汗，晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，無表證，脈沉微，身無大熱者，下列何方治療最適當？
(A)乾薑附子湯 (B)桂枝附子湯 (C)甘草附子湯 (D)人參附子湯
- 3 依《醫宗金鑑·傷寒論》，太陽病六、七日，表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人發狂者，少腹當硬滿，而小便自利者，下列何方治療最適當？
(A)調胃承氣湯 (B)抵當湯 (C)大承氣湯 (D)桃核承氣湯
- 4 依《醫宗金鑑·傷寒論》，傷寒表不解，心下水氣，乾嘔發熱而咳，或渴、或痢、或噎、或小便不利，少腹滿，或喘者，下列何方治療最適當？
(A)小青龍湯 (B)小柴胡湯 (C)小建中湯 (D)十棗湯
- 5 依《醫宗金鑑·傷寒論》，症見霍亂，頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，下列何方最適當？
(A)五苓散 (B)葛根黃芩黃連湯 (C)理中丸 (D)吳茱萸湯
- 6 太陽病不用汗解而屢用攻下，致脾氣虛寒而協熱下利，為下列何方證之病因病機？
(A)葛根芩連湯 (B)厚朴生薑半夏甘草人參湯
(C)桂枝人參湯 (D)十棗湯
- 7 依《傷寒論》，有關梔子厚朴湯的原文敘述，下列何者錯誤？
(A)傷寒下後 (B)心煩，腹滿 (C)臥起不安 (D)心下結硬
- 8 仲景治療「寒實結胸，無熱證者」所用的處方，其組成含有下列何種藥物？①白芷 ②貝母 ③白及 ④桔梗
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 9 依《傷寒論》所述：「少陽中風，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下」，若吐下會產生下列何種變證？
(A)譫語 (B)悸而驚 (C)大便難 (D)衄血
- 10 依《傷寒論》，有關調胃承氣湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬則譫語，調胃承氣湯主之
(B)陽明病，不吐不下，心煩者，可與調胃承氣湯
(C)太陽病，三日，發汗不解，蒸蒸發熱者，屬胃也，調胃承氣湯主之
(D)傷寒吐後，腹脹滿者，與調胃承氣湯
- 11 62歲陳先生，空腹血糖：210 mg/dl，糖化血色素(HbA1c)：8%，在一次感冒時經醫師過度使用吐、下法後，經過1週以上出現時時惡風，口渴多飲，飲不解渴，舌乾燥而煩，治以下列何方最適當？
(A)豬苓湯 (B)白虎加人參湯 (C)調胃承氣湯 (D)梔子豉湯
- 12 依《傷寒論》所述，在辨太陽病誤治傷津轉屬為陽明病之敘述，下列何者為最重之症？
(A)不更衣 (B)小便不利 (C)大便難 (D)胃家實
- 13 依《醫宗金鑑·傷寒論》，陽明與少陰之病皆可背惡寒之症，兩者區別下列何者正確？
(A)前者陽熱乘陰虛而內陷，後者陰寒盛 (B)前者陰寒盛，後者陽熱乘陰虛而內陷
(C)前者陽熱盛，後者陰盛格陽 (D)前者陽熱盛，後者陰盛戴陽

- 14 依《醫宗金鑑·傷寒論》：「脈陰陽俱緊，反汗出者，亡陽也，此屬少陰」，法當出現下列何症狀？
①咽痛 ②復吐利 ③腹滿 ④煩渴
(A)①③ (B)①② (C)②③ (D)②④
- 15 依《醫宗金鑑·傷寒論》，手足厥冷，脈細欲絕者，宜當歸四逆湯，其方藥之主要機理為何？
(A)和厥陰以散寒邪，調營衛以通陽氣 (B)直走厥陰，溫而散之
(C)直通厥陰之陽 (D)取酸苦辛溫寒熱併用，解陰陽雜錯之邪
- 16 依《傷寒論·太陰病篇》所述：「傷寒，脈浮而緩，手足自溫者，繫在太陰。太陰當發身黃，……」此處「太陰發黃」之病因病機，下列何者最適當？
(A)寒濕鬱滯 (B)濕鬱化熱 (C)寒極轉熱 (D)脾陽來復
- 17 暑熱病邪致病特點，下列敘述何者正確？
(A)易逆傳心包 (B)初起逕犯陽明氣分
(C)易遏傷陽氣，阻滯氣機 (D)易犯太陰
- 18 溫病挾血瘀證，葉天士謂「熱傳營血，其人素有瘀傷宿血在胸膈中，挾熱而搏」其舌診及脈象特點，下列敘述何者最正確？
(A)舌色必紫而暗，捫之乾，脈弦 (B)舌色必紫而絳，捫之乾，脈澀
(C)舌色必紫而暗，捫之濕，脈澀 (D)舌色必紫而絳，捫之濕，脈弦
- 19 依《中醫溫病學》，關於溫毒的敘述，下列何者錯誤？
(A)吳鞠通在《溫病條辨》中指出：「溫毒者，諸溫挾毒」
(B)是獨立於溫病之外的一類疾病
(C)具有局部紅腫熱痛，甚至潰爛等特殊腫毒症狀
(D)包括大頭瘟、爛喉痧、疔腮
- 20 清營涼血法中，下列何者具輕清透泄之作用？
(A)氣營兩清 (B)清營泄熱 (C)涼血散血 (D)滋陰涼血
- 21 下列何者是余師愚的代表著作？
(A)《廣溫熱論》 (B)《外感溫病篇》 (C)《傷寒溫疫條辨》 (D)《疫疹一得》
- 22 下列關於溫病「舌象」之敘述何者錯誤？
(A)舌苔主要反映衛分及氣分的病變，舌質則反映營血分的病候
(B)老黃苔、灰燥苔，或黑苔焦燥起刺，質地乾澀蒼老等，均為陽明腑實證之徵象
(C)鏡面舌反映肝腎陰竭之危重證候
(D)舌絳不鮮，乾枯而萎是腎陰枯涸的徵象
- 23 關於風溫證，邪在衛分之敘述，下列那些最正確？①臨床上惡寒和發熱同時存在 ②因溫邪在體表致衛氣鬱阻，腠理開合失常產生無汗或少汗之徵 ③風熱邪氣致腠理閉塞，導致陽氣耗傷產生惡寒 ④風熱之邪易傷津液，故臨床上出現口渴、舌深紅、苔薄黃、脈浮數
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 24 神昏譫語或昏憤不語，身體灼熱，四肢厥冷，舌蹇，舌色紅絳鮮澤，脈細數，辨證上下列何者最適宜？
(A)熱陷心包 (B)陽明熱熾 (C)痰熱擾心 (D)內閉外脫
- 25 春溫，證屬熱結腸腑，小腸熱盛者，以下列何方劑治療最適宜？
(A)導赤承氣湯 (B)牛黃承氣湯 (C)增液承氣湯 (D)新加黃龍湯
- 26 1歲小男童，突然出現壯熱口渴，煩躁不寧，苔黃舌絳等見證，下列敘述何者錯誤？
(A)治宜氣營兩清法 (B)可用玉女煎去熟地牛膝加細生地玄參方
(C)如見肌膚發斑嚴重，宜用化斑湯 (D)如見吐衄嚴重，則宜用白虎湯合黃連解毒湯
- 27 王男，當兵受訓，夏月在操場上練槍，突然出現身熱息高，心煩溺黃，口渴自汗，肢倦神疲，脈虛無力，治宜下列何方？
(A)三仁湯 (B)白虎加蒼朮湯 (C)王氏清暑益氣湯 (D)白虎加入參湯
- 28 濕溫患者若熱入營血，損傷腸道血絡而致大便下血，最宜用下列何種治則來治療？
(A)補氣攝血 (B)活血止血 (C)收斂止血 (D)涼血止血

- 29 王先生到花蓮旅遊，旅程途中不小心感冒，症見惡寒發熱，體表初捫之不覺很熱，但捫之稍久則覺灼手，頭覺重墜感，也覺得疲倦，胸悶，肚子也悶悶的不舒服，舌苔白膩，脈濡緩。綜合臨床表徵，其病證最適宜的診斷為何？
(A)外感寒濕在表 (B)濕溫邪遏衛氣 (C)濕熱中阻困脾 (D)寒濕襲表犯胃
- 30 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A)《溫熱經緯》甘露消毒丹 (B)《霍亂論》王氏連朴飲
(C)《醫原》藿朴夏苓湯 (D)《和劑局方》甘露飲
- 31 20 歲女性，於秋季久晴無雨之際，突然發熱，微惡風寒，頭痛，少汗，咳嗽少痰，咽乾鼻燥，口渴，苔白舌紅，右脈數大，最宜選用下列何處方治之？
(A)沙參、玉竹、生甘草、冬桑葉、麥門冬、生扁豆、花粉
(B)杏仁、紫蘇、半夏、陳皮、前胡、甘草、桔梗、枳殼、茯苓、生薑、大棗
(C)石膏、杏仁、甘草、冬桑葉、人參、胡麻仁、阿膠、麥門冬、枇杷葉
(D)桑葉、杏仁、沙參、象貝、香豉、梔皮、梨皮
- 32 下列關於秋燥「診斷要點」之敘述何者正確？
(A)季節性明顯，尤以立秋以後至秋分以前為多見
(B)初起除肺衛見證外，必伴口、鼻、咽、唇、二便等津液乾燥徵象
(C)病情較輕淺，一般傳變較少，以傷肺胃之陰者多，少傳下焦
(D)與風溫之別只在於初起時津液乾燥見症明顯
- 33 依《金匱要略·瘧濕喝病脈證治第二》，有關適用「甘草附子湯」患者的相關論述，下列何者正確？
(A)頭中寒濕首選處方 (B)病風寒，但陽氣尚不虛
(C)關節腫脹僵硬，尚不痛 (D)風濕相搏，骨節疼痛，掣痛不得屈伸
- 34 43 歲陳先生，罹患瘧病。目前自覺身重熱感，關節痛，汗出、微惡風，腹脹食慾較差，噁心，略口渴，脈弦數濡，依《金匱要略·瘧病脈證并治第四》，下列處方何者最適當？
(A)小柴胡湯加茯苓白朮 (B)白虎桂枝湯加蒼朮薏苡仁
(C)柴胡桂枝乾薑湯加附子生薑 (D)蜀漆散加黃芩半夏
- 35 依《金匱要略·奔豚氣病脈證治第八》，「發汗後」可引發奔豚，有關「桂枝加桂湯」與「茯苓桂枝甘草大棗湯」之比較，下列何者最適當？
(A)桂枝加桂湯用於腎陽虛下焦水飲上衝
(B)茯苓桂枝甘草大棗湯用於心陽虛水飲內動
(C)兩方皆有心悸兼證
(D)桂枝加桂湯用炙甘草，茯苓桂枝甘草大棗湯用生甘草
- 36 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注·五臟風寒積聚病脈證並治第十一》，小腸有熱會引起下列何證？
(A)大便堅 (B)驚漉 (C)便腸垢 (D)痔
- 37 依《金匱要略》所述，下列選項何者屬於橘皮竹茹湯的藥物？①大棗 ②人參 ③生薑 ④茯苓
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 38 依《金匱要略》所述：「虛勞腰痛，少腹拘急，小便不利者」，治以下列何方最佳？
(A)八味腎氣丸 (B)杞菊地黃丸 (C)知柏地黃丸 (D)麥味地黃丸
- 39 有關《醫宗金鑑·金匱要略》水氣病的敘述，下列何者最適當？
(A)風水，其脈自浮，外證骨節疼痛，惡風
(B)皮水，其脈沉遲，外證腹滿不喘
(C)正水，其脈沉遲，外證身發熱，胸滿，四肢頭面腫
(D)石水，其脈自沉，外證附腫，按之沒指，不惡風
- 40 有關《醫宗金鑑·金匱要略》黃疸病：「心中懊懣而熱，不能食，時欲吐」，下列何種病證最適當？
(A)女勞疸 (B)穀疸 (C)酒疸 (D)黑疸
- 41 依《醫宗金鑑·金匱要略》原條文，「妊娠養胎」以下列何方治療最適當？
(A)附子湯 (B)當歸芍藥散 (C)當歸散 (D)白朮散

- 42 依《醫宗金鑑·金匱要略》之敘述，下列那個方劑使用時小瘡即粉之，大瘡但服之？
(A)王不留行散 (B)蛇床子散 (C)排膿散 (D)文蛤散
- 43 依《金匱要略·婦人產後》：「產後風續之，數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出」，治以下列何方最適當？
(A)桂枝湯加黃芩 (B)桂枝湯加黃連 (C)桂枝湯加葛根 (D)桂枝湯加半夏
- 44 依《金匱要略》所述：「皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者」，治以下列何方最適當？
(A)防己黃耆湯 (B)防己茯苓湯 (C)麻黃附子湯 (D)枳實白朮湯
- 45 中風發作期，對於脈絡空虛，風邪入中者，下列何方最適宜？
(A)鎮肝熄風湯 (B)麻黃湯 (C)牽正散加味 (D)蘇合香丸
- 46 有關眩暈的敘述，下列選項何者正確？
(A)40 歲女性，主訴眩暈多年，勞累即發，伴見面色不華，髮色不澤，心悸失眠，神疲懶言，納差，舌淡，脈細弱，治以養心安神，滋陰清熱，處方為《攝生秘剖》天王補心丹
(B)50 歲男性，主訴暈眩 2 年，伴見頭重如裹，胸悶噁心，食少多寐，舌苔白膩，脈濡緩，治以益氣升清，處方為《東垣》益氣聰明湯
(C)50 歲女性，停經 2 年，主訴頭暈脹痛 1 年，伴見煩躁易怒，怒則暈痛加重，面赤耳鳴，少寐多夢，口乾口苦，舌紅少苔，脈弦，治以平肝潛陽，滋養肝腎，處方為《雜病證治新義》天麻鉤藤飲
(D)60 歲男性，西醫診斷為阿茲海默症，主訴記憶減退 1 年，頭暈耳鳴，精神萎靡，腰膝痠軟，遺精多夢，自汗盜汗，舌紅少苔，脈細數，治以補腎填精，處方為《金匱》腎氣丸
- 47 有關脅痛的辨證，下列何者最正確？
(A)以隱痛為主，綿綿不絕，疲勞疼痛加重，按之反較舒服，多屬肝鬱不舒
(B)疼痛走竄不定，時痛時止者，多屬外感脅痛
(C)以重著疼痛為主，痛有定處，疼痛多為持續性，間歇加劇，多為濕熱結於肝膽
(D)以刺痛為主，觸之堅硬，間歇發作，入夜更劇，多屬血不養肝
- 48 56 歲魏先生，腹脹按之不堅，脅下脹滿，食少易脹，小便短少，脈弦，下列選項何者正確？①屬肝脾血瘀之臌脹 ②屬氣滯濕阻之臌脹 ③治法宜行濕散滿，疏肝理氣 ④治法宜行水利氣，溫中健脾
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 49 一患者急躁易怒不寐、多夢，頭暈頭脹，口苦，目赤耳鳴，便秘溲赤，脈弦數。有關證型病機與治療的敘述，下列何者正確？
(A)證型—心火熾盛 (B)病機—肝鬱化火，上擾心神
(C)治法—化痰清熱，安神寧心 (D)主方—黃連阿膠湯
- 50 72 歲男性患者，主訴反覆心悸，近日加重，中醫四診：胸脘痞滿，眩暈，渴不欲飲，形寒肢冷，惡心嘔吐泛涎，合併小便短少與輕微下肢浮腫，舌淡苔滑，脈沉細而滑。下列辨證論治何者最適當？
(A)證型為心陽不足，治法為溫補心陽、安神定志，主方用桂枝甘草龍骨牡蠣湯
(B)證型為氣陰兩虛，治法為益氣養心、滋補陰血，主方用炙甘草湯
(C)證型為心氣不足，治法為養心益氣、化氣行水，主方用炙甘草湯
(D)證型為水飲凌心，治法為振奮心陽、化氣行水，主方用苓桂朮甘草湯
- 51 有關真心痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)真心痛之順逆，關鍵在厥、脫 (B)若氣短之症，迨見喘促，則病情嚴重
(C)舌體變胖，舌苔轉滑，表示病情好轉 (D)動輒汗出或自汗，也是常見症狀
- 52 腹痛即瀉，瀉下急迫，勢如水注，便色黃褐而臭，肛門灼熱。苔黃膩，脈滑數。煩熱口渴，小便短黃。下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)甘露飲 (D)葛根黃連黃芩湯
- 53 有關《備急千金藥方》溫脾湯之臨床見症，下列敘述何者最適當？
(A)大便清稀如水，脘悶食少，腹痛腸鳴；面色蒼白，周身冷，苔白膩，脈濡緩
(B)腹痛急暴，遇冷則甚，得溫則緩，怕冷，踡臥，便溏，舌淡紅苔薄白，脈沉緊
(C)面色皸白，髮色不澤，心悸失眠，眩暈，神疲懶言，飲食減少，舌淡，脈細弱
(D)大便艱澀，排出困難，腹中冷痛，四肢不溫，腰膝痠冷；小便清長，面色皸白，舌質淡，苔薄，脈沉遲

- 54 胃脘隱隱灼痛，口燥咽乾，口渴，大便乾結，舌紅，苔光剝，脈弦細。治以下列何方最適宜？
(A)一貫煎 (B)生脈散 (C)知柏地黃丸 (D)清胃散
- 55 某患者便秘病證，醫者用黃耆湯治療效佳，下列敘述那些較適宜？①大便秘結，欲便不得，腹中脹滿痛 ②兼見面色晄白，神疲氣怯，舌淡嫩苔薄，脈虛 ③此病機為肝脾氣機鬱滯，腸道傳導失職 ④此方具有益氣潤腸功效
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 56 林太太突然聲不出，心煩易怒，咽喉哽塞不通，下列選項何者正確？①治法宜百合固金湯治之 ②治法宜柴胡疏肝湯治之 ③其證型是氣鬱失音 ④其證型是肺腎陰虛之失音
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 57 小安上課時，突然深感不適，自覺呼吸困難、伴有哮鳴、咳嗽，痰多呈黏液樣，甚則張口出氣等情形，最可能是那種病症發作？
(A)心悸 (B)哮喘 (C)癲癇 (D)氣胸
- 58 咳血，為由肺中來的徵兆，下列臨床症狀何者較不相關？
(A)常有胸悶、喉癢 (B)常有腹脹、腹痛 (C)咳嗽而出的鮮血 (D)痰間夾泡沫
- 59 50 歲男性，主訴小便混濁如米泔水 1 年，伴見尿道熱澀疼痛，舌紅，苔黃膩，脈濡數，治以下列何方最適宜？
(A)《太平惠民和劑局方》八正散 (B)《三因極一病證方論》沉香散
(C)《醫學心悟》程氏萆薢分清飲 (D)《醫學衷中參西錄》膏淋湯
- 60 60 歲男性，主訴腰以下冷痛重墜感多年，麻痺不仁，骨節疼痛，屈伸不利，天陰加重，苔白滑，脈濡緩，治以下列何方最適宜？
(A)《太平惠民和劑局方》五積散 (B)《傷寒雜病論》黃耆桂枝五物湯
(C)《備急千金要方》獨活寄生湯 (D)《傷寒雜病論》甘薑苓朮湯
- 61 37 歲劉先生，建築工人，因夏季於戶外工作後，壯熱口渴頭痛，煩躁不寧，神昏譫語，肌膚發斑，時有便血，舌絳或紫暗，苔黃脈滑數，下列處方何者最適合？
(A)少腹逐瘀湯 (B)補陽還五湯 (C)桃紅四物湯 (D)清瘟敗毒飲
- 62 有關痿證的論述，下列何者錯誤？
(A)病機為氣血痹阻不通，筋脈失於濡養 (B)精血受損，陰虛火旺，實證、寒證較少
(C)病發於溫熱病中和他病之後 (D)濕熱浸淫者，多見兩足痿軟或微腫
- 63 17 歲男性，眼瞼浮腫及全身水腫，小便不利，身發瘡瘍，咽喉紅腫熱痛，惡風發熱，舌質紅、苔薄黃，脈浮數滑，下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)豬苓湯 (C)越婢湯 (D)五味消毒散
- 64 40 歲患者已結婚多年未生育，證見陽痿，面色晄白，時頭暈目眩，精神萎靡，腰膝痠軟，苔薄白，脈沉細，以下列何方治療最適宜？
(A)歸脾湯 (B)五子衍宗丸 (C)大補元煎 (D)知柏地黃丸
- 65 32 歲張小姐，3 日前突然頻頻打噴嚏流鼻水，鼻塞，頭暈，疲倦，惡風。自己至藥房購買感冒成藥服用後症狀緩解，但昨日卻突然出現臉頰麻木，口角歪斜偏歪向左側，眼皮下垂等症狀。依中醫辨證原理，本病證的診斷以下列何者最適宜？
(A)急驚風 (B)肝風內動 (C)破傷風 (D)風邪入絡
- 66 62 歲洪太太，主訴近半年來容易腰酸背痛。脊椎 X 光與核磁共振掃描 (MRI) 檢查均無異常發現，望之面色自若，身材微胖，問之近半年來夜尿頻達 5 次，排尿後還有餘瀝不盡感覺，偶而咳嗽時還會漏尿，偶而下腹酸，陰道出現透明量多的分泌物，脈來沉而無力，舌苔白滑，舌質淡紅。下列何種證型並未出現在洪太太的臨床症狀中？
(A)腎虛，膀胱氣化無力 (B)腎虛，帶脈失固
(C)腎虛，筋骨失養 (D)腎虛，水氣凌心
- 67 關於五色主病中青色的敘述，下列何者錯誤？
(A)青色：主寒證、痛證、瘀血和驚風 (B)面青頰赤，為往來寒熱之少陽病
(C)面青赤而晦暗，多為鬱火 (D)面青耳赤，多為腎火

- 68 關於全目色診，下列何者錯誤？
(A)目眇赤為肺火；白睛赤為心火，黃為陰寒內盛
(B)珠腫為肝火；全目赤腫，是肝經風熱，目清澈的為寒，目暗濁的為熱
(C)目眇淡白的是血虧；目胞上下鮮明的，是痰飲病
(D)眼胞皮紅濕爛，是脾火；目胞色暗晦，多屬腎虛
- 69 《醫門棒喝》中有關舌診之敘述，下列何者正確？
(A)觀舌質可驗其正之表裡淺深，審苔垢即可知其邪之陰陽虛實
(B)觀舌質可驗其正之陰陽寒熱，審苔垢即可知其邪之虛實淺深
(C)觀舌質可驗其正之虛實淺深，審苔垢即可知其邪之陰陽寒熱
(D)觀舌質可驗其正之陰陽虛實，審苔垢即可知其邪之寒熱淺深
- 70 某患者患細菌性腦膜炎，經 1 週西醫治療後已退燒出院，但是仍覺身體疲倦，舌象見舌色紅嫩，舌苔少，脈細弱，則下列診斷何者最適當？
(A)氣虛 (B)陰虛 (C)氣陰兩虛 (D)陰虛火旺
- 71 11 歲陳同學，仍會尿床，家屬非常焦急，聽說酒燉米糕或龍眼乾煮水喝能治療尿床，也都無效，有時更甚，求診後經診斷為「下焦熱盛」。下列有關小便狀況的敘述，何者最不可能？
(A)小便短 (B)小便臊臭 (C)小便清長 (D)小便頻數
- 72 虛勞證的患者，某日身體忽覺痛甚，最有可能為下列何證？
(A)陽氣衰憊 (B)陰虛已極 (C)風寒濕痺 (D)痿證
- 73 下列關於「小兒脈診」之敘述，何者錯誤？
(A)小兒至 15 歲均可用「一指三部診法」
(B)3 歲以下小兒，除脈診外，更應注意形色、聲音和診指紋、按胸腹頭額等診法
(C)小兒腎氣未充，脈氣止於中候，重按多不見，如重按仍見者，與成人的牢實脈同論
(D)小兒脈診只以浮沉、遲數、強弱、緩急為主，不詳別二十八脈
- 74 有關脈象的特徵，下列何者錯誤？
(A)往來艱澀，如輕刀刮竹，為澀脈 (B)往來流利，如珠走盤，應指圓滑，為滑脈
(C)極軟而沉細，按之欲絕指下，為虛脈 (D)三部脈舉按皆有力，為實脈
- 75 下列關於「表證入裏」的敘述，何者錯誤？
(A)小便無色而多，可以認為邪未傳裏
(B)若嘔吐、噁心、口苦、或心胸滿悶不欲食，為表邪傳入胸中漸入於裏者
(C)若煩躁、不眠、口渴、譫語、或見腹痛、自痢，此為邪入裏症狀
(D)常見發麻疹、或發斑等症
- 76 楊同學日前淋雨受寒，來診症見關節疼痛，遍身不舒，頭重如裹，身熱無汗，四肢倦怠，脈浮緩，舌苔薄白而滑。下列何項診斷最正確？
(A)風寒外感 (B)寒濕傷絡 (C)濕邪傷表 (D)濕熱外襲
- 77 下列關於「太陰病證」的敘述，何者正確？
(A)太陰病證，適與太陽病證相對，一屬裏虛寒、一屬裏實熱
(B)三陽病而見中氣虛寒者，每易轉為太陰病證
(C)太陰病之腹滿痛證，雖屬虛寒，並不喜溫或喜按
(D)太陰病若吐利嚴重時，亦可能出現口乾，且喜冷飲的表現
- 78 24 歲年輕女性主訴工作壓力大，月經前乳房脹痛，情志易怒，痛經，咽部常有異物感，西醫檢查乳房有良性纖維性囊腫及頸部甲狀腺腫大，下列辨證何者最適宜？
(A)肝火上炎 (B)肝氣鬱結 (C)肝胃不和 (D)肝脾不調
- 79 25 歲女病患欲懷孕，主訴過去 2 年已流產 3 次，自高中起即有頻繁的性行為，且過去有 2 次墮胎史，症見面白神疲，腰膝痠軟，伴隨夜尿頻多，平素帶下清稀，下列辨證診斷何者最適宜？
(A)腎不納氣 (B)腎陰虛 (C)腎精不足 (D)腎氣不固
- 80 若見形肥食少，則下列何者為最適宜之診斷？
(A)中氣虛弱 (B)脾虛有痰 (C)胃強脾弱 (D)脾旺胃虛