

106年第二次醫師考試分階段考試（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、106年助產師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 有關醫療照護相關感染之敘述，下列何者正確？
 - A. 工作人員洗手不確實易形成內生性感染來源
 - B. 大量使用抗生素易造成外生性感染來源
 - C. 醫療照護相關感染大多發生在病人住院24小時以後
 - D. 病人外科手術後傷口發炎化膿應為院內手術部位感染
2. 林瑪莉為印尼籍家庭幫傭，近日發燒、咳嗽、皮膚紅疹，就醫診斷為水痘，需要進行隔離措施，下列何者正確？
 - A. 此個案主要採腸道隔離防護措施
 - B. 此個案需要正壓隔離病房
 - C. 照護人員至少需帶外科口罩
 - D. 照護人員不需要穿隔離衣
3. 有關放射線危害與預防的敘述，下列何者正確？
 - A. 使用鉛衣、鉛板可有效阻隔放射線的輻射傷害
 - B. 半衰期越長的放射線物質，其輻射傷害的時間越長
 - C. 放射線的強度和距離平方成正比，距離越長強度越強
 - D. 接觸病人時須穿隔離衣、戴手套、口罩，減少傷害
4. 下列何者為護理師維護醫療環境的首要考量？
 - A. 環境設計溫馨舒適
 - B. 注重工作人員的儀表態度
 - C. 完善的意外事件通報系統
 - D. 確保病人的安全
5. 有關給藥醫囑的縮寫，下列敘述何者正確？①O.D.（左眼） ②A.U.（雙耳） ③qod（每隔一天）
④Supp.（栓劑） ⑤S.O.S.（緊急急救）
 - A. ①②④
 - B. ①③④
 - C. ②③④
 - D. ②③⑤
6. 執行護理活動應隨時觀察病人的症狀（symptom）與徵象（sign），下列何者是症狀？
 - A. 胸悶
 - B. 瞳孔放大
 - C. 體溫37.9℃

- D.呼吸12次／分鐘
- 7.有關「行為過程紀錄」的敘述，下列何者正確？
- A.最好一面會談一面記錄以免忘記
 - B.會談時間最好半小時以上，如此才能達到會談效果
 - C.會談或記錄時，護理師應避免先入為主的觀念
 - D.過程應僅記錄語言溝通的部分
- 8.醫囑開立「Ativan 1[#] P.O. h.s.」時，其給藥時間為何？
- A.飯前30到60分鐘給與
 - B.飯後30分鐘內給與
 - C.準備入睡30到60分鐘給與
 - D.接到醫囑後立即先給與
- 9.醫囑：Gentamycin 60 mg I.M.，而藥瓶中有2 mL溶液含有80 mg的Gentamycin，依醫囑該抽取多少mL的藥物劑量？
- A.1
 - B.1.5
 - C.1.8
 - D.2
- 10.醫生為08-1床王小美小姐於11：50 AM開立臨時醫囑「R.I. 8u S.C.」，護理師於12：05 PM以空針抽取R.I.（10u）為20-1床王小美小姐執行皮下注射。上述給藥過程中，護理師違反了那幾項給藥的「五對」原則？①病人 ②時間 ③藥物 ④劑量 ⑤途徑
- A.①②
 - B.①④
 - C.②④
 - D.③⑤
- 11.小華，5歲，住院期間發燒到39.5℃，醫囑為Acetaminophen 1/2[#] supp st.，下列給藥措施何者錯誤？
- A.協助採左側臥
 - B.若腸道有糞團，應先執行小量灌腸將之清除
 - C.栓劑推入肛門約2～2.5公分
 - D.壓住肛門，維持原臥位約15分鐘
- 12.有關給錯藥物時的處置，下列何者錯誤？
- A.先觀察病人，若有不適反應再通知醫師
 - B.隨時觀察病人的反應、生命徵象並記錄
 - C.應告知單位主管
 - D.依醫囑給予補救措施
- 13.李小姐因下樓不慎跌倒，左足踝扭傷至急診處置，護理師提供何種措施較適當？
- A.酒精擦拭
 - B.溫水浸泡
 - C.熱水袋
 - D.冰寶

14. 輸血前後唯一可以使用的溶液是下列何者？
- A. Normal Saline
 - B. 5% glucose
 - C. Taita No.1
 - D. Ringer's solution
15. 病人接受靜脈輸液，發生注射部位紅、腫、熱、痛現象時，下列敘述那些正確？①可能為靜脈炎 ②送血液培養後再做決定 ③重新更換注射部位 ④按摩注射部位 ⑤抬高患部並冷敷
- A. ①②④
 - B. ①③⑤
 - C. ②③④
 - D. ③④⑤
16. 有關輸血反應的原因，下列敘述何者正確？
- A. 急性溶血反應可能是病人ABO-Rh血型不合
 - B. 細菌性發熱反應可能是血液革蘭氏陽性桿菌污染
 - C. 非溶血性發熱反應可能是病人對血漿蛋白過敏
 - D. 過敏休克反應可能是病人缺乏IgG，但又有IgG抗體
17. 需快速輸血時，可使用輸血加壓袋，但其壓力最高不可超過多少，以防破壞血球？
- A. 300 mmHg
 - B. 400 mmHg
 - C. 500 mmHg
 - D. 600 mmHg
18. 有關執行女病人單次導尿的步驟，下列何者錯誤？
- A. 病人採屈膝仰臥式
 - B. 洗手後戴上清潔手套
 - C. 導尿管潤滑頭部5~7公分
 - D. 消毒時最後消毒尿道口中間部分
19. 下列那一種姿勢，最可以避免尾薦骨處承受過多的重量？
- A. 半坐臥
 - B. 仰臥
 - C. 側臥
 - D. 垂頭仰臥式
20. 林女士有心臟病史，於3天前接受臀部擴瘡術，現有導尿管及右側手臂的靜脈輸液留置，有關執行林女士床上沐浴的措施，下列何者正確？①先從眼睛開始清潔 ②脫衣時先脫右側 ③清潔肢體時由遠心端擦向近心端 ④清潔背部同時給與背部按摩
- A. ①②
 - B. ①③
 - C. ②④
 - D. ③④
21. 吳女士今日至家醫科門診看病，護理師替吳女士量血壓，吳女士告知：「我從住家走路30分鐘，剛剛才到醫

院」，下列何者適當？

- A.告訴吳女士：「走路是輕度運動不會影響血壓，可以立即測量血壓」
 - B.告訴吳女士：「可以立即量血壓，但是測量血壓時你需要深呼吸」
 - C.告訴吳女士：「你先休息坐一下，20分鐘後才量血壓，」
 - D.告訴吳女士：「可先立即量第一次血壓，30分鐘後再量一次，以最高測量血壓數值為準」
- 22.陳女士在炎熱天氣下工作，出現臉部潮紅、皮膚乾熱和頭暈等症狀而送醫治療，下列照護措施何者不適當？
- A.用冷水擦拭陳女士額頭和臉部
 - B.補充3%食鹽水
 - C.採平躺頭部抬高的姿勢
 - D.調整陳女士所處環境室溫為23°C
- 23.為正常體重之成年病人測量其下肢膝關節動脈血壓時，下列敘述何者錯誤？
- A.應將壓脈帶放置於大腿上1/3處，靠近腹股溝處
 - B.所測收縮壓比手臂肱動脈處的血壓值高10~40 mmHg
 - C.所測舒張壓與手臂肱動脈處的血壓值一樣
 - D.測量時病人可採仰臥，彎曲膝蓋
- 24.使用彈性繃帶固定下肢時，結尾繃帶應固定在何處最適當？
- A.足踝
 - B.肢體外側
 - C.膝關節
 - D.肢體內側
- 25.石先生，因打球不慎造成腕骨骨折，現短臂石膏固定中，護理師指導下床時應使用三角巾懸臂帶，勿讓患肢下垂，其主要目的為何？
- A.支托患臂，減輕腫脹
 - B.加壓止血
 - C.固定患臂，避免二度傷害
 - D.減輕疼痛，防止變形
- 26.在協助醫師置放鼻胃管後，當出現下列何種狀況，須將鼻胃管拔除重新置放？
- A.反抽時可抽出胃液
 - B.由鼻胃管打入空氣時，可聽到空氣入胃的聲音
 - C.將鼻胃管末端放入水中，有連續性水泡出現
 - D.置鼻胃管於耳旁，無氣體流動的咻咻聲
- 27.李先生因車禍受傷入急診室救治，有腹脹不適的主訴，醫師診斷疑有腹部鈍傷，醫囑禁食觀察並給予鼻胃管留置，其主要目的為何？
- A.供給食物，補充營養
 - B.提供灌洗管道
 - C.給予減壓
 - D.抽取胃液檢查
- 28.病人因腦血管意外出現右側肢體癱瘓，提供此病人的護理措施，下列何者錯誤？
- A.病人一切肢體運動需由家屬執行，才能確保病人的安全

- B.鼓勵病人左側肢體執行主動運動
- C.鼓勵病人以左側肢體協助右側肢體活動
- D.執行關節活動時，動作須緩慢、有節律，重複操作5～10次
- 29.長期臥床不動，心臟負荷增加，容易出現心絞痛情形，下列敘述那些錯誤？①回心血量減少 ②心跳速率增加 ③舒張壓降低 ④冠狀動脈流量增加
- A.①③
- B.②③
- C.①④
- D.②④
- 30.當病人處於否認期時，下列護理措施何者不適當？
- A.評估病人家屬是否也出現與病人相似的情緒反應
- B.果斷地告知病人及家屬，目前病人的病情及預後
- C.傾聽病人及家屬的感受
- D.評估病人及家屬對疾病了解的狀況
- 31.下列那一種疾病會咳出綠色的痰？
- A.肺氣腫
- B.肺水腫
- C.肺膿瘍
- D.肺結核
- 32.有關結核菌素試驗（PPD）之敘述，下列何者正確？
- A.注射前需先以優碘消毒
- B.需反抽針心觀察有無回血
- C.注射後10～15分鐘觀察結果
- D.若為陽性，不用打卡介苗
- 33.髖關節置換術後病人的排便姿勢，下列何者適當？
- A.坐馬桶如廁時，身體儘可能地往前傾，以增加腹壓
- B.便器座位的高度應儘可能的低
- C.排便時髖關節彎曲不可超過90度
- D.坐馬桶時雙腿應交叉或蹺腳
- 34.病人因壓力性尿失禁而進行行為治療，護理師的護理指導內容下列何者正確？
- A.訓練期間多從事爬山、彎腰、跑步等活動，增加腹壓以訓練膀胱的耐受力
- B.水分攝取至少100～150 c.c./小時，白天與晚上均勻攝取，以維持足夠的液體攝取量
- C.訓練期間多攝取可以利尿的食物，如茶、咖啡、西瓜，增加尿液量
- D.進行收縮肛門、陰道、尿道周圍的肌肉訓練，可強化整體骨盆底肌肉的強度與張力
- 35.當臨終病人的循環功能減退時，下列症狀何者較不可能出現？
- A.由下肢開始變冷
- B.心跳速率規則緩慢
- C.大量出汗而溼冷
- D.四肢末端皮膚蒼白

- 36.某區域醫院主任的領導是要成為全國重症護理的標竿，此為護理部的：
- A.理念
 - B.願景
 - C.任務
 - D.宗旨
- 37.選擇護理助產為終生職業，你首要考量為何？
- A.了解職業
 - B.了解世界
 - C.了解自己
 - D.了解薪資
- 38.根據霍桑實驗研究結果發現影響生產力最重要的因素，是下列何者？
- A.人
 - B.工作
 - C.環境
 - D.社會
- 39.執行臨床研究實驗時，告知病患研究目的並取得其同意，是符合下列何項倫理原則？
- A.行善原則
 - B.自主原則
 - C.公平原則
 - D.不傷害原則
- 40.有關預算的敘述，下列何者錯誤？
- A.預算是計畫未來所必備的金額
 - B.用數字表達未來的營運計畫
 - C.預算是計畫及控制的工具
 - D.預算編列愈多愈易達成組織目標
- 41.企業競爭中管理者的首要之務為何？
- A.提供很好的福利制度
 - B.選對人，放在適當的位置，做對的事
 - C.以優渥的物力資產吸引人才
 - D.充分的經費支援
- 42.衛生福利部所推行的二年期護理師訓練計畫能完成護理能力進階制度中之那一階段訓練？
- A.N1
 - B.N2
 - C.N3
 - D.N4
- 43.將病房病人分成幾個單元，每一單元病人固定由同一組護理人員照顧，此為下列那兩種護理模式的結合？
- A.功能性護理和個案護理
 - B.功能護理和全責護理
 - C.成組護理和個案護理
 - D.全責護理和成組護理
- 44.

病人分類系統的功能，下列何者錯誤？

- A.作為各班別護理工作量的指數
- B.預測病人個別性的護理需要
- C.測量護理工作的成果及績效
- D.作為護理品質監測的依據

45.某病房 40 床，護理人員輪兩班，休假係數 1.4，占床率 80%，每個病人每天護理時數為 3 小時，則該病房需要多少護理人員？

- A.5人
- B.11人
- C.16人
- D.17人

46.依據弗雷德里克·賀茲保（Frederick Herzberg）提出的「保健-激勵」二元因素理論，下列何者不屬於激勵的因素？

- A.受肯定的地位與頭銜
- B.合理的福利設施
- C.具挑戰性的工作
- D.得以發揮所長的工作

47.「極重視組織的願景，用激勵人心的方式與部屬溝通，激發部屬的才智與自我思考能力使之願意為組織效力」是屬下列何種領導型式？

- A.交易型
- B.轉換型
- C.服務型
- D.Y型

48.吉利斯（Gillies）將管理者的衝突管理行為分為四種，採「整合式的衝突處理行為」是下列何者？

- A.和藹可親的管理者
- B.擅操縱的管理者
- C.擅表達的管理者
- D.擅分析的管理者

49.有關護理品質管理的敘述，下列何者正確？

- A.是屬於護理管理過程中「組織」的一環
- B.參與品管圈活動，可以提高護理人員的工作滿意度
- C.孰能無過，因此不應訂定100%的護理品管標準
- D.品質管理工作將會提高組織的營運成本

50.某病房的品管圈成員自由提出創意的想法，不加以批評，然後再討論，以找出最好的解決方案。此決策過程是下列何種決策法？

- A.德菲氏團體決策法
- B.記名式團體決策法
- C.腦力激盪決策法
- D.電子投票決策法