

114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：3310

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 與出現溝通型態改變問題之中風病人的溝通策略，下列何者較適宜？

- A. 提高音量與個案對談
- B. 提供多重選擇以增加思考機會
- C. 以面對面方式與個案溝通
- D. 經常更換照顧者以增加溝通機會

2. 有關壓力與慢性消化性潰瘍的敘述，下列何者正確？

- A. 慢性潰瘍常發生穿孔
- B. 壓力性潰瘍常見的導因是幽門螺旋桿菌
- C. 慢性潰瘍常無明顯症狀
- D. 壓力性潰瘍多發生在十二指腸

3. 若曾感染B型肝炎且恢復期已久，或接受過B型肝炎疫苗，則其B型肝炎病毒的血清學檢查結果，下列何者最為可能？

- A. HBsAg（+）、Anti-HBc（-）、Anti-HBs（+）
- B. HBsAg（-）、Anti-HBc（-）、Anti-HBs（+）
- C. HBsAg（+）、Anti-HBc（+）、Anti-HBs（-）
- D. HBsAg（-）、Anti-HBc（+）、Anti-HBs（-）

4. 有關右側股骨頭骨折接受全髖關節置換術後病人的護理措施，下列何者最適宜？

- A. 雙腿避免張開
- B. 右腿需執行等長收縮運動
- C. 翻身時，避免放置枕頭於兩腿間
- D. 不可執行抬腿動作

5. 下列何者不是風濕熱的主要臨床表徵？

- A. 多發性關節炎（polyarthritis）
- B. 昆氏脈搏（Quincke's pulse）

- C. 希登漢氏舞蹈症 (Sydenham's chorea)
- D. 皮下結節 (subcutaneous nodules)
6. 有關高血壓病人生活型態之護理指導，下列何者正確？
- A. 避免等張運動，以免引起伐氏效應
- B. 規律運動以增加血中低密度脂蛋白濃度
- C. 建議採取得舒飲食 (DASH)
- D. 建議適量酒精攝取，每日約為100 gm酒精
7. 有關接受扁桃腺切除術後病人之護理指導，下列何者不適宜？
- A. 24小時內可採冰敷減輕疼痛
- B. 手術後24小時內可進食
- C. 傷口結痂脫落前應採冷的軟食
- D. 不要用力咳嗽及漱口
8. 有關癌症病人接受放射線治療後的皮膚反應，下列護理指導何者錯誤？
- A. 避免陽光直接照射
- B. 穿著質料柔軟的衣服
- C. 使用電動刮鬍刀刮鬍子
- D. 照射部位使用乳液保濕
9. 王小姐有全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 病史，近期有結婚與懷孕的打算，下列護理指導何者不適宜？
- A. 可在病情控制良好半年後與醫師討論懷孕計畫
- B. 孕期持續使用奎寧類藥物及類固醇，可預防SLE復發
- C. 避孕方式以服用口服避孕藥為首選
- D. 少數新生兒會出現皮疹，但會於出生後6個月自動消失
10. 有關癌症及其治療對病人性影響之敘述，下列何者正確？
- A. 罹患癌症後不宜再有性生活
- B. 放射線治療期間宜減少性生活，以免將輻射線傳至性伴侶
- C. 男性接受化學治療期間，藥物易對精子產生傷害，故需避孕
- D. 女性接受化學治療期間，藥物會對卵巢造成暫時或永久的不孕，故無需再避孕
11. 一位懷孕30週且BMI 40 Kg/m²之孕婦，在長途國道客運上突然出現胸痛及呼吸困難，下列何者為其最可能的診斷？
- A. 肺水腫
- B. 心衰竭

C.肺栓塞

D.急性支氣管炎

12.承上題，醫療處置給予孕婦低分子量heparin，下列何者為此藥的主要治療目的？

A.促進肺部血管擴張

B.溶解已形成之血栓

C.減少肺部血栓形成

D.緩解胸痛程度

13.有關尿路結石之敘述，下列何者正確？

A.最常形成部位在腎臟，最易發生阻塞部位在輸尿管三處狹窄處

B.最常見結石成分為草酸鈣，故採酸灰性食物以減少結石再發生

C.結石會阻塞尿道，病人易出現無痛性間歇性血尿

D.女性因尿道較短，故較男性易罹患尿路結石

14.有關良性前列腺肥大醫療處置及護理措施之敘述，下列何者正確？

A.因病程變化快，確定診斷後要及早接受手術治療

B.經尿道前列腺切除術後，易出現體液容積過量之症狀

C.教導病人術後立即進行凱格爾氏運動，以增加排尿控制力

D.教導病人術後一週後才可以有性生活，以避免逆行性射精出現

15.下列何者不是妊娠糖尿病的危險因子？

A.糖尿病家族史

B. BMI 22 Kg/m²

C. 30歲以上

D.曾產下巨嬰

16.有關庫欣氏症候群之護理指導，下列何者正確？

A.建議病人多攝取高蛋白、低熱量、高鈉與低鉀飲食

B.因鈉離子流失，會出現肌無力，故需維持適當活動

C.鼓勵病人將家裡門窗打開保持空氣流通，以預防感染

D.告知病人需攝取足量鈣質與高維生素C，以預防骨質疏鬆

17.有關服用飽和碘化鉀溶液（SSKI）與Lugol's溶液的注意事項，下列何者正確？

A.主要作用在促進甲狀腺素釋放

B.用於治療黏液水腫（Myxedema）

- C.通常用做長期治療藥物（超過一個月用藥）
- D.以吸管服用，可與牛奶、果汁合併飲用
- 18.急性呼吸窘迫之慢性阻塞性肺疾病病人，出現下列何者應立即處置？
- A.採用三點式呼吸
- B.聽診雙側下肺葉有爆裂音
- C.周邊血氧飽和濃度為90%
- D.呼吸次數由每分鐘30次降為12次
- 19.妮妮，足月產出生，出生體重3,000公克，身長50公分，現1歲大，有關其正常之生長發展，下列敘述何者錯誤？
- A.身高約為75公分
- B.體重約9公斤
- C.乳牙長20顆
- D.會坐，也會爬行
- 20.小傑，3個月大，體重5公斤，每4小時餵食嬰兒配方奶 120 mL（30 mL／匙），請問小傑1天攝入的熱量為多少大卡？
- A.333大卡
- B.480大卡
- C.750大卡
- D.1,080大卡
- 21.小華，2個月大，因嬰兒猝死症候群而離世，提供父母相關護理處置，下列敘述何者最不適當？
- A.立即與父母討論造成猝死的原因
- B.尊重家庭的文化習俗及儀式
- C.提供參與支持性團體，互相扶持
- D.傾聽並接受父母的哀傷反應
- 22.有關嬰幼兒氣質之評估，下列敘述何者正確？
- A.「慢吞吞型」：活動量大、反應強度大
- B.「磨娘精型」：適應力強但對挫折反應弱
- C.「難養育型」：對新環境適應快、負向情緒弱
- D.「易養育型」：易適應初次接觸的食物或環境
- 23.助產師為1位正常2個月大的嬰兒進行發展評估，下列敘述何者正確？
- A.偶爾會左右轉頭，但無法抬頭

- B.間歇性會將頭部抬起
- C.在有支持時可坐直，頭不會向後倒
- D.能從仰臥翻成俯臥

24.劉小妹，出生時妊娠週數29週又4天，有關其身體外觀特徵，下列敘述何者最不適當？

- A.耳朵較扁平且缺乏彈性
- B.手腕彎曲度呈約90度
- C.手肘不易跨越對側鎖骨中線
- D.覆蓋胎毛量較多且皮膚較薄

25.有關呼吸窘迫症候群，下列敘述何者錯誤？

- A.為早產兒常見的健康問題及主要死因之一，妊娠週數越小，發生機率越高
- B.胎兒約在妊娠24週大時，第二型肺泡細胞開始製造及分泌表面張力素
- C.吸氣喘鳴聲（wheezing）、鼻翼煽動及肋間凹陷等，為常見的臨床表徵
- D.胸部X光檢查呈現網狀顆粒樣的變化，嚴重時兩側肺部毛玻璃樣影像

26.有關嬰兒高膽紅素血症（hyperbilirubinemia），下列敘述何者最適當？

- A.核黃疸是指結合型膽紅素通過血腦屏障造成神經功能障礙
- B.總膽紅素值為8~10 mg/dL之間，需立即停餵母乳
- C.生理性黃疸在出生後24小時內開始出現
- D.病理性黃疸的特徵是總膽紅素值每日增加 >5 mg/dL

27.助產師在進行新生兒評估時，下列何者為「低血糖」的臨床表徵？

- A.紅潤、張口呼吸、肌肉鬆弛、少尿
- B.臉潮紅、好哭、痙攣、躁動不安
- C.蒼白、出汗、顫抖、軟弱無力
- D.皮膚泛黃、呼吸快、昏睡、痙攣

28.有關胎兒自出生後體循環及肺臟循環產生之變化，下列敘述何者正確？

- A.出生後全身血管阻力下降，左心房、左心室和主動脈壓力下降
- B.出生後全身血管阻力下降，左心房、左心室和主動脈壓力增加
- C.出生後全身血管阻力增加，左心房、左心室和主動脈壓力下降
- D.出生後全身血管阻力增加，左心房、左心室和主動脈壓力增加

29.小海綿，11個月大，因發燒住院，助產師欲測量其生命徵象，下列措施何者最適當？

- A.先量耳溫，再測量心尖脈，之後測呼吸
- B.告訴小海綿，不用害怕，不會痛而且一下下就好了喔

- C.請媽媽與其玩躲貓貓遊戲，以轉移注意力，助產師利用機會儘快測量
- D.請媽媽暫時離開，以免小海綿過度依賴，哭鬧不願意測量
- 30.小宇，5個月大，罹患肝母細胞瘤（hepatoblastoma），目前正接受化學治療，小宇可以接種下列何種疫苗？
- A.卡介苗
- B.結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）
- C.水痘疫苗
- D.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
- 31.有關膽道閉鎖（biliary atresia），下列敘述何者正確？
- A.出生時即明顯呈現黃疸、肝脾腫大
- B.比對嬰兒大便卡，大便顏色呈現灰白
- C.儘早接受手術，預防生長與智力發展遲滯
- D.補充低蛋白、低熱量、水溶性維生素飲食
- 32.有關注意力不足／過動症兒童的照護，下列敘述何者最不適當？
- A.規律服用中樞神經興奮劑，即使症狀改善也不可自行停藥
- B.安排感覺統合的活動，有助於安定腦神經和穩定情緒
- C.當兒童出現偏差或不適當的行為，應立即口頭提醒
- D.規律的作息，安排兒童在固定地點完成家庭作業
- 33.小靜，3個月大，因唇裂（cleft lip）入院，今日接受唇裂修補手術，剛由手術室返回病房，有關當日手術後護理，下列敘述何者錯誤？
- A.唇裂修補手術後，鼓勵俯臥，以利於口腔分泌物流出預防嗆到
- B.當以滴管進食餵食，需注意應從嘴角內側頰緩緩注入，以避免嗆到
- C.若小靜不時地出現吞嚥動作，應注意是否為吞嚥血液造成的現象
- D.避免給與小靜安撫奶嘴吸吮，以防傷口縫合處裂開
- 34.有關巨結腸症（megacolon），下列敘述何者錯誤？
- A.男童的發生率高於女童
- B.病變區域的腸段明顯的脹大
- C.出現腸阻塞的症狀包括嘔吐和便秘
- D.最確切的診斷方式為直腸組織切片檢查
- 35.有關嬰兒胃食道逆流之照護，下列敘述何者錯誤？
- A.睡前避免餵食，餵完後避免激烈遊戲

- B.為減緩食物反流，鼓勵及早以米粥代替配方奶
 - C.為避免吸入性肺炎，餵食後宜採頭低腳高姿勢以利引流
 - D.吐奶或嘔吐常發生在餵食後數分鐘至數小時
- 36.面對剛經歷死產的產婦，護理師表達對其關心，但個案表示：「我沒事，我只想好好休息。」下列護理措施何者最適宜？
- A.主動討論死產的話題
 - B.多利用肢體接觸表達關心
 - C.依其需求適時接觸個案
 - D.立即轉介心理諮商師
- 37.護理人員與產婦建立治療性人際關係過程中，協助個案處理壓力或焦慮情緒，主要是下列那個時期的工作重點？
- A.互動前期
 - B.介紹期
 - C.工作期
 - D.結束期
- 38.伍太太，32 歲，第一次懷孕，目前懷孕第 26 週。今天在醫院辦的媽媽團體中有一成員提到自己剛懷孕 10 週，一方面高興懷孕，但又擔心懷孕過程不知是否會順利；伍太太在團體中分享自己在懷孕初期也有類似感受，並說出自己是如何從當時的情境走過來，現在一切順利。依據耶隆（Yalom）的論點，伍太太的分享發揮了下列那一項療效因子？
- A.希望的灌注
 - B.原生家庭生活的重現
 - C.存在因素
 - D.獨特性
- 39.承上題，依照團體類型，伍太太所參加的團體較屬下列那一類型？
- A.活動性團體
 - B.介入－探索性團體
 - C.教導－啟發性團體
 - D.職能治療團體
- 40.有關罹患產後憂鬱症服用fluoxetine（Prozac[®]）藥物之敘述，下列何者正確？
- A.為血清素及正腎上腺素回收抑制劑（SNRIs）類藥物
 - B.腸胃道不適是病人初期使用常見的副作用

C.一般持續服用4週以上才有療效出現

D.促進神經末梢對serotonin的再吸收

41.下列何者不是全民健康保險法規定免自行負擔費用的適用對象？

A.分娩

B.於山地離島地區就醫者

C.經轉診就醫者

D.榮民、低收入戶者

42.有關生命統計指標之敘述，下列何者最不適當？

A.不同族群可採用標準化死亡率進行比較

B.嬰兒死亡率可用以評估婦幼衛生推行之成效

C.總生育率可用以評估國家未來人口增加的潛能

D.新生兒死亡率可作為家庭計畫推展之依據

43.依據衛生福利部疾病管制署公布之法定傳染病中，下列何種傳染病不需於24小時內通報？

A.小兒麻痺

B.登革熱

C.白喉

D.結核病

44.依據Pender健康促進模式於民眾的體重管理，下列那一項屬於自我效能的概念？

A.減重可以讓我更有活力

B.我知道自己可以依照計畫達成目標

C.我立下減重契約書

D.我在上個月減重3公斤，獲得同事的讚美

45.針對健康照護計畫評值之敘述：「某衛生局推動乳癌篩檢工作，投入經費比去年少了50萬，但受惠人數卻增加了10%」，是屬於下列何種評值指標？

A.效率（efficiency）

B.效能（effectiveness）

C.成效（impact）

D.效力（efficacy）

46.詹先生在今年得知罹患肝癌後，逐漸將家裡的大小事情、家庭事業轉交給大兒子管理與負責，此屬於下列何種家庭權力結構？

A.集權權威

B.傳統權威

C.情況權威

D.分享權威

47.依據社區健康照護品質改善過程（community health improvement process）模式，下列何者不屬於發現及確立健康問題優先順序的循環步驟？

A.預備及分析社區檔案

B.制訂績效指標

C.形成社區健康聯盟

D.確認關鍵健康議題

48.Holmes等學者（1972）的生活改變事件評值表中，下列何項事件發生的生活改變單位分數最高？

A.配偶死亡

B.離婚

C.個人入獄

D.親人死亡

49.有關母乳哺餵推廣內容之敘述，下列何者最適當？①推廣主要對象為新手媽媽及新住民媽媽 ②成立母乳哺餵支持團體，同時邀請媽媽及其伴侶參加 ③建議職業婦女上班時間讓嬰兒喝配方奶，待下班後再餵母乳以補足所需營養 ④鼓勵藥局將母乳哺餵相關產品放置明顯處 ⑤鼓勵於社區中設置支持母乳哺餵的環境

A.①②⑤

B.②④⑤

C.①③④

D.②③④

50.李小妹出生7個月，有關其生長發育之敘述，下列何者最適當？

A.可開始餵食菜肉稀飯

B.會叫爸爸媽媽

C.可開始大小便訓練

D.積木可由一手換至另一手