

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。


(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 關於解表方劑之敘述，下列何者最不適當？
 - (A)《此事難知》九味羌活湯辛溫發汗，兼清裏熱，適用於外感風寒挾濕，惡寒發熱，無汗身痛，兼有口苦微渴者
 - (B)《傷寒六書》柴葛解肌湯辛涼解肌，兼清裏熱，適用於風寒漸化為熱，初犯陽明經或三陽合病者
 - (C)《傷寒六書》再造散助陽益氣，辛溫發汗，適用於陽氣虛弱而見表寒證，非汗不解者
 - (D)《醫學心悟》加味香蘇散解肌清裏，適用於風溫初起，肺氣失宣，身熱而微惡風寒，咽痛口渴較甚者
- 2 關於《金匱要略》三物備急丸之敘述，下列何者最不適宜？
 - (A)組成為大黃、乾薑、巴豆
 - (B)用時以暖水，苦酒送服
 - (C)本方主治冷積久病，寒實積輕
 - (D)如服後瀉下不止，可喝冷粥止之
- 3 下列何方劑煎煮時，大黃須後下？
 - (A)大承氣湯
 - (B)小承氣湯
 - (C)調胃承氣湯
 - (D)大陷胸湯
- 4 患者證見腹痛，大便秘結，脇下偏痛，發熱但手足厥冷不溫，其脈緊弦，舌苔白膩。使用下列何方劑最適宜？
 - (A)大建中湯
 - (B)大黃附子湯
 - (C)四逆散
 - (D)大柴胡湯
- 5 關於《傷寒論》麻子仁丸之功用，下列何者最適宜？
 - (A)補益氣血，瀉熱通便
 - (B)潤腸泄熱，行氣通便
 - (C)溫陽散寒，瀉結行滯
 - (D)溫腎益精，潤腸通便
- 6 關於中藥煎煮方法，下列何類藥物最不宜武火急煎？
 - (A)解表藥
 - (B)清熱藥
 - (C)滋補藥
 - (D)芳香類藥
- 7 下列何者為《溫病條辨》增液承氣湯之組成藥物？
 - (A)厚朴
 - (B)枳實
 - (C)甘草
 - (D)芒硝
- 8 下列敘述何者錯誤？
 - (A)人參敗毒散的君藥有人參
 - (B)蔥白七味飲的君藥有蔥白、生薑
 - (C)麻黃附子細辛湯的君藥有麻黃
 - (D)再造散的君藥有黃耆、人參
- 9 下列敘述何者正確？
 - (A)七寶美髯丹主治脫髮，腰膝痠軟，崩帶，消渴，腎虛不孕等
 - (B)人參養榮湯為生脈飲加黃耆、肉桂、遠志、陳皮、生薑、大棗。主治積勞虛損，心虛驚悸
 - (C)百合固金湯主治肺虛無熱之咳嗽氣喘
 - (D)右歸丸與右歸飲之組成藥物皆有菟絲子、鹿角膠、枸杞

- 10 下列何方最宜主治因真元虛損，陰陽精血不足，所造成之陽萎遺精，兩目昏花，久不孕育？
(A)大補陰丸 (B)舉元煎 (C)龜鹿二仙膠 (D)杞菊地黃丸
- 11 下列各項敘述何者錯誤？
(A)《小兒藥證直訣》導赤散主治遺精淋濁，五心煩熱之心經火盛證，木通苦寒清心降火為方中主藥，生地涼血養陰以制心火為次藥
(B)《丹溪心法》左金丸，黃連與吳茱萸之比例為六比一
(C)《蘭室秘藏》清胃散，黃連清泄胃火為主要藥物，夏月用此方，黃連用量可以加倍
(D)《宣明論方》當歸龍薈丸的組成藥物中，具有黃連解毒湯的組成藥物
- 12 下列敘述何者正確？
(A)《溫病條辨》增液湯用治氣陰兩傷所致之肺虛久欬
(B)《宣明論方》地黃飲子之方劑辨證為：下元虛衰，虛陽上浮，痰濁上逆，阻塞竅道證
(C)《醫學正傳》白朮芍藥散，主治脾胃久虛，嘔吐泄瀉，頻作不止，煩渴欲飲
(D)《脾胃論》升陽益胃湯之組成藥物包含柴胡、黃連、黃芩、澤瀉
- 13 炙甘草湯組成中炙甘草的主要作用為下列何者？
(A)補益心氣 (B)滋養心陰 (C)調和脾胃 (D)緩和藥性
- 14 《溫病條辨》益胃湯與《續名醫類案》一貫煎共有的組成藥物，下列有幾味正確？①枸杞 ②沙參 ③麥冬 ④生地 ⑤玉竹
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 15 吳茱萸湯中吳茱萸的作用，下列何者正確？①溫胃止嘔 ②疏肝理氣 ③下氣降逆 ④溫腎回陽
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 16 下列方劑與主治證配對，何者正確？①痛瀉要方—肝胃不和 ②逍遙散—肝鬱脾虛 ③左金丸—肝脾不調 ④吳茱萸湯—肝胃虛寒
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 17 下列敘述何者正確？
(A)《證治準繩》四神丸乃是針對脾胃虛寒之泄瀉而設
(B)《證治準繩》四神丸組成為肉豆蔻、吳茱萸、補骨脂、五味子
(C)《普濟本事方》二神丸組成為肉豆蔻、吳茱萸
(D)《普濟本事方》五味子散組成為補骨脂、五味子
- 18 《景岳全書》玉女煎的組成不包含下列何種藥物？
(A)石膏 (B)牛膝 (C)生地黃 (D)麥門冬
- 19 下列何者不是半夏瀉心湯的組成之一？
(A)大棗、生薑 (B)人參、乾薑 (C)黃芩、黃連 (D)甘草、柴胡
- 20 當歸四逆湯的組成，下列何者正確？
(A)桂枝湯去大棗，倍生薑，加當歸、細辛、通草 (B)桂枝湯去生薑，倍大棗，加當歸、細辛、通草
(C)桂枝湯去芍藥，加當歸、細辛、通草 (D)桂枝湯倍芍藥，加當歸、細辛、通草
- 21 下列有幾味是《傅青主女科》完帶湯與易黃湯共同的組成藥物？①山藥 ②白朮 ③車前子 ④白芍
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 22 下列何方不含延胡索？
(A)金鈴子散 (B)安中散 (C)橘核丸 (D)天台烏藥散

- 23 桃核承氣湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)本方可治譫語煩渴、其人如狂之證 (B)方中大黃下瘀泄熱
(C)本方由調胃承氣湯加桃仁、紅花組成 (D)本方有破血下瘀之功用
- 24 因心虛肝鬱之睡眠不安，除補養安神外，宜急食甘以緩之，則下列何方有此效果？
(A)酸棗仁湯 (B)加味逍遙散 (C)甘麥大棗湯 (D)一貫煎
- 25 理血方劑中，常用活血藥配以理氣藥，下列敘述何者錯誤？
(A)血府逐瘀湯配以柴胡、枳殼、桔梗行氣開胸 (B)復元活血湯用柴胡行氣疏肝
(C)膈下逐瘀湯用木香、枳殼疏肝理氣 (D)丹參飲用檀香、砂仁行氣寬中
- 26 《傅青主女科》生化湯中用量最大的是那一味藥？
(A)川芎 (B)桃仁 (C)乾薑 (D)當歸
- 27 下列何方主治肝腎陰寒之疝氣痛？
(A)天台烏藥散 (B)暖肝煎 (C)橘核丸 (D)吳茱萸湯
- 28 下列方劑組成中使用地龍者，正確有幾項？①身痛逐瘀湯 ②補陽還五湯 ③復元活血湯 ④小活絡丹
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 29 《慎齋遺書》百合固金湯所治之咳痰帶血，咽喉燥痛，係屬下列何項陰虛所致？
(A)肝、腎 (B)肺、胃 (C)肺、腎 (D)脾、肺
- 30 痰飲，臍下動悸，吐涎沫而頭眩，或短氣而咳者，何方主之？
(A)麻黃、生薑、杏仁、甘草 (B)茯苓、豬苓、澤瀉、滑石、阿膠
(C)茯苓、豬苓、澤瀉、白朮、桂枝 (D)防己、黃耆、白朮、甘草
- 31 「麥冬、半夏、人參、甘草、粳米、大棗」所組成之方劑，主治肺痿，係因下列何項陰虛，痰涎不化所致？
(A)肺、胃 (B)肺、腎 (C)脾、肺 (D)心、肺
- 32 《丹溪心法》萆薢分清飲主治陽虛濕邪下注，煎服時加入何者「引藥直達下焦」？
(A)酒 (B)醋 (C)生薑 (D)鹽
- 33 《傷寒論》附子湯主治陽虛寒濕內侵，身體骨節疼痛，其組成是真武湯去何藥再加人參？
(A)茯苓 (B)芍藥 (C)白朮 (D)生薑
- 34 百合固金湯與養陰清肺湯均有的組成藥物，下列正確有幾味？①白芍 ②貝母 ③生地 ④玄參
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 35 有關三子養親湯之敘述，下列何者正確？①組成為萊菔子、紫蘇子、白芥子等三藥 ②主治老年人因食少痰少哽後之喘咳證 ③白芥子與蘇子因氣味芳香，不宜煎煮太過，以防藥性耗散
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 36 下列何者為海藻玉壺湯之組成？
(A)連翹、甘草、海藻、貝母、半夏、青皮、陳皮、昆布、海帶、當歸、玄參、川芎
(B)昆布、貝母、牡蠣、半夏、青皮、海藻、當歸、陳皮、川芎、連翹、甘草、獨活
(C)昆布、海藻、牡蠣、貝母、青皮、半夏、當歸、陳皮、玄參、川芎、連翹、甘草
(D)川芎、獨活、連翹、海藻、海帶、昆布、貝母、半夏、青皮、陳皮、當歸、甘草
- 37 有關清氣化痰丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)以半夏燥濕化痰為方中主藥 (B)以黃芩、瓜蒌清肺火、化痰熱
(C)以枳實、陳皮理肺寬胸、消痰散結 (D)以膽星清熱化痰

- 38 關於《傷寒論》小陷胸湯的敘述，下列有幾項正確？①主治痰熱互結，表現胸脘痞悶，按之不痛，或咳痰黃稠，舌苔黃膩，脈滑數 ②此證型為小結胸病，相較於水熱互結胸腹，從心下至少腹硬滿而痛不可近的大結胸病為輕 ③以半夏為君，黃連為臣，辛開苦降，除心下之結 ④佐以瓜蒌實清熱化痰，通胸膈之閉
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 39 枳朮丸以下列何者製為丸？
- (A)湯浸，蒸餅為丸 (B)水泛丸 (C)薑汁為丸 (D)荷葉裹，燒飯為丸
- 40 有關《傷寒論》葛根黃芩黃連湯之敘述，下列有幾項錯誤？①主治表證未解，熱邪入裏。證見身熱，下利臭穢，肛門有灼熱感，苔黃脈數 ②先煎芩、連而後納諸藥，以減其苦寒之性損傷正氣 ③甘草可和中緩其腹痛 ④本方雖屬表裏同治之劑，但以清裏熱為主
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 41 有關附圖藥材功效之敘述，下列何者正確？
- (A)為風病，血病，產後要藥
(B)為活血調經，潤腸通便藥
(C)治風寒咳嗽，喉癢痰多
(D)能祛風除濕，通痹止痛
- 
- 42 薄荷不具有的功效是：
- (A)宣散風熱 (B)清利頭目 (C)利咽透疹 (D)利尿消腫
- 43 附子在臨床上的應用，下列敘述何者錯誤？
- (A)腎陰不足，頭暈目眩，腰痠腿軟 (B)陰寒內盛，脾陽不振，而見脘腹冷痛
(C)脾腎陽虛，見小便不利，肢體浮腫 (D)陽虛外感風寒者，常與麻黃、細辛同用
- 44 下列那組藥物合用具有祛風散寒、勝濕止痛的功效？
- (A)白芷、紫蘇 (B)藁本、紫蘇 (C)防風、荊芥 (D)防風、羌活
- 45 下列敘述何者錯誤？
- (A)連翹，瘡家聖藥 (B)葛根，脾胃虛弱泄瀉聖藥
(C)麻黃，肺家專藥 (D)白芷，太陽主藥
- 46 下列藥物中，何者屬於質量最輕的藥材且具有通乳作用？
- (A)木通 (B)乳香 (C)通脫木 (D)赤小豆
- 47 八月札、玫瑰花二者皆入下列何經？
- (A)心 (B)肝 (C)肺 (D)腎
- 48 有關車前子的敘述，下列何者最不適宜？
- (A)性味甘寒 (B)滲膀胱濕熱 (C)治暑濕下痢 (D)治腎虛寒
- 49 有關金錢草功效主治的敘述何者錯誤？
- (A)利尿通淋治淋證 (B)活血化瘀治惡瘡腫毒 (C)泌尿系結石要藥 (D)除濕退黃治黃疸
- 50 下列關於蒼朮的敘述，有幾項正確？①菊科植物 ②可用於治夜盲 ③具補氣健脾作用 ④足膝痠軟可用
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 51 下列何藥物長期服用會產生腎毒性？
(A)粉防己 (B)漢防己 (C)廣防己 (D)川木通
- 52 下列四味中藥皆能除虛熱，但何者能治肺熱咳嗽、產後血虛發熱、胎前產後的熱淋、血淋，又可解毒療瘡？
(A)白薇 (B)青蒿 (C)銀柴胡 (D)地骨皮
- 53 下列何藥上能清肺熱、潤肺燥，中能瀉胃火生津，下能滋腎陰降火；用於肺熱燥咳、胃熱津傷口渴及腎陰虛火旺、骨蒸潮熱？
(A)梔子 (B)黃芩 (C)知母 (D)黃連
- 54 關於蚤休之敘述，下列何者最不適宜？
(A)治癰腫疔毒，疔腮喉痹 (B)用於陰證瘡瘍，兼能涼血止痢
(C)具清肝泄火，清熱解毒之效 (D)可散腫止痛，兼能化瘀止血
- 55 下列何藥最常用於孕婦之除熱安胎？
(A)天花粉 (B)大黃 (C)漏蘆 (D)黃芩
- 56 有關梔子之臨床應用，下列何者最不適宜？
(A)治濕熱黃疸 (B)治濕熱引起之小便不暢
(C)外用治跌傷、扭傷 (D)用於虛火上炎
- 57 治大便秘結，大黃常與下列何藥相須為用？
(A)枳實 (B)芒硝 (C)厚朴 (D)甘草
- 58 下列何種瀉下藥最適合用於年老、體弱、久病？
(A)大黃 (B)蘆薈 (C)番瀉葉 (D)火麻仁
- 59 關於茜草的論述，下列何者錯誤？
(A)有止血之功效 (B)因性味甘溫，而有補益元氣之功
(C)有活血祛瘀之功效 (D)有通經之功效
- 60 下列何種止血藥收斂性強，臨床應用於止血時需留意產生瘀滯？
(A)艾葉 (B)棕櫚炭 (C)川七 (D)白茅根
- 61 下列何者不是沒藥的臨床療效？
(A)頭昏頭痛 (B)癰疽疔瘡 (C)消腫生肌 (D)跌打損傷
- 62 有關於止血藥物的主要作用功效及臨床應用原則論述，下列何者錯誤？
(A)臨床治療出血病證時需根據出血原因和具體證候，選用相應止血藥，並適當配伍其它藥物增強止血效果
(B)治療因血熱妄行而致出血者，可以使用止血藥物配伍清熱涼血藥物
(C)治療因瘀血阻滯而致出血者，可以使用止血藥物配伍行氣活血藥物
(D)治療因出血過多而致氣虛欲脫者，可以使用止血藥物配伍滋陰潛陽藥物
- 63 關於白茅根的性味、功效及臨床應用論述，下列何者最正確？
(A)只用於上部出血 (B)可用治虛寒性的出血病證
(C)因血熱妄行而致的出血症，不可使用本品 (D)止血又可清熱利尿
- 64 下列何者用於婦女血脈阻滯之月經不調、經行不暢、小腹脹痛、經閉、產後瘀阻腹痛、惡露不盡，以及跌打損傷、瘀血作痛等證之經產良藥？
(A)槐花 (B)香附 (C)益母草 (D)荊三稜

- 65 能破血行氣、通經止痛，善治風濕肢臂疼痛，用於風濕痹痛的藥物為何？
(A)牛膝 (B)薑黃 (C)乾漆 (D)蘇木
- 66 於滋養強壯或氣虛欲脫體衰的重證，可使用：
(A)太子參 (B)沙參 (C)黨參 (D)人參
- 67 有關南沙參與北沙參之敘述，下列何者錯誤？
(A)北沙參為桔梗科植物輪葉沙參等的根，南沙參為繖形科植物珊瑚菜的根
(B)均以養陰清肺、益胃生津為主要功效
(C)北沙參清養肺胃作用較強，肺胃陰虛有熱之證較為多用
(D)南沙參具有益氣及祛痰作用，較宜用於氣陰兩傷及燥痰咳嗽者
- 68 關於西洋參的敘述，下列何者最不適宜？
(A)用於肺陰虛火旺 (B)用於熱病氣陰兩傷 (C)用於胃陰不足 (D)用於中陽衰微
- 69 關於白朮用於脾氣虛弱的敘述，下列何者最不適宜？
(A)治痰飲水腫之良藥 (B)有固表止汗作用
(C)具明顯持久的利尿作用 (D)用於氣不能攝血的脫證
- 70 有關韭子的作用，下列何者錯誤？
(A)補肝腎 (B)暖腰膝 (C)滋陰明目 (D)壯陽固精
- 71 下列何藥性平味鹹、辛，最適用於肝風內動及痰熱壅盛所致的抽搐驚癇？
(A)石決明 (B)珍珠母 (C)白僵蠶 (D)地龍
- 72 下列何者不是天南星之功效？
(A)燥濕化痰 (B)平肝潛陽 (C)祛風止癱 (D)散結消腫
- 73 肝主風，其合在筋，下列何藥物能祛風舒筋，故可治驚癇，抽搐，骨痛，筋攣？
(A)琥珀 (B)豬膽 (C)羚羊角 (D)磁石
- 74 為治寒嗽要藥，常與紫菀相須為用，以增強治喘咳的療效。為下列何藥？
(A)旋覆花 (B)桔梗 (C)款冬花 (D)前胡
- 75 關於冰片的應用，下列敘述何者錯誤？
(A)用於中風昏迷有回醒者 (B)用於中暑腹瀉
(C)用於各種瘡瘍、咽喉腫痛 (D)氣血虛弱者忌服
- 76 下列何者最不適用於濕熱下注，小便淋瀝不暢的治療？
(A)苧麻根 (B)冬瓜子 (C)川木通 (D)千金子
- 77 有關五味子之敘述，下列何者正確？
(A)久服補脾氣，可以止咳化痰 (B)入止咳藥，多蜜炙用
(C)表邪未解，內有寒飲，不宜使用 (D)胃酸過多者，不宜使用
- 78 下列何藥具有驅蟲作用，並可應用於脾胃氣滯，水濕壅阻等證？
(A)榧子 (B)鶴虱 (C)檳榔 (D)苦楝皮
- 79 羚羊角常用的煎服法為下列何者？
(A)烊化 (B)後下 (C)銼末服 (D)打碎煎服
- 80 中藥製劑的品質直接影響中醫診療的效果，乙藥廠購入之甘草經「台灣中藥典」的標準，檢驗合格後轉賣一部分給甲藥廠，並附有檢驗成績書，檢驗項目包括①赭麴毒素 ②重金屬 ③基原鑑定 ④微生物 ⑤甘草甜素 ⑥農藥殘留，甲藥廠在購入後半年才使用於製造甘草濃縮製劑，依風險評估的原則，甲藥廠還需要對這批甘草藥材再做那些必要檢驗，才可以確保製劑的品質？
(A)①④⑤ (B)②④⑥ (C)①③⑥ (D)②③⑤