

101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、
營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、
101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

代號：5106
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學（二）（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 22 歲患者與朋友騎機車夜遊，途中食用海產後，隔天嘔吐腹瀉，發熱又惡寒，身痠痛，胸悶腹脹。診其苔白膩質淡紅，脈濡緩。以下列何方治之最適當？
(A)香蘇散 (B)藿香正氣散 (C)柴葛解肌湯 (D)半夏瀉心湯
- 2 33 歲男性患者就診時自訴前天吹冷風後身倦，四肢沉重感、頭暈重、微惡寒，症狀仍持續到今天，耳溫為攝氏 36.8 度，無鼻塞，目前沒有咳嗽、咽痛等症狀。診其舌苔白滑，質淡暗紅，脈浮滑緊，治以下列何方最適宜？
(A)柴葛解肌湯 (B)苓桂朮甘湯 (C)荆防敗毒散 (D)羌活勝濕湯
- 3 63 歲男性患者有肝硬化病史，平時右脅肋脹痛，部位固定，持續不變，生活機能尚可。然近日宿疾發作，皮膚暗黃，舌暗紅苔膩，脈弦細，則下列何種治法及治療處方是首先要考慮的？
(A)疏肝健脾，溫化寒濕，用茵陳朮附湯 (B)祛濕化濁，化瘀軟堅，用硝石礬石散
(C)清熱解毒，涼營開竅止血，用安宮牛黃丸 (D)利濕化濁，佐以清熱，用茵陳五苓散
- 4 42 歲男性鼻咽癌患者，就診時證見鼻塞鼻流濁涕，涕中帶血，頸淋巴結腫大，痰多黏膩。診其舌質胖嫩，舌苔厚膩，脈弦滑或滑數。治以下列何方最適宜？
(A)瀉白散 (B)辛夷散 (C)清氣化痰丸 (D)礬石滾痰丸
- 5 38 歲女性患者常處理繁雜公眾事務，所以脾氣急躁易怒。這些日子以來，甚至面部烘熱口苦，眼突手顫，抖動不安，煩熱易汗出，她發現頸前好像越來越腫，柔軟光滑，令她心情不安，其最可能是何種病證？
(A)風陽上擾 (B)肝鬱氣滯 (C)肝火亢盛 (D)肝風內動
- 6 《景岳全書·血證》：「血有澀者，宜利之。」其所用之藥物不包括下列何者？
(A)牛膝 (B)烏藥 (C)益母草 (D)滑石
- 7 38 歲男性患者近半個月來感頭暈眩，且頭重脹，胸悶、噁心、食慾變差，診其脈濡緩，舌苔白膩，則下列何方最適宜？
(A)半夏白朮天麻湯 (B)保和丸 (C)天麻鉤藤飲 (D)真武湯
- 8 患者突然昏仆，不醒人事，牙關緊閉，口噤不開，兩手握固，大小便閉，肢體強瘳，面白唇暗，靜臥不煩，四肢不溫。診其苔白膩，脈沉滑緩，治療選用下列何方為宜？
(A)至寶丹 (B)蘇合香丸 (C)安宮牛黃丸 (D)羚羊角湯
- 9 某女性患者自訴自生完第三胎後即常覺頭痛作暈，伴有心悸，近來因雜事煩心，常兼有耳鳴、難入睡、且頭暈更明顯。望其面色略淡，舌質亦淡紅偏淡，舌尖略紅，苔薄白，脈弱稍細。依證治以下列何方最宜？
(A)六味地黃湯加菊花、蔓荊子、防風、細辛 (B)加味逍遙散加川芎、生地
(C)四物湯加蔓荊子、菊花、枸杞、黃精、棗仁 (D)知柏地黃丸加細辛、川芎

- 10 張同學暑假結束前到山區一遊，當日艷陽高照，午後突然一場大雨，回到家中後開始頭痛、發熱微惡寒，老覺得汗悶在體內，口渴胸悶，胃口變差，有點反胃。依證治以下列何方治療最適宜？
(A)羌活勝濕湯加半夏、生薑 (B)芎芷石膏湯加半夏、生薑
(C)黃連香薷飲加藿香、竹茹 (D)川芎茶調散加藿香、竹茹
- 11 關於「食厥」之敘述，下列何者錯誤？
(A)暴飲暴食，復遇惱怒為常見之誘發因素
(B)其治療大法為「和中消導」，病重者當「和中導滯」
(C)不論病程，應治以吐法，以去實邪
(D)主要病機為食填中脘，氣機不暢，氣逆於上
- 12 「消渴」臨床上又分上、中、下三消。關於中消的敘述，下列何者錯誤？
(A)中消病位在脾胃，胃受火燄，虛熱內亢，有虛實之分
(B)若胃火熾烈，易飢多食，形體漸壯碩，大便燥結
(C)若胃火久燔，灼傷胃陰，則雖飢不能多食，形體消瘦，大便乾燥
(D)勞倦太過，榮衛之氣大傷，不能與水穀之氣併行周身，致使穀氣內鬱化火，亦可導致消渴
- 13 25 歲女性患者甲狀腺機能亢進，身倦乏力，怕熱，自汗，盜汗，眠淺，口乾口苦，舌紅苔白膩，白睛赤脈，大便秘，脈弦數，用下列何方最合適？
(A)天王補心丹 (B)牡蠣散 (C)當歸六黃湯 (D)知柏地黃丸
- 14 消渴病，飢食不多，食多則身倦，小便清長，大便溏，小腹重墜，舌淡脈弱，治以下列何方最合適？
(A)七味白朮散 (B)補中益氣湯 (C)參苓白朮散 (D)升陽益胃湯
- 15 下列何者非《內經》所述消渴之概況？
(A)內有熱則渴，除熱則止渴 (B)熱中消中，不可服膏粱芳草石藥
(C)胃中熱則消穀，令人懸心善飢 (D)瘴成為消中
- 16 30 歲女性患者甲狀腺開刀後，機能變低下服甲狀腺素中，症見面色少華，怕冷，嗜睡，思維遲鈍，月經後期，舌淡體胖，脈沉遲，治以下列何方最適宜？
(A)補中益氣湯 (B)理中湯 (C)二仙湯 (D)桂附八味丸
- 17 有關哮證的敘述：①《內經》中尚無哮證的病名，但類似哮證的特徵有散在的記載 ②呷嗽者，胸膈痰飲多，嗽則氣動於痰，痰氣相擊，呼呷有聲 ③張景岳首創哮喘病名，並闡明病理因素「專主於痰」，提出未發以扶正為主，既發以攻邪為急 ④後世醫家鑑於「哮必兼喘」，故一般統稱哮喘，簡名哮證。下列何者最正確？
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④
- 18 25 歲女性患者罹患系統性紅斑狼瘡（Systemic lupus erythematosus），出現口瘡的症狀，症見口腔潰瘍、久不癒合，頭昏目眩，腰膝痠軟，午後潮熱，時烘熱出，手足心熱。診其舌紅少苔，脈細數，則下列診斷何者最可能？
(A)熱毒濕濁 (B)肝腎陰虛 (C)腎虛血瘀 (D)脾虛濕困
- 19 承上題，以下列何方加減治療最適當？
(A)清胃散 (B)甘露飲 (C)導赤散 (D)知柏地黃丸

- 20 30 歲男性患者罹患脊柱關節疼痛已多年，初期患處侷限於骶髂關節，後發展逐漸累及腰、胸椎等處，主要表現為發病部位疼痛，活動受限。經 X 光檢查，發現小關節間模糊、融合消失及椎體骨質疏鬆破壞，則下列診斷何者最為可能？
(A)脈痹 (B)肌痹 (C)皮痹 (D)骨痹
- 21 承上題，經中醫審視後，患者主訴見寒加重，得熱則舒，並有腰部不能轉搖，膝腿痠軟等情形。診其脈沉弦略細，則治以下列何方最適當？
(A)三妙散 (B)五苓散 (C)獨活寄生湯 (D)桃紅四物湯
- 22 夢遺，寐少多夢，頭暈目眩，心悸怔忡，小便短赤，舌紅，脈細澀，宜用下列何方治療？
(A)黃連清心飲 (B)萆薢分清飲 (C)妙香丸 (D)六味地黃丸
- 23 某 55 歲女性患有腎病症候群 8 年，身體浮腫反覆消長，腰以下腫盛，按之凹陷沒指，脛腹脹悶，納少便溏，小便短少，神疲肢冷，面色萎黃，舌質淡苔白膩，脈沉緩。其診斷以下列何證型最適宜？
(A)濕熱壅結 (B)腎虛瘀滯 (C)肝腎陰虛 (D)脾陽虛衰
- 24 承上題，宜以何方治療？
(A)清心蓮子飲 (B)知柏地黃丸
(C)實脾飲 (D)當歸芍藥散合六味地黃丸
- 25 淋證是指小便頻數短澀，滴瀝刺痛，欲出未盡，小腹拘急，或痛引腰腹的病證。而歷代醫家對於淋證亦多有描述，隋·巢元方在《諸病源候論》中如何分類？
(A)冷、熱、氣、勞、膏、砂、虛、實等八種 (B)石、勞、氣、血、膏、寒、熱等七種
(C)子、產後、老人、暴、石等五種 (D)腎勞、脾勞、心勞等三種
- 26 某 16 歲男性患者來到門診，主訴咽痛二天，伴有咽癢、鼻塞、畏風、微流鼻水、噴嚏連連、小便呈現茶色、腰酸，過去病史有 IgA 腎炎一年，目前並無服用任何藥物，患者另有過敏性鼻炎。診其舌質紅，苔薄白，有齒痕，中有裂紋，脈浮數，尿液檢查 protein(-)，glucose(-)，WBC 10/HPF，RBC>500/HPF，bilirubin +++。在現階段的治療上，下列診斷何者最為適宜？
(A)脾肺氣虛 (B)氣陰兩虛 (C)濕熱鬱滯 (D)外感風熱
- 27 承上題，以下列何方治療最為適宜？
(A)補中益氣湯合小薊飲子 (B)生脈散合小薊飲子
(C)清心蓮子飲合小薊飲子 (D)銀翹散合小薊飲子
- 28 有關耳鳴、耳聾的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)耳鳴突然發作，伴見面色黧黑，耳聾閉塞，舌黯者，辨證屬腎虛
(B)因心煩易怒，耳鳴、耳聾加重者，辨證屬火
(C)耳鳴耳聾漸起，伴見皮膚甲錯，唇白耳鳴者，辨證屬血虛
(D)頭痛發熱，耳鳴、耳聾兼耳內作癢者，辨證屬風
- 29 46 歲女性患者有腎結石病史，證見小便澀痛有血，心煩、舌尖紅，苔黃、脈數，其治法以下列何者最適宜？
(A)滋陰清熱，涼血止血 (B)益氣升提，健脾止血
(C)補虛固澀，健脾止血 (D)清熱通淋，涼血止血

- 30 45 歲男性患者有糖尿病、B 型肝炎帶原、肝硬化，目前使用口服西藥 Lamivudine，並且胰島素注射控制血糖，就診時主訴疲倦、食慾不振，體重下降，下肢水腫，手麻，膚癢，膚乾。四診：膚色暗黃、鞏膜呈黃色、體格消瘦、舌淡少苔、腹部膨大，叩診：shifting dullness(+)、下肢水腫：2-3+，大便一日一行、呈黃綠色、偏黏，手足冰冷、畏寒，實驗室重要診斷數值：AST:93 IU/L、ALT:51 IU/L、Albumin:2.4 g/dL、T-Bil:12.50 mg/dL、Hb:10.2 g/dL。其病機以下列何者最為適宜？
- (A)氣壅濕阻、肝鬱脾虛 (B)隧道不通、瘀阻肝脾
(C)寒濕阻滯、脾陽不振 (D)濕遏熱伏、膽汁外溢
- 31 承上題，治以下列何者最為適宜？
- (A)茵陳朮附湯 (B)茵陳五苓散
(C)調營飲 (D)茵陳蒿湯合中滿分消丸
- 32 64 歲女性患者，主訴脅肋隱痛，悠悠不休，近日勞動後加重，口乾咽燥，心中煩熱，頭暈目眩。診其舌紅少苔，脈弦而數。下列何方治療最適宜？
- (A)柴胡疏肝散 (B)旋覆花湯 (C)六味地黃丸 (D)一貫煎
- 33 若患者主訴腹痛綿綿，時作時止，喜熱惡冷，痛時喜按，應屬虛寒腹痛；若虛寒腹痛見證較重，嘔吐肢冷脈微者，應選用下列何方最適宜？
- (A)小建中湯 (B)大建中湯 (C)芍藥甘草湯 (D)補中益氣湯
- 34 患者因長期腹瀉經西醫大腸鏡檢查無異常發現，服西藥時好時壞，故轉而就診中醫，證見大便溏甚或稀水，日五六行，腹悶痛，溲少不黃，口不渴，個性急。診其苔白膩質淡紅，脈濡。以下列何方治之最適宜？
- (A)加味逍遙散合平胃散 (B)五苓散合平胃散
(C)六君子湯合逍遙散 (D)四逆散合逍遙散
- 35 25 歲女性患者主訴大便軟瀉日約三至五次已五年，腹瀉時容易伴有腹絞痛，尤其心情不佳時多發，大便量不多，不很惡臭，便後腹痛稍緩，但不久絞痛或悶脹痛又起，口乾微苦，易煩躁，眠差難入睡。則其腹瀉應屬下列何種證型？
- (A)濕熱 (B)傷食 (C)腎虛 (D)肝鬱
- 36 承上題，其治以下列何法為宜？
- (A)消食導滯 (B)清熱利濕 (C)抑肝扶脾 (D)健脾補腎
- 37 5 月正值梅雨季節，36 歲男性患者證見身熱頭痛，口渴自汗，四肢困倦，不思飲食，胸悶身重，便溏尿赤，舌淡苔膩，脈虛弱。以下列何方治之最適宜？
- (A)《脾胃論》清暑益氣湯 (B)《溫熱經緯》清暑益氣湯
(C)《宣明論》益元散（六一散） (D)《溫病條辨》新加香薷飲
- 38 26 歲男性患者，平素並無異常症狀，但因與朋友打賭吃西瓜誰吃得多，雖贏得一千元，但隨後腹瀉多次，水樣，上腹脹。診其苔白膩質淡紅。以下列何處方治之最適當？
- (A)茯苓、白朮、陳皮、黨參、甘草、砂仁、生薑
(B)蒼朮、厚朴、陳皮、茯苓、甘草、白朮、生薑
(C)甘草、茯苓、桂枝、大棗
(D)木香、砂仁、黨參、黃耆、陳皮、甘草、茯苓、生薑

- 39 55 歲男性患者為肝硬化末期病患，某日在大量吐血之後，出現面色㿗白、出冷汗、手足逆冷、血壓下降、脈芤，暈厥等現象，而被送至急診。患者此次急症的病機下列何者最適宜？
(A)氣不攝血 (B)氣滯血停 (C)氣血兩虛 (D)氣隨血脫
- 40 承上題，本病的緊急處置最佳方劑，下列何者為首選？
(A)養心湯 (B)生脈散 (C)獨參湯 (D)天王補心丹
- 41 46 歲女性患者，身高 156 公分，體重 68 公斤。來診時主訴罹患高血脂症已十年，血中三酸甘油脂偏高：400 mg/dL。超音波檢查發現脂肪肝。患者體型肥滿，工作壓力大，長期失眠，容易手足麻，夜間咽乾甚，但渴不欲飲，排便軟。近半年來月經不規則，容易陣發身熱汗出，面潮紅。診其苔薄少舌質偏紅，脈左沉細數右弦滑數。本病證的主要病機下列何者最適宜？
(A)陰虛夾痰熱 (B)肝陽偏亢 (C)三焦壯熱 (D)心脈瘀阻
- 42 心陽不足型「心悸」，臨床常見面色蒼白偏暗、動則氣短、胸悶、形寒肢冷、心悸不安，苔白，脈沉細無力。當病患經常心神不寧、心慌明顯時，治療時依中醫辨證用藥原則，處方除溫補心陽的桂枝、附子為主之外，應再加入下列那一組安神定悸的藥物最適宜？
(A)柏子仁、茯神 (B)琥珀、丹參 (C)珍珠母、鉤藤 (D)龍骨、牡蠣
- 43 70 歲男性患者，主訴眩暈近 1 月餘，發作時並伴有嘔吐痰涎，兼見心悸胸悶，舌淡紅、苔白膩，脈沉緊，下列何者是最有可能的診斷？
(A)痰火內擾 (B)飲遏心陽 (C)心脾兩虛 (D)心肺氣虛
- 44 承上題，下列何方治之最適宜？
(A)礞石滾痰丸 (B)導痰湯 (C)歸脾湯 (D)保元湯
- 45 38 歲女性患者因咽痛而就診，自訴四天前開始咽癢，咽癢則咳甚，咳至咽痛而腫，不咳則痛減，痰清稀，無惡寒發熱，肢無不適。望診咽部暗紅，脈浮滑緊、微數，苔白滑。治以下列何方最適宜？
(A)大青龍湯 (B)麻杏石甘湯 (C)荊防敗毒散 (D)射干麻黃湯
- 46 支氣管擴張症久病不癒，日久耗氣傷陰，證見大量膿痰延續不斷，身體羸瘦，自汗煩躁，神疲乏力，顏面爪甲四肢末端紫紺，氣喘不能平臥，飲食無味，畏寒肢冷等，診其舌質紅、鏡面舌，少津，脈微欲絕。治以下列何法最適宜？
(A)清熱利痰，活血排膿 (B)清金化痰，填陰回陽
(C)益氣養陰，潤肺排膿 (D)益氣養血，溫陽救逆
- 47 85 歲男性患者，有多年吸菸史合併支氣管擴張病史，近 3 日來家屬發現其神智恍惚，嗜睡，咳痰不爽。診其舌苔白膩，脈細滑數，關於此肺脹之中醫辨證，下列何者最適宜？
(A)痰熱擾心 (B)痰蒙心竅 (C)肺腎氣虛 (D)陽虛水泛
- 48 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)真武湯 (B)越婢加半夏湯 (C)滌痰湯 (D)三子養親湯
- 49 《金匱要略》論經閉的原因，下列何者錯誤？
(A)虛 (B)結氣 (C)勞傷 (D)積冷

- 50 陳自明《婦人大全良方》的用藥特點，下列何項敘述正確？①溫散風寒 ②活血化瘀 ③疏肝解鬱 ④補益養正
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)③④
- 51 關於婦女「月經先期」的敘述，下列何者正確？①月經週期提前八、九天以上稱之 ②常見證型有血熱、虛熱和氣虛 ③血熱屬實者，可以兩地湯《傳青主女科》加減治療
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 52 朱丹溪：「經水去多不能住者」，以下列何者加莎根、龜板、金毛狗脊治療？
(A)當歸、熟地、川芎、白芍 (B)黃芩、黃連、黃柏
(C)女貞子、旱蓮草 (D)黃耆
- 53 經前乳脹之辨證與治療，下列敘述何者錯誤？①應著重在排卵期加強調治 ②久病而致乳房結節成塊者，不宜使用軟堅散結之品 ③經行後症狀緩解者，治以調肝為要
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 54 有關崩漏之敘述，下列何者正確？
(A)崩漏虛證少、實證多 (B)崩漏熱者少、寒者多
(C)久崩多熱，久漏多寒 (D)崩為漏之甚，漏為崩之漸
- 55 絕經前後的年齡最易好發癥瘕，必要時結合現代醫學檢查以免誤診，下列何項症狀與癥瘕最不相關？
(A)身體明顯消瘦 (B)帶下五色互見，氣味臭穢
(C)月經過多或經斷復來淋漓 (D)性慾減低，暴躁緊張
- 56 30 歲女性患者主訴結婚三年不孕，月經稀發，量少色淡，腰酸腿軟，小便清長，大便不實，舌淡苔白，脈沉細。下列何者治療最適宜？
(A)啓宮丸加石菖蒲 (B)開鬱種玉湯
(C)毓麟珠加紫河車、丹參、香附 (D)養精種玉湯加女貞子、旱蓮草
- 57 40 歲女性患者平素帶下量多色白無臭味，偶發陰癢，食後易腹脹，大便軟散，脈滑，舌淡紅苔白膩。下列處方何者最適宜？
(A)六君子湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)清白散 (D)八味帶下方
- 58 40 歲女性患者下腹有堅硬積塊，疼痛拒按，面色晦黯，口乾不欲飲，舌邊瘀點，脈沉。下列何方治療最適宜？
(A)《金匱要略》桂枝茯苓丸 (B)《濟生方》香稜丸
(C)《萬氏婦人科》開鬱二陳湯 (D)《校注婦人良方》趁痛散
- 59 一名 30 歲懷孕 8 週女性，不慎吹風淋雨後頭暈昏重，噁心腹瀉二天，不欲食，身體困重，脈濡。下列何方治療最適宜？
(A)平胃散 (B)藿香正氣散 (C)香砂六君子湯 (D)半夏人參乾薑丸
- 60 有關婦女妊娠諸病之敘述，下列正確的有幾項？①妊娠後，肢體面目發生腫脹者，稱為「子脹」 ②妊娠後胸腹脹滿，甚或喘息煩躁不安者，稱為「子煩」 ③妊娠期間，小便不通，甚至小腹脹急疼痛，心煩不得臥，稱為「轉胞」 ④妊娠出現聲音嘶啞，甚或不能出聲者，稱為「子冒」
(A)1 項 (B)2 項 (C)3 項 (D)4 項

- 61 產後因感染邪毒而病瘧，可用華佗瘧風散，加全蝎、蜈蚣、殭蠶、桑寄生、炒荊芥治療，下列有關該處方的敘述何者錯誤？
- (A)全蝎蜈蚣解毒止瘧 (B)殭蠶驅風鎮瘧
(C)桑寄生養陰舒筋 (D)炒荊芥理風中之血
- 62 關於產後身痛之敘述，下列何者正確？
- (A)發生的機理主要是產後血虛，經脈失養，或產後腎陽不固，外邪乘虛襲於經絡而致
(B)因血虛而致遍身關節疼痛，肢體痠楚、麻木，宜治以黃耆桂枝五物湯
(C)因產後外感而致周身關節疼痛，屈伸不利，宜治以柴葛解肌湯
(D)本病特點，以虛證多見，雖挾外感，但宜扶正祛邪，補氣為主，適當佐以祛風散寒或除濕通絡之品，切不可重傷其陰
- 63 下列那些是《景岳全書》舉元煎之組成藥物？①人參、炙甘草 ②白朮、升麻 ③黃耆、柴胡 ④當歸、陳皮
- (A)①② (B)①③ (C)①②③ (D)②③④
- 64 下列出自《傅青主女科》之方劑，那些敘述正確？①茯苓、熟地、丹皮是清經散的部分組成 ②芍藥、山茱萸、菟絲子是定經湯的部分組成 ③兩地湯的組成藥物包含《溫病條辨》增液湯
- (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 65 對小兒「暑瘧」的證治，指出「瘧因於暑，只治致瘧之因，而瘧自止，不必沾沾但於瘧中求之。」的醫家為下列何者？
- (A)吳瑭 (B)葉天士 (C)薛雪 (D)夏禹鑄
- 66 有關「赤游丹」的治療，下列何者正確？①屬風火熱毒者，可選用犀角地黃湯 ②屬邪毒入營者，可選用神犀丹 ③屬熱毒熾盛，氣血兩燔，可用清瘟敗毒飲
- (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 67 某 6 歲患者，證見高熱無汗，頭痛，身重困倦，胸悶泛惡，食慾不振，腹瀉，流涕，咳嗽，苔薄膩，舌質紅，脈數，宜治以下列何者？
- (A)厚朴、扁豆、銀花、連翹、香薷
(B)藿香、蘇葉、白芷、生薑、大腹皮、厚朴、陳皮、桔梗、半夏、白朮、茯苓、甘草、大棗
(C)葛根、蘇葉、桔梗、半夏、前胡、茯苓、陳皮、木香、枳殼、人參、炙甘草
(D)石膏、生薑、麻黃、大棗、炙甘草、杏仁、桂枝
- 68 依《醫宗金鑑》之描述：面紅目赤，發熱有汗，時時煩渴，咬牙弄舌，口乾舌燥，喜飲，口舌生瘡，小便色赤，胸膈滿悶，喜伏臥，懶食乾瘦，或吐，或利。則該症狀屬於何種疳證？
- (A)心疳 (B)胃疳 (C)脾疳 (D)疳積
- 69 林小妹妹，出生 3 個月，口腔舌面滿布白屑，白屑不易擦去，面赤，唇紅，煩躁不寧，叫擾啼哭，大便乾結，小便短黃，舌質紅，脈滑。試問下列敘述何者正確？①此屬小兒「鵝口瘡」 ②屬心脾積熱證，治以清熱瀉脾散 ③屬虛火上浮證，治以六味地黃湯加肉桂 ④本病又稱為「口糜」
- (A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

- 70 有關痲證輕度發作的特徵：①點頭 ②吐涎沫 ③咀嚼動作 ④意識喪失。下列何者最正確？
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 71 依《幼科雜病心法·淋證門》，有關熱淋的治療，下列何者正確？
(A)輕症用葵子散，重症則用八正散 (B)方用十味導赤湯，大便結急服八正散
(C)方用小蘗飲子，若莖中痛用五淋散 (D)方用五淋散
- 72 依《幼科雜病心法·水腫門》，有關小兒水腫之敘述，下列何者正確？①腫在腰以上屬風，宜發汗 ②腫在腰以下屬濕，宜攻下 ③全身腫者利小便 ④腫從四肢至腹者可治
(A)① (B)①② (C)③④ (D)①③④
- 73 《幼科發揮》指出，痢不問赤白，皆從積治。濕熱者，食積之所生也，痢初得之，宜用下列何方法治療？
(A)和法 (B)消法 (C)下法 (D)清法
- 74 夏季熱的臨床表現，下列何者正確？①口渴 ②不欲飲 ③少尿 ④多汗
(A)① (B)①③ (C)②③④ (D)①③④
- 75 依《醫宗金鑑》，下列何者為「二聖救苦丹」之藥物組成？
(A)板藍根、馬勃 (B)黃連、殭蠶 (C)大黃、皂角 (D)蘆薈、薄荷
- 76 依《醫宗金鑑》，有關小兒失血，損傷的原因，下列何者正確？①熱傷陽絡及陰絡 ②氣虛 ③勞傷 ④努傷
(A)①② (B)①②③ (C)①③④ (D)①②③④
- 77 依《醫宗金鑑》，小兒溺血的治療，下列何者正確？
(A)牛膝四物湯 (B)小蘗飲子 (C)槐花散 (D)豬苓湯
- 78 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，毒熱移入大腸經，傳化失常瀉泄引起腸炎初起，治以下列何方？
(A)黃連解毒湯加赤苓、木通 (B)升麻葛根湯加赤苓、豬苓、澤瀉
(C)清熱導滯湯加車前子、滑石 (D)三黃石膏湯加車前子、木通
- 79 女嬰感染腦膜炎，凶門膨開，頭皮浮軟、紫筋怒張、兩目偏垂，身熱氣促、口乾煩躁，面赤唇紅、二便短少。下列治療何者最恰當？
(A)水牛角、生地、丹皮、赤芍、連翹、桃仁、竹瀝、生薑、菖蒲
(B)知母、黃柏、熟地、山茱萸、丹皮、澤瀉、茯苓、鱉甲、牡蠣、龜板
(C)龍膽草、山梔、大黃、羌活、防風、川芎
(D)知母、石膏、粳米、甘草、人參
- 80 有關小兒遺尿的敘述，下列何者正確？①尿床症（Nocturnal Enuresis）指大於 5 歲或 6 歲的孩童於睡眠時不自主的排尿現象 ②原發性尿床常隨年紀而漸減，6-7 歲時只剩 5-10%的小孩仍會尿床 ③小兒遺尿是有遺傳傾向的，且通常男多於女
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③