

107年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專技高考助產師考試

代 號：6304

類科名稱：牙醫師(二)

科目名稱：牙醫學(六) (包括齒顎矯正學、兒童牙科學、牙科公共衛生學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理)

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 根據Enlow研究，關於鼻上顎複合體（nasomaxillary complex）的生長發育，下列敘述何者錯誤？

- A. 顴骨（zygomatic bone）前緣以骨頭沉積為主
- B. 腭穹窿（palatal vault）的口腔側（oral roof）以骨頭沉積為主
- C. 上顎骨前緣以骨頭吸收為主
- D. 腭穹窿（palatal vault）的寬度逐漸增加

2. 關於出生後顱顏骨生長發育之敘述，以下何者錯誤？

- A. 顱頂大部分經由膜內骨生長而成
- B. 顱底仍可經由軟骨聯合（synchondrosis）骨化轉變成骨頭
- C. 上顎骨完全經由膜內骨化而發育
- D. 下顎骨完全經由膜內骨化而發育

3. 評估骨年齡（skeletal age）的諸多方法中，下列何者可靠性最差？

- A. 手腕骨的發育
- B. 牙齒的發育
- C. 身體的發育
- D. 頸椎的發育

4. 有關30歲以後嘴唇厚度的正常變化，下列敘述何者正確？

- A. 逐漸增加
- B. 逐漸減少
- C. 先增後減
- D. 先減後增

5. 關於門齒空間負債（incisor liability）的敘述，何者正確？

- A. 是由於乳門齒的尺寸比恆門齒大所造成的差異
- B. 主要是因靈長空間（primate space）提供額外空間，有助於下顎恆門齒排列
- C. 主要是因餘裕空間（leeway space）提供額外空間，有助於上顎恆門齒排列
- D. incisor liability上顎大於下顎

6. 關於人類齒顎顏面的敘述，下列何者最適當？

- A. 根據Behrents對齒顎顏面的長期研究，發現成人完全沒有生長發育
- B. 下齒列的後期門牙擁擠（late incisor crowding）主因是智齒的存在


- C.口腔顎面的主要生理功能包括呼吸、吞嚥、咀嚼和說話
- D.嬰兒出生以後開始了呼吸和吞嚥等活動
- 7.通常牙根發育完成多少時，牙齒才會開始萌出牙齦？
- A.1/4
- B.2/4
- C.3/4
- D.4/4
- 8.對於第二乳臼齒終端平面（terminal plane）的敘述，下列何者錯誤？
- A.用於乳牙咬合關係分類
- B.mesial step為下顎第二乳臼齒遠心面位於上顎第二乳臼齒遠心面之近心側
- C.distal step為下顎第二乳臼齒遠心面位於上顎第二乳臼齒遠心面之遠心側
- D.恆牙第一大臼齒長出後仍可使用終端平面做咬合分類
- 9.下列何者較不可能是引起facial asymmetry的致病因？
- A.唇繫帶肥厚
- B.單側咀嚼肌過度肥大
- C.單側下顎骨髁狀突（condyle）吸收
- D.斜頸（torticollis）
- 10.有關安格氏第二級異常咬合（Angle Class II malocclusion）的定義，下列何者正確？
- A.上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）上
- B.上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的近心端
- C.上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的遠心端
- D.上顎第一大臼齒的遠心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的遠心端
- 11.有關咬合線（line of occlusion）的描述，下列何者正確？
- A.上下顎的咬合線都是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的舌面隆突（cingulum）
- B.上下顎的咬合線都是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的切緣（incisal edge）
- C.上顎的咬合線是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的舌面隆突（cingulum），下顎的咬合線是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的切緣（incisal edge）
- D.上顎的咬合線是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的舌面隆突（cingulum），下顎的咬合線是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的切緣（incisal edge）
- 12.在正中咬合（centric occlusion）關係時，下列門齒垂直覆蓋（overbite）之數據，何者屬於前牙開咬（anterior open bite）？
- A.-2 mm
- B.0 mm
- C.2 mm

D.4 mm

13.如果要檢查顳顎關節，取得關節盤（articular disk）的影像資訊，以下何種醫療影像最適合？

- A.斷層掃描（computed tomograph）
- B.環景放射片（panoramic radiograph）
- C.磁共振造影（magnetic resonance image）
- D.結構光（structured light）

14.根據Proffit所提出的"envelope of discrepancy"圖示，下列敘述何者正確？



- A.上顎門牙經過單純齒列矯正治療，至多可向前改善7mm的距離
- B.上顎門牙經過矯正治療合併絕對錨定輔助，至多可向下改善5mm的距離
- C.上顎門牙經過矯正治療合併正顎手術，至多可向下改善15mm的距離
- D.在生長階段施以功能性矯正治療，其改善效果可能大於單純齒列矯正治療

15.有關測顱分析中Frankfort plane的敘述，下列何者錯誤？

- A.是porion與orbitale連線
- B.其缺點之一是界標（landmark）的定位困難
- C.與SN plane的夾角正常值為15度
- D.可作為水平參考線

16.微笑曲線（smile arc）的定義是在社交微笑（social smile）時，下列何者具有和諧關係？

- A.上顎前牙的切端連線形態和上唇曲線
- B.下顎前牙的切端連線形態和下唇曲線
- C.上顎前牙的切端連線形態和下唇曲線
- D.下顎前牙的切端連線形態和上唇曲線

17.7歲小男生，前牙呈開咬狀態，有吸手指習慣，下列敘述何者錯誤？

- A.持續的吸手指習慣，是引起開咬的原因
- B.不必理會持續吸手指習慣，長大後開咬自然會消失變正常
- C.治療計畫的重要考量是先解決不良口腔習慣

D.舌柵欄矯正器是常用來解決習慣造成牙齒開咬的方法之一

18.對於安格氏二類短臉型（骨性深咬）混合齒列期孩童患者，若希望能增加顏面高度改善深咬，並解決安格氏二類咬合，最佳的矯正治療裝置是

A.功能性矯正裝置（functional appliance）

B.頸拉頭套（cervical pull headgear）

C.第二類橡皮筋（Class II elastics）

D.高拉式頭套（high-pull headgear）

19.動物實驗中，當施於牙齒輕而持續的力量，一段時間後局部環腺苷酸（cAMP）增加，牙周膜開始有分化的能力。此關鍵步驟在施力多久以後會發生？


A.4小時

B.4分鐘

C.4秒鐘

D.即時

20.如圖所示為下顎齒列移動關閉第一小白齒拔牙的空間，白色為移動前，紅色為移動中。下列何者最適合描述後牙錨定控制？




A.不動錨定（stationary anchorage）

B.相互錨定（reciprocal anchorage）

C.中等錨定（moderate anchorage）

D.皮質骨錨定（cortical anchorage）

21.如下圖所示，矯正線所作的彎折屬於：



- A. first order bend
- B. second order bend
- C. third order bend
- D. fourth order bend

22.理想的齒顎矯正用矯正線性質須具備的特性，下列何者錯誤？

- A.高強度
- B.低硬度
- C.很大之彈性彎曲範圍
- D.低成形性

23.下列那一項裝置較適合治療10歲小孩的骨性開咬（skeletal open bite）？

- A.高拉式頭套（high-pull headgear）
- B.面罩（facemask）
- C.哈伯氏裝置（Herbst appliance）
- D.前牙咬合板（anterior bite plate）

24.關於自鎖式矯正托架（self-ligating brackets）的研究，下列何者正確？

- A.比較容易將矯正弓線（archwire）拿除（removal）與放入（ligation），可以減少每次治療時間（chair time）
- B.因為自鎖式矯正托架與矯正弓線的摩擦力（friction）大，所以減少整體治療時間（total treatment time）
- C.自鎖矯正托架僅適合成人矯正治療
- D.因為自鎖式矯正托架可以撐寬牙弓，所以可以免除拔牙矯正

25.下列何者是固定式功能性矯正裝置（fixed functional appliance）？

- A.bionator
- B.activator
- C.Herbst appliance
- D.Fränkell appliance

26.針對安格氏II類1級異常咬合且門齒深咬的患者，使用功能性矯正裝置（functional appliance）治療，通常希望引導下顎生長往那個方向改變？

- A.往上往後

- B. 往上往前
- C. 往下往前
- D. 往下往後

27. 請依下列口內照片判斷最可能之顱顏疾病：



- A. 單側唇腭裂
 - B. 雙側唇腭裂
 - C. 皮爾氏症 (Pierre Robin sequence)
 - D. 亞伯氏症 (Apert's syndrome)
28. 有一患者於甲醫師處裝置全口矯正器2天，因口內疼痛不已，但又沒空去甲醫師診所而就近前來乙醫師處求診，何者為乙醫師合宜處理方式？
- A. 告訴患者只有回甲醫師處處理才能解決
 - B. 拆除矯正線與矯正器，以解除患者疼痛
 - C. 痛斥甲醫師只顧賺錢不自己照顧患者
 - D. 先看口內疼痛來源，找出可能原因，與甲醫師聯絡後，對患者說明可能之解決方式與甲醫師之建議，取得患者同意後做適當口內處理，或開給患者止痛藥，請患者儘速回甲醫師診所
29. 下列何種藥物適合用於兒童牙科之黏膜下鎮靜 (submucosal sedation) ？
- A. Fentanyl
 - B. Propofol
 - C. Midazolam
 - D. Benadryl
30. 關於牙齒白斑病灶 (white spot lesion) 的敘述，下列何者錯誤？
- A. 脫鈣最嚴重的部分位於牙釉表層下方
 - B. 已經是一個表層下病灶 (subsurface carious lesion)
 - C. 無法被再礦化 (remineralization)
 - D. 若無適當處理，會進展成窩洞
31. 牙本質發育不良 (dentinogenesis imperfecta) 為一遺傳性缺陷，其原因來自那一時期的牙齒發育異常？
- A. 初生期 (initiation)
 - B. 增殖期 (proliferation)
 - C. 組織分化期 (histodifferentiation)
 - D. 形態分化期 (morphodifferentiation)
32. 下列何者不是造成上顎側門牙的前牙錯咬 (anterior crossbite) 最常見的原因？
- A. 贅生齒
 - B. 乳牙之外傷

C.空間不足

D.吐舌 (tongue thrust)

33. 臨床上運用W形牙弓裝置 (W-arch appliance) 來矯正後牙錯咬 (posterior crossbite) 時，下列敘述何者錯誤？

A. 用直徑0.036或0.040英吋鋼線，彎成W形且與所有錯咬牙接觸

B. 鋼線應緊密貼住腭面組織 (palatal tissue)

C. 調整時，W形裝置需撐開2~3毫米，再黏合 (cementation)

D. 每3~4週調整一次

34. 下列何者是引起正常人具高度危險性之急性細菌性心內膜炎 (acute bacterial endocarditis, ABE) 最常見之病原菌？

A. 表皮葡萄球菌 (*Staphylococcus epidermidis*)

B. 草綠色鏈球菌 (*Streptococcus viridans*)

C. 金黃葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)

D. 腐生葡萄球菌 (*Staphylococcus saprophyticus*)

35. 有位3歲女孩，患有齲齒及上顎門牙牙冠折斷 (crown fracture) 伴隨牙髓暴露，臨床並無其他症狀，其X光如圖，就左側正中門牙而言，下列何者不是合理的處理？



A. 拔除

B. 冠髓切除術 (pulpotomy)

C. 追蹤觀察即可

D. 根管治療 (root canal therapy)

36. 上顎恆正中門牙發生下面何種斷裂時不需積極治療？

A. 1/3牙冠斷裂

B. 齒頸部斷裂

C. 上1/3牙根斷裂 (coronal 1/3 root fracture)

D. 下1/3牙根斷裂 (apical 1/3 root fracture)

37. 含有1:100,000腎上腺素 (epinephrine) 之2%利度卡因 (lidocaine) 用於浸潤麻醉時，注射後，其開始作用時間為：

A. 2分鐘以內

- B.2~5分鐘
- C.5~8分鐘
- D.8~10分鐘

38.母親在懷孕初期，若罹患下列那一種疾病，較容易產下智能障礙（mental retardation）的小孩？

- A.德國麻疹
- B.充血性心臟病
- C.糖尿病
- D.風濕熱

39.門診初診時，一位孩童病患由母親帶她來看診。孩子有明顯智能障礙，口中有許多齲齒。你的對策應先做什麼？

- A.先處理簡單的齲齒，以建立孩子與家長的信任
- B.強調預防的重要性
- C.立即轉診到教學醫院
- D.諮詢過去病史與就醫狀況

40.下列何者不是醫療團隊執行行為誘導時應具備的基本原則（fundamentals of behavior guidance）？

- A.威嚴
- B.耐心
- C.誠實
- D.彈性

41.使用以手摀嘴法（hand-over-mouth exercise）主要的目的為何？

- A.讓小朋友心生恐懼而產生配合行為
- B.可降低小朋友哭聲以抑制不良行為
- C.用以引起小朋友的注意得以進行溝通
- D.建立醫師威嚴的肢體語言

42.兒童行為處理時，下列何者錯誤？

- A.做行為處理前，要事先與父母做良好的溝通
- B.3歲以前，父母在旁邊陪伴治療對兒童之行為表現是有幫助的
- C.兒童表現良好時，應該給予適當的鼓勵
- D.對於害怕恐懼的兒童，應立即請父母離開診間

43.下列那一項並非影響孩子容易齲齒的因子？

- A.唾液的酸鹼值及流量
- B.牙齒排列的整齊度
- C.齲齒已經填補
- D.口中是否有矯正裝置

44.有關齲齒的敘述，下列何者錯誤？

- A.遺傳因素相對大於環境影響因素
- B.只要牙釉質表面未受破壞，齲齒窩洞未形成，初期齲齒（incipient subsurface lesions）的再礦化

(remineralization) 就有可能發生

C.在幼兒早發性齲齒 (early childhood caries)，下顎門牙較晚受影響

D.牙釉質表面對抗酸蝕的能力較深部強

45.嬰幼兒奶瓶性齲齒，最不容易侵犯下列何部位之牙齒？

A.下顎乳門牙

B.上顎乳門牙

C.上顎第一乳臼齒

D.下顎第一乳臼齒

46.關於美國兒童牙科醫學會所建議之齲齒風險評估工具 (caries risk assessment tool)，下列敘述何者正確？

A.不需要定期做齲齒風險之評估

B.只能由牙醫師來執行

C.X光片及細菌之檢測結果須為評估項目之一

D.齲齒風險評估之結果無法視為診斷報告

47.下列那些物質是兒童牙科常用之牙菌斑顯示劑 (disclosing agent) 的成分之一？①紅螢素 (erythrosin)

②碘 (iodine) ③龍膽紫 (gentian violet)

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

48.下列何者，出生時之尺寸在成人水平50%以下？

A.臉部寬度

B.臉部高度

C.頭顱高度

D.頭顱寬度

49.對於孩童整體自然生長，下列敘述何者錯誤？

A.生長 (growth) 是解剖大小 (anatomic size) 的增加

B.評估顏面部生長發育需涵蓋大小、速度、方向等三項

C.生長速率於出生前速度較慢，出生後前 2~3 年速度較快

D.青春期生長速率較快

50.有關於乳牙型態的敘述，下列何者正確？

A.上顎第一乳臼齒的牙冠型態與上顎恆牙第一大臼齒相似

B.下顎第一乳臼齒的牙冠型態與下顎恆牙第一大臼齒相似

C.在外型上，上顎第二乳臼齒比上顎第一乳臼齒稍小

D.下顎第二乳臼齒有三個差不多大小的頰側咬頭

51.下列乳齒的末端平面 (terminal plane)，何者容易造成將來第一大臼齒的二級不正咬合？

A.垂直型末端平面 (straight terminal plane)

B.近心階末端平面 (mesial step)

- C.遠心階末端平面（distal step）
- D.對齊式末端平面（flush terminal plane）

52.關於生長發育時，牙齒牙弓關係的敘述，下列何者錯誤？

- A.決定恆牙牙弓狀態主要因素為牙齒大小及齒槽大小的差異
- B.牙齒大小主要決定於基因
- C.Moorrees認為乳牙大小可精確預測恆牙大小
- D.混合齒列空間分析（mixed dentition space analysis）主要是預測恆牙犬齒及第一、二小白齒近遠心距離總和

53.常見骨骼性後牙錯咬的原因為何？

- A.上顎牙弓狹窄
- B.下顎牙齒向外傾斜
- C.下顎發育不良
- D.口呼吸

54.關於上顎前牙間隙（anterior diastema），下列敘述何者錯誤？

- A.治療時間應延遲至恆牙犬齒長出時再行評估
- B.常見造成原因為較厚的唇繫帶（heavy labial frenum）
- C.如果需進行繫帶切除術，應於矯正治療前實施
- D.正中贅齒（mesiodens）可造成前牙間隙

55.對罹患法洛氏症（Tetralogy of Fallot）青少年，下列何項牙科處置必須做endocarditis prophylaxis的處置？

- A.牙齦切除術（gingivectomy）
- B.上橡皮布（rubber dam）
- C.拆線（remove sutures）
- D.印齒模（taking of oral impression）

56.關於鐮刀狀細胞貧血症患者之口腔特徵，下列何者錯誤？

- A.骨骼生長會受影響，因此下顎常有內縮（retrusion）之情形
- B.牙齒常有礦物質化不足（hypomineralization）之情形
- C.牙齒常會延遲萌發
- D.X光片常會誤判為骨髓炎（osteomyelitis）

57.關於血友病患者之根管治療，下列何者錯誤？

- A.血友病患者之治療原則是盡量選擇根管治療，避免拔牙之風險
- B.大部分之情況使用浸潤麻醉便足夠完成根管治療
- C.可使用笑氣去除不適及焦慮
- D.若牙髓神經已壞死，必須使用阻斷麻醉

58.對於年輕恆門齒脫出（avulsion）的處理方式，何者錯誤？

- A.避免以緊抓牙根部位方式撿拾脫出的牙齒
- B.牛乳比生理食鹽水適宜作為脫出牙暫存的液體
- C.應儘速植回原位

D.應以堅硬不易彎曲之金屬線固定其位置

59.腦性麻痺病人接受牙科診療時，需特別注意不可讓病人的頭突然後仰是因為下列那一個原始反射（primitive reflex）仍然存在的關係？

A.驚嚇反射（startle reflex）

B.強直性迷路反射（tonic labyrinthine reflex）

C.非對稱性強直頸部反射（asymmetric tonic neck reflex）

D.頭回縮反射（head-withdrawal reflex）

60.下列關於腦性麻痺的敘述，何者正確？

A.早產兒發生率較高

B.隨著年齡，腦損傷情形會改善

C.嬰兒反射太早消失

D.唇顎裂發生率較高

61.一位五歲、體重20公斤的兒童，每日使用含0.243% NaF的牙膏，但他卻習慣性地每天吞食牙膏2 g，若依據「形成氟斑齒的劑量為0.1 mg F／每公斤體重／每天」，此兒童因吞食牙膏而發生氟斑齒的可能性為何？

A.不可能發生氟斑齒

B.可能發生在乳牙門牙

C.可能發生在乳牙臼齒

D.可能發生在恆牙

62.在三段五級的疾病預防層級（level of prevention）中，牙科臨床上的「早期診斷、立即治療」是屬於：

A.第一段預防

B.第二段預防

C.第三段預防

D.第五級預防

63.依公共衛生、社區牙醫學的概念，兒童第一次牙科檢查應於幾歲實行？

A.6歲長恆齒時

B.12歲恆齒換好時

C.3歲前

D.剛出生時

64.下列那一項目是社區口腔健康發展工作首先要做的項目？

A.社區分析

B.社區診斷

C.社區計畫

D.社區評價

65.齲齒檢查時若發現有一顆牙先前已做過填補處理，但填補物旁有明顯蛀洞，則應登錄為：

A.Sound

B.Decayed

C.Missing

D.Filled

66.世界衛生組織於2013年發行之第五版口腔健康調查的基本方法（Oral Health Surveys, Basic Methods, 5th ed., WHO, 2013）中，較適合用來比較不同國家間之齲齒狀況的指標年齡為何？

- A.3歲
- B.12歲
- C.15歲
- D.20歲

67.下列有關身心障礙者之敘述，何者錯誤？

- A.智能遲緩的患者，智商近70，屬可教育的一類，故易接受正常牙科治療
- B.失聰者的看診，在操作前示範給患者看，並慢慢的解說，較可使患者接受正常的牙科治療
- C.眼盲者接受牙醫治療時，均應慢慢與患者及家屬詳細說明，較可使患者接受正常的牙科治療
- D.唇腭裂患者的醫療工作中，牙醫師亦有參與治療

68.下列對身心障礙者的口腔疾病預防項目中，以何者最重要？

- A.訓練其刷牙行為
- B.回歸正常飲食習慣
- C.潔牙和健牙輔助用品的使用
- D.定期口腔檢查

69.我國政府每年會針對特定年齡層的國人進行大型的口腔健康調查，以瞭解國人的齲齒盛行率、牙周健康情形與治療需求等。此類調查使用之研究方法屬於下列何者？

- A.病例對照研究（case-control study）
- B.臨床試驗（clinical trial）
- C.世代研究（cohort study）
- D.橫斷式研究（cross-sectional study）

70.某研究針對國小學童進行含氟漱口水防齲試驗，受邀參加的學童，其家長需填寫知情同意書（informed consent）。下列有關知情同意書之敘述何者錯誤？

- A.同意書內容需說明此試驗進行的期間與方法
- B.同意書內容不需說明使用含氟漱口水可能造成的風險
- C.同意書內容需說明使用含氟漱口水可能的好處
- D.填寫同意書之後仍可隨時無條件退出此試驗

71.有關含氟牙膏內的氟化物之敘述，下列何者正確？①可被去礦質化（demineralization）的牙釉質所攝取 ②能增加牙菌斑內的含氟濃度 ③當口腔內酸鹼度下降時，存放在牙菌斑內的氟化物無法被用於再礦質化（remineralization） ④不可以合併使用其他氟化物

- A.①④
- B.③④
- C.②③
- D.①②

72.國小學童是否會因為使用含氟漱口水而造成門牙的氟斑齒？

- A.會造成門牙的氟斑齒，因為氟化物的濃度很高
- B.會造成門牙的氟斑齒，因為學童可能吞食過量的含氟漱口水
- C.會造成門牙的氟斑齒，因為國小學童的門牙牙冠尚未完成鈣化
- D.不會造成門牙的氟斑齒，因為國小學童的門牙牙冠已經鈣化完成

73.「相信睡前刷牙有益健康」屬於班迪拉（Bandura）社會學習理論中之何項定義？

- A.結果期望
- B.自我效能
- C.行為能力
- D.同儕影響

74.多數醫療人員常用的口腔衛生教育方法為何？

- A.參觀法
- B.小組討論法
- C.講述法
- D.戲劇法

75.下列何者不能診斷為裂溝齲齒？

- A.探針探到裂溝底部鬆軟
- B.裂溝附近出現脫鈣之窩洞
- C.裂溝顏色深染但底部堅硬
- D.裂溝周圍有牙釉質剝落現象

76.B型肝炎病毒（HBV）屬耐熱型病毒，一般可在工作檯面上存活至少多久的時間？

- A.1天
- B.3天
- C.5天
- D.7天

77.世界衛生組織（WHO）推動的「健康促進學校」（health promoting school）所涵蓋的參與對象除了學生以外，還包括：①學生家長 ②學校的教、職員 ③社區牙醫師 ④企業人士

- A.①②④
- B.①③④
- C.②③④
- D.①②③

78.在牙醫診療時，「圓形頭顱、鼻樑塌下、手掌有單一貫通紋」比較可能是下列那一種特殊需求（special needs）者的特徵？

- A.腦性麻痺（cerebral palsy）
- B.癲癇（epilepsy）
- C.唐氏症（Down syndrome）
- D.自閉症（autism）

79.下列那一項不是全民健保實施總額預算制度之目的？

- A.控制醫療費用成長於合理範圍內
- B.提供民眾最佳的醫療服務
- C.透過集體協商平衡付費者、供給者之權益
- D.平衡各地區醫療資源之分布

80.假設你正針對中學生進行菸品對成癮及致病的認知評估，若要呈現的是拒菸的利多於弊及討論他們的想法及決定，上述作法屬於下列那一種健康促進理論或模式之應用？

- A.階段改變理論
- B.社會學習理論
- C.擴散理論
- D.健康信念模式