

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關參蘇飲之敘述，下列何者正確？
(A)為張仲景所創之方
(B)功用為助陽解表
(C)其組成為：人參、紫蘇葉、葛根、半夏、乾薑、黃耆、陳皮、炙甘草、前胡、桔梗
(D)其主證為惡寒，發熱，無汗，頭痛，咳嗽痰白，胸膈滿悶，倦怠乏力，苔白，脈弱
- 2 下列方劑之敘述，何者錯誤？
(A)張仲景枳朮湯之枳實劑量倍於白朮，以消積導滯為主
(B)張元素枳朮丸之白朮劑量倍於枳實，以健脾為主
(C)張仲景小承氣湯之大黃劑量比厚朴多，功用為瀉熱通便，消痞除滿
(D)張仲景厚朴三物湯之大黃與厚朴劑量相等，治支飲胸滿兼腑實便秘
- 3 下列何者可治外感風寒濕？①九味羌活湯 ②荊防敗毒湯 ③三拗湯 ④華蓋散
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 4 下列何者提出「治病之方，則又以汗、和、下、消、吐、清、溫、補八法盡之」之歸類總結？
(A)張璐 (B)汪昂 (C)張景岳 (D)程鍾齡
- 5 下列何者最不適合歸類在瀉下劑？
(A)濟川煎 (B)溫脾湯 (C)新加黃龍湯 (D)防風通聖散
- 6 有關方劑之敘述，下列選項何者正確？①小青龍湯與定喘湯之組成藥物均含麻黃、半夏、甘草 ②小青龍湯與定喘湯同治痰多清稀及表證 ③小青龍湯與定喘湯均以麻黃為主藥 ④小青龍湯可用於外寒內飲；定喘湯可清熱化痰
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 7 有關方劑之敘述，下列共幾項正確？①大承氣湯、小承氣湯、調胃承氣湯等三方均主治陽明腑實證 ②大承氣湯之功用為峻下熱結 ③小承氣湯之功用為輕下熱結 ④調胃承氣湯之功用為緩下熱結
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 8 有關一貫煎的敘述，下列何者正確？
(A)本方為清代醫家葉天士所創制，載於其著作《臨症指南醫案》中
(B)本方組成藥物中，以當歸劑量最大
(C)主治肝鬱脾虛所引起之胸脘脅痛，吞酸吐苦
(D)本方配伍，照顧到「肝體陰而用陽」的生理特點
- 9 70 歲男性喘咳多年，症見喘促胸滿，咳嗽痰黃稠，痰中帶血，面目浮腫，形體消瘦，胸中煩熱，脈浮虛，下列何方治療最適宜？
(A)《衛生寶鑑》人參蛤蚧散 (B)《統旨方》清金化痰丸
(C)《醫考方》清氣化痰丸 (D)《重樓玉鑰》養陰清肺湯

- 10 下列方劑中，其組成含有升麻、柴胡兩藥物者有幾項？①《脾胃論》補中益氣湯 ②《東垣試效方》普濟消毒飲 ③《脾胃論》升陽益胃湯 ④《醫方集解》益氣聰明湯
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 11 25 歲男性研究生身形瘦弱，食慾不振，大便時而稀軟，時而泄瀉。舌苔白膩，脈細緩。下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散 (B)葛根芩連湯 (C)溫膽湯 (D)參苓白朮散
- 12 下列方劑組成中有青蒿與知母的有幾項？①青蒿鱉甲湯 ②秦艽鱉甲散 ③清骨散
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- 13 下列各項方劑之敘述，何者錯誤？
(A)《傷寒論》白虎湯，加人參，主治熱盛氣分，氣津兩傷，脈浮大有力者
(B)《溫病條辨》清營湯使用銀花、連翹，其目的在透熱轉氣，使營分之邪透出氣分而解
(C)《外臺秘要》黃連解毒湯主治一切實熱火毒，充斥三焦，方中黃連用量最重，為主要藥物
(D)《蘭室秘藏》清胃散主治胃有積熱，牙痛；或是牙宣出血
- 14 有關《小兒藥證直訣》六味地黃丸與《景岳全書》左歸丸之敘述，有幾項正確？①共同組成藥物有熟地、山藥、山茱萸 ②左歸丸之熟地：山藥比例為 2：1 ③兩方均為「壯水之主，以制陽光」之代表方劑 ④左歸丸去除牛膝、菟絲子、鹿角膠、龜板膠；加入炙甘草則為《景岳全書》左歸飲，其補力較為緩和
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 15 《醫方集解》有關左金丸的方義敘述，下列何者錯誤？
(A)實則瀉其子，心者肝之子，故原方中用黃連瀉心，使火不克金，金能制木，則肝平矣
(B)吳茱萸辛熱，行氣解鬱又能引熱下行，以為反佐
(C)左金者，使金令得行於左而平肝也
(D)本方黃連：吳茱萸劑量比為 1：6
- 16 下列何種方劑源自《醫學衷中參西錄》，主治脾虛氣陷，導致衝任不固，所造成的月經崩漏症？
(A)升陷湯 (B)溫經湯 (C)固經丸 (D)固冲湯
- 17 以小柴胡湯去柴胡、黃芩、生薑，加桂枝、黃連、乾薑，主治下列何證？
(A)水熱互結，心下痞硬，乾噦食臭，腸中雷鳴下利者
(B)胸中有熱，胃中有寒，胸中煩悶欲嘔，腹中痛或腸鳴泄瀉
(C)心下痞滿，嘔吐，腸鳴下利，苔膩微黃，脈弦數
(D)腸中雷鳴下利，水穀不化，心下痞硬而滿，嘔，心煩不得安
- 18 《醫方集解》龍膽瀉肝湯是治肝膽經實火濕熱的重要方劑，下列何者非其組成藥物？
(A)茵陳 (B)梔子 (C)黃芩 (D)柴胡
- 19 某 45 歲女性，半月前因受涼，發熱惡寒，咳嗽，吐痰腥臭帶血，用抗生素治療無效。現仍胸悶痛，咳嗽，咯膿血痰，量多腥臭，舌紅苔黃膩，脈滑數，體溫 39.5℃，最宜使用下列何者所組成之方藥？
(A)薏苡仁、冬瓜仁、桃仁、葶苈
(B)桑白皮、地骨皮、粳米、炙甘草
(C)麻黃、杏仁、石膏、甘草
(D)半夏、膽星、枳實、杏仁、茯苓、陳皮、黃芩、瓜蒌仁
- 20 關於方劑的藥味組成敘述，下列何者錯誤？
(A)蒿芩清膽湯組成含有溫膽湯 (B)四逆散組成含有芍藥甘草湯
(C)當歸四逆湯組成含有四逆湯 (D)小建中湯組成含有桂枝湯

- 21 牡蠣散有固表斂汗之功，其組成中以何藥為次藥（臣藥）？
(A)龍骨 (B)黃耆 (C)浮小麥 (D)麻黃
- 22 下列何藥不包含在《時方歌括》丹參飲的組成中？
(A)丹參 (B)檀香 (C)木香 (D)砂仁
- 23 冰片具有開竅醒神、清熱止痛之作用，經常被用於開竅醒神的方劑中。下列處方何者沒有使用冰片？
(A)《溫病條辨》安宮牛黃丸 (B)《太平惠民和劑局方》至寶丹
(C)《回春丹症治》小兒回春丹 (D)《太平惠民和劑局方》蘇合香丸
- 24 《醫學發明》天台烏藥散的製服法中，下列何藥與川棟子同炒，以增加其行氣散結之作用，並且可制其苦寒之性？
(A)木香 (B)小茴香 (C)烏藥 (D)巴豆
- 25 34 歲女性懷孕 10 週，主訴嘔逆不已，食入即吐，伴隨胸脘痞悶，其舌脈診發現舌淡苔白滑，脈弦而虛。下列何方治療最適宜？
(A)《金匱要略》旋覆代赭石湯 (B)《金匱要略》橘皮竹茹湯
(C)《太平惠民和劑局方》二陳湯 (D)《症因脈治》丁香柿蒂湯
- 26 45 歲男性患者失眠心悸求診，問診得知患者尚有神疲虛煩健忘的症狀，而且容易手足心熱、夢遺、便秘以及反覆口舌生瘡；醫師診其舌紅少苔、脈細數。最宜下列何方治療？
(A)炙甘草湯 (B)柴胡加龍骨牡蠣湯 (C)酸棗仁湯 (D)天王補心丹
- 27 下列方劑中含有理氣藥木香，共幾項正確？①《保命集》芍藥湯 ②《醫學發明》天台烏藥散 ③《濟生方》歸脾湯 ④《丹溪心法》越鞠丸
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 28 有關厚朴溫中湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)有溫中行氣，燥濕除滿之功 (B)厚朴、枳實行氣除滿
(C)與良附丸皆具溫中行氣止痛之功效 (D)與理中丸皆治脾胃虛寒之腹痛
- 29 有關《黃帝素問宣明論方》地黃飲子之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治下元虛衰、痰濁上逆之瘡癰證 (B)臨床上可適用於下肢偏冷兼虛陽上浮的患者
(C)以熟地黃、山茱萸滋補腎陰 (D)以肉蓯蓉、鎖陽溫壯腎陽
- 30 有關《太平惠民和劑局方》川芎茶調散的敘述，下列何者錯誤？
(A)集眾多辛散疏風藥為一方，但升散中寓有清降，使全方不會過於溫燥
(B)原方服法為諸藥磨為細末，每次服二錢，用時以清茶調下
(C)方中劑量最大者為川芎
(D)川芎為治頭痛要藥，也被稱作血中氣藥，在此方中體現了「治風先治血，血行風自滅」的道理
- 31 有關《溫病條辨》杏蘇散之敘述，下列何者錯誤？
(A)與《醫林改錯》血府逐瘀湯比較，皆以桔梗、枳殼升降氣機、理氣寬胸
(B)主治外感涼燥，伴氣機鬱滯、津液輸布不利
(C)本方去杏仁，加人參、香附、葛根，即為《太平惠民和劑局方》參蘇飲的組成
(D)也可用於外感風寒之輕證
- 32 有關《金匱要略》防己黃耆湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)原文提及主治風濕和風水，出現「四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者」
(B)和《丹溪心法》玉屏風散都以黃耆、白朮來健脾益氣固表
(C)方中防己苦寒，具有止痛、利水消腫功效，臨床常用於濕熱痹症
(D)原書方後提及「服後，當如蟲行皮中」

- 33 宣痹湯組成中，下列何者「清熱利濕，通絡止痛」而為方中主要藥物？
(A)薏仁 (B)滑石 (C)晚蠶砂 (D)防己
- 34 張小姐來院門診，證見發熱困倦，胸悶腹脹，肢酸，咽腫，頤腫口渴，小便短赤，吐瀉，經醫師診察舌苔黃膩，脈滑數，下列何方最適宜？
(A)茵陳五苓散 (B)甘露消毒丹 (C)八正散 (D)茵陳蒿湯
- 35 《丹溪心法》保和丸的組成中，主要的三味消食藥物，下列那些正確？①陳皮 ②茯苓 ③山楂 ④神麴 ⑤麥芽 ⑥萊菔子
(A)①②⑤ (B)①⑤⑥ (C)②③④ (D)③④⑥
- 36 下列何者為《太平惠民和劑局方》香薷飲的功用？
(A)解表散寒，溫肺化飲 (B)解表散寒，化濕和中
(C)發汗解表，兼清裏熱 (D)祛暑解表，化濕和中
- 37 消食導滯方劑組成中，下列何者含《太平惠民和劑局方》四君子湯的組成？
(A)《蘭室秘藏》枳實消痞丸 (B)《內外傷辨惑論》枳朮丸
(C)《丹溪心法》保和丸 (D)《儒門事親》木香檳榔丸
- 38 有關《溫熱經緯》清暑益氣湯之敘述，下列何者正確？
(A)主治中暑受熱，氣津兩傷。證見身熱無汗，心煩口渴，小便短赤，體倦少氣，脈虛數
(B)若不考慮藥物劑量，本方包含了整個《金匱要略》麥門冬湯的藥物組成
(C)方中梔子、竹葉、連翹清熱除煩；甘草、梗米益氣養胃，共為佐使藥
(D)本方側重養陰生津，宜於暑熱傷津耗氣之證；《脾胃論》清暑益氣湯側重健脾燥濕，用於元氣本虛，傷於暑濕者
- 39 30 歲男性，適逢寒流出遊，當天夜晚出現發燒 38.5℃，伴見咳嗽，微喘，汗出，下利臭穢，苔黃脈數。最宜下列何方治療？
(A)麻黃、杏仁、甘草、石膏
(B)麻黃、葛根、桂枝、白芍、甘草、生薑、大棗
(C)葛根、黃芩、黃連、甘草
(D)葛根、黃芩、柴胡、羌活、白芷、白芍、桔梗、甘草
- 40 下列何者為消瘰丸之功用？
(A)開達膜原，燥濕化積 (B)燥濕利水，化痰軟堅
(C)清熱滌痰，寬胸散結 (D)清熱化痰軟堅，消瘰養陰
- 41 麻黃用於喘咳證，下列何者最不宜？
(A)風寒外束 (B)腎不納氣 (C)內有寒飲 (D)熱邪壅肺
- 42 有關生薑主治，下列敘述何者最不宜？
(A)外感風寒，惡寒發熱，頭痛鼻塞 (B)形寒飲冷，寒濕傷中，脘腹冷痛
(C)陰虛內熱，嘔吐呃逆，腹痛腹瀉 (D)跌打損傷，魚蟹中毒，癰疽凍瘡
- 43 有關威靈仙主治，下列敘述何者最不宜？
(A)中風偏風，頭風頑痹 (B)風濕痰氣，氣虛血弱
(C)癥瘕積聚，痰水宿膿 (D)黃疸浮腫，大小便秘
- 44 有關附子主治，下列敘述何者最不宜？
(A)三陰傷寒，中寒中風，陰虛陽盛 (B)嘔噦膈噎，冷痢寒瀉，霍亂轉筋
(C)拘攣風痹，癥瘕積聚，小兒慢驚 (D)痘瘡灰白，癰疽不斂，沉寒痼冷
- 45 有關丁香主治，下列敘述何者最不宜？
(A)陰虛火旺，痙攣奔豚腹痛 (B)胃冷壅脹，嘔噦呃逆泄利
(C)腎陽虛衰，腰膝酸痛陽痿 (D)腦疳齒齲，痘瘡灰白不發

- 46 有關白花蛇的主治應用，下列何者錯誤？
(A)中風半身不遂 (B)小兒驚風抽搐 (C)皮膚搔癢 (D)癥瘕血塊
- 47 下列何藥具有清熱利水，除濕止癢的功效？
(A)地膚子 (B)薦蓄 (C)海金沙 (D)木通
- 48 下列何者為薤白最適當的功效？
(A)行氣止痛，溫腎納氣 (B)降氣止呃
(C)行氣止痛、開鬱醒脾 (D)通陽散結、行氣導滯
- 49 有關蒼朮之敘述，下列選項何者正確？①菊科植物 ②赤朮即是蒼朮 ③至《新修本草》始有蒼朮之名 ④北蒼朮、南蒼朮皆為正品蒼朮
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 50 下列藥物中，何者藥材為革質葉，具有利尿通淋，清熱止血作用？
(A)石韋 (B)海藻 (C)淫羊藿 (D)海金沙
- 51 下列何藥，平常配伍用於胃失和降所致的呃逆之證？
(A)枳實 (B)玫瑰花 (C)薤白 (D)柿蒂
- 52 下列藥物中，何者藥用部位為莖髓，能利水通淋、清心除煩？
(A)木賊 (B)竹茹 (C)燈心草 (D)蘆根
- 53 下列何者用於陰虛燥咳，歸肺胃腎經的藥物？
(A)百部 (B)知母 (C)杏仁 (D)白果
- 54 下列何種根莖類藥物治喉痹咽痛要藥，歸肺經？
(A)射干 (B)桔梗 (C)蚤休 (D)馬勃
- 55 下列何藥治肺熱咳嗽，不宜久煎？
(A)桑白皮 (B)蘇子 (C)連翹 (D)魚腥草
- 56 下列何藥能明目退翳，有瞳子散大者忌用？
(A)決明子 (B)穀精草 (C)密蒙花 (D)青箱子
- 57 有關敗醬草的敘述，下列何者錯誤？
(A)治腸癰已成 (B)治風濕痹痛 (C)治下痢膿血 (D)治肺癰發熱
- 58 下列何者為根皮類藥材並用於退虛熱、除骨蒸？
(A)桑白皮 (B)胡黃連 (C)地骨皮 (D)銀柴胡
- 59 下列何藥功善止血，又能化瘀生新，止血不留瘀，化瘀不傷正之特長？
(A)白及 (B)前胡 (C)白芍 (D)三七
- 60 有關白茅根主治功用，下列選項何者正確？①傷寒嘔逆 ②反胃腹痛 ③血閉寒熱 ④洩多不渴 ⑤內熱煩渴
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②④⑤ (D)③④⑤
- 61 下列何藥能祛風止痛，可用於感冒風寒的頭痛，又能用於月經不調、痛經、閉經等病證？
(A)乳香 (B)川芎 (C)沒藥 (D)當歸
- 62 下列何者不屬於牛膝的功效？
(A)行氣解鬱 (B)引藥下行 (C)活血通經 (D)補肝腎、強筋骨
- 63 下列何藥物可用於溫熱病熱入營血，證見高熱、時有譫語、煩躁不寐，或斑疹隱隱、舌紅絳等，以及心悸怔忡、失眠等證。以活血涼血見長，又能養血安神，有清心除煩，涼血消癰功效的中藥？
(A)苦參 (B)川芎 (C)丹參 (D)紅花

- 64 關於生槐花的敘述，下列何者正確？
(A)能涼血止血，適用於血熱妄行所致的出血病證
(B)可用於止咳化痰
(C)便血、痔血等因血熱而起者，不可用本品
(D)只可用治於上部出血，下部出血如便血、痔血等，用之不效
- 65 有關扁豆的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)清心除煩 (B)和胃益脾 (C)化濕消暑濕 (D)和中解毒
- 66 有關墨旱蓮的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)涼血止血 (B)滋補肝腎 (C)和胃益脾 (D)滋陰清熱
- 67 下列何種補氣藥具有滋補強壯、補脾胃、止消渴、安神鎮靜之功效？
(A)黃耆 (B)扁豆 (C)白朮 (D)人參
- 68 有關飴糖的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)濕熱內鬱 (B)中滿吐逆 (C)小兒疳積 (D)肺虛乾咳
- 69 下列何者是巴戟天的藥用部位？
(A)果實 (B)葉 (C)根 (D)樹皮
- 70 下列何者最不常用於肝腎精血不足、鬚髮早白？
(A)桑椹 (B)女貞子 (C)黑芝麻 (D)天門冬
- 71 下列何藥用治驚癇癲狂，係取其開竅醒神之功效？
(A)冰片 (B)龍骨 (C)合歡皮 (D)磁石
- 72 有關麝香敘述，下列何者錯誤？
(A)成熟雄麝體內香囊的乾燥分泌物，又稱當門子
(B)醒神回甦的要藥，宜入煎劑
(C)內服或外用於瘡瘍腫毒，跌打損傷
(D)孕婦禁服
- 73 下列何藥能燥濕化痰、降逆和胃，常與生薑同用於寒飲嘔吐？
(A)天竹黃 (B)半夏 (C)桔梗 (D)貝母
- 74 牡蠣除了軟堅散結，收斂固澀之外，還可用於下列何證？
(A)精寒自出 (B)風寒濕痹，肢體麻木癱瘓
(C)風疹瘙癢 (D)神志不安，心悸怔忡，失眠多夢
- 75 下列何藥息風止癇、善清熱，亦能用於痰鳴喘息、小便不利、尿閉不通等證？
(A)地龍 (B)白僵蠶 (C)蜈蚣 (D)全蠍
- 76 下列何藥色白質輕，除上焦胸膈之痰熱？
(A)白石英 (B)硼砂 (C)海螵蛸 (D)明礬
- 77 下列何藥治療冠心病，不是取其活血化瘀的功效？
(A)生山楂 (B)益母草 (C)琥珀 (D)石菖蒲
- 78 大腹皮治濕阻氣滯，脘腹痞悶脹滿，以及下列何者？
(A)五緩虛羸 (B)風蹶頑痺 (C)水腫腳氣 (D)崩中帶下
- 79 下列何藥具有制酸止痛的功效，用於泛酸胃痛？
(A)海螵蛸 (B)桑螵蛸 (C)延胡索 (D)貝母
- 80 有關麥芽的炮製對應功效，下列何者錯誤？
(A)回乳：生用、炒用均可 (B)止瀉多炒用
(C)健胃消食，疏肝和胃，宜生用 (D)生者多服，可致噁心嘔吐