

102年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3304

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 關於表達性失語症的敘述，下列何者正確？
 - 布洛卡氏區（Broca's area）受損
 - 病人不能正確接收訊息
 - 溝通時應提供多重選項讓病人回答
 - 溝通時應使用開放式問句
- 腦膜炎病人腦脊髓液檢查，最可能出現下列那些結果？①葡萄糖減少 ②蛋白質減少 ③白血球增加 ④紅血球增加
 - ①②
 - ①③
 - ②③
 - ③④
- 有關肝昏迷病人的照護，下列何者正確？
 - 密切監測血中氨（ NH_3 ）值，檢體應隔冰水冷卻，儘速送檢
 - 給予 Lactulose，以避免腸道吸收過多蛋白質
 - Neomycin 存留灌腸可避免便秘
 - 病人意識清楚時，即應給予預防性約束
- 有關胃食道逆流（GERD）病患之飲食指導，下列何者正確？
 - 多攝取高蛋白、低脂飲食
 - 多喝蕃茄汁及柳橙汁
 - 餐後 2~3 小時內維持平躺
 - 睡前可多喝奶類製品
- 引起骨髓炎最常見的細菌為何？
 - 白色念珠菌
 - 鏈球菌
 - 大腸桿菌
 - 金黃色葡萄球菌
- 下列何種心律不整，未作立即處理會有致命危險？
 - 心室纖維性顫動
 - 心房纖維性顫動
 - 右束支傳導阻滯
 - 陣發性上心室性心搏過速
- 心肌纖維長度最直接影響下列那一項生理功能？
 - 周邊動脈阻力
 - 心跳速率
 - 心臟收縮力
 - 心房舒張末期壓力
- 輸血中的病人出現呼吸急促、寒顫時，下列何者為優先處理的護理措施？
 - 安撫情緒並給予烤燈使用
 - 通知醫師，等待醫囑處置
 - 立即停止輸血，並以生理食鹽水維持管路通暢
 - 降低輸血速率並給予抗組織胺類藥物
- 陳太太懷孕 14 週，主訴近日常感覺會陰部極度發癢且有乳酪狀分泌物，診斷為陰道炎，最可能感染的細菌為何？
 - 金黃色葡萄球菌
 - A 群鏈球菌
 - 螺旋桿菌
 - 白色念珠菌
- 盤林西林皮膚試驗（penicillin skin test）陽性反應，屬於下列何者？
 - 第一型過敏反應
 - 第二型細胞毒性反應

- C.第三型免疫複合物反應
D.第四型延遲性過敏反應
- 11.教導過敏性鼻炎病人使用鼻噴劑的敘述，下列何者錯誤？
A.使用鼻噴劑前，應緩緩地由鼻腔吸吐氣
B.使用鼻噴劑前，將頭稍往後仰
C.使用鼻噴劑後，應先閉氣數秒後再吐氣
D.使用鼻噴劑後，應由鼻腔立即吐氣
- 12.血氧過低型急性呼吸衰竭病人會出現下列那些臨床表徵？①皮膚溫暖潮紅 ②視乳突水腫 ③意識混亂 ④針狀瞳孔 ⑤頭痛
A.①②
B.②③
C.③④
D.④⑤
- 13.下列何者不會使慢性腎衰竭患者產生心臟血管併發症？
A.液體容積過量
B.腎素-血管收縮素系統的刺激
C.交感神經性介質引起血管收縮
D.前列腺素過多
- 14.關於內分泌腺體的敘述，下列何者正確？
A.胰臟 β 細胞分泌胰島素
B.腎上腺髓質分泌糖皮質類固醇
C.腦下垂體後葉分泌促甲狀腺荷爾蒙
D.副甲狀腺分泌降鈣素（calcitonin）
- 15.有關副甲狀腺功能不足的診斷評估，下列何者錯誤？
A.出現沃德克氏徵象（Chvostek's sign）
B.出現特魯索氏徵象（Trousseau's sign）
C.出現高血鈣症
D.指尖與嘴的周圍出現麻刺感
- 16.有關糖尿病病人的足部護理，下列何者正確？
A.修剪趾甲時應儘量剪短
B.觀察趾甲變厚、變色，以確定黴菌感染情形
C.修剪趾甲前不宜浸泡趾甲
D.可觸診足背靜脈，以檢視足部血循環
- 17.失溫病人進行保暖回溫的過程，下列何項措施是必須的？
A.裝上心電圖監視器
B.放置導尿管
C.協助放置氣管內管
D.準備升血壓劑備用
- 18.心肌梗塞合併心因性休克病人的生命徵象如下：血壓 88 / 54 mmHg、心跳 124 次／分、呼吸 30 次／分、肺動脈楔壓（PAWP）上升及心輸出量下降，下列何者為較適當的醫療處置？
A.注射利尿劑（furosemide）
B.靜脈滴注腎上腺素
C.給予生理食鹽水輸液
D.放置氣管內管
- 19.王小弟，4 歲，因挖鼻孔時導致流鼻血，下列處置方式，何者不適當？
A.協助維持頭向上仰的姿勢
B.用冷毛巾敷於鼻樑上協助止血
C.以拇指及食指於鼻中隔上加壓約 10 分鐘
D.鼓勵將鼻血擤出而不要吞下
- 20.小華，4 歲，吃果凍時不小心吞入而造成呼吸道阻塞，以哈姆立克法進行急救處置時，下列何者最適宜？
A.維持小華直立，以手掌在小華背後肩胛骨間背部叩擊 5 下
B.維持小華頭低腳高，以手掌在小華背後肩胛骨間背部叩擊 5 下
C.站在小華後面，將拳頭拇指側向劍突下部位，快速向上重壓
D.跪在仰臥的小華足部，以手掌置於下腹部，用力往上施壓
- 21.有關嬰幼兒副食品添加的敘述，下列何者正確？
A.每次添加 2、3 種新食物，以了解嬰幼兒對食物的喜好
B.若嬰幼兒拒食可將副食品混在奶品裡一起食用

- C.添加副食品順序爲：果汁→蔬菜泥→蛋白→蛋黃
D.餵母乳的嬰幼兒宜在6個月大時添加含鐵質的副食品
- 22.有關母乳成分及其功能的敘述，下列何者錯誤？
A.母乳含較多的乳糖，可提供中樞神經系統發育之所需
B.母乳含較多的不飽和脂肪酸，可預防血管硬化
C.母乳含較多的酪蛋白，可促進胃排空
D.母乳含較多的亞麻油酸，可預防皮膚病變
- 23.牛小妹經由母親垂直感染後天免疫缺乏症候群（AIDS）；牛小妹不可接受下列那一種預防注射？
A.五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）
B.口服小兒麻痺疫苗（OPV）
C.B 型肝炎疫苗（HBV）
D.日本腦炎疫苗（JE）
- 24.有關新生兒餵食後發生反流現象之原因，下列敘述何者錯誤？
A.餵食後未排氣
B.新生兒的胃容量較小
C.新生兒的腸蠕動較慢
D.新生兒的賁門括約肌尚未成熟
- 25.將嬰兒的髖關節屈曲而做外展運動時，若出現卡嗒聲即爲先天性髖脫位，此檢查稱爲：
A.巴羅氏徵象（Barlow's sign）
B.葛氏徵象（Galeazzi's sign）
C.特倫伯氏徵象（Trendelenburg's sign）
D.歐氏徵象（Ortolani's sign）
- 26.正常新生兒的反射動作那些會持續終身？①尋乳反射 ②咳嗽反射 ③驚嚇反射 ④作嘔反射 ⑤眨眼反射
A.①②③
B.①③⑤
C.②④⑤
D.③④⑤
- 27.罹患肥厚性幽門狹窄（hypertrophic pyloric stenosis）新生兒手術後，應採取下列何種護理措施以避免嘔吐？
A.餵食時宜採平躺，不可抱起，餵食後可採右側半坐臥
B.餵食時宜採平躺，不可抱起，餵食後可採左側半坐臥
C.餵食時應將頭部稍微抬高，餵食後可採右側半坐臥
D.餵食時應將頭部稍微抬高，餵食後可採左側半坐臥
- 28.下列何種情況下，會增加核黃疸（Kernicterus）的危險性？
A.鹼中毒
B.高血糖
C.缺氧
D.發燒
- 29.丁小弟是早產兒，未矯正年齡爲 2 個月，體重 1700 公克（g），目前只喝早產兒配方奶，早產兒配方奶 30 毫升（c.c.）可提供 24 大卡（Kcal）的熱量，丁小弟一天需攝取多少量配方奶，其熱量才足夠？
A.212 毫升（c.c.）
B.234 毫升（c.c.）
C.244 毫升（c.c.）
D.255 毫升（c.c.）
- 30.下列何種膽紅素過高，是造成核黃疸發生的原因？
A.水溶性的結合膽紅素
B.脂溶性的結合膽紅素
C.水溶性的未結合膽紅素
D.脂溶性的未結合膽紅素
- 31.下列何者爲新生兒壞死性腸炎的臨床表徵？①腸蠕動增加 ②嘔吐物未含膽汁 ③呼吸暫停 ④腹脹、腹瀉合併血便
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
- 32.朱小弟，1 歲 3 個月，因持續發燒、口腔黏膜發紅破損而入院，醫師診斷爲川崎氏症（Kawasaki

- disease)，給予高劑量靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immune globulin）治療，下列護理措施何者錯誤？
- A.注射免疫球蛋白時需觀測血壓變化
 - B.密切觀察腦神經病變之合併症狀
 - C.需合併阿斯匹林的治療，以控制症狀
 - D.衛教家屬 6 個月內不可接種疫苗
33. 個月大的安安接受發展篩檢評估時，下列何者為其不尋常的反應？
- A.聽到聲音會驚嚇、變安靜或睜大眼睛
 - B.仰躺時雙手會在胸前互相靠近
 - C.身體仰躺時雙手手掌均能自然地張開，不再一直緊握
 - D.即使跟他玩，他也很少發出聲音
34. 有關嬰幼兒缺鐵性貧血的敘述，下列何者錯誤？
- A.嬰幼兒只哺餵母乳或配方奶時，容易缺乏鐵質
 - B.以口服鐵劑治療時，避免與牛奶及制酸劑同時服用
 - C.補充鐵劑需與維生素 E 合用，可促進鐵質吸收
 - D.嬰幼兒長期的缺鐵性貧血，可能導致生長發展遲滯
35. 有關囊性纖維病變（cystic fibrosis）的敘述，下列何者正確？
- A.是一種體染色體顯性遺傳疾病
 - B.是一種體內酵素改變，致使外分泌腺功能障礙之疾病
 - C.主要是侵犯皮膚及神經系統的遺傳性疾
 - D.主要是好發於嬰幼兒，會隨年齡增加而逐漸改善
36. 劉太太目前懷孕 10 週但仍每日抽一包香菸，護理師衛教抽菸對胎兒的影響，劉太太表示：「自己一直都能控制抽菸的量，不會對孩子有不好的影響。」劉太太是使用何種防衛機轉？
- A.隔離（isolation）
 - B.壓抑（suppression）
 - C.否認（denial）
 - D.內射（introjection）
37. 王太太懷孕 20 週產檢時發現空腹血糖為 200 mg/dL，於會談時抱怨自己很糟糕，不會成為好母親，並常覺得先生在外面有女朋友，自己都沒有辦法專心工作。護理師應優先處理何種問題？
- A.糖尿病問題
 - B.自我概念困擾
 - C.與先生互動關係
 - D.工作能力障礙
38. 莊太太懷孕 34 週卻發現胎兒死亡，目前已完成引產手術，住院中先生和婆婆雖來訪，但他們之間幾乎沒有交談，下列何種溝通策略較為適宜？
- A.請家屬先回家，以免影響莊太太情緒
 - B.進一步與莊太太及家屬會談，評估並瞭解問題癥結
 - C.清官難斷家務事，讓家屬與莊太太自然互動
 - D.待家屬離去，再給予莊太太更多心理支持
39. 陳太太 45 歲，因罹患精神分裂症，須長期接受藥物及復建治療而無法繼續她在銀行的工作。若依艾瑞克森（Erikson）理論所提到的發展任務與危機，此階段她可能面臨的情況為何？
- A.勤勉與自卑
 - B.認同與角色混淆
 - C.親密與疏離
 - D.生產與停滯
40. 有關防衛機轉的敘述，下列何者正確？
- A.防衛機轉存在於意識狀態中
 - B.防衛機轉是自我用來解決內心衝突或焦慮的心理過程
 - C.只有精神病人才會使用防衛機轉
 - D.防衛機轉的使用有礙人格成熟
41. 有關全民健保給付的項目，下列何者錯誤？
- A.人工協助生殖技術
 - B.血液透析治療
 - C.0~6 歲兒童預防保健
 - D.山地離島地區的就醫
42. 周太太罹患糖尿病，公共衛生護士家訪時，發現她已懷孕 16 週，此時最優先的護理措施為何？
- A.協助血糖控制於理想值範圍內
 - B.詢問母乳哺餵之準備

- C.產前運動之規律性
 - D.鼓勵羊膜穿刺了解胎兒是否正常
- 43.社區衛生護士常需與個案及案家訂定契約，以便確立問題，訂定問題優先順序，並擬定具體照護策略。下列對於契約的敘述何者最合適？
- A.契約是具動力性，其增加了護理人員與個案互動的明確性
 - B.契約中應強調長期照護的目標，以增強個案的合作度
 - C.契約書應以醫療專業照護的語句描述，以展現專業化
 - D.契約中應把護理專業列為主要解決的目標
- 44.近年來台灣人口素質的改善，主要是透過加強下列何種措施達成？
- A.優生保健服務
 - B.長期照護福利措施
 - C.全民健保納保人口提升措施
 - D.國民教育的普及與實施
- 45.在分析流行病學研究方法中，針對一群健康者，根據其危險因子的暴露量追蹤比較這些世代日後的發病情形，此種方法稱為？
- A.前瞻法 (prospective study)
 - B.回溯法 (retrospective study)
 - C.橫斷法 (cross-sectional study)
 - D.病例對照研究法 (case-control study)
- 46.世代研究法有下列何種缺點？
- A.費用較高
 - B.樣本數較小
 - C.易有記憶上的偏差
 - D.只可得知相對危險性
- 47.產後婦女參加團體運動課程時，下列何者屬於衝擊評值（impact evaluation）的指標？
- A.參與的產後婦女出席人數
 - B.身體質量指數下降人數
 - C.產後婦女對運動的態度
 - D.計畫執行期間的預算及人力投入
- 48.社區健康營造的內在推力，下列何者正確？
- A.社會傳播助力
 - B.社區健康自覺
 - C.國家政策支持
 - D.國際趨勢與潮流
- 49.下列那一種工具，最適合評估家庭與外在系統之連結情形？
- A.生活改變事件評值表
 - B.家庭生態圖（eco-map）
 - C.APGAR 家庭評估表
 - D.家庭發展階段評估
- 50.有關社區健康營造志工管理之團體動力原則，下列何者錯誤？
- A.規畫固定的志工階層
 - B.創造志工歸屬感
 - C.營造志工成就感
 - D.強化志工被需要感