

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、根據 Ingram (2001) 之看法，請討論脆弱性 (vulnerability) 與心理疾患間之關係。
回答時，請依據下述三重點分別說明：

(一)何為脆弱性 (vulnerability)？(10 分)

(二)脆弱性與危機 (risk) 間的關係？(5 分)

(三)脆弱性與復原力 (resilience) 間的關係？(5 分)

二、說明臨床心理師可由那些角度來看偏差行為之成因，各舉一偏差行為之例，且提出
相關研究來說明之。

(一)請列出三種臨床心理學常見的偏差行為成因的取向或觀點。(9 分)

(二)分別就每一取向或觀點列舉一個偏差行為或心理疾患種類。(6 分)

(三)請就各該取向或觀點的例子，進一步描述相關研究或發現 (包括：假設、研究方法、主要發現)。(15 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：2107

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 因社交畏懼症導致無法找到適合的工作，符合下列何項偏差行為的定義？①個人受苦感 ②偏離文化常態
③生理證據 ④失功能 (harmful dysfunction)
(A)①③ (B)②④ (C)①④ (D)②③
- 2 Transvestism 要符合變態行為的條件是必須加上下列何者？
(A)偏離常模 (violation of norms) (B)個人受苦感 (personal distress)
(C)殘障或失功能 (disability or dysfunction) (D)非預期性 (unexpectedness)
- 3 下列何者不是 Robins 與 Guze (1970) 指出建立一個症候群 (syndrome) 的診斷效度所需經過的必要歷程？
(A)追蹤研究 (follow-up studies) (B)實驗室研究 (laboratory studies)
(C)跨國研究 (cross-nation studies) (D)家庭研究 (family studies)
- 4 關於臨床心理師專業規範 (Professional Regulation) 的描述，下列何者錯誤？
(A)專業規範是為了保障公眾利益
(B)取得執照 (Licensing) 是專業規範的方式之一
(C)授予證書 (Certification) 是專業規範的方式之一
(D)一般來說，授予證書的法律效力大於取得執照
- 5 下列有關類別分類 (categorical classification) 與向度分類 (dimensional classification) 診斷系統之敘述，
何者錯誤？
(A) DSM 診斷中第一軸與第二軸為類別分類
(B)類別分類診斷可提供臨床工作者明確的治療依據
(C)不符合診斷類別的個案無法接受臨床治療
(D) DSM-V 將會把向度分類取向加入在對人格疾患的診斷中

- 6 在衡鑑及診斷偏差行為時，應盡量降低文化偏誤（culture bias），下列敘述何者錯誤？
(A)衡鑑工具應透過多位翻譯者進行反向翻譯（back translation），以確認是否適用於不同語言文化
(B)將個案轉給和個案相同文化背景的臨床心理師進行衡鑑及診斷
(C)應多花些時間和個案建立關係，以降低刻板印象
(D)形成多元假設，蒐集多元資料，逐步驗證再形成推論
- 7 若確認某種治療介入確實有其治療效果，且對實驗情境之外的其他對象，亦具有治療效果，顯示此類療效研究具有下列何者？
(A)內效度 (B)外效度 (C)安慰劑效果 (D)模擬效果
- 8 有關個案研究（case studies）的敘述，下列何者錯誤？
(A)個案不僅限於一個人，可以是一個家庭、機構、族群、社團、學校…等為單位
(B)藉由對已選定的個案仔細地進行資料蒐集與分析，並從中獲得結論
(C)研究過程強調獨變項和依變項關係間的操弄
(D)研究結果無法提供因果關係之探討
- 9 對於臨床心理學採用相關研究法的敘述，下列何者錯誤？
(A)許多變項難以完全以實驗法控制，故研究常採用相關法探討其中關係
(B)相關法須考慮第三變項可能造成的混淆效果
(C)相關法無法回答因果關係
(D)利用迴歸分析法可以控制干擾變項也可回答因果關係
- 10 在預防性研究中，針對高危險群個案進行早期介入，以避免他們未來發生問題，這是屬於下列那一類策略？
(A)正向發展策略（positive development strategies）
(B)全面性預防策略（universal prevention strategies）
(C)選擇性預防策略（selective prevention strategies）
(D)特定性預防策略（indicated prevention strategies）
- 11 單一受試者設計（single-subject designs）中，關於基準線階段（baseline stage）之敘述，下列何者正確？
(A)可直接提供操控變項是否具介入效果之訊息
(B)提供受試者間主要差異之訊息
(C)提供受試者完整的豐富訊息
(D)提供尚未操控變項之前，有關受試者行為表現之訊息
- 12 下列關於知情同意（informed consent）的敘述，何者錯誤？
(A)即使同意研究進行，如有不適，仍然隨時可拒絕研究的進行
(B)臨床上有必要確定患者是否真的「知情」，再進行研究
(C)知情同意已成為必須的研究倫理要求
(D)由於認知功能缺損，並不需要讓失智症患者本人簽知情同意書
- 13 研究顯示（Kessler et al., 2005）有 6.6% 的女性，在一生中曾被診斷為廣泛性焦慮疾患。這種資料稱為：
(A)發生率（incidence） (B)危險因子（risk factor）
(C)流行率（prevalence） (D)中介因子（mediator）
- 14 有關臨床研究方法的敘述，下列何者正確？
(A)為檢驗某種治療的效果，除了檢視其治療後的統計顯著性，尚需考慮其臨床顯著性（clinical significance）
(B)父母婚姻衝突和兒童問題行為之間呈現顯著相關，表示父母衝突越多則兒童越容易出現問題行為
(C)流行病學研究中為了解某些疾病的危險因子，常透過個案研究法得知
(D)發生率（incidence）是指單一時間點或一段時間內，罹患疾病人數占總人口數的比例
- 15 張同學在教學醫院實習時，看到急診室送進了一位病人，主治醫師依據家屬的報告在病歷上描述病人在使用某種不明物質後出現攻擊性行為，主治醫師注意到病人步態不穩、眼球震顫，但是身上並無明顯酒精或揮發性吸入劑的氣味，主治醫師認為該病人可能是在使用該不明物質後產生了中毒現象，則該不明物質不可能為下列何者？
(A)安非他命（Amphetamine） (B)鎮靜劑（Sedatives）
(C)催眠劑（Hypnotics） (D)抗焦慮劑（Anxiolytics）
- 16 與情感性疾患（Mood Disorders）中的憂鬱症狀有關且較為常見的一般醫學情況，是下列何者？
(A)腎上腺功能低下（hypoadrenalism） (B)腎上腺功能亢進（hyperadrenalism）
(C)甲狀腺功能低下（hypothyroidism） (D)甲狀腺功能亢進（hyperthyroidism）

- 17 依據盧易亞（Luria）對大腦中央後溝回（postcentral gyrus）的敘述，下列何者錯誤？
(A)該區的細胞具有特定排列（topologically arranged）之特性
(B)該區主要功能是調控皮質基調（cortical tone）
(C)該區大多是感道特定性（modality-specific）的細胞
(D)該區主要是第四層傳入的神經元（neurons of afferent layer IV）
- 18 有關大腦白質（white matter）與灰質（grey matter）的敘述，下列何者較適當？
(A)灰質負責大腦神經細胞間的聯繫，是人類認知功能統整的重要機制
(B)灰質負責大腦神經細胞的營養和固定，是人類神經統整的重要資源系統
(C)所謂「白質受損」意指聯繫神經細胞間的系統在傳遞訊息上呈現異常
(D)大腦皮質中，白質與灰質所占的比例約為 3:2
- 19 下列何者不是品行疾患（conduct disorder）常見之神經認知功能缺損？
(A)記憶力（memory）
(B)問題解決（problem-solving）
(C)視空間知覺（visuospatial perception）
(D)口語技巧（verbal skills）
- 20 有關躁鬱症的病理因素，下列何者正確？
(A)背外側前額葉（dorsolateral prefrontal cortex）異常
(B)下頂葉（inferior parietal lobule）異常
(C)基底核（basal ganglia）異常
(D)可體松（cortisol）分泌過低
- 21 研究結果顯示額葉因後天經驗而明顯改變的最重要時期為何？
(A)出生前
(B)國小階段
(C)青少年期
(D)成年期
- 22 下列何者不是神經元（Neuron）的主要部分之一？
(A)細胞本體（cell body）
(B)神經傳導素（neurotransmitter）
(C)樹突（dendrites）
(D)軸突（axons）
- 23 當我們面對壓力的反應時，因體質的因素，常出現對生理訊息的錯誤知覺（如心跳太快，可能不能負荷），而產生習得警報（learned alarms），這種論述，常出現在陳述何類型的心理疾患？
(A)憂鬱疾患（Depressive disorder）
(B)恐慌疾患（Panic disorder）
(C)飲食疾患（Eating disorder）
(D)分離焦慮疾患（Separation Anxiety disorder）
- 24 根據 Harvey 等人（2004）對推理功能的心理病理學實徵研究整理，認為何種心理疾患的推理歷程較少被關注？
(A)社交畏懼症（Social phobia）
(B)廣泛焦慮疾患（GAD）
(C)精神疾患（Psychotic disorder）
(D)睡眠疾患（Sleep disorder）
- 25 依據 Harvey 等人（2004）的整理，有關創傷後壓力疾患的記憶偏誤，下列何者錯誤？
(A)外顯記憶會出現與創傷相關記憶的偏誤
(B)僅內隱記憶明顯受損
(C)出現過度類化的記憶偏誤
(D)一再出現侵入式的創傷相關記憶
- 26 DSM 系統對於精神疾病進行分類所依據的主要取向為何？
(A)症候群取向（syndrome approach）
(B)功能取向（functional approach）
(C)向度取向（dimensional approach）
(D)折衷取向（eclectic approach）
- 27 下列何種症狀在兒童創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder）患者常見，但在成人患者則比較少見？
(A)睡眠問題
(B)躁動（agitation）
(C)無望感（hopelessness）
(D)情境再現（flashbacks）
- 28 依據 A. Harvey 等人之理論，下列那兩種思考歷程，是已證實屬於跨診斷取向的重要歷程（definite transdiagnostic processes）？
(A)正負向後設認知信念（positive and negative metacognitive beliefs）與思考壓抑（thought suppression）
(B)重覆性思考（recurrent thinking）與來源監控異常（Deficits in source monitoring）
(C)重覆性思考（recurrent thinking）與正負向後設認知信念（positive and negative metacognitive beliefs）
(D)思考壓抑（thought suppression）與後設認知覺察（Metacognitive awareness）
- 29 根據 DSM-IV-TR，下列有關怪異群組的人格疾患（odd/eccentric cluster）的家族研究發現，何者正確？
(A)基因於此類人格疾患扮演重要角色
(B)基因與此類人格疾患無關
(C)精神分裂症與此類人格疾患之間的關係並無定論
(D)相較於妄想性人格疾患（paranoid personality disorder），基因在類分裂性人格疾患（schizoid personality disorder）扮演較重的角色

- 30 關於「心理病態」(psychopathy)的描述，下列何者正確？
(A)較缺乏習得之恐懼反應 (B)習得之恐懼反應較一般人強烈
(C)抑制衝動的能力與一般人無異 (D)抑制衝動的能力較一般人強烈
- 31 下列何者為妄想性人格疾患、類分裂性人格疾患、分裂病性人格疾患的共同特徵？
(A)焦慮、害怕 (B)戲劇化、不穩定
(C)古怪、偏離常態 (D)過度理性、缺乏人際界限

情況：珍妮過分以身材及體重來進行自我評價，因此她以控制身材及體重來增強對自己的正向感受。珍妮通常以十分嚴厲的方式來限制自己的飲食，但由於方法過於嚴厲，最後總是失敗。失敗時她常出現暴食行為，且在暴食後常進行催吐，暫時減低她對因暴食可能造成體重增加的焦慮，但她也因失敗控制自己的飲食，而強化自己原有的低自尊，此低自尊進而引發珍妮日後持續以嚴厲方式來控制自己的飲食，但珍妮在飲食控制失敗時，又再進行暴食，且在暴食之後又繼續出現催吐行為，於是再感到低自尊，如此不斷的惡性循環下去。依此回答下列第 32 題至 33 題。

- 32 根據 DSM-IV-TR，珍妮最有可能為：
(A)強迫性人格疾患 (obsessive-compulsive personality disorder) 患者
(B)畏避性人格疾患 (avoidant personality disorder) 患者
(C)心因性厭食症 (anorexia nervosa) 患者
(D)心因性暴食症 (bulimia nervosa) 患者
- 33 文中的敘述方式，下列何者最適合來解釋珍妮目前呈現問題行為的心理病理？
(A)認知行為 (B)特質論 (C)心理動力論 (D)案主中心論
- 34 下列何者為邊緣性性格疾患 (borderline personality disorder) 的可能成因？
(A)具穩定的情緒反應 (emotion reactivity)
(B)可能為遺傳來的生理基礎與生活中遭遇到的壓力事件（例如：兒童時期的創傷經驗）交互作用之結果
(C)內分泌系統 (endocrine system) 失調
(D)小腦發展的不完全
- 35 有關兒童青少年雙極症 (bipolar disorder) 與憂鬱症的敘述，下列何者錯誤？
(A)過去兒童雙極症的診斷較少，其原因之一是不易與 ADHD 區分
(B)兒童或青少年雙極症的診斷標準與成人相同
(C)兒童青少年的憂鬱症狀與成人不同之處在於前者有較多罪惡感
(D)憂鬱症狀中的早醒、起床憂鬱、食慾與體重下降，兒童青少年皆和成人相同
- 36 下列有關 ADHD 的藥物治療，何者錯誤？
(A)大約有七成的 ADHD 兒童接受藥物治療能改善其不專注及過動衝動行為
(B)藥物治療對提升 ADHD 兒童的學業成績具有直接效果
(C)治療 ADHD 的中樞神經興奮劑可能造成心血管疾病之副作用
(D)治療 ADHD 的中樞神經興奮劑可能造成胃痛或失眠之副作用
- 37 當一位正常發展中的兒童，最近生活上出現「容易爭執、要求多、不聽話又專注力不足，常容易害怕又容易顯得好動，也會對上床睡覺有不同意見」，則這名孩童，應該是幾歲？
(A) 1 歲 (B) 3 歲 (C) 8 歲 (D) 10 歲
- 38 研究顯示老年人自殺與成年人相比較，下列何者正確？
(A)老年人容易透露自殺意念 (B)老年人的自殺方式較為平和
(C)老年人的自殺率與年輕人無異 (D)老年人的生理問題是自殺的重要危險因子
- 39 媛媛的母親是重鬱症患者，媛媛平日雖然想法較為灰色，但仍頗能勝任科學園區工程師的工作，並未符合任何精神科診斷。但數月前因母親車禍重傷，又逢景氣不佳、公司業務下滑，媛媛被列入休「無薪假」的名單，她才出現食慾與睡眠欠佳、心情低落等症狀，且持續一陣子。求助精神科後被醫師診斷為「重鬱症」。關於媛媛之病因，下列何者正確？
(A)「母親是重鬱症患者」乃媛媛患病之主要壓力因素
(B)「母親車禍重傷」乃媛媛患病之主要壓力因素
(C)「平日想法較灰色」乃媛媛患病之主要壓力因素
(D)「食慾與睡眠欠佳」乃媛媛患病之主要壓力因素
- 40 建功在大學畢業後入伍服役，未料在入伍兩個月後出現怪異的行為和幻覺，家人質疑建功的異常是「軍中長官要求過於嚴格」所致。家人最可能將此精神症狀歸因於下列何種因素？
(A)素質 (B)壓力 (C)情緒 (D)認知