

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

等 別：高等考試
類 科：臨床心理師
科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病
之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)
考試時間：2 小時 座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、你接到一個 10 歲男孩的心理治療轉介單，診斷是 ADHD-combined type，主要的問題有兩個：(1)干擾課堂，例如老師尚未說完話就搶著回答問題，或者上課中不時找旁邊的同學說話；(2)人際關係不佳，容易跟同學起衝突，例如跟同學玩的時候不肯輪流所以同學不跟他玩，或者同學走向他輕輕拍他的肩膀叫他，卻被他反手打回來而且跟同學吵起架來等。請問依據有關 ADHD 的臨床特徵，你如何安排心理衡鑑以蒐集完整資料？你會有什麼心理病理成因假設或個案概念化 (case formulation)？根據你的病因假設或個案概念化，你會如何進行心理治療？(20 分)
- 二、請說明雙極性疾患的臨床特徵與社會及心理病因因素，並說明如何進行心理治療。(15 分)
- 三、心理師法對臨床心理師業務內容主要分為：「(1)一般心理狀態及功能之心理衡鑑，(2)心理發展、社會適應或認知、情緒、行為等偏差與障礙之心理諮商及心理治療，(3)精神官能症之心理諮商及心理治療，(4)精神病之心理衡鑑及心理治療，(5)腦部心智功能之心理衡鑑及心理治療」。請問何謂腦部心智功能？請你以失智症為例說明，並進一步說明相關的心理衡鑑與心理治療。(15 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：5107

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 有關額顳葉失智症 (Frontotemporal dementia) 之描述，下列何者正確？
(A)知覺功能明顯改變 (B)執行功能明顯改變
(C)語言功能明顯改變 (D)動作功能明顯改變
- 有關輕度知能障礙 (Mild Cognitive Impairment) 之解說，下列何者正確？
(A)即為所謂的老年性良性健忘 (Benign senescent forgetfulness)
(B)即為所謂的「年齡相關性知能減退」(Age Related Cognitive Decline, ARCD)
(C)日常生活中，病患在例行性的工作任務或社會互動環境並無影響
(D)常被視為退化性症狀與失智症之過渡期
- 下列何者不是失智症必要的診斷標準？
(A)心智功能下降並足以影響其工作與社交生活之晤談證據
(B)神經細胞加速退化死亡之生理檢查證據
(C)記憶功能障礙之衡鑑證據
(D)有抽象思考、判斷力或其他高級大腦皮質功能損害之衡鑑證據

- 4 你準備對中期 Alzheimer's Disease 患者與家屬進行復健心理諮詢，下列何者應是較不合適的假設和方式？
(A)以簡要的語言說明認知功能與情緒功能間息息相關，以理解患者萬一認知監控不當可能引發衝動而攻擊家人
(B)建議家屬以尊重和同理心來整理一下家居空間，讓患者能過他適合的簡單生活方式
(C)以事先準備的簡要失智症衛教手冊來解釋病程，進行家庭情緒支持，詢問是否有轉介長照評估之需求
(D)建議患者和家屬與朋友共同進行近期生命經驗之整理，領悟生活中的豐富和趣味
- 5 譫妄患者較可能有下列何病史？
(A)暴飲暴食 (B)自殺意念 (C)多重人格 (D)物質濫用
- 6 有關對譫妄患者常有的妄想現象之描述，下列何者正確？
(A)兒童患者比成年患者較少發生妄想現象
(B)老年和兒童患者發生妄想時，經常被家人誤解為無理取鬧
(C)患者所產生的妄想，經常有長時間持續發生的情況
(D)譫妄症狀緩解時，患者可以記得妄想與幻想之內容
- 7 中風的吳老先生被轉介給臨床心理師進行心理衡鑑。臨床心理師實施 MMSE，發現很難得到確定的答案，得分勉強計為 3 分。衡鑑過程中，他很無力地顯露少量反應，偶會點頭，身體略微晃來晃去，偶會低頭喃喃發音但聽不出意義，偶爾似乎以揮手方式要拒絕配合衡鑑歷程。則其鑑別診斷應以下列何者為優先？
(A)以情緒問題為主的憂鬱症 (B)以認知與記憶問題為主的失智症
(C)以人際與情境為主的環境適應問題 (D)以生理狀況影響為主的譫妄
- 8 下列何者是後向失憶症（Retrograde amnesia）最常見的特徵？
(A)無法記得受傷後發生的事件 (B)無法記得受傷前發生的事件
(C)無法記得自己的名字 (D)無法記得家人的名字
- 9 有關暫時性一般失憶症（Transient general amnesia）的敘述，下列何者正確？
(A)有些許後向失憶症（Retrograde amnesia）存在
(B)除記憶功能之外，其他認知功能亦有明顯缺損
(C)僅有非語文記憶（Non-verbal memory）呈現損傷
(D)立即性記憶（Immediate memory）明顯受損
- 10 關於血管瘤破裂造成的失憶症（Aneurysmal amnesia）敘述，下列何者錯誤？
(A)再認（Recognition）的表現常會比自由回憶（Free recall）來的好
(B)因蜘蛛網膜下腔出血（Subarachnoid haemorrhage, SAH）造成
(C)常跟前交通動脈動脈瘤（Anterior communicating artery aneurysm）有關
(D)因硬腦膜下出血（Subdural haemorrhage, SDH）造成
- 11 DSM-IV-TR 中的認為患者呈現出的認知、身體與行為的症狀，需要於受傷後至少持續幾個月，才可診斷為腦震盪後疾患（Postconcussional disorder）？
(A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 12
- 12 下列可能造成神經認知功能損傷的疾病中，何者並不涉及到皮質下（Subcortical）的腦部異常？
(A)阿茲海默氏症 (B) HIV 相關疾患 (C)帕金森氏症 (D)杭丁頓氏症
- 13 針對注意力缺失／過動疾患兒童在教室的問題行為處理，下列何者不屬於教育介入常見的處理技巧？
(A)以反應代價程序（response-cost procedures）做為在教室問題行為出現的負向後果
(B)以提供視覺提示，協助在教室環境出現的適當行為
(C)以文字或是口頭指導的方式，幫助留意及記得重要事項
(D)以口頭方式，僅交代回家作業一次，來訓練專注力
- 14 根據 Frick 等人（1993）在品行問題（conduct problems）上的分類描述，兒童若持續且常挑起打架行為，下列何者正確？
(A)衝動性－過度反應行為問題 (B)衝動性－破壞性行為問題
(C)外顯性－破壞性行為問題 (D)外顯性－過度反應行為問題
- 15 有關父母處理訓練（parent management training）運用在品行問題的治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)教導父母如何在家或是在其他場合改變孩子的行為
(B)使用後果處理技術（contingency management techniques）
(C)著重在改善親子互動關係及增加父母管教技巧
(D)著重在提供父母有效的學校及社會資源（例如：司法服務和特殊教育）

- 16 ADHD 兒童常出現注意力分散 (distractibility) 之缺陷，這是指下列何者？
(A)警戒度 (alerting) (B)警覺度 (vigilance)
(C)選擇性注意力 (selective attention) (D)注意力的容量 (attentional capacity)
- 17 下列何者是「主要為不注意型 (predominantly inattentive type)」的 ADHD 患者有較高機率出現的共病？
(A)智能遲緩 (B)情感性疾患 (C)飲食障礙 (D)自閉症
- 18 一位 11 歲的男童，最近這 4 個月來，常出現打架，對小動物施以殘暴動作，闖入商店偷竊並開始逃學蹺課，這些行為讓身邊的大人非常困擾，男童的功課亦一落千丈，這樣的問題，臨床上認為是：
(A) CD (B) ODD
(C) ADHD (D) Disruptive behavior disorder not otherwise specified
- 19 有關學習障礙的敘述，下列何者正確？
(A) Learning disorder 與 learning disability 指稱不同的學習問題
(B) DSM-IV-TR 指出，智能不足患者中不可能合併學習障礙
(C) DSM-IV-TR 指出，注意力缺陷患者中不可能合併學習障礙
(D)學習障礙必須透過標準化的學業成就測驗 (如閱讀、數學等) 檢測
- 20 關於智能不足的治療與預防，下列何者錯誤？
(A)目前沒有任何有關智能不足的有效治療方案
(B)藥物治療可以改善兒童的攻擊、自傷行為
(C)透過衛教教導母親於懷孕期避免酒精、藥物、鉛中毒等
(D)父母需要接受行為改變技巧訓練
- 21 依據 DSM-IV-TR，輕度智能不足之發展特徵敘述，下列何者錯誤？
(A) 90%可在學齡前期被發現 (B)在學齡期之學業功能表現顯著較差
(C)感官運動領域發展無明顯或只有輕微缺陷 (D)到成年期，在適當的支持下，可在社區獨立生活
- 22 關於自閉症的敘述，下列何者錯誤？
(A)男性：女性大約等於 3~4:1
(B)高功能自閉症之男性：女性大約等於 10:1
(C)極重度智能不足自閉症之男性：女性大約等於 1:1
(D)女童患者智力功能通常較男童患者優秀
- 23 下列何者不是自閉症兒童的社交缺陷？
(A)觀看人臉時，通常只著重局部而非全臉 (B)難以辨識臉部表情，特別是生氣情緒
(C)通常把人當作物品，而非社交同伴 (D)他們表達情緒的肢體動作或臉部表情較僵化奇怪
- 24 關於正常發展中的害怕 (fear)，像是怕黑、怕小動物等，一般認為是從多大時開始就會出現？
(A) 6 個月 (B) 7~12 個月 (C) 2 歲 (D) 6 歲
- 25 下列何種類型的兒童焦慮疾患，他們大都合併有社交焦慮的問題？
(A)強迫性疾患 (B)選擇性緘默疾患 (C)分離焦慮疾患 (D)廣泛性焦慮疾患
- 26 有關兒童及青少年焦慮疾患的異常神經生物機轉，下列何區域較無關？
(A)枕－顳葉迴 (Occipital-temporal gyri) (B)杏仁體 (Amygdala)
(C)藍斑核 (Locus ceruleus) (D)顳上迴 (Superior temporal gyrus)
- 27 關於兒童青少年憂鬱症的治療，美國 FDA (Food and Drug Administration) 認為 SSRI 藥物可能有的問題而一度要求警告的是下列何者？
(A)嗜睡 (B)增胖 (C)自殺意念及行為 (D)藥效有限
- 28 關於兒童青少年期的重鬱疾患 (Major depressive disorder) 與低落性情感疾患 (Dysthymic disorder) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)重鬱疾患 (MDD) 的流行率多於低落性情感疾患 (Dysthymic disorder)
(B)重鬱疾患 (MDD) 的初發年齡早於低落性情感疾患 (Dysthymic disorder)
(C)低落性情感疾患 (Dysthymic disorder) 常有非情感性疾患的共病
(D)重鬱疾患 (MDD) 常有性格疾患的共病

- 29 檢驗精神分裂病患者的腦脊髓液，製造下列何者的酵素往往被發現有低落的現象？
(A)正腎上腺素（norepinephrine） (B)同半胱胺酸（homocysteine）
(C)高香草酸（homovanillic acid, HVA） (D)谷氨酸（glutamate）
- 30 下列何種治療典範，最需要仰賴跨領域專業團隊（multidisciplinary team）的協調與合作？
(A)個案管理（Case management） (B)認知行為治療
(C)社交技巧訓練 (D)家族治療
- 31 安非他命使用者往往會出現類似精神分裂病的症狀，下列何者可做為鑑別安非他命誘發精神病與精神分裂病兩者的依據？
(A)妄想的内容 (B)是否出現幻覺
(C)是否出現刻板化行為 (D)是否有明顯的負性症狀
- 32 某精神分裂病患者妄想的内容之一為相信他的小孩已被某人取代。此現象被稱為：
(A) Cotard's syndrome (B) Capgras syndrome
(C) Gerstmann syndrome (D) Kosakoff syndrome
- 33 據近期的研究結果（MacDonald & Chafee, 2006），精神分裂病患者腦部 N-Methyl-D-aspartate（NMDA）受體（receptor）的缺陷除了與認知功能缺損有關外，尚與下列何種症狀有關？
(A)幻覺 (B)妄想
(C)情感平板（flat affect） (D)混亂（disorganization）
- 34 有學者主張，聽幻覺的產生主要是因個人將自己的語音誤認為是來自他人所致。依據生理心理或腦造影研究，發現下列何者？
(A)額葉與頂葉之間的連結有缺損 (B)額葉與下皮質區之間的連結有缺損
(C)額葉與顳葉之間的連結有缺損 (D)額葉與枕葉之間的連結有缺損
- 35 依 DSM-IV-TR，有關快速週期特性說明（Rapid-Cycling Specifier）之敘述，下列何者錯誤？
(A)可適用於第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder）或第二型雙極性疾患（Bipolar II Disorder）
(B)診斷準則為在最近 1 年內，至少出現 4 次情感障礙的發作
(C)若在混合發作（Mixed Episode）後立即接著出現躁狂發作（Manic Episode），即為 2 次發作
(D)在快速週期模式的個案中，女性約占 7 至 9 成
- 36 有關躁症的神經傳導物質之研究發現，下列何者正確？
(A)正腎上腺素（norepinephrine）過低與多巴胺（dopamine）過高
(B)正腎上腺素（norepinephrine）與血清素（serotonin）皆過高
(C)正腎上腺素（norepinephrine）過高與血清素（serotonin）過低
(D)多巴胺（dopamine）與血清素（serotonin）皆過低
- 37 有關成人循環性情感疾患（Cyclothymic Disorder）之診斷特質敘述，下列何者正確？
(A)初發 2 年內，任何無症狀的時期從未超過 2 個星期以上
(B)初發 2 年內，可有重鬱或躁狂發作
(C)在初發的 2 年以後，若出現躁狂發作，可加作第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder）的額外診斷
(D)有此診斷之患者，可以同時診斷為分裂情感性疾患（Schizoaffective Disorder）
- 38 依 DSM-IV-TR，輕躁狂發作的最低期間要求為：
(A) 2 天 (B) 4 天 (C) 5 天 (D) 7 天
- 39 最常見的妄想性疾患（Delusional disorder）的類型為：
(A)色情狂型（Erotomantic Type） (B)自大型（Grandiose Type）
(C)嫉妒型（Jealous Type） (D)被迫害型（Persecutory Type）
- 40 王先生首先出現妄想與幻覺症狀 1 個月，接著此症狀與重鬱發作同時持續 3 個月，當重鬱發作完全結束後，妄想與幻覺仍持續 1 個月，則最適當的診斷為何？
(A)分裂情感性疾患（Schizoaffective Disorder）
(B)伴隨精神病性特質之情感性疾患（Mood Disorder with Psychotic Features）
(C)類精神分裂性疾患（Schizophreniform Disorder）
(D)精神分裂病