

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：2114
頁次：8-1

等 別：相當專技高考
類 科：語言治療師
科 目：神經性溝通障礙學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。


(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何種疾病與失語症之間的關聯性最受爭議？
(A)腦血管意外 (B)失智症 (C)腦腫瘤 (D)腦外傷
- 2 最終共同路徑 (final common pathway) 受損可能會出現那些臨床徵狀？
(A)肌肉痙攣 (spasticity) (B)肌陣攣 (clonus)
(C)肌束顫動 (fasciculations) (D)巴賓斯基徵兆 (Babinski's sign)
- 3 下列關於腦膜之敘述，何者最為適當？
(A)由腦部之外而內依序為：軟腦膜 (pia mater)、蜘蛛膜 (arachnoid)、硬腦膜 (dura mater)
(B)軟腦膜為一層透明薄膜，不含任何血管
(C)蜘蛛膜與軟腦膜緊密結合，不形成腔室，以提供大腦足夠保護
(D)硬腦膜靜脈竇是由兩層硬腦膜形成的腔室，匯集大腦的靜脈血
- 4 基底神經節中的紋狀體 (striatum) 包含下列那兩個構造：①putamen ②globus pallidus ③subthalamic nucleus ④caudate nucleus ⑤substantia nigra
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)④⑤
- 5 基底神經節迴路受損的臨床徵狀中，不包含下列何項？①resting tremor ②bradykinesia ③intention tremor ④dysmetria ⑤chorea ⑥muscular atrophy
(A)①④⑥ (B)③④⑥ (C)①②⑤ (D)②③④
- 6 造成出血性中風 (hemorrhagic stroke) 之可能病因中，通常不包含下列何者？
(A)血栓形成 (thrombosis) (B)動脈瘤 (aneurysms)
(C)高血壓 (hypertension) (D)動靜脈畸形 (arteriovenous malformations)
- 7 某一小塊血凝塊游離於血液循環系統中，最後停留、栓塞在腦部動脈處，造成的中風屬於下列何者？
(A) intracerebral hemorrhages (B) extracerebral hemorrhages
(C) embolic stroke (D) thrombotic stroke
- 8 下列關於非穿透性 (nonpenetrating) 腦傷之描述，何者較適當？
(A)腦膜仍保持完整
(B)可分為高速 (high-velocity) 與低速 (low-velocity) 撞擊腦傷
(C)高速撞擊腦傷的死亡率較高，大多在受傷後數分至數小時內死亡
(D)低速撞擊腦傷的受傷部位屬於局部 (focal)、非擴散性傷害 (diffuse injury)
- 9 訓練失語症個案詞彙提取能力時，可藉由給予不同提示來協助個案正確提取詞彙。當目標詞彙為「火車」，治療師給予「火」；目標詞彙為「腳踏車」，治療師給予「腳」，此種提示方式屬於下列何項？
(A)視覺提示 (B)首字提示 (C)物品功能提示 (D)相反概念提示

- 10 下列何者為痙攣型啞吃 (spastic dysarthria) 之典型言語特徵？①slow and irregular AMRs ②slow rate
③strained-strangled voice ④hypernasality ⑤irregular articulation breakdowns
(A) ②③⑤ (B) ①②③ (C) ②③④ (D) ①④⑤
- 11 有關運動過度型啞吃-舞蹈症 (hyperkinetic dysarthria in chorea) 之神經肌肉損傷 (neuromuscular deficits) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 個別動作 (individual movements) 的方向不正確
(B) 重複性動作 (repetitive movements) 的速度減慢
(C) 個別動作的力量減少
(D) 重複性運動的不規律 (irregular)
- 12 下列何者可能為右腦傷患者會出現的徵狀？①忽略症 ②缺乏病識感 ③大量的命名錯誤 ④子音
扭曲 ⑤情感/情緒辨識困難
(A) ①②④ (B) ②③④ (C) ①③⑤ (D) ①②⑤
- 13 Lee Silverman voice treatment 最被廣泛應用於下列那一種個案的言語治療中？
(A) hypokinetic dysarthria (B) hyperkinetic dysarthria
(C) ataxic dysarthria (D) flaccid dysarthria
- 14 承上題，此治療方式主要著重於下列那兩個言語產生的次系統？
(A) 共鳴及構音 (B) 發聲及呼吸 (C) 共鳴及旋律 (D) 構音及發聲
- 15 由 Kagan 提出之「supported conversation」治療方法，主要治療目標是加強失語症個案的那一項能力？
(A) 語意 (semantic) (B) 語法 (syntax)
(C) 音韻 (phonology) (D) 溝通效能 (communicative effectiveness)
- 16 如下圖所示，某位腦傷個案正在接受認知功能評估，施測者請他將下圖中所出現的實心星號 (★)
一一刪除，此測驗之名稱為何？
■★☆◆●◇★◆★■●△●★△☆★■△★◆◇△◆★
(A) line bisection test (B) symbol digit modalities test
(C) cancellation test (D) trial-making test
- 17 承上題，該測驗可用於評估個案之何項能力？
(A) sustained attention (B) selective attention (C) alternating attention (D) divided attention
- 18 根據 Sohlberg 等人提出的 attention process training (APT)，當腦傷個案之注意力出現缺損時，介
入的順序由先至後依序應該為何？①sustained attention ②selective attention ③divided attention
④alternating attention
(A) ③④①② (B) ②④①③ (C) ①②④③ (D) ①④③②
- 19 Global deterioration scale (GDS) 特別適用於下列那一類個案的評估？
(A) dementia (B) right hemisphere damage
(C) traumatic brain injury (D) CVA
- 20 針對右腦傷個案之語言治療，其主要的治療目標應著重在下列何項？
(A) 語用 (pragmatics) (B) 語意 (semantics) (C) 語法 (syntax) (D) 音韻 (phonology)




- 21 旋律語調治療法（melodic intonation therapy，MIT）是屬於下列那一種失語症的治療策略？
 (A)語言性導向治療法（linguistic approach）
 (B)社會導向治療法（social approach）
 (C)非優勢半腦導向治療法（minor-hemisphere approach）
 (D)認知導向治療法（cognitive approach）

情況：依下圖回答下列第 22 題至第 24 題。




- 22 圖中①、②及③，皆屬於何種類的神經纖維束？
 (A)投射纖維（projection fibers） (B)前連合纖維（anterior commissural fibers）
 (C)後連合纖維（posterior commissural fibers） (D)聯絡纖維（association fibers）
- 23 圖中①、②及③分別為下列何者？
 (A) superior longitudinal fasciculus, cingulum, and uncinate fasciculus
 (B) superior longitudinal fasciculus, inferior longitudinal fasciculus, and cingulum
 (C) perpendicular fasciculus, uncinate fasciculus, and inferior longitudinal fasciculus
 (D) perpendicular fasciculus, cingulum, and uncinate fasciculus
- 24 下列何者對於圖中神經纖維之描述最適當？
 (A)①與語言功能高度相關
 (B)額葉及顳葉皮質下區域經由②與對側腦的頂葉連結
 (C)布洛克區（Broca's area）與威氏區（Wernicke's area）藉由②獲得聯繫
 (D)下額葉（inferior frontal lobe）經由③與左右腦的前顳葉（anterior temporal lobe）連結
- 25 在評估時，請個案看字卡，並指出相對應的圖片，主要是要評估個案的那一項能力？
 (A) auditory comprehension (B) naming
 (C) reading comprehension (D) sentence production
- 26 中大腦動脈（middle cerebral artery）主要提供大腦半球中央區域之血流供應，若在語言優勢半腦的中大腦動脈之前支血管阻塞，最有可能造成下列何種失語症？
 (A) transcortical sensory aphasia (B) conduction aphasia
 (C) Broca's aphasia (D) Wernicke's aphasia
- 27 下列在 Rancho Los Amigos Scale of Cognitive Levels-Revised 所述的各階段，依嚴重程度由輕至重排列順序應為何？①confused, agitated ②automatic, appropriate ③purposeful, appropriate ④confused, appropriate
 (A)①④②③ (B)①②③④ (C)③④①② (D)③②④①
- 28 陳先生在上班途中不幸發生車禍，到院時 Glasgow 昏迷指數為 E2V2M3，其腦傷嚴重程度是屬於：
 (A)正常 (B)輕度 (C)中度 (D)重度
- 29 以下關於上運動神經元（upper motor neuron, UMN）系統之描述，何者最適當？
 (A)由最終共同路徑（final common pathway, FCP）組成
 (B)皮質脊髓路徑（corticospinal tract）以雙側支配為主
 (C)皮質延髓路徑（corticobulbar tract）以對側支配為主
 (D)位於中樞神經系統，包含錐體路徑（pyramidal tract）


- 30 寫字過小症（micrographia）是下列那一種患者常見之臨床表現？
(A) right hemisphere damage (B) Alzheimer's disease
(C) Parkinson's disease (D) CVA
- 31 小腦損傷最有可能造成下列那一種吮吃？
(A)運動失調型（ataxic） (B)弛緩型（flaccid）
(C)痙攣型（spastic） (D)運動過度型（hyperkinetic）
- 32 偷餅乾圖（cookie theft picture）主要是用來評估個案的那一項能力？
(A)聽理解能力 (B)敘事能力 (C)複誦能力 (D)閱讀能力
- 33 國內簡明失語症測驗（CCAT）之記分系統，主要是參考下列那一個評估工具的記分系統而編制？
(A) Porch index of communicative ability（PICA）
(B) Western aphasia battery（WAB）
(C) Minnesota test for differential diagnosis of aphasia（MTDDA）
(D) Boston diagnostic aphasia examination（BDAE）
- 34 Reminiscence activities 是一種可使用於失智症個案的治療活動，下列有關 reminiscence activities 之敘述，何者錯誤？
(A)乃利用失智症個案仍保留的短期記憶力進行治療
(B)治療中大量使用視、聽覺材料（例如：報紙、照片、音樂）
(C)廣泛地被使用於團體治療中
(D)治療中會有一名帶領者，鼓勵參與的個案針對特定話題發表他們對該事件的記憶
- 35 下列有關腦傷患者的預後指標（prognostic indicators）之敘述，何者錯誤？
(A) Glasgow coma scale 分數愈高，預後較佳
(B) Galveston orientation & amnesia test 分數愈低，預後愈佳
(C)年紀大的傷患之預後通常較年紀輕的傷患差
(D) comprehensive level of consciousness scale 之分數愈低，預後愈差
- 36 下列何者不是 ASHA functional assessment of communication skills for adults（ASHA FACS）之評估項目？
(A) social communication (B) communication of basic needs
(C) reading, writing and number concepts (D) sentence completion
- 37 Boston naming test 是利用下列那一種方式評估個案的詞彙提取能力？
(A) responsive naming test (B) generative naming test
(C) confrontation naming test (D) word fluency test
- 38 複誦（repetition）的大腦處理機制中包含下列結構：①Broca's area ②primary auditory cortex ③Wernicke's area ④primary motor cortex ⑤arcuate fasciculus。上述結構依神經活化的順序由先至後排列應為：
(A)③②⑤④① (B)②③⑤①④ (C)②⑤③①④ (D)①④⑤③②
- 39 某位患者和治療師分享她前幾天和朋友聚會的經過。她說：「我先到才是他再過來，那裡人很好，我把這個跟他說，他也在那裡，我們就在裡面，還有很多東西一直來。」上述主要是屬於何種語言問題？
(A) jargon (B) logorrhea (C) empty speech (D) paragrammatism
- 40 布洛克氏失語症（Broca's aphasia）患者最不可能出現下列何種語言異常問題？
(A) agrammatism (B) press of speech (C) phonetic dissolution (D) telegraphic speech
- 41 言語流暢度（speech fluency）是診斷失語症類型重要的指標，它的判斷通常應包含下列那些言語特徵向度？①speech rate ②naming ③intonation ④stress ⑤repetition
(A)②⑤ (B)①⑤ (C)①②⑤ (D)①③④

- 42 阿土伯這個月初因中風入院，本週接受第一次語言評估，結果發現阿土伯說話時雖然常出現語誤，但還算流暢；單詞複述、聽寫單詞與朗誦文字會出現困難，聽理解以及閱讀理解能力則屬於正常。病灶位置可能在何處？
(A) Broca's area (B) arcuate fasciculus (C) anterior frontal lobe (D) middle cerebral artery
- 43 承上題，此個案應診斷為何種類型的失語症？
(A) Broca's aphasia (B) anomic aphasia (C) Wernicke's aphasia (D) conduction aphasia
- 44 林先生接受語言評估時，治療師問到：「您姓張嗎？」、「房間裡的燈關了嗎？」、「一個禮拜有七天嗎？」以上問題是在評估林先生何種語言的能力？
(A) 句子理解 (sentence comprehension) (B) 對話理解 (discourse comprehension)
(C) 句子表達 (sentence production) (D) 回應式命名 (responsive naming)
- 45 ①  ②  ③  ④ 
上面四個圖何者較適用於評估失語症患者單詞的閱讀理解 (single-word reading comprehension) 能力？
(A) ②④ (B) ①③ (C) ② (D) ③
- 46 Token test 主要在評量個案的何種能力？
(A) 句子理解 (sentence comprehension) (B) 詞彙理解 (vocabulary comprehension)
(C) 問題解決 (problem solving) (D) 推理與推論 (reasoning and inference)
- 47 影響失語症患者對話理解的許多因素中，下列何項描述是最不適當的？
(A) 與一般無腦傷成人相似，對於暗示性 (implied) 內容的理解較直述性內容為差
(B) 對話內容大意 (main idea) 的理解能力較事件細節來的好
(C) 放慢說話速度以及加強語氣 (emphatic stress) 都無法提昇患者的對話理解能力
(D) 解釋或換個方式再說一次用以強調重要資訊，增加內容的多餘性 (redundancy)，可以提昇患者的對話理解能力
- 48 關於短文閱讀理解測驗材料「passage dependency」的描述，下列何者較適當？
(A) 測驗題型應以 passage independent 的題目為主
(B) passage dependent 的題目只能測出句子閱讀理解能力
(C) low passage dependency 的題目會降低該測驗的效度
(D) passage independent 的題目需看完文章內容後才知道如何作答
- 49 下列何種類型失語症個案之複誦 (repetition) 能力最差？
(A) transcortical motor (B) transcortical sensory (C) anomic (D) conduction
- 50 某項治療策略採用低結構治療設計，強調由患者主導，鼓勵患者運用個人經驗、既有知識來詳加說明，而非命名圖片，儘管反應多為關鍵字也可接受，目的在增加非流利型失語症患者語句長度及內容。此為何種治療法？
(A) mapping therapy
(B) cueing verb treatments
(C) response elaboration training
(D) Helm elicited language program for syntax stimulation
- 51 對於下列何類型的失語症患者，在語言治療初期應以加強聽覺理解以及自我監控能力為主？
(A) global aphasia (B) Wernicke's aphasia
(C) conduction aphasia (D) transcortical sensory aphasia

- 52 張伯伯接受語言治療時，語言治療師將下圖放在他的前方，共同討論完圖中六個問題之後，將討論結果記錄在各個方框內，最後請張伯伯說出中間圖片的意思。此語言治療目的在訓練什麼能力？




- (A)聽從指令 (B)動詞命名 (C)簡單句表達 (D)回答“wh”問句
- 53 承上題，此訓練方式依據什麼原理設計的？
(A) cueing hierarchies (B) interactional strategies
(C) semantic feature analysis (D) semantic category rhyme therapy
- 54 有一治療方式可以改善失語症病人詞彙搜索困難（word-finding deficits），並可擴充其語彙表達量。經過練習後，當目標詞無法說出，病人可改用其它可接受的替代性語詞回應。此治療法是：
(A) convergent naming (B) divergent naming
(C) cueing verb treatments (D) melodic intonation therapy
- 55 弛緩型吶吃（flaccid dysarthria）可能由下列那些疾病所引起？①格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome） ②多發性硬化症（multiple sclerosis） ③亨丁頓舞蹈症（Huntington's chorea） ④小兒麻痺症（polio） ⑤重症肌無力症（myasthenia gravis）
(A)②③④ (B)③④⑤ (C)①②③ (D)①④⑤
- 56 潘先生中風後，出現以下特徵：右眼無法緊閉也不行眨眼，往上看時左側額頭有皺紋但右側平坦無紋路，笑的時候嘴角歪向左側，用杯子喝水會從右側嘴角流出，吞嚥後食物會堆積在口腔右側。他可能是在何處的運動神經元受損？
(A)右側上運動神經元受損 (B)左側上運動神經元受損
(C)右側下運動神經元受損 (D)左側下運動神經元受損
- 57 雙側下運動神經元受損的患者，可能會出現那些言語特徵？
(A)嗓音出現明顯氣息聲，說話時有聽得到吸氣聲，子音咬字不清，鼻音重
(B)說話速度慢，伴隨掙扎緊縮的嗓音，音量無大小聲變化
(C)說話音量小，語調平淡無變化，速度快慢不一
(D)說話時會突然停頓、中斷，音量變化大，鼻音過重
- 58 下圖為口語表達階段模式（stage model of expressive communication），何者屬於運動言語歷程（motor speech processes）？



- (A)③ (B)④ (C)②③ (D)③④

- 59 承上題，編號①～④若出現異常，可能造成何種障礙？
 (A)①出現異常，可能造成失語症
 (B)痙攣型吶吃（spastic dysarthria）屬於④異常所造成
 (C)③或④出現問題，都會產生言語失用症（apraxia of speech）
 (D)②與③皆出現問題，會造成吶吃（dysarthria）
- 60 張先生咳嗽無力，但可以正常發出喉哼聲（glottal coup），應為何種機制不足所造成？
 (A) respiratory weakness (B) labial weakness
 (C) laryngeal weakness (D) palatal weakness
- 61 請患者深呼吸時出現了喘鳴聲（inspiratory stridor），很可能是何種問題所引起？
 (A) 喉咽閉鎖不全 (B) 口內壓不足
 (C) 聲帶外展（abduction）不足 (D) 聲帶閉合（adduction）不良
- 62 某病患左側舌下神經（hypoglossal nerve）受損，治療師進行口腔功能評估請他伸出舌頭時，他的舌頭會：
 (A) 往右側偏移 (B) 往左側偏移
 (C) 雙側出現肌束顫動，舌頭無法前伸 (D) 可對稱性移動，但活動範圍減少
- 63 評估運動性言語障礙對溝通效能的影響，可藉由清晰度（intelligibility）、可理解度（comprehensibility）及效率（efficiency）來判斷。下列敘述何者最適當？
 (A) 事先瞭解談話主題及內容，有助於提昇清晰度
 (B) 構音正確性是決定可理解度優劣的主要因素
 (C) 患者言語清晰度佳，但因說話速度過慢，還是會降低效率
 (D) 使用溝通手勢或利用情境線索幫助瞭解說話內容，可增加清晰度
- 64 下列那一項評估對於鑑別診斷言語失用症的靈敏度最好？①數數由 1~10 ②複述句子 ③sequential motion rates（SMRs） ④alternate motion rates（AMRs）
 (A)②③ (B)②④ (C)①③ (D)③④
- 65 對言語失用症的評估大都用下列何種方式進行？
 (A) 命名 (B) 仿說 (C) 造句 (D) 回答問題
- 66 依據動作學習原則（principles of motor learning）給予患者回饋時，應考量下列何者？
 (A) 團體治療時，不應由團體中的其他患者提供回饋
 (B) 藉由器具或儀器給予的回饋可以是立即的、高準確度的，適合在動作習得後期使用，以維持長期效益
 (C) 應避免提供患者最近在清晰度或目標音正確性表現的資訊，尤其當進步狀況不明顯時，會抑制學習動機
 (D) 若對尚未學會的動作給予立即性、頻繁性回饋（frequent feedback），可能會降低該動作在長期維持或類化的表現
- 67 若是中大腦動脈的後支（posterior branch of the middle cerebral artery）阻塞，很可能造成何種類型的失語症？
 (A) Broca's aphasia (B) anomic aphasia (C) Wernicke's aphasia (D) global aphasia
- 68 下列何種治療法通常較適用於對言語失用症患者的介入？
 (A) 共鳴訓練 (B) 使用 delayed auditory feedback（DAF）
 (C) 口腔肌力訓練（strength training） (D) 手勢重整法（gestural reorganization）
- 69 林先生在中風之後，子音構音不準確，嗓音粗糙且常出現緊壓音質，音調低沉，鼻音過重，說話速度緩慢。請問林先生之吶吃種類可能為何？
 (A) 運動失調型（ataxic） (B) 運動不足型（hypokinetic）
 (C) 弛緩型（flaccid） (D) 痙攣型（spastic）

- 70 失智症晚期的病人應以下列何種治療方式為主？①現實定向（reality orientation） ②空間提取訓練（spaced-retrieval training） ③生活經驗策略（life-experience strategies） ④情境治療（milieu therapy）
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)③④
- 71 失智症患者發病初期仍可執行日常事務，例如：騎機車、泡茶，這是由於何種記憶能力尚未衰退？
(A)陳述性記憶（declarative memory） (B)前向性記憶（prospective memory）
(C)程序性記憶（procedural memory） (D)回溯性記憶（retrospective memory）
- 72 皮質下失智症（subcortical dementia）在發病初期，以何項能力的受損最為明顯？
(A)記憶 (B)動作 (C)智力 (D)語言
- 73 下列何種治療策略有助於改善失智症患者溝通能力？
(A)腳本策略（script strategies） (B)空間提取訓練（spaced-retrieval training）
(C)提示-行為聯想訓練（cue-behavior association） (D)無錯誤學習（errorless learning）
- 74 下列何種能力在阿茲海默症（Alzheimer's disease）發病初期所受到的影響相對地較少？
(A)認知 (B)語言 (C)記憶 (D)智力
- 75 下列何者為皮質型失智症（cortical dementia）的病因？①亨丁頓舞蹈症（Huntington's disease）
②畢克氏病（Pick's disease） ③帕金森氏症（Parkinson's disease） ④阿茲海默症（Alzheimer's disease）
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)②④
- 76 由一醫師轉介的腦外傷患者至語言治療部門接受視知覺訓練。治療師將下圖放在患者前面，請他依照圖樣用積木做出一樣的構造，此訓練的目的在訓練何種能力？



- (A)視覺記憶（visual memory） (B)視覺辨認（visual recognition）
(C)視覺空間處理（visuospatial processing） (D)視覺區辨（visual discrimination）
- 77 某位腦外傷患者返家後在處理事務時出現部分困難，例如在打掃的同時若是跟家人講話，會重複掃同一個地方，或是煮飯時聽廣播，會放錯調味料，食材也會搞混。以上這些是屬什麼方面的問題？
(A)選擇性注意力（selective attention） (B)維持性注意力（sustained attention）
(C)交替性注意力（alternating attention） (D)分散性注意力（divided attention）
- 78 在吶吃的言語治療中，降低說話速度有助於改善許多運動不及型吶吃患者的構音能力，下列何者並不是控制語速的方法？
(A)節拍板（pacing board）
(B)字母板（alphabet board）
(C)延遲聽覺回饋（delayed auditory feedback, DAF）
(D)咬口器（bite block）
- 79 阿水伯，男性，78 歲，上週因腦外傷入院，格拉司哥昏迷指數（Glasgow coma scale, GCS）為 6 分。入院前有賭博的習慣，會酗酒，教育程度為小學肄業，曾是塑膠工廠老闆，目前已退休，工廠交由兒子負責。以上那些個人性因素對腦傷復原狀況的影響較大？
(A) 78 歲，酗酒 (B)男性，賭博，塑膠工廠老闆
(C)賭博，教育程度為小學肄業，已退休 (D)男性，78 歲，賭博，教育程度為小學肄業
- 80 三位患者的格拉司哥昏迷指數（Glasgow coma scale, GCS）分別為：阿明 4 分，強哥 8 分，小光 15 分。其腦傷程度各為何者？
(A)阿明：昏迷，強哥：輕度腦傷，小光：正常
(B)阿明：重度腦傷，強哥：昏迷，小光：正常
(C)阿明：昏迷，強哥：昏迷，小光：輕度腦傷
(D)阿明：重度腦傷，強哥：中度腦傷，小光：輕度腦傷