

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：5105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 關於肺癆的敘述，下列何者錯誤？
(A)症見咳嗽，潮熱，盜汗，身體逐漸消瘦 (B)是具有傳染性的慢性肺部虛勞疾患
(C)臨床上以肝腎虧損為多見 (D)治療當以補虛培元，治癆殺蟲為原則
- 2 關於肺癰的敘述，下列何者錯誤？
(A)其證候與西方醫學所稱「肺膿瘍」、「化膿性肺炎」相似
(B)症見形體多虛，咳唾涎沫
(C)病程可分初期，成癰期，潰膿期，恢復期等
(D)治療以祛邪為原則，膿未成可著重清肺消癰，膿已成需排膿解毒
- 3 22 歲女性患者有氣喘病史，1 週前開始有咳嗽情況，痰色白稀薄呈現泡沫樣，半夜呼吸時會有哮鳴聲，常覺畏寒，舌苔白，脈浮緊。依中醫治法，下列何者最適宜？
(A)溫肺散寒 (B)宣肺化痰 (C)補肺益腎 (D)瀉肺斂飲
- 4 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)定喘湯 (B)三子養親湯 (C)小青龍湯 (D)蘇子降氣湯
- 5 下列有關支氣管哮喘的轉歸敘述，何者錯誤？
(A)冷哮日久或治療中長期過用溫燥，在裏之寒痰濕痰亦有化燥化火的可能
(B)熱哮是冷哮的進一步發展，故熱哮病情較為嚴重
(C)無論冷哮、熱哮，哮喘屢癒屢發，都會使人體正氣日耗，由實證漸次向虛證方向轉化
(D)哮病如反覆發作，見周身悉腫，胸凸背駝，發作時冷汗如油，面色青紫，四肢厥冷，脈按之如游絲者，預後不良
- 6 下列對心絞痛的敘述何者錯誤？
(A)臨床特徵為當胸悶痛，甚則胸痛徹背，短氣，喘息，不得安臥
(B)其病位在心，但與脾腎有關
(C)病機總屬本虛標實
(D)急性期之治療原則，先從扶正入手，再予祛邪
- 7 炙甘草湯多用於治療下列何種證型之心律不整？
(A)陰虛火旺 (B)氣陰兩虛 (C)心陽不足 (D)心血瘀阻
- 8 某 60 歲男性患者，平時喜食肥肉，體胖，就診時胸悶如窒而痛，氣短痰多，氣促而喘，舌苔濁膩，脈滑。此為下列何證？
(A)陰寒內結 (B)痰濁閉阻 (C)氣陰兩虛 (D)氣虛血瘀
- 9 承上題，治以下列何方最宜？
(A)桃紅四物湯 (B)生脈散 (C)栝蒌薤白半夏湯 (D)栝蒌薤白白酒湯

- 10 嘔吐物的性質常反映病變的寒熱虛實及病變臟腑，下列敘述何者錯誤？
(A)嘔吐物酸腐難聞，多為食積內腐 (B)吐酸水綠水，多為肝氣犯胃
(C)吐清水痰涎併頭眩心悸，多為痰飲內阻 (D)時作乾嘔或黏沫量少，多屬脾胃陽虛
- 11 關於泄瀉及痢疾兩證的敘述，下列何者錯誤？
(A)兩者多發於夏秋季節
(B)兩者病變均在腸胃，皆由外感時邪，內傷飲食而發病
(C)兩者治法皆以止瀉為先
(D)如以症狀嚴重度來區別，泄瀉較輕，痢疾較重
- 12 患者少腹疼痛嚴重，痛如針刺，痛處不移，舌紫暗，脈細澀，則下列處方何者最宜？
(A)當歸芍藥散 (B)少腹逐瘀湯 (C)金鈴子散 (D)溫經湯
- 13 有關「胃痛」的敘述，下列何者錯誤？
(A)虛證多為久病，痛勢綿綿，喜按，食後痛甚，痛有定處
(B)在氣者多是新病，以脹痛為主，疼痛不定
(C)拘急而痛，得溫痛減，遇寒痛劇，苔白，脈弦緊，為寒邪
(D)在血者，以刺痛為主，夜間加重
- 14 32 歲產後婦人，作完月子後面色仍萎黃，身倦懶言，食少納呆，脘腹不舒，坐臥則較舒，噯氣不舒，食後加重。診其舌淡苔白，脈緩弱。治以下列何方最適當？
(A)保和丸 (B)平胃散 (C)補中益氣湯 (D)四物湯
- 15 45 歲女性患者經西醫胃鏡診斷有消化性潰瘍，因服西藥仍不癒，尋求中醫治療。症見胃脘部隱隱作痛，易吐涎，得食則減，身倦乏力，喜溫飲，舌淡，脈弱。治以下列何方最適當？
(A)保和丸 (B)黃耆建中湯 (C)參苓白朮湯 (D)金鈴子散
- 16 下列有關鼓脹之敘述，何者錯誤？
(A)鼓脹的病理演變過程，與肺、脾、腎三臟密切相關
(B)鼓脹雖可由積證引起，但並非所有鼓脹皆由積證引起
(C)腹大但脹滿不甚，朝寬暮急，為脾腎陽虛證
(D)腹大脹滿不舒，多形瘦面顴，為肝腎陰虛證
- 17 膽結石症，若起病急劇，右上腹劇痛，噁心嘔吐，不思食，高熱惡寒，身面目皆黃，右上腹拒按，小便黃濁短少，大便灰白，舌紅苔黃膩，脈弦滑數者，治以下列何方最宜？
(A)膈下逐瘀湯 (B)甘露消毒丹 (C)茵陳蒿湯 (D)茵陳五苓散
- 18 西醫學中的慢性腎衰竭、尿毒症，與下列中醫的何種病證最為相近？
(A)關格 (B)尿濁 (C)遺尿 (D)淋證
- 19 某一慢性水腫病人，其驗尿結果如下：蛋白質 300 毫克，白血球 9-10/hpf，紅血球柱 3+，病人有高血壓，其驗血報告，血液尿素氮（Blood urea nitrogen, BUN）：33 mg/dl，肌酐酸（Creatinine, Cr.）：2.5 mg/dl，若見下肢水腫，納差，腹痞悶，腰痠乏力，脈弱、尺微。此乃下列何臟損傷所致？
(A)心腎 (B)肺腎 (C)肝腎 (D)脾腎

- 20 下列有關腎生理病理的敘述，何者錯誤？
(A)老人呼多吸少，造成吸氣性呼吸困難，此與「腎不納氣」有關
(B)腎上腺之功能與命門之說可能有關
(C)水腫因腎虛引起者，和腎主藏精失常最有關
(D)腎不藏精，會影響骨髓的長養，甚至造成牙齒鬆動早脫
- 21 50 歲女性患者因排尿困難且澀，而常常有餘瀝致膀胱常滿小便，其病症屬下列何者？
(A)石淋 (B)氣淋 (C)膏淋 (D)勞淋
- 22 某慢性腎盂腎炎患者，症型為脾腎兩虛，餘濕未清，其主症尿路刺激感，面腳浮腫，納呆腹脹，大便不實，神疲乏力。治以下列何方最宜？
(A)六味地黃丸 (B)豬苓湯 (C)實脾飲 (D)清心蓮子飲
- 23 患者因患陽痿求診，自陳因業務繁忙，經常工作逾時，飲食不規律，也常陪同客戶至聲色場所，診察見病人外陰部大致正常，但陰囊潮濕，平素小便短赤，小便後餘瀝臊氣，舌紅，苔黃，脈沉滑。下列那一個處方最為合適？
(A)《醫宗金鑑》知柏地黃丸 (B)《證治準繩》五子愆宗丸
(C)《和劑局方》龍膽瀉肝湯 (D)《景岳全書》大補元煎
- 24 臨床治療痹證的基本治則，除風寒濕熱之餘，若配合相關配套模式，則能發揮更好的療效，並可避免副作用，下列相關敘述何者錯誤？
(A)行痹宜配合補氣 (B)痛痹宜配合溫陽 (C)著痹宜配合健脾 (D)熱痹宜注意養陰
- 25 某 40 歲女性乾癬 (Psoriasis) 患者，症見皮損多發於關節屈側和皮膚皺折處，皮損色紅濕爛，低熱，關節紅腫，灼熱疼痛，身倦乏力，納呆，下肢痠脹沉重，陰雨天症狀加重，舌質紅，苔黃膩，脈沉滑數，則下列診斷何者最可能？
(A)風熱血燥 (B)氣陰兩虛 (C)熱毒熾盛 (D)濕熱蘊結
- 26 承上題，以下列何方治療最適當？
(A)黃連解毒湯 (B)三妙散 (C)生脈散 (D)當歸飲子
- 27 一位 40 歲業務員，長期吸菸，早晨起床會打噴嚏、流鼻水，自中秋節後反覆咳嗽已三個月，求助於診所使用中西藥月餘皆未改善，來到醫學中心中醫部門，下列何者為暫時不必要之檢驗？
(A)照胸部 X-ray，排除肺癌之可能
(B)抽血檢驗常見之過敏原，衛教病人避開過敏原
(C)抽血檢驗 CD4/CD8、HIV 病毒，排除愛滋病感染造成之免疫低下
(D)轉診至胸腔科安排肺功能檢測，進一步分析氣喘或其它呼吸系統疾病之可能
- 28 承上題，此患者之咯痰黏濁稠厚，排吐不利，或黃或白，煩悶不安，汗出，面赤，口苦，口渴喜飲，不惡寒，舌質紅，苔黃膩，脈滑數，下列何方加減最適宜？
(A)三拗湯 (B)定喘湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)清心蓮子飲
- 29 45 歲女性患者近來發現皮膚出現不明的紫癍，並伴隨有口乾、牙齦出血、便秘、便血、血尿等情形。診其舌質紅，苔黃，脈弦數，則該患者之診斷為下列何者最適當？
(A)肺胃陰虛 (B)陰虛火旺 (C)血熱妄行 (D)脾不統血
- 30 承上題，治療以下列何者加減為最適宜？
(A)歸脾湯 (B)地榆散 (C)茜根散 (D)犀角地黃湯

- 31 下列關於尿崩症的敘述，何者錯誤？
(A)是下視丘分泌的抗利尿激素缺乏所引起的疾病
(B)在中醫學與「消渴」有關
(C)多尿，腰痠，尺脈弱者，可用六味地黃丸加減
(D)多尿之病理機轉和糖尿病相同
- 32 某 48 歲形體消瘦男性患者，症見口渴，善飢，溲數，便秘，望其舌苔黃燥，診其脈滑實有力。下列診斷證型何者最宜？
(A)胃火消中 (B)腎虛火亢 (C)燥熱傷肺 (D)脾胃氣虛
- 33 承上題，治以下列何方最宜？
(A)白朮散 (B)知柏八味丸 (C)白虎湯 (D)清燥救肺湯
- 34 「消渴」臨床上又分上、中、下三消。下列關於下消的敘述，那些是正確的？①病位在腎 ②女子病位在肝 ③以小便頻而量多為主要症狀 ④以尿渾濁如膏脂，或具甜味為主要症狀
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 35 癭病的主要病機，下列何者最少見？
(A)火熱傷陰 (B)氣鬱化火 (C)痰氣壅結 (D)脾虛生痰
- 36 關於癭病的預防及護理，下列敘述那些是正確的？①水土因素是癭病的主要病因之一，因此，在容易發生癭病的地區可採用食鹽加碘法來作大規模的預防 ②預防癭病應保持精神愉快，防止情志內傷 ③癭病患者應避免肥膩、香燥、辛辣之品
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 37 76 歲男性患者，一年前梗塞性中風後引起左側肢體偏廢不仁，患側筋骨痠軟，左足無法背伸，左下肢肌力：1-2 分，上肢：2-3 分，腰膝酸軟，伴見眩暈耳鳴、言語蹇澀，舌質淡紅苔少，脈細稍數，治以下列何方最為適宜？
(A)解語丹 (B)地黃飲子 (C)補陽還五湯 (D)鎮肝熄風湯
- 38 下列有關治療頭痛引經藥之敘述，何者錯誤？
(A)太陽經頭痛宜藁本、獨活 (B)陽明經頭痛宜白芷、葛根
(C)少陽經頭痛宜柴胡、川芎 (D)厥陰經頭痛宜吳茱萸
- 39 35 歲男性患者，由家人陪同前來就診，主訴患躁鬱症已 10 年餘，並代述 1 年來已漸少發狂，並有多言善驚，時而煩躁等症。視其精神不佳，形瘦面紅，舌質紅，脈細數，下列何者是最適合的診斷？
(A)痰氣鬱結 (B)心脾兩虛 (C)痰火上擾 (D)火盛傷陰
- 40 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)順氣導痰湯 (B)歸脾湯 (C)生鐵落飲 (D)二陰煎
- 41 25 歲女性患者，主訴失眠近半年，其症狀有多夢易醒，心悸健忘，頭暈目眩，肢倦神疲，飲食無味，面色少華，舌淡苔薄，脈細弱，下列何者是最適合的診斷？
(A)肝鬱化火 (B)陰虛火旺 (C)心脾兩虛 (D)心膽氣虛
- 42 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)黃連阿膠湯 (C)安神定志丸 (D)歸脾湯

- 43 耳聾有分虛實，有關虛聾的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)耳聾兼見目眩善恐者，屬肝虛 (B)耳聾兼見心神恍惚驚悸煩躁者，屬心虛
(C)耳聾兼見少氣噎乾者，屬脾虛 (D)耳聾兼見面頰黧黑者，屬精脫
- 44 52 歲男性患者，平時好飲咖啡，且喜食精緻甜點。近日發現右上腹部悶痛刺痛皆有，痛都在同一個位置上，感覺有脅肋部位青筋浮現。就診後醫師處方是復元活血湯加三棱、莪朮、地鱉蟲治療。請問醫師的用意為何？
(A)活血補血，理氣止痛，泄熱通便 (B)活血止血，清熱利濕，利膽排石
(C)活血化瘀，理氣止痛，清熱滋陰 (D)活血祛瘀，通經活絡，消堅破瘀
- 45 鼻咽癌患者經放射線治療，若出現咽喉腫痛，色鮮紅屬於熱毒甚者，治以下列何藥最宜？
(A)丹皮、赤芍、玄參 (B)牛蒡子、射干、山豆根
(C)蘆根、天花粉、桔梗 (D)生地、麥冬、玉竹
- 46 扶正培本中藥治療惡性腫瘤的作用機理，下列敘述何項錯誤？
(A)提高淋巴細胞增殖及網狀內皮系統活力
(B)調整癌症患者機體環核苷酸系統 cAMP/cGMP 比值，有利於抑制癌細胞的生長
(C)減輕放化療副作用，增強放化療的效果
(D)改善骨髓造血功能，但無保護作用
- 47 依近代學者研究，當歸龍薈丸能治療慢性顆粒性白血病，方中主要抗癌成分為下列何者？
(A)當歸 (B)蘆薈 (C)青黛 (D)龍膽草
- 48 對癌病患者而言，下列何治療法最能減輕放射線或化學治療副作用，並可保護脾胃，以增加機體免疫能力？
(A)清熱解毒法 (B)活血化瘀法 (C)扶正培本法 (D)軟堅散結法
- 49 有關濕邪引起的婦產科疾患，下列敘述何項錯誤？
(A)濕與脾的關係較為密切
(B)濕是有形之邪，屬陽，其性重濁濡滯，困阻氣機
(C)濕熱蘊鬱日久，浸淫組織致成潰腐膿血，則為濕毒
(D)可致白帶增多，或經前泄瀉、經行前後浮腫
- 50 32 歲吳小姐，已婚，最近因經濟不景氣，工作壓力大，一向月經規則的她，這次月經距上次月經已經 2 個月沒來。最宜優先給予下列何項處置？
(A)考慮壓力大以致月經沒來，建議調暢情緒即可
(B)考慮可能腦部長腫瘤，給予電腦斷層掃描檢查
(C)考慮可能懷孕，先驗孕
(D)考慮月經後期，給予《醫宗金鑑》過期飲加減治療
- 51 《證治準繩》之先期湯，最宜用來治療下列何種病證？
(A)「月經過多」之血熱證 (B)「月經過少」之血虛證
(C)「月經先後不定期」之肝鬱證 (D)「月經先期」之虛熱證
- 52 對於痛經，根據其疼痛性質辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)喜按屬虛，拒按屬實 (B)得熱則痛減屬熱，得寒則痛減屬寒
(C)脹多於痛，多為氣滯 (D)血瘀或濕熱多會持續作痛

- 53 一高中女學生，每逢經來則胸脅痞悶，腹絞痛而瀉，瀉後痛減。下列何者為正確的診斷？
(A)脾虛肝鬱 (B)腸風瀉泄 (C)脾腎陽虛 (D)濕濁困脾
- 54 婦人月經由量少色淡而漸至停閉不行，頭暈目眩、心悸、氣短懶言，脈細弱，其辨證歸屬下列何者最宜？
(A)氣滯血瘀 (B)肝腎不足 (C)陰虛血燥 (D)氣血虛弱
- 55 承上題，最宜以下列何項治療？
(A)血府逐瘀湯 (B)人參養榮湯 (C)歸腎丸加味 (D)加減一陰煎
- 56 一婦人主訴婚後已多年未孕，經來後期，經行量少色淡，畏寒喜暖，腹痛綿綿喜按，小腹冷痛，腰酸乏力，診其面色㿔白，舌淡、苔薄，脈沉細無力。下列何項辨證診斷正確？
(A)腎陰不足，虛火偏旺 (B)氣火偏盛，熱鬱血分
(C)陽氣不足，陰寒內盛 (D)肝氣鬱滯，氣鬱化火
- 57 53 歲患者已停經 2 年，時常感覺陰道乾澀灼熱疼痛，伴有少量黃色水樣分泌物，且反覆發作頻尿、小便灼熱感，舌紅少苔，脈細數，以下列何方治療最適宜？
(A)易黃湯 (B)知柏地黃湯 (C)加味逍遙散 (D)龍膽瀉肝湯
- 58 關於陰痛之辨證，下列何者正確？
(A)陰道抽痛上連少腹及乳房，伴煩躁易怒，為肝經濕熱之證
(B)外陰灼熱腫脹，伴帶下黃黏量多味臭，為下焦濕熱之證
(C)陰道墜痛，伴身倦頭暈，氣短懶言，為氣陰兩虛之證
(D)陰道乾澀灼熱疼痛，伴隨五心煩熱，腰酸耳鳴，為肝經鬱火之證
- 59 下列敘述正確的有幾項？①妊娠期小腹反覆疼痛稱為「胞阻」 ②妊娠早期最常見的證候為「子病」
③妊娠後之噁心嗜酸、擇食，常至六個月後才逐漸消失 ④妊娠期之安胎法以調肝腎為主
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 60 一名 32 歲女性，懷孕三次，皆於懷孕八週至十週間流產。平素月經後期，面色萎黃，頭暈心悸，神疲肢軟，脈細弱。有關此病例之描述，最宜下列何方治療？
(A)壽胎丸 (B)白朮散 (C)泰山磐石散 (D)兩地湯
- 61 患者產後惡露過期不止，淋漓不斷，且量多，其色淡紅質稀。望其面色白，神倦懶言，舌質淡，脈緩弱。下列何組成最宜治療此一病患？
(A)人參、白朮、黃耆、黃連、半夏、陳皮、茯苓、澤瀉、防風、羌活、獨活、柴胡、白芍、甘草、大棗、生薑
(B)生地、熟地、白芍、山藥、續斷、黃芩、阿膠、旱蓮草、烏賊骨、甘草
(C)人參、白朮、黃耆、升麻、陳皮、當歸、柴胡、鹿角膠、艾葉炭、炙甘草
(D)當歸、川芎、桃仁、炮薑、益母草、炒地榆、炙甘草
- 62 顏小姐產後鬱乳不散，乳房腫塊逐漸增大，硬結明顯，繼而皮膚微紅。高熱、疼痛持續十餘天不減，並有持續搏動性疼痛，最宜下列何方治療？
(A)《外科正宗》托裡消毒散 (B)《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯
(C)《外科正宗》海藻玉壺湯 (D)《金匱要略》瓜蒌薤白半夏湯

- 63 下列何者是《傳青主女科》生化湯的組成？
(A)當歸、熟地、桃仁、紅花、炙甘草
(B)當歸、川芎、桃仁、炙甘草、黑薑
(C)人參、當歸、熟地、益母草、桃仁、炙甘草
(D)當歸、阿膠、紅花、川芎、桃仁、黑芥穗、乾薑
- 64 下列各項敘述，何者正確？
(A)《景岳全書》舉元煎的功效是升提腎中元陽
(B)桃仁、炮薑是《傳青主女科》固本止崩湯的部分組成
(C)《和劑局方》人參養榮湯可用治血虛型經來後期量少色淡者
(D)山藥、菟絲子同為《景岳全書》小營煎與歸腎丸的部分組成
- 65 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列何者為痘疹欲發之候？
(A)若耳梢冷，尻骨冷，四肢發冷者
(B)單指梢發冷者
(C)大便稠黏，穢氣難聞者
(D)小兒無故皺眉曲腰啼叫
- 66 3歲大的小兒，4天前右足小腿被不知名的昆蟲叮咬，癢甚，不時搔抓至破皮流血。昨天起出現高熱，患部皮膚焮赤疼痛，紅腫形如雲片，心煩，唇燥口乾，神昏亂語，舌絳苔黃，雖已用西藥，效仍未顯，家長急欲中藥配合，治以下列何方最適宜？
(A)水牛角、黃連、金銀花、連翹、赤芍、生地、防風、荊芥，牛蒡子
(B)水牛角、豆豉、金銀花、連翹、黃芩、人中黃、板藍根、生地、玄參、紫草，天花粉、石菖蒲
(C)金銀花、當歸、玄參、連翹、黃耆
(D)金銀花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、青天葵、白附子
- 67 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒有病，貴乎詳審。下列相關敘述何者錯誤？
(A)發熱、無汗，此邪在表
(B)喜熱惡冷屬陽病
(C)晝若煩熱而夜安靜，其病在陽
(D)若夜煩熱而晝安靜，其病在陰
- 68 依《醫宗金鑑》，小兒濕痰證，屬痰多者，治以下列何者最適宜？
(A)二陳湯
(B)甘桔二陳湯
(C)杏桔二陳湯
(D)枳桔二陳湯加蒼朮、白朮
- 69 林小妹4歲，由其祖父帶來門診，代訴其近一週來，食慾下降，經診察其腹脹，敲之有鼓音，夜臥不安，大便酸臭，手足心熱，偶而抱怨腹痛，其精神尚可，體重未見下降，則林小妹最有可能的病症為何？
(A)厭食
(B)積滯
(C)疳積
(D)疳氣
- 70 6歲男童，感外邪二天後，氣喘發作，症見發熱無汗，呼吸氣急，鼻塞或鼻翼煽動，咳嗽聲重，喉有痰聲，舌質淡紅，苔薄白，脈浮微緊，應以下列何方治療最適宜？
(A)三拗湯
(B)華蓋散
(C)定喘湯
(D)麻杏甘石湯
- 71 林小妹3歲，因腹痛1天來求診，起因於戲水後，大吃西瓜，證見腹痛陣發，得溫較舒，面色蒼白，痛甚則額冷汗出，唇色紫暗，舌苔白滑，治療以下列何方最適宜？
(A)養臟散
(B)芍藥甘草湯
(C)桃花湯
(D)木香大安丸

- 72 某年 9 月有兩歲男童求診，主訴持續發熱已數月，每日午後約至攝氏 40 度。無惡風、頭不痛，亦無神昏驚厥。臨症見口乾膚熱，但肢端涼；多飲多尿，但食納差、消瘦倦怠，舌淡苔黃、脈細數無力。下列診斷何者最不可能？
(A)暑溫 (B)暑熱 (C)陽明經熱 (D)夏季熱
- 73 王姓孩童 6 歲，因感染急性咽喉炎，引發水腫，並有血尿、高血壓症狀，今來院求診，發現其咳嗽，氣急，心悸，胸悶，煩躁，不能平臥，口唇青紫。下列相關敘述何者錯誤？
(A)該孩童極可能罹患急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎 (Acute poststreptococcal glomerulonephritis)
(B)該孩童的症狀疑似有肺水腫，鬱血性心臟病等急性腎衰竭狀態
(C)證屬水毒內閉
(D)可選用己椒藶黃丸合參附湯
- 74 小兒病小便頻數短赤，尿道灼熱疼痛，尿液淋瀝混濁，小腹痛，伴有發熱，煩躁口渴，頭痛，噁心嘔吐，便秘，舌質紅，苔薄膩微黃，脈數有力。綜其症狀，以下列何方治之最宜？
(A)《和劑局方》八正散 (B)《丹溪心法》萆薢分清飲
(C)《醫學心悟》萆薢分清飲 (D)《三因方》玉鑰匙散
- 75 某 6 歲男童，因尿床困擾多年來求診，症見遺尿，尿量不多，尿味腥臊，尿色較黃，平時性急，夜間磨牙，唇紅苔薄白，脈數有力，則治以下列何方最適宜？
(A)茯苓、澤瀉、阿膠、豬苓、滑石
(B)生地黃、甘草、柴胡、當歸、車前子、木通、澤瀉、梔子、黃芩、龍膽草
(C)益智仁、川萆薢、石菖蒲、烏藥
(D)蓮鬚、黃連、黃柏、益智仁、砂仁、半夏、茯苓、豬苓、炙甘草
- 76 依《醫宗金鑑》所述，小兒熱病與溫病之主要不同點，下列敘述何者正確？
(A)不惡寒 (B)不汗出 (C)不身重 (D)不口乾
- 77 某 9 歲男童，症見鼻塞，流清涕，之後高熱煩躁，口渴飲水，食慾不振，腮部漫腫，脹痛、堅硬拒按，咀嚼困難，咽紅腫痛，舌紅苔黃，脈象滑數，隨後併發少腹痛、睪丸腫痛，下列治療方劑何者最適當？
(A)龍膽草、山梔、黃芩、木通、柴胡、當歸、赤芍、延胡索、川楝子、桃仁
(B)銀花、連翹、竹葉、薄荷、牛蒡子、桔梗、甘草、滑石、荊芥
(C)桑葉、菊花、薄荷、牛蒡子、蟬衣、連翹、黃連、紫花地丁、鮮蘆根、全瓜蒌
(D)黃芩、黃連、玄參、連翹、板藍根、僵蠶、夏枯草、蒲公英
- 78 三歲孩童高熱不退，四肢欠溫，神志昏迷，躁動不安，頸項強直，四肢抽搐，經腦脊髓液檢查發現有白血球升高現象 (pleocytosis)，呼吸不利，大便秘結，小便短少而黃，舌苔黃糙，質紅絳，脈洪數。則下列診斷何者正確？
(A)驚風 (B)疳夏 (C)疫毒痢 (D)暑溫
- 79 依《醫宗金鑑》所述，五硬若因風寒凝滯，致陽氣不得宣通者，下列何者錯誤？
(A)重者以小續命湯疏風 (B)輕者以烏藥順氣散調氣
(C)食少氣弱者，以加味六君子湯治之 (D)面青腹硬者，以溫脾湯緩下硬結
- 80 依據一般幼兒發展里程碑，下列何者最正確？
(A)三個月能仰頭至少 45 度 (B)六個月才會爬行
(C)八個月才會伸手拿東西 (D)十二個月會模仿大人聲調