

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：6105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列有關中醫外科辨經的敘述，何者錯誤？
(A)手心屬心包經 (B)足心屬腎經 (C)乳房屬肝經 (D)腹部，總屬陰經
- 2 下列有關中醫外科開刀法的敘述，何者錯誤？
(A)當切開潰瘍後，除面部、手指外，儘量慢慢將留膿擠出
(B)當膿瘍成膿後，膿腫中央有透膿點，是已到膿熟階段
(C)深部膿瘍手術使用藥捻治療，待停用藥捻後，需將消腫散結藥末摻於膏藥上，直到膿盡生肌
(D)瘡瘍生在皮肉較薄的頭、頸、指等部位，必須淺切
- 3 耳痔最常生於何處？
(A)內耳 (B)中耳 (C)耳咽管 (D)外耳道
- 4 「鍼眼」是臨床常見的眼科疾病。下列有關其證治之敘述，何者錯誤？
(A)生於眼皮毛睫間
(B)膿已成者，候膿熟針之，再貼「黃連膏」
(C)破後邪風入侵致病患頭面浮腫，目赤澀痛者，治宜內服「芎皮散」
(D)多因脾經痰濁鬱積而成
- 5 硃砂散之使用方法為何？
(A)食前溫服 (B)水調蘸點 (C)空心溫酒送下 (D)撒布吹敷患處
- 6 大小腸癰，若膿未成者，最宜服下列何方？
(A)大黃湯 (B)薏苡附子散 (C)薏苡湯 (D)丹皮湯
- 7 下列何者不生於手指處？
(A)托盤疔 (B)蛇眼疔 (C)蛇背疔 (D)鰵肚疔
- 8 下列何者不是乳癰初起之治則？
(A)速下乳汁 (B)清熱解毒法 (C)托裡透膿法 (D)發表散邪
- 9 下列何處之疔瘡，一般能自行排膿不需切開？
(A)面部 (B)手部 (C)臀部 (D)足部
- 10 百脈疽的發生部位為何處？
(A)頭頂 (B)會陰處 (C)頸部 (D)背脊處
- 11 下列何者不是百會疽的病因？
(A)膏粱太過，火毒凝結 (B)陽經亢極熱氣不散，氣血凝結聚頂而成
(C)六陽經受風邪風火相煽，臟腑熱毒上攻 (D)由於濕痰流結所致
- 12 一名病患皮膚出現如雲片、色白、浮腫、高壘如粟的病灶，搔癢不已，此病患最可能的診斷為下列何者？
(A)面遊風 (B)白駁風 (C)赤白遊風 (D)紫白癜風
- 13 承上題，下列何項治療最適宜？
(A)內服「黃連消毒飲」
(B)初服「浮萍丸」，次服「蒼耳膏」
(C)初服「荊防敗毒散」，次服「補中益氣湯」加防風、蟬蛻、殭蠶、何首烏
(D)初起宜服「萬靈丹」，次以「胡麻丸」常服

- 14 下列那一種皮膚病的發生是因中螳螂水毒而生？
(A)黃水瘡 (B)蜚蠊蛀 (C)狐水刺 (D)烏白癩
- 15 某患者出現疙瘩滋生，搔癢流水，蔓延增竄，纏綿不休症狀。請問其病因為何？
(A)風燥為病 (B)風濕為病 (C)風寒濕為病 (D)風火為病
- 16 有關便毒之敘述，下列何者為錯誤？
(A)精搏血留，聚中壅遏 (B)由暴怒傷肝，以致氣滯血凝而成
(C)由交合不潔，感染毒邪而成 (D)勞傷肺氣，衛氣失固
- 17 有關氣瘤的敘述，下列何者錯誤？
(A)此病發生在皮膚，歸屬肺經 (B)腫塊浮軟，宛如氣在瘤中，擠壓富有彈性
(C)由氣血凝滯而成 (D)宜用歸脾丸治之
- 18 有關舌疳的敘述，下列何者正確？
(A)此病由心肝膽火毒上炎，結於舌尖而生 (B)此病由心脾毒火上升，結於舌部而生
(C)此病由腎火上升，結於舌根而生 (D)此病由脾胃濕熱上蒸，結於舌面而生
- 19 有關「大頭瘟」的敘述，下列何者錯誤？
(A)由夏秋天時炎熱，受暑毒而造成 (B)本病會造成人與人之間傳染
(C)治療可內服「普濟消毒飲」 (D)治療可外敷「如意金黃散」
- 20 張老先生 78 歲，患蛇串瘡，皮疹消退後，患部仍劇痛不止，下列何種治療原則最佳？
(A)清肝火，利濕熱 (B)健脾胃，清濕熱
(C)理氣活血，重鎮止痛 (D)滋陰清熱
- 21 50 歲男性搬運工人，近 3 個月來右膝在行走及上下坡時易疼痛，且偶爾膝關節無法屈伸、狀如交鎖，得將患膝稍作晃動或按摩才可緩解並恢復行走。下列何項疾病要首先考慮？
(A)髌骨無位移性骨折 (B)膝前十字韌帶損傷 (C)膝半月板損傷 (D)髌骨軟骨病
- 22 承上題，下列何者測試可鑑別診斷？
(A)屈膝 90°，兩手環握小腿上段作向前拉的動作，患者脛骨向前移動度明顯大於健側
(B)患膝伸直，用拇、食指將髌骨向遠端推壓，囑患者用力收縮股四頭肌，引發髌骨部疼痛
(C)患者俯臥位，屈膝 90°，在足踝部用力下壓並作旋轉研磨，引發疼痛產生
(D)患者平臥，將患膝過度伸直，髌下即產生疼痛
- 23 有關腰椎椎管狹窄症，下列何者錯誤？
(A)好發於 40 歲以上之中年人
(B)長期反覆腰腿痛和間歇性跛行
(C)疼痛為酸痛，刺痛或灼痛，有的可放射到大腿外側或前方
(D)多為單側
- 24 有關腰椎間盤突出症的診斷要點，下列何者正確？
(A)小腿下端以脛骨為界，脛骨前皮膚感覺過敏、遲鈍、痛覺喪失表明腰 5-骶 1 椎間盤突出壓迫第 5 腰神經根
(B)X 光顯示椎間隙前寬後窄，左右不等寬，亦表示椎間盤突出
(C)足背伸肌和伸拇肌力減弱可能是腰 4-5 椎間盤突出
(D)跟腱反射減弱或消失多是腰骶椎間盤突出，壓迫第 5 腰神經根所致
- 25 有關梨狀肌症候群（piriformis syndrome），下列敘述何者錯誤？
(A)可因長時間騎乘單車誘發
(B)其發病原因與坐骨神經關係密切
(C)疼痛可能會由臀區放射到下肢
(D)可藉由直腿抬高試驗（straight leg raising test）陰性反應與椎間盤突出（herniated intervertebral disc）鑑別
- 26 下列那一個不是踝關節周圍主要韌帶？
(A)外側副韌帶 (B)內側副韌帶 (C)下脛腓韌帶 (D)距跟韌帶

27 如附圖所示髖關節的角度，其名稱為何？



- (A) Q 角 (Q angle) (B) 頸幹角 (neck shaft angle)
(C) 髖臼角 (acetabular angle) (D) 前傾角 (anteversion angle)

28 有關損傷疾患的解剖部位，下列組合何者正確？

- (A) Perthes' disease-髖關節 (B) Osgood-Schlatter's disease-踝關節
(C) Jones 氏骨折-掌骨 (D) 貝克氏囊腫 (Baker's cyst)-腕關節

29 懷疑半月板損傷時，可進行下列何項測試加以驗證？

- (A) 抽屜測試 (drawer test) (B) 奧培爾氏測試 (Ober's test)
(C) 髌骨研磨測試 (Patellar grind test) (D) 阿普萊氏研磨測試 (Apley's grinding test)

30 38 歲男性，近半年來打球後右手肘外側疼痛，疼痛延至前臂，提重物、扭毛巾等動作均感疼痛乏力。下列何項疾病要首先考慮？

- (A) 尺骨鷹嘴滑囊炎 (B) 肱骨外上髁炎 (C) 旋前肌肌腱炎 (D) 肱骨內上髁炎

31 承上題，下列何者測試可鑑別診斷？

- (A) 手腕放置於屈曲 90° 的位置，60 秒內出現麻痛加重
(B) 四指包住拇指握拳並向尺側屈曲，患處疼痛加劇
(C) 手肘伸直前臂旋後，再將手腕極度背伸，患處疼痛加劇
(D) 手肘伸直前臂旋前，再將手腕屈曲及向尺側偏，患處疼痛加劇

32 附圖為手肘前後位成像 (AP view) 的 X 光片，其中以白色星狀標示的結構為何？



- (A) 肱骨外上髁 (B) 肱骨內上髁 (C) 橈骨頭 (D) 肱骨鷹嘴窩

33 由於過度使用及勞動所造成的損傷，下列何者較為少見？

- (A) 扳機指 (B) 腱鞘囊腫 (C) 腕三角軟骨損傷 (D) 橈骨莖突腱鞘炎

34 45 歲女性患者，無明顯外傷史，右肩部疼痛，肩外展 60° 至 120° 時疼痛明顯，肩外展超過 120° 時疼痛減輕，其最可能病症為何？

- (A) 肩關節周圍炎 (B) 肱二頭肌長頭肌腱炎
(C) 棘上肌肌腱炎 (D) 三角肌肌腱炎

- 35 45 歲女性家庭主婦近 3 個月來腕部橈側疼痛，提菜籃、拿鍋子、切菜等動作均感無力、疼痛，且局部微腫、微熱。下列何項疾病要首先考慮？
(A)屈指肌腱腱鞘炎 (B)腕隧道症候群 (C)腕三角軟骨損傷 (D)橈骨莖突腱鞘炎
- 36 承上題，下列何者測試可鑑別診斷？
(A)手腕放置於屈曲 90° 的位置，60 秒內出現麻痛加重
(B)四指包住拇指握拳並向尺側屈曲，患處疼痛加劇
(C)手肘伸直前臂旋後，再將手腕極度背伸，患處疼痛加劇
(D)手肘伸直前臂旋前，再將手腕屈曲及偏向尺側，患處疼痛加劇
- 37 「夾紙試驗」(如圖)與檢查何神經損傷最相關？



- (A) C6 (B) C7 (C) T1 (D) T2
- 38 依《醫宗金鑑·正骨心法》，有關傷損發熱之證，下列敘述何者錯誤？
(A)因出血過多，脈洪大而虛，重按之全無，用獨參湯
(B)發熱煩躁，肉瞤筋惕，用聖愈湯
(C)脈沉微，按之軟弱，此陰盛發熱，宜用四君子湯加炮薑、附子
(D)血脫之證，脈細小者易治
- 39 22 歲女性患者於一個月前打完羽毛球後開始覺得左手腕酸脹，而且經常連帶左前臂酸脹不適。經醫師檢視，發現其左腕之外觀如圖示，其最可能之診斷為：




- (A)舟狀骨脫位 (B)雞眼 (C)惡性腫瘤 (D)腱鞘囊腫
- 40 某 40 歲家庭主婦自訴突然出現腰痛，伴有頻尿，尿急，血尿，腎區有叩擊痛。下列初步診斷何者為宜？
(A)腰椎間盤突出症 (B)增生性脊柱炎 (C)腎盂炎 (D)腰部扭挫傷
- 41 下列何種治法多應用於損傷中期？①清熱涼血 ②和營止痛 ③補氣養血 ④舒筋活絡
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 42 依《正骨心法要旨》記載，蓋氣流而注，血注而凝，或注於四肢關節或流於胸腹腰脅，或漫腫，或結塊。若日久潰破而氣血虛者，宜治以下列何者最適當？
(A)歸脾湯 (B)十全大補湯 (C)補中益氣湯 (D)益氣養榮湯
- 43 下列何者不是「大七厘散」的適應症？
(A)五勞七傷 (B)坐鬱過多 (C)前胸挫傷 (D)急性大出血
- 44 下列那一洗方能洗一切跌倒損傷，筋翻骨錯，疼痛不止？
(A)散瘀和傷湯 (B)五加皮湯 (C)海桐皮湯 (D)正骨紫金丹
- 45 有關受傷後神志躁動不安、夜臥不寧的原因，下列何者錯誤？
(A)傷後出血過多，致氣血兩虧，心失血養，則心神不安或心煩，夜難成眠
(B)肝腎虛弱患者，久病致虛勞，或房勞過度，或遺泄頻繁，傷及腎陽，虛陽上擾心神而心煩不寐
(C)傷後瘀血停留，阻滯經絡，血液運行不暢，亦能導致心煩不寐
(D)久病體虛，亦可致氣血兩虧，心失血養，則心神不安，或心煩夜難成眠

- 46 內傷後期治法以「補法」為主，《小兒藥證直訣》中提到可治損傷後期腎陰虛，腰膝痠痛，頭暈目眩，咽乾耳鳴，潮熱盜汗等症，是下列何種臨床常用方劑？
(A)四物湯 (B)右歸丸 (C)二仙湯 (D)六味地黃丸
- 47 一體力勞動者，近日工作不遂常遷怒同事，平時覺胸腹悶痛，嗜以手撫摸，依《醫宗金鑑·正骨心法》宜處以下列何方？
(A)補中益氣湯 (B)四君子湯加柴胡、山梔
(C)四物湯加柴胡、山梔、桃仁、紅花 (D)六君子湯加柴胡、川芎、當歸
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損而少腹引陰莖作痛，以下列何方治療？
(A)六味地黃丸 (B)復元活血湯
(C)小柴胡湯加大黃、黃連、山梔 (D)地龍散
- 49 橈尺骨幹雙骨折，若橈尺骨骨折斷端互相靠攏時，可用下列何種手法整復？
(A)擠捏分骨手法 (B)折頂手法 (C)縱壓手法 (D)回旋手法
- 50 行軍骨折多好發於下列那一部位？
(A)跟骨 (B)舟狀骨 (C)第二蹠骨 (D)第五蹠骨
- 51 有關蹠跗關節脫位之敘述，下列何者正確？
(A)多因間接暴力所致
(B)前足受到扭、旋外力時，更易發生蹠跗關節脫位
(C)臨床中可見第 2~5 蹠骨向內側脫位
(D)一般固定時間 2~3 週
- 52 45 歲女性，踩在椅凳上擦窗戶時不慎向後跌倒，肩部著地損傷，肩部疼痛、腫脹，呈「方肩」畸形，彈性固定於肩外展 20~30 度位置，肩關節照 X 光片如圖示，請問診斷為何？



- (A)肩關節後脫位 (B)盂下脫位 (C)喙突下脫位 (D)鎖骨下脫位
- 53 習慣性顫顫關節脫位復位後，患者可配合自行按摩下列那一個穴道？
(A)翳風穴 (B)風池穴 (C)太陽穴 (D)地倉穴
- 54 下列骨折經正骨手法整復，經 4~6 週後開始以理筋手法復健，下列理筋手法何者不適用？



- (A)按摩法 (B)撥絡法 (C)拔伸牽引法 (D)舉臂抬肩法
- 55 下列何者是正中神經損傷的症狀？
(A)腕下垂 (B)拇指不能外展和背伸
(C)第四、五指不能夾緊紙片 (D)拇指不能對掌，不能向掌側運動

56 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損嘔吐黑血，形氣虛，用加味芎藭湯，此方乃川芎、當歸再加下列何者？

(A)側柏葉、赤芍、生地

(B)百合、生地、牡丹皮

(C)白朮、百合、荊芥

(D)黃連、梔子、大黃

57 附圖箭頭所示，X光診斷為第幾椎壓迫性骨折？



(A)第十二胸椎

(B)第一腰椎

(C)第二腰椎

(D)第三腰椎

58 圖中所示之骨折整復方法，患者坐位，挺胸抬頭，雙手叉腰，術者將膝部頂住患者背部正中，雙手握其兩肩外側，向背部徐徐牽引，使之挺胸伸肩，此法適用於下列何種骨折？




(A)鎖骨骨折

(B)肩胛骨骨折

(C)肱骨外科頸骨折

(D)胸椎骨折

59 圖中所示是指何種基本復位手法？




(A)縱壓

(B)分骨


(C)捺正

(D)端提

- 60 《傷科彙纂》載《陳氏秘傳》法：「布帶一條從患處綁至那邊腋下縛住，又用一條從患處腋下綁至那邊肩胛上，亦用棉絮一團實其腋下，方得穩固。」上述方法是用於固定下列那一種骨折？
(A)鎖骨骨折 (B)肱骨骨折 (C)肩胛骨骨折 (D)肋骨骨折
- 61 「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。精之窠為眼，骨之精為瞳子，筋之精為黑眼…」，該敘述記載於下列何典籍？
(A)《靈樞·五癰津液別篇》 (B)《素問·上古天真論》
(C)《素問·逆調論》 (D)《靈樞·大惑論》
- 62 下列何者為我國最早的五官科醫生？
(A)張仲景 (B)巢元方 (C)扁鵲 (D)孫思邈
- 63 患者自訴眼瞼有一硬塊，發現日漸長大，但生長緩慢，皮色不變（如圖），則下列敘述何者正確？



- (A)痰濕阻結，氣血混結，用化堅二陳丸
(B)脾胃蘊積濕熱，阻滯脈絡，治用荊防敗毒散
(C)局部用紫金錠，外敷如意金黃散
(D)熱毒上攻，口渴喜飲，便秘溲赤，宜清熱瀉火解毒
- 64 一患者長年務農，大眥內側漸鼓起如肉膜，且向黑珠生長（如圖），下列相關敘述何者錯誤？



- (A)胬肉初生者，心肺風熱，多淚癢澀，治宜梔子勝奇散加減
(B)胬肉頭尖高起，體厚紅赤，生長迅速，屬脾胃實熱，蒸騰於上，可治以瀉脾除熱飲，瀉熱通腑
(C)三焦壅熱者，胬肉時輕時重，實熱擾心，心中煩熱，治以消翳湯加減
(D)眼裂部位暴露於外，易於感邪，外感風熱，客於心肺之絡，使眥部經脈瘀滯，胬肉脹起
- 65 患者白睛赤澀輕微，小泡反覆難癒，全身乏力，便溏或便秘，食慾不振，咳嗽有痰，腹脹不舒，舌淡苔薄白，脈細無力，其最可能的診斷及證治為何？
(A)肺陰不足，內治宜養陰清肺湯，以滋陰潤肺，兼以散結
(B)肺脾兩虛，內治宜六君子湯加減，以脾肺雙補
(C)脾腎陽虛，內治宜腎氣丸加減，以溫補脾腎
(D)心脾兩虛，內治宜歸脾湯加減，以健脾養心
- 66 下列何項眼疾癒後較不影響視力？
(A)聚星障 (B)花翳白陷 (C)凝脂翳 (D)白睛溢血
- 67 抱輪紅赤，臨證需與白睛紅赤鑑別，下列敘述何者錯誤？
(A)抱輪紅赤是環繞黑睛周圍發紅，顏色紫暗；白睛紅赤起自白睛周邊，顏色鮮紅
(B)抱輪紅赤其血絡呈放射狀；白睛紅赤其血絡呈樹枝狀
(C)抱輪紅赤血絡推之可動；白睛紅赤血絡推之不可動
(D)兩者可以同時存在，稱白睛混赤

- 68 12 歲男童曾經眼部意外受傷，雖然眼睛外觀完好，視力卻逐漸喪失。檢查眼底視網膜血管變細，視神經萎縮。有關患童的治療，下列何者最適宜？
(A)丹梔逍遙散 (B)血府逐瘀湯 (C)明目地黃丸 (D)人參養榮湯
- 69 金元時代有關耳鼻喉相關醫學的發展與論述，下列何者錯誤？
(A)醫學分科有口齒兼咽喉科
(B)《瘡瘍全書》提及以切開排膿的方法治療咽喉膿腫
(C)《世醫得效方》有喉風十八症之論述
(D)《洪氏集驗方》有應用壓迫頸外動脈以止鼻衄的報導
- 70 有關耳鼻喉口齒科癌症的敘述，下列何者錯誤？
(A)鼻咽癌：早期症狀不明顯，症狀明顯者，多已出現轉移
(B)上頰竇癌：會出現局部疼痛，在患側鼻道流出臭味帶血的膿水
(C)舌菌：好發於舌根，初起舌面易出現增厚斑塊，潰瘍
(D)喉菌：好發於軟顎與喉核處，初起僅有不適感，嚴重會引發呼吸困難
- 71 肝膽濕熱上蒸造成耳部疼痛，痛引腮腦，出現暫時性聽力減退，內治可選用銀花解毒湯，而方中何藥可利水滲濕消腫？
(A)澤瀉 (B)豬苓 (C)赤茯苓 (D)車前子
- 72 耳眩暈之病因病理，下列何者錯誤？
(A)髓海不足 (B)上氣不足 (C)心火上炎 (D)痰濁中阻
- 73 鼻腔內有贅生物，其狀若葡萄或榴子，光滑柔軟，帶蒂而可活動者為下列何病？
(A)鼻疔 (B)鼻痔 (C)鼻槁 (D)鼻疳
- 74 傷風鼻塞，四時均可發生，尤以冬春兩季為多，主要症狀為鼻竅不通、流涕、噴嚏，甚至不聞香臭。其相當於下列何病？
(A)慢性鼻炎 (B)鼻竇炎 (C)急性鼻炎 (D)過敏性鼻炎
- 75 根據《內經》對病機、病位、症狀及「腦滲為涕」的論述與今之急慢性鼻竇炎相類似的是指何鼻病？
(A)鼻槁 (B)鼻淵 (C)鼻塞 (D)鼻瘰肉
- 76 《靈樞·癰疽篇》：「癰發於咽中，名曰猛疽，猛疽不治，化為膿，膿不瀉，塞咽半日死」，是描述下列何病？
(A)乳蛾 (B)喉癰 (C)喉痹 (D)石蛾
- 77 咽喉病的發生，外因多為何種外邪乘機侵犯？
(A)風、濕、燥、火 (B)風、寒、疫、癘 (C)風、熱、濕、疫 (D)風、火、熱、濕
- 78 腎主骨，齒乃骨之餘，而腎之經脈，上繫於齒，齒的生理功能和病理變化，與腎的盛衰有著一定關係；下列相關敘述，何者錯誤？
(A)丈夫二八腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極
(B)丈夫五八腎氣衰，髮墮齒槁
(C)腎熱者色黑而齒槁
(D)齒者骨之所絡，髓之所養，腎實主之，故腎衰則齒豁，精盛則齒堅，虛熱則齒動
- 79 患者因牙齦疾患前來求診，診之發現牙齒疏豁鬆動，牙齦潰爛萎縮根露，潰爛邊緣微紅腫，頭暈耳鳴，舌質微紅少苔，脈細數。此時處置方式下列何者錯誤？
(A)宜選用五味消毒飲加薄荷、牛蒡子、連翹、竹葉
(B)除上述症狀外，若兼有口燥咽乾，口臭，便秘，宜選用玉女煎加女貞子、菟絲子
(C)除上述症狀外，若兼有腰寒肢冷，小便清長，宜選用附桂八味丸
(D)外治可常用淡鹽湯漱口或旱蓮草煎水含漱
- 80 牙癰，波及頰面部腫脹者，宜以下列何種方法處置最為恰當？
(A)用吳茱萸搗爛敷雙足湧泉穴，使浮游上炎之火下行，以引火歸原
(B)用冰硼散藥粉敷貼於患部
(C)用龍眼白鹽散敷貼患部
(D)用如意金黃散敷貼患部