

110年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 42 歲男性，平素喜食冰飲。一日受寒後，咳嗽，平躺時咳甚，痰多而稀，兼見惡寒、發熱、無汗。舌淡紅苔白微厚兼見水滑，脈浮。下列處方何者最適宜？
(A)桂枝三錢，麻黃三錢，白芍三錢，細辛一錢，乾薑兩錢，炙甘草兩錢，五味子兩錢，半夏兩錢
(B)桂枝三錢，麻黃六錢，杏仁三錢，炙甘草兩錢，生石膏六錢，生薑兩錢，大棗三錢
(C)川芎兩錢，柴胡三錢，桔梗兩錢，枳殼兩錢，茯苓兩錢，羌活三錢，獨活兩錢，人參兩錢，甘草兩錢
(D)柴胡兩錢，葛根三錢，羌活兩錢，白芷兩錢，黃芩兩錢，白芍兩錢，桔梗兩錢，炙甘草兩錢，生石膏五錢
- 2 有關《太平惠民和劑局方》參蘇飲之組成下列何者正確？
(A)人參、紫蘇葉、葛根、半夏、前胡、茯苓、陳皮、木香、枳殼、桔梗、生薑、大棗、炙甘草
(B)人參、紫蘇梗、荊芥、防風、枳殼、桔梗、葛根、陳皮、白朮、生薑、大棗、炙甘草
(C)北沙參、紫蘇葉、葛根、半夏、陳皮、木香、枳殼、桔梗、生薑、大棗、炙甘草
(D)黨參、紫蘇梗、黃耆、荊芥、防風、川芎、前胡、半夏、生薑、大棗、炙甘草
- 3 下列解表劑中何者不含有桔梗？
(A)《攝生眾妙方》荊防敗毒散 (B)《此事難知》九味羌活湯
(C)《溫病條辨》銀翹散 (D)《太平惠民和劑局方》參蘇飲
- 4 瀉下劑可分為寒下劑、溫下劑、潤下劑、逐水劑和攻補兼施劑五種類型。下列方劑歸類何者正確？
(A)《傷寒論》大承氣湯屬於寒下劑；《傷寒論》麻子仁丸屬於潤下劑
(B)《金匱要略》大黃附子湯屬於逐水劑；《景岳全書》濟川煎屬於攻補兼施劑
(C)《溫病條辨》新加黃龍湯屬於溫下劑；《溫病條辨》增液承氣湯屬於潤下劑
(D)《傷寒論》十棗湯屬於寒下劑；《備急千金要方》溫脾湯屬於攻補兼施劑
- 5 下列敘述，何者錯誤？
(A)大黃附子湯和當歸四逆湯兩方中共有的藥物有細辛
(B)大黃牡丹皮湯和葶苈湯兩方中共有的藥物有桃仁
(C)大陷胸湯和礞石滾痰丸兩方中共有的藥物有大黃
(D)麻子仁丸和瓜蒌貝母散兩方中共有的藥物有杏仁
- 6 下列各方的功用，何者錯誤？
(A)香蘇散：發汗解表，祛風止痛 (B)銀翹散：辛涼透表，清熱解毒
(C)桑菊飲：疏風清熱，宣肺止咳 (D)人參敗毒散：益氣解表，散風祛濕
- 7 張先生來院門診主訴大便不通，頻轉矢氣，脘腹痞滿，腹痛拒按，按之則硬，潮熱譫語，手足濇然汗出，經醫師診察舌苔黃燥起刺，脈沉實。最宜下列何方？
(A)大承氣湯 (B)小承氣湯 (C)調胃承氣湯 (D)大黃牡丹皮湯
- 8 下列藥物中有幾項為《本草綱目》七寶美髯丹之組成？①何首烏、熟地黃 ②枸杞子、菟絲子 ③杜仲、牛膝 ④當歸、補骨脂
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 9 下列藥物中有幾項為《婦人良方》仙方活命飲之組成？①金銀花、連翹、乳香 ②當歸尾、赤芍、沒藥 ③白芷、防風、柴胡 ④天花粉、甘草、皂角刺
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 10 有關《和劑局方》四物湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)本方具有補而不滯、溫而不燥、滋而不膩，調和陰陽的特點
(B)本方具有血虛能補、血燥能潤、血溢能止、血瘀能行的調血作用
(C)本方加黃連、黃柏、黃芩名曰三黃四物湯，治陰虛潮熱
(D)本方加人參、黃耆，治月經先期而至，量多色淡，四肢乏力，體倦神衰之證
- 11 有關《宣明論方》地黃飲子的敘述，下列何者正確？
(A)方中以熟地黃劑量最大
(B)方中以熟地黃、山茱萸、麥門冬、天門冬滋補腎陰
(C)方中以肉蓯蓉、巴戟天、官桂、附子溫補腎陽
(D)本方陰陽雙補，不溫燥，不滋膩，適宜久服、常服
- 12 有關《脾胃論》補中益氣湯之敘述，下列何者正確？
(A)以人參為君藥，其劑量最大
(B)升麻引太陽清氣上騰，柴胡引少陽清氣上行，以助下陷之清陽上升
(C)本方可治脾胃氣虛證、氣虛下陷證及氣虛發熱證
(D)脾肺虛甚者，最適宜本方治療
- 13 下列方劑中，其組成含茯苓者有幾項？①《衛生寶鑑》人參蛤蚧散 ②《景岳全書》泰山磐石散 ③《三因極一病證方論》人參養榮湯 ④《濟生方》歸脾湯
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 14 下列方劑敘述，何者錯誤？
(A)《小兒藥證直訣》導赤散功用為清心養陰，利水通淋。方藥組成為生地黃、木通、生甘草梢、竹葉
(B)《小兒藥證直訣》瀉青丸為苦辛通降，氣血同治之方。龍膽草苦寒瀉火，為主要藥物；梔子，大黃導熱下行，為次要藥物
(C)《小兒藥證直訣》瀉白散主治肺熱咳嗽，皮膚蒸熱，舌紅苔黃，脈細數。方中桑白皮清瀉肺熱為主要藥物；地骨皮瀉肺之伏火，退虛熱為次要藥物
(D)《小兒藥證直訣》瀉黃散主治脾胃伏火，口瘡。主藥為石膏清熱；梔子清瀉三焦火，為次要藥物；防風、羌活發散鬱火，為佐藥
- 15 下列何種方劑的組方重點在於以石膏清胃熱，與用熟地滋腎陰？
(A)青蒿鱉甲湯 (B)清骨散 (C)玉女煎 (D)瀉黃散
- 16 下列藥物（竹葉、連翹、黃芩、薄荷、梔子、大黃、芒硝、甘草、生蜜）共同組成那個方劑？
(A)普濟消毒飲 (B)涼膈散 (C)清氣化痰丸 (D)清咽利膈湯
- 17 有關《丹溪心法》當歸龍薈丸的組方原則與臨床應用，下列何者錯誤？
(A)主治肝經實火熱盛生風，神志不寧，驚悸抽搐，頭暈目眩，耳鳴耳聾，躁擾狂越，胸膈痞塞，大便秘結，脇痛引少腹
(B)以龍膽草、蘆薈、青黛直入肝經，苦寒瀉火為主藥
(C)以香附與麝香，疏肝行氣通竅
(D)以黃連、黃芩、黃柏、梔子、大黃加強瀉火，使熱從二便出

- 18 下列均為治療腸胃病的常用方劑，其組方原理與運用原則之敘述何者錯誤？
 (A)《證治準繩》四神丸中用肉豆蔻為君藥，取其溫脾暖胃，瀉腸止瀉
 (B)《傷寒論》桃花湯中用赤石脂為君藥，取其酸溫質重，瀉腸固脫而止瀉
 (C)《局方》真人養臟湯中配伍木香，以理氣醒脾
 (D)以上三方止瀉均以溫藥為主，唯一配伍有健脾益氣藥物的方劑是《局方》真人養臟湯
- 19 17 歲邱姓學生來診時，主訴近半年來，月經量多難止。望之身材中等，問之近半年來月經經常先後不定期，且每次月經來經色深紅量多，常有暗黑色黏稠血塊，伴隨頭暈與腰痠；蹲下去站起會頭暈，而且自覺容易煩躁，讀不下書，口乾舌燥。近年來因準備考試，經常熬夜到清晨 2 點才睡覺，精神壓力大，難入眠。三餐飲食規則，排便偏硬日一行。舌質紅，脈來沉細數略弦。依中醫辨證思考，下列證型何者最接近本崩漏案例？
 (A)氣血兩虛 (B)氣虛下陷 (C)陰虛火旺 (D)氣滯血瘀
- 20 承上題，依中醫辨證論治原則，本崩漏案例的治療處方，下列方劑何者最適當？
 (A)《金匱要略》膠艾四物湯 (B)《醫學衷中參西錄》升陷湯
 (C)《丹溪心法》固經丸 (D)《醫林改錯》少腹逐瘀湯
- 21 有關固澀劑中同時含有龍骨與牡蠣的方劑，下列選項何者正確？①《和劑局方》牡蠣散 ②《醫方集解》金鎖固精丸 ③《本草衍義》桑螵蛸散 ④《醫學衷中參西錄》固衝湯
 (A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 22 下列何藥不包含在《金匱要略》桂枝茯苓丸的組成中？
 (A)桃仁 (B)白芍 (C)牡丹皮 (D)紅花
- 23 有關《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯常用於治療咳喘的處方，下列敘述何者正確？
 (A)以生薑、蘇葉宣肺散寒 (B)半夏降逆祛痰平喘，為本方主要藥物
 (C)治療痰涎壅盛，表裏俱實之咳喘證 (D)杏仁降氣平喘、厚朴寬中除滿，為方中次藥
- 24 有關《醫林改錯》，下列處方中何者沒有使用桃仁或紅花？
 (A)少腹逐瘀湯 (B)膈下逐瘀湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)通竅活血湯
- 25 24 歲女性懷孕 8 週，主訴噁逆不已，食入即吐，伴隨胸悶煩躁，其舌脈診發現舌偏紅嫩，脈虛數。下列何方治療最適宜？
 (A)《濟生方》柿蒂湯 (B)《症因脈治》丁香柿蒂湯
 (C)《金匱要略》橘皮竹茹湯 (D)《金匱要略》旋覆代赭石湯
- 26 下列那個方劑組成中無芒硝？
 (A)《傷寒論》大承氣湯 (B)《傷寒論》大陷胸湯
 (C)《金匱要略》大黃附子湯 (D)《溫病條辨》新加黃龍湯
- 27 依《丹溪心法》越鞠丸之敘述，下列共幾項正確？①香附治氣鬱 ②川芎治血鬱 ③梔子治火鬱 ④白朮治濕鬱
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 28 下列何方屬溫開之劑？
 (A)安宮牛黃丸 (B)至寶丹 (C)蘇合香丸 (D)紫雪丹
- 29 下列何者不是《通俗傷寒論》羚羊鉤藤湯的組成藥物？
 (A)桑葉、菊花 (B)白芍、生地 (C)川貝、竹茹 (D)茯神、石決明
- 30 有關蟬蛻的敘述，下列何者錯誤？
 (A)《外科正宗》消風散用本品以祛風止癢
 (B)《傷寒溫疫條辨》升降散用本品疏散風熱，透邪外出
 (C)本品能息風止癢兼清肝熱，可用於小兒急熱驚風
 (D)《楊氏家藏方》牽正散用本品以息風止癢

- 31 有關《傷寒論》豬苓湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)主治水熱互結導致的小便不利
(B)方中用量最大的藥物是豬苓
(C)本方體現利水不傷陰，滋陰不斂邪的特點
(D)《傷寒論》提及豬苓湯證可出現心煩不得眠症狀
- 32 養陰清肺湯主治白喉，係因素體陰虛蘊熱，復感燥氣疫毒所致，方中何者具有「散邪利咽」之效？
(A)大青葉 (B)板藍根 (C)牛蒡子 (D)薄荷
- 33 下列那些藥物為《醫門法律》清燥救肺湯之組成？①阿膠、麥冬、枇杷葉 ②杏仁、胡麻仁 ③人參、甘草 ④貝母、桔梗
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 34 方劑中含有茵陳藥物者，下列共幾項正確？①甘露消毒丹 ②當歸拈痛湯 ③鎮肝息風湯 ④實脾飲
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 35 有關《丹溪心法》保和丸組成中有連翹一味，其作用為何？
(A)清熱解毒 (B)辛涼透表 (C)清熱散結 (D)透熱轉氣
- 36 下列何者為《內外傷辨惑論》枳實導滯丸主要的消食化滯的藥物？
(A)萊菔子 (B)雞內金 (C)神麴 (D)麥芽
- 37 有關《溫熱經緯》清暑益氣湯與《傷寒論》竹葉石膏湯的比較敘述，下列何者正確？
(A)清暑益氣湯主治夏月感暑、濕困傷脾之證 (B)竹葉石膏湯主治氣陰兩傷、胃氣不和之證
(C)清暑益氣湯中有半夏，可降胃和逆 (D)竹葉石膏湯中石斛、麥冬來養陰生津
- 38 有關《千金備急方》溫膽湯之敘述，下列何者正確？
(A)其組成為《太平惠民和劑局方》二陳湯加竹茹、梔子
(B)主證是膽胃不和、痰熱內擾
(C)此方乃以竹茹為君藥；陳皮理氣化痰為臣藥
(D)製服時用酒煎服
- 39 40 歲男性，長期抽菸，主訴咳嗽 1 年，咽癢作咳，夜間咳甚，少痰質稠，口乾咽燥，納可，二便正常，舌紅少苔，脈虛數。最宜下列何項組成方治療？
(A)生地黃、熟地黃、麥冬、百合、白芍、當歸、貝母、玄參、桔梗、甘草
(B)麥冬、半夏、人參、甘草、梗米、大棗
(C)貝母、瓜蒌、花粉、茯苓、陳皮、桔梗
(D)桔梗、荊芥、紫苑、百部、白前、陳皮、甘草、生薑
- 40 下列何者為《濟生方》滌痰湯之主治？
(A)中風，痰迷心竅，舌強不能言者
(B)頑痰膠固，痰涎壅盛，胸膈痞塞，飲食少思以及肝風挾痰，眩暈痰厥，舌苔厚膩，脈滑
(C)膽胃不和，痰熱內擾，虛煩不眠或嘔吐呃逆以及驚悸不寧、癲癇
(D)濕痰咳嗽、痰多色白易咯、胸膈痞悶、噁心嘔吐、肢體困倦、或頭眩心悸、舌苔白潤、脈滑
- 41 有關桂枝單行之功能，下列何者最不宜？
(A)調和營衛 (B)溫經通脈 (C)開竅醒腦 (D)發汗解肌
- 42 下列敘述，何者錯誤？
(A)香薷用於中暑吐瀉，身熱無汗，頭痛口渴，以其化濕解暑
(B)荊芥用於外感風寒，麻疹不透，濕熱瘙癢，以其解表透疹
(C)牛蒡子用於風熱癰疹，疹出不暢，皮膚搔癢，以其疏散風熱
(D)蒼耳子用於風濕痹痛，四肢拘攣，血虛頭痛，以其祛濕止痛

- 43 有關絡石藤之主治，下列敘述何者最不宜？
(A)風濕熱痹，筋脈拘攣 (B)咽喉腫塞，癰疽痲痛
(C)濕熱黃疸，大便溏泄 (D)骨蒸潮熱，小兒疳熱
- 44 有關花椒主治，下列敘述何者最不宜？
(A)下焦虛冷，小便頻數，陰汗囊濕 (B)肺胃素熱、噁心嘔吐、腹痛泄瀉
(C)心腹冷痛，吐瀉痢疾，痰飲水腫 (D)腎氣上逆，陽衰洩數，陰汗泄精
- 45 有關防風宣散之敘述，下列何者最不宜？
(A)散頭目滯氣 (B)散痰火鬱結 (C)散經絡留濕 (D)散目赤瘡瘍
- 46 下列何藥不用於鼻淵常流清涕，鼻塞不聞香臭？
(A)細辛 (B)薄荷 (C)辛夷 (D)白芷
- 47 利水滲濕藥中，下列何者具下乳，潤腸的功效？
(A)瞿麥 (B)燈心草 (C)冬葵子 (D)木通
- 48 下列何藥與柴胡、當歸、白芍等配伍，可用來治療肝鬱氣滯所致的月經不調，經期乳房脹痛，胸悶不舒等症？
(A)香附 (B)鹿茸 (C)牛膝 (D)艾葉
- 49 下列何藥有解熱，止嘔，止瀉，健胃的功效？
(A)青蒿 (B)厚朴 (C)藿香 (D)扁豆
- 50 下列何藥物能清熱利水、除濕止癢？
(A)地膚子 (B)茯苓 (C)澤瀉 (D)燈心草
- 51 關於蒼朮與厚朴的比較，下列何者最正確？
(A)蒼朮偏重氣滯 (B)厚朴偏重濕滯
(C)蒼朮為消積平喘之要藥 (D)厚朴為消除脹滿之要藥
- 52 下列何藥具有破氣消積，化痰除痞的功效？
(A)厚朴 (B)枳實 (C)佛手 (D)桔梗
- 53 下列何藥能清實熱，且可清虛熱，又能滋腎陰，潤腎燥而退骨蒸？
(A)知母 (B)地骨皮 (C)生地黃 (D)牡丹皮
- 54 下列何者為天花粉的藥用部位？
(A)根 (B)種子 (C)花粉 (D)全草
- 55 下列藥物之敘述，何者正確？
(A)漏蘆藥用部位為塊根 (B)山慈姑使用部位為根部
(C)光慈姑毒性大於毛慈姑 (D)白斂毒性大於蚤休
- 56 下列敘述何者正確？
(A)清熱燥濕於中焦的功效，黃連勝於黃芩 (B)黃芩善清心經實火，胃火
(C)葛根解肌，久服易傷脾胃 (D)葛根芩連湯的「連」是指連翹
- 57 下列何者不是石膏適用之證？
(A)汗出 (B)脈洪大 (C)壯熱 (D)入血分
- 58 龍膽草之解痙作用，可用於治下列何者所致之高熱驚厥、手足抽搐？
(A)肝膽虛火 (B)肝腎陰虛 (C)血虛生風 (D)肝經熱盛
- 59 九畏十八反中，白及反下列何者？
(A)紫石英 (B)杏仁 (C)烏頭 (D)龍膽
- 60 下列情況何者需慎用地榆？
(A)虛寒性血便者 (B)吐、衄、崩中者 (C)血熱者 (D)血痢者
- 61 有關虎杖的敘述，下列何者錯誤？
(A)不宜生用 (B)為蓼科植物虎杖的根莖和根
(C)用於經閉、風濕痹痛、跌打損傷等證 (D)能瀉下通便，可用於熱結便秘

- 62 下列何者為蘇木的功效？
(A)利尿通淋 (B)潤腸通便 (C)消腫止痛 (D)蟲積腹痛
- 63 用於痛經、血滯經閉、產後瘀阻腹痛、癥瘕積聚、跌打損傷瘀痛，以及關節疼痛等證。能活血祛瘀，通調經脈。下列何藥用治上述諸種瘀阻之證，常與桃仁、當歸、川芎、赤芍等活血祛瘀藥配用？
(A)荊三稜 (B)紅花 (C)益母草 (D)丹參
- 64 下列何種藥物，可以止血又可以其收斂之性治療慢性泄利？
(A)烏梅 (B)仙鶴草 (C)白茅根 (D)艾葉
- 65 有關甘草的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)潤肺祛痰 (B)安神增智 (C)緩急止痛 (D)調和諸藥
- 66 有關菟絲子的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)溫肺定喘 (B)滋補肝腎 (C)益精壯陽 (D)固精縮尿
- 67 下列何種補陰藥具有滋補肝腎，強腰膝，烏鬚髮之功效？
(A)百合 (B)玉竹 (C)石斛 (D)女貞子
- 68 有關鹿茸的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)陰虛陽亢 (B)陽痿 (C)血分有熱 (D)外感熱病
- 69 下列何種補血藥具有補血和血、活血調經止痛、潤腸通便之功效？
(A)熟地黃 (B)何首烏 (C)當歸 (D)白芍
- 70 下列何者是肉蓯蓉的使用部位？
(A)根 (B)莖 (C)花 (D)葉
- 71 下列何藥用治癲狂、痴呆，係取其開竅安神之功效？
(A)磁石 (B)石菖蒲 (C)石決明 (D)牡蠣
- 72 下列那些藥在開竅藥中，可應用於跌打損傷？①麝香 ②冰片 ③蘇合香 ④石菖蒲
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 73 治療林女士產後血虛，症見驚悸怔忡、虛煩失眠、皮膚搔癢、便秘，下列何項藥物最宜？
(A)龍眼肉 (B)黃耆 (C)柏子仁 (D)合歡皮
- 74 有關天南星的敘述，下列何者最不適當？
(A)陰虛燥痰不適宜使用 (B)膽汁製可增強天南星清熱化痰的功效
(C)為天南星科植物的塊莖 (D)具燥濕和胃作用
- 75 地龍與下列何藥，往往相須為用，治手足抽搐、角弓反張？
(A)龜板 (B)珍珠 (C)僵蠶 (D)全蠍
- 76 下列何藥溫肺化痰，利氣散結，常與蘇子、萊菔子同用於咳喘痰多清稀？
(A)白附子 (B)遠志 (C)白芥子 (D)皂莢
- 77 下列何藥最能利膽退黃？
(A)雞內金 (B)虎杖 (C)鬱金 (D)金錢草
- 78 下列何者歸肺、心、腎經，可用於心陰不足的心悸失眠，還能生津止渴用於津傷口渴？
(A)百合 (B)五味子 (C)天花粉 (D)麥冬
- 79 下列藥物中，何者用於縮泉丸，常與山藥、益智仁、桑螵蛸等同用，可用於遺尿、小便頻數？
(A)烏賊骨 (B)金櫻子 (C)五味子 (D)烏藥
- 80 有關石菖蒲的敘述，下列何者錯誤？
(A)為毛茛科石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.的根莖
(B)可開竅寧神、醒神益智、豁痰、化濕和胃
(C)可用於濕濁中阻，胸脘脹悶
(D)可用於健忘、耳鳴等