

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。


(三)禁止使用電子計算器。

- 依據世界衛生組織及聯合國兒童基金會推行的政策，要成為母嬰親善醫院需符合下列那一項規定？
(A)要求所有母親均需在產檯即開始哺餵母乳
(B)醫院實施每天 8 小時親子同室
(C)除非有醫療特殊需要，否則不給嬰兒母乳以外的食物，包括水、葡萄糖水或配方奶
(D)醫療人員可提供嬰兒人工奶嘴或安撫奶嘴，以緩解哺餵母親乳頭的負擔
- 下列那一種細菌或病毒感染，為罹患子宮頸癌的高危險群？
(A)梅毒螺旋體 (B)奈瑟氏淋病雙球菌 (C)疱疹病毒 (D)人類乳突狀病毒(HPV)
- 李女士，G₁P₀，懷孕 25 週，請教護理師：「我身體上從肚臍到會陰部有一條褐色的線，這正常嗎？什麼時候會消失？」，護理師的回答，下列何者為宜？
(A)這是懷孕期荷爾蒙變化造成皮膚色素沈著，約在生產後會逐漸變淡
(B)這是懷孕常見的妊娠紋，約在生產後 2~3 個月會消失
(C)有可能是胎兒異常的徵兆，建議進一步做染色體核型分析
(D)需儘快到整型外科或皮膚科進行去斑處理，否則容易留下永久的色素沈著
- 有關生產教育的觀念，下列何者正確？①由醫護團隊主導生產過程，減少孕婦生產壓力 ②讓孕婦因應懷孕與分娩照護的過程 ③朝向以家庭為中心的照護 ④強調一定不要使用藥物性減痛方法
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
- 有關運用廓清式呼吸之敘述，下列何者錯誤？
(A)分娩期間每次宮縮開始與結束都應做一次廓清式呼吸
(B)可做為產婦肺部通氣及放鬆的訊號
(C)呼吸速率為正常呼吸速率的 2 倍（約每分鐘 24~32 次）
(D)呼吸法的運用須依產婦的需要及放鬆程度來進行調整
- 羊水指數（AFI）是以超音波觀察羊水量，有關判定之標準，下列何者正確？①小於 10 cm 為羊水過少 ②大於 2000 mL 為羊水過多 ③28 週可達 1000 mL ④約 36 週羊水增加至最高點
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 吳女士，育有一子，目前懷孕 10 週，她曾自然流產一次，也曾因懷孕 24 週胎死腹中而引產。其生產紀錄史，下列何者正確？
(A) G₄P₃AA₁ (B) G₃P₃SA₁ (C) G₄P₂SA₁ (D) G₃P₂SA₁

- 8 下列何種方式是依據懷孕婦女子宮底高度位置推估預產期？
(A)最後一次月經週期 (LMP) (B)內格萊式法則 (Nagel's rule)
(C)麥當勞法則 (McDonald's rule) (D)雙頂徑 (BPD)
- 9 懷孕 11 週的黃女士向護理師抱怨有頻尿的現象，可是並無解尿困難的情形，下列何者是較適當的護理指導？
(A)白天的飲水量應該減少
(B)仍維持每日適當的飲水量
(C)要求黃女士馬上接受醫生的問診
(D)要求黃女士慢慢練習自我控制膀胱，然後將兩次排尿的時間儘量拉長
- 10 李女士在第一產程中破水，下列何者為最優先的措施？
(A)給予陰道內診 (B)評估胎心音 1 分鐘 (C)給予腹部觸診 (D)以石蕊試紙測試羊水
- 11 王女士待產時，胎心率之變異性為 6~10 bpm，下列敘述何者正確？
(A)胎兒感染 (B)胎兒缺氧 (C)胎兒瀕死 (D)胎兒正常
- 12 陳女士，G₁P₀，因規則陣痛而入產房待產，胎位為 ROA，子宮頸口開 1 cm，station=0，下列何者為 station 0？
(A)胎兒的胎頭在骨盆入口上方 (B)胎兒的雙頂徑通過骨盆入口
(C)胎兒的雙頂徑通過恥骨聯合 (D)胎兒的胎頭接近骨盆出口
- 13 承上題，陳女士裝上胎兒監視器，此時胎兒心跳轉送器放置何處，可聽到最清楚胎心音？
(A)肚臍上 1 cm 處 (B)與肚臍平行右側 3 cm 處
(C)肚臍與右髂骨前上棘連線中點 (D)肚臍與恥骨聯合連線中點
- 14 照顧處於過渡期之待產婦，下列何者為最適當的護理措施？
(A)減少探視次數 (B)延長衛教時間 (C)告知產程進展 (D)增加環境刺激
- 15 有關分娩時經產婦的子宮頸變化之敘述，下列何者正確？
(A)子宮頸變薄與擴張同時進行 (B)子宮頸先擴張，再變薄
(C)子宮頸先變薄，再擴張 (D)潛伏期時，子宮頸變薄變短程度為 90~100%
- 16 吳女士 G₂P₁，她希望生產時能免除會陰切開術，以維持會陰的完整性，有關第二產程的護理措施，下列何者錯誤？
(A)溫和觸壓按摩會陰 (B)鼓勵產婦溫和向下用力推進
(C)配合產婦用力衝動向下推擠 (D)平躺使用腳凳盡力伸展腿部
- 17 有關基礎體溫的敘述，下列何者正確？
(A)危險期是排卵前 3 天及排卵後 2 天 (B)依據排卵時體溫上升的原理，以確認危險期
(C)排卵時體溫上升（高於 36.7°C 為高溫期） (D)排卵後體溫下降（約 36.2°C 為低溫期）
- 18 下列何者為子宮復舊不全的現象？
(A)產後 18 天在腹部觸摸到子宮底 (B)產後子宮底每天約下降 1~2 cm
(C)產後 1 週子宮重量下降至 500 公克 (D)產後第 1 天子宮底高度臍平
- 19 有關剖腹產術後照護之敘述，下列何者錯誤？
(A)平躺時可將頭側一邊，避免分泌物阻塞呼吸道
(B)產後 1 小時內每隔 15 分鐘測量生命徵象
(C)術後導尿管須留置至少 8 小時
(D)等產婦可下床活動時，再哺餵母乳

- 20 有關產後生理變化的敘述，下列何者正確？
(A)產後 24 小時內體溫會輕微下降，是因為生產過度用力、脫水的關係
(B)產後 12~24 小時內，排尿量增加為正常現象，是為了排除懷孕時滯留多餘的水份
(C)因為凝血因子增加，可利用霍曼氏試驗評估下肢血栓動脈炎
(D)產後心輸出量增加，脈搏會增加到 80~120 次／分
- 21 劉女士 G₂P₂，陰道生產，產後第 2 天主訴：「我的子宮收縮怎麼這麼痛」，下列何者錯誤？
(A)經產婦的肌肉張力較鬆弛，故疼痛感更明顯
(B)這是因為子宮收縮造成的正常現象
(C)建議熱敷或輕撫按摩緩解疼痛
(D)此現象稱為產後痛，約持續 7 天就會減輕
- 22 有關母嬰親善醫院的 10 項措施，下列何者可直接促進親子依附關係？
(A)生產後於產檯立即性肌膚接觸
(B)除非醫療需求，不提供配方奶
(C)不使用奶瓶奶嘴餵食
(D)提供產婦母乳支持團體
- 23 有關霍曼氏試驗（Homan's test）之敘述，下列何者錯誤？
(A)須讓個案的腳板向背側彎曲
(B)在縮短腓腸肌以壓迫深部靜脈
(C)主要測試是否有深層靜脈血栓
(D)陽性反應為發生疼痛反應
- 24 新生兒出生後進行口鼻抽吸之目的為何？
(A)刺激迷走神經
(B)移除呼吸道分泌物
(C)引發嘔吐反射
(D)適度移除二氧化碳
- 25 有關新生兒凶門的敘述，下列何者正確？①前凶門為菱形，由二塊額骨及二塊頂骨組成 ②後凶門為三角形，約出生後 18 週關閉 ③凶門若凹陷代表有脫水現象 ④胎頭之塑形現象（molding），1 個月後即可恢復
(A)①②
(B)③④
(C)②④
(D)①③
- 26 出生第 3 天的新生兒，出現早發性母乳黃疸，產婦擔心是否可以繼續哺餵母乳，下列護理師的回答何者適當？
(A)應該繼續哺餵母乳
(B)暫停哺餵母乳
(C)減少哺餵母乳次數
(D)暫停由口進食
- 27 有關新生兒的暗示行為之敘述，下列何者錯誤？
(A)投入性暗示行為：注視著照護者，微笑，代表想和人互動
(B)脫離性暗示行為：手腳屈曲，臉轉向照顧者，表示想睡覺
(C)飢餓的暗示行為：把手放在嘴裡，哭泣，拱背
(D)吃飽的暗示行為：睡著，推開照顧者，吸吮動作減少
- 28 護理師執行產後新生兒立即性護理時，發現劉小弟頭頂部有一局部軟組織腫脹，觸診組織鬆軟且外緣界線不清楚，下列敘述何者正確？
(A)是胎頭腫塊（產瘤），為骨膜與顱骨間的血液聚集
(B)是胎頭腫塊，為頭皮上軟組織水腫
(C)是頭血腫，會逐漸越過縫合線
(D)是頭血腫，通常於出生後 24~48 小時消失
- 29 有關 HELLP syndrome 的症狀與致病機轉之敘述，下列何者正確？
(A)為妊娠子癇症，易在懷孕 20 週以前出現，主要症狀是因血小板增加與溶血所引發
(B)指溶血、肝功能指數上升、血小板下降的症候群
(C)是妊娠出血性疾病的一種，包含血液動力失衡、低紅血球症與胎盤功能下降
(D)致病機轉通常與孕婦對胎兒的 ABO 血型不合有關

- 30 有關協助子宮復舊的產後運動，下列何者錯誤？
(A)臀部運動 (B)抬腿運動 (C)膝胸臥式 (D)擴胸運動
- 31 張女士懷孕 39 週，入院待產中，產程進度情形為：子宮頸擴張 4 cm，變薄 40%，高度為 0，胎兒監測器顯示如下圖。根據此圖形，下列何者正確？



- (A)胎頭受壓 (B)胎盤功能不良 (C)臍帶受壓 (D)正常情形
- 32 承上題，護理師的處置下列何者不適當？
(A)採左側臥 (B)調快點滴 (C)調增催產素 (D)面罩給氧
- 33 有關前置胎盤住院治療的護理措施，下列何者錯誤？
(A)執行陰道檢查 (B)監測子宮收縮及胎心率
(C)觀察陰道出血狀況 (D)測量生命徵象
- 34 下列何者不是用來判斷孕婦是否破水的方法？
(A)黏液塞排出 (B)陰道窺鏡檢查 (C)石蕊試紙試驗 (D)羊齒試驗
- 35 子宮頸於產後多久可以恢復到幾乎完全閉合，且變得較厚？
(A)產後 7 天 (B)產後 14 天 (C)產後 28 天 (D)產後 42 天
- 36 有關心臟病婦女妊娠期護理之敘述，下列何者錯誤？
(A)每天應有至少 10 小時以上睡眠，以減少心臟負擔
(B)採左側臥姿勢休息
(C)孕期應告知避免服用 digitalis，以免致畸胎
(D)有上呼吸道感染應立即就醫，及早控制感染
- 37 有關口服 metronidazole (flagyl) 治療陰道滴蟲感染之護理指導，下列何者正確？
(A)婦女先接受治療，無效後再請性伴侶一起治療
(B)可進行陰道清水沖洗以加強治療效果
(C)服藥期間，不可飲用酒精性飲料
(D)治療期間，應配合採用口服避孕藥
- 38 有關以子宮托 (pessary) 減輕子宮脫垂程度，其正確的放置部位為何？
(A)陰道前穹窿 (B)陰道後穹窿 (C)子宮頸外口 (D)子宮頸內口
- 39 有關精液檢查之護理指導，下列何者正確？
(A)保險套直接收集精液送檢 (B)取精後以冰塊維持 7°C 以下送檢
(C)取精後保溫 42°C 送檢 (D)取精後室溫 1~2 小時內送檢

- 40 有關更年期婦女的脂質與脂蛋白改變，下列何者錯誤？
(A)血小板凝集增加 (B)高密度脂蛋白（HDL）增加
(C)低密度脂蛋白（LDL）增加 (D)纖維蛋白原濃度增加
- 41 有關青少年病人住院的護理，下列何者錯誤？
(A)鼓勵青少年病人繼續與同儕保持聯絡
(B)以不批判的態度，接受青少年可能會有的退化性行為
(C)為維護其自我控制權，由他選擇服藥時間及意願，自行服藥
(D)討論各種自我照顧的方式，儘量減少依賴
- 42 護理師幫幼兒觸診頸部時，觸摸到淋巴結，下列對於觸摸到淋巴結特徵的描述，何者屬於異常現象？
(A)直徑小於 1 cm (B)界限不清楚 (C)指下可移動 (D)不會壓痛
- 43 依據常見的嬰幼兒發展現象，一般嬰幼兒乳齒的生長順序，下列何者正確？①上排中央門牙 ②下排中央門牙 ③犬齒 ④第一臼齒 ⑤第二臼齒
(A)①→②→③→④→⑤ (B)①→②→④→⑤→③
(C)②→①→③→④→⑤ (D)②→①→④→③→⑤
- 44 小妮及小美為幼稚園的玩伴，坐在地板互借遊戲器材或玩具一起玩，她們此時的遊戲特徵為何？
(A)競爭遊戲 (B)合作遊戲 (C)平行遊戲 (D)聯合遊戲
- 45 小明，1 歲，罹患主動脈狹窄症（coarctation of the aorta）而入院，下列何者不是其症狀？
(A)上肢血壓比下肢高 (B)肺血管阻力升高而有發紺現象
(C)常主訴頭痛、暈眩 (D)股動脈搏動較弱，甚至摸不到
- 46 雯雯是法洛氏四重畸形（Tetralogy of Fallot's）的病嬰，當其出現發紺嚴重時，護理師為其採膝胸臥式姿勢，可使症狀改善的原理為何？
(A)減少全身血管的阻力，提高血壓 (B)減少下肢回心血量，增加肺部血流
(C)減少上肢回心血量，增加腦部的血液供應 (D)減少血液循環全身的距離，提高全身循環血量
- 47 葳葳，5 歲，剛做完右心導管檢查，返回病房後護理師提供的護理措施，下列何者錯誤？
(A)臥床 6 小時，清醒後即可進食
(B)評估檢查側之肢體循環，並與另一側比較
(C)砂袋加壓穿刺部位，彎曲肢體防止砂袋掉落
(D)觸診兩側肢體的脛骨後動脈或足背動脈，做對稱性比較
- 48 有關胰島素注射的敘述，下列何者錯誤？
(A)應先抽取短效胰島素 RI 後，再抽取中效胰島素 NPH
(B)以 Z 字法做肌肉注射
(C)注射部位須輪換，以避免注射部位脂質增生，影響胰島素的吸收
(D)胰島素注射部位吸收速度由快而慢之排列順序為：腹部＞手臂＞大腿＞臀部
- 49 小明，8 個月大，疑似患有胃食道逆流（gastroesophageal reflux, GER）接受多項診斷檢查，下列何者正確？
(A)食道鏡檢查，可以確認逆流量的多寡
(B)上腸胃道攝影術，需喝下含顯影劑的牛奶
(C)腹部超音波掃描，確認食道炎的位置
(D)24 小時食道酸鹼值測定，是最準確的診斷方法

- 50 兒童接受排空性膀胱尿道攝影（voiding cystourethrography）的主要目的是：
- (A)了解尿路動力學 (B)了解泌尿道生理結構
(C)評估輸尿管逆流情形 (D)評估尿路結石情形
- 51 病童罹患厭食症，於營養復健期間，因過度餵食、體重快速增加可能造成的問題，下列敘述何者正確？
- (A)心血管負擔過重 (B)無月經 (C)胃出血 (D)暴食症
- 52 常見的兒童虐待類型包括身體虐待、情緒（精神）虐待、性虐待及疏忽，有關兒童虐待的敘述，下列何者正確？
- (A)多數兒童虐待的施虐者多為認識的人 (B)大部分兒童性虐待很容易由兒童的舉止發現異常
(C)其中只有身體虐待會導致兒童死亡 (D)兒童疏忽主要是來自照顧者的過度保護
- 53 有關嬰兒急救的程序，下列敘述何者正確？
- (A)可用刺腳跟的方式，檢查嬰兒是否失去意識
(B)以手捏住嬰兒鼻子，口罩住其嘴巴吹兩口氣，進行人工呼吸
(C)以 5～10 秒檢查嬰兒頸動脈的脈搏跳動
(D)若懷疑嬰兒頸部損傷，應使用壓額抬下巴法
- 54 根據衛生福利部擬訂「2025 年衛生福利政策白皮書」，婦幼健康促進長程指標，下列敘述何者錯誤？
- (A)孕產婦死亡率降至 0.016% (B)嬰兒死亡率降至 2.0‰
(C)低出生體重比率降到 2.0% (D)6 個月以下純母乳哺育率提升至 50%
- 55 陳小妹，1 歲半，14 公斤，從火場中被救出，全身 30% 的部分皮層燒傷，目前正滴注靜脈輸液，為評估輸液是否適當，陳小妹每小時的尿量應為多少 mL 較適宜？
- (A) 6 mL (B) 14 mL (C) 30 mL (D) 60 mL
- 56 阿帕嘉評分（Apgar score）是最常用來評估新生兒對子宮外生活立即適應的方法。下列何者不是阿帕嘉評分的計分項目？
- (A)心跳速率 (B)膚色 (C)肌肉張力 (D)排泄情況
- 57 小英，4 歲，因中耳炎需執行耳內給藥，給藥時，應將小英耳朵往那一方向拉？
- (A)往上往後拉 (B)往下往前拉 (C)往上往前拉 (D)往下往後拉
- 58 小明，9 歲，因患白血病被告知需住院至少一個月接受治療，此階段兒童最關心的事為何？
- (A)與父母分離 (B)活動限制 (C)閹割焦慮 (D)學業與同儕關係
- 59 有關早產兒視網膜病變，下列敘述何者正確？
- (A)主要發生於妊娠 35 週以上的早產兒 (B)與過度或長期給高氧、光線刺激有關
(C)因視網膜血管舒張及發育不良所致 (D)應於 4 個月大時，開始接受視網膜檢查及追蹤
- 60 有關新生兒各系統生理特徵與調節，下列何者正確？
- (A) IgG 不會通過母體胎盤到達新生兒體內
(B)女嬰出生後，陰道出現紅色分泌物，此徵象乃是受母親雌激素中斷所影響
(C)出生後肺血流增加，肺靜脈血回流至左心房血流量與壓力增加，使靜脈導管關閉
(D)新生兒黃疸主要是由於體內甲硫胺酸（methionine）量不足或未活化，而導致結合型膽紅素無法排出
- 61 小健，國中一年級，罹患第一型糖尿病（type 1 diabetes mellitus），有關糖尿病照護，下列敘述何者正確？
- (A)為減少兒童被歧視，儘量減少其參與社會性活動
(B)避免告知老師及同儕罹患糖尿病，以減少被標籤化
(C)聯絡老師，允許不參加體育課，以預防疾病惡化
(D)只要適當控制血糖，也可自我照顧並和同學一起聚餐

- 62 彤彤，因母親懷孕 30 週時突然破水致早產，出生體重 1020 公克，併有腦室內出血（intraventricular hemorrhage, IVH），下列護理措施，何者錯誤？
(A)抬高床頭 15~20 度，以減少顱內壓
(B)密切監測出血徵狀，如血壓降低、血比容下降
(C)觀察是否出現囟門膨出、頭圍增加等顱內壓升高現象
(D)限制家屬探訪，避免造成感染
- 63 有關新生兒壞死性腸炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)因週產期窒息腸道缺氧，引起壞死及細菌侵犯腸黏膜
(B)常侵犯部位為乙狀結腸及直腸壺腹處
(C)哺餵母乳為最佳的預防方法，母乳內之 IgA 能抑制或殺死細菌
(D)體溫測量時宜避免測量肛溫，以免傷害腸黏膜
- 64 凱凱，足月產，體重 3050 公克，出生後 24 小時抽血呈現血清膽紅素值為 27 mg/dL，欲執行換血治療，下列相關描述，何者正確？
(A)採用之血液，最好為新鮮血液，或不超過 72 小時之血庫血袋，以防止血袋中鉀離子過高
(B)為預防血袋內抗凝血劑所含之檸檬酸，與嬰兒血中鈣結合引起高血鈣，需注射抑鈣激素（calcitonin）
(C)備血之血量為嬰兒全身血量的 3 倍，約 800mL 為原則
(D)如因 Rh 血型不合而發生溶血者，應備 O 型且 Rh 血型為陽性
- 65 依照衛生福利部疾病管制署 106 年公布之「我國現行兒童預防接種時程」，卡介苗（BCG）之建議接種時間為：
(A)出生滿 7~21 天 (B)出生滿 1~4 個月 (C)出生滿 5~8 個月 (D)出生滿 9~12 個月
- 66 小冬，5 歲半，是一位初診斷後長期需要類固醇治療的腎病症候群的病童，今年秋天母親提出預防接種的問題，下列何種疫苗適用於小冬？
(A)水痘疫苗（varicella） (B)麻疹疫苗（measles）
(C)流行性感冒病毒（influenza） (D)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）
- 67 有關哮喘（croup）之敘述，下列何者正確？
(A)最常引起的致病原是 A 群 β 型葡萄球菌
(B)較易發生在學齡期兒童
(C)呼氣時會聽見哮喘聲（stridor）
(D)病童會出現聲音沙啞（hoarseness）、喉嚨緊縮及狗吠式咳嗽（barking cough）
- 68 有關扁桃腺切除術（tonsillectomy）後的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)鼓勵病童常做咳嗽動作，以利肺部擴張
(B)協助採側臥或俯臥，以利分泌物引流
(C)觀察嘔吐物是否含血液性質
(D)開始進食後，可提供冰涼的果凍、布丁、冰淇淋
- 69 下列那一項胸腔物理治療是利用重力原理，使肺內的分泌物，易流至較大的支氣管，以利痰液排除？
(A)震顫 (B)姿位引流 (C)叩擊 (D)抽痰
- 70 小紅，7 歲，因發燒、咳嗽、流鼻水症狀而入院。診斷為黴漿菌感染性肺炎（mycoplasma pneumonia），下列敘述何者正確？
(A)好發於 1~3 歲兒童 (B)使用藥物為 erythromycin 或 azithromycin
(C)傳染途徑主要為接觸傳染，應加強洗手 (D)主要由腺病毒引起，導致黏膜水腫

- 71 疼痛控制為照護兒癌病童之一大挑戰，有關疼痛的評估及處置，下列敘述何者正確？
(A)若兒童沒有主訴疼痛，表示沒有疼痛
(B)病童主訴疼痛時再給止痛藥，可減少止痛藥物副作用
(C)可運用轉移注意力的方式（如看卡通），緩解疼痛
(D)在給予止痛藥物時，應以針劑止痛藥為優先考量
- 72 根據衛生福利部疾病管制署「愛滋病防治手冊」，有關照顧愛滋病（AIDS）的產婦及新生兒，下列敘述何者正確？
(A)母親於分娩過程中應停止抗病毒藥物治療
(B)新生兒出生 24 小時內通報
(C)新生兒一週後開始接受抗病毒藥物治療
(D)建議哺餵母乳增加新生兒抵抗力
- 73 近年來由於飲食及生活型態的改變，致使那一類型的問題疾病增加？
(A)第一型糖尿病（type 1 diabetes）
(B)第二型糖尿病（type 2 diabetes）
(C)葡萄糖耐受性不良（impaired glucose tolerance）
(D)糖尿病酮酸症（diabetes ketone acidosis）
- 74 有關於先天性腎上腺素增生症（congenital adrenal hyperplasia, CAH），下列敘述何者正確？
(A)是一種體染色體顯性遺傳疾病
(B)24 小時尿液 17-ketosteroids（17-KS）會下降
(C)夜間服用 cortisone，以維持正常皮質類固醇分泌
(D)注意每日體重、輸入、輸出量及鈉、鉀離子之平衡
- 75 小鋼，7 歲，罹患威廉氏腫瘤（Wilms tumor）第三期，即將接受腎臟切除術。下列敘述何者正確？
(A)屬無觸痛感之良性腫瘤
(B)術前可按摩病童腹部，減輕腫脹不適
(C)第三期腫瘤局限於腎臟及周邊組織，以腎臟切除手術即可完全根除
(D)需監測腎功能、血壓及輸出入量
- 76 5 歲以下兒童跌倒，容易導致何部位脫臼（dislocation）？
(A)髖部
(B)膝部
(C)手肘
(D)腕部
- 77 王小弟，3 歲，罹患腎病症候群（nephrotic syndrome），目前服用 prednisolone 治療。護理師在安排與王小弟同住的病童時，下列何者適宜？
(A)2 歲，張小弟，診斷哮吼（croup）
(B)3 歲，吳小弟，診斷腸病毒（enterovirus）
(C)3 歲，李小妹，診斷水痘（varicella）
(D)4 歲，陳小妹，診斷疝氣（hernia）
- 78 有關皮肌炎（dermatomyositis）兒童的護理評估，下列何者錯誤？
(A)視診臉部會有紅斑結節性皮膚疹
(B)視診關節部有對稱性紅斑
(C)觸診肌肉時會感到鬆軟無力
(D)叩診病變處裡的關節反射減低
- 79 王小弟，8 歲，罹患細菌性腦膜炎（bacterial meningitis），下列徵象何者正確？
(A)巴氏徵象（Barlow's sign）陰性
(B)布魯金斯基氏徵象（Brudzinski's sign）陽性
(C)克爾尼格氏徵象（Kernig's sign）陰性
(D)反彈性疼痛（Rebounding pain）陽性
- 80 有關腰椎穿刺之敘述，下列何者錯誤？
(A)可做為檢查、診斷或治療途徑
(B)採俯臥平躺，以利穿刺針頭插入，避免傷害
(C)穿刺後宜觀察中樞神經系統感染、脊髓脫出等合併症
(D)穿刺後應教導平躺 4~6 小時，避免頭痛等合併症