

105 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、  
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105 年專門職業及技術人員  
高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2102  
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 44 歲女性患者，主訴咳嗽已 3 天，近咽癢則咳，痰白黏，胸悶，頭身微重痛，惡風寒、無發燒，口乾喜溫飲。診其舌苔白、淡紅舌，脈浮緊。治以下列何方最適宜？  
(A)羌活勝濕湯 (B)荊防敗毒散 (C)小青龍湯 (D)柴葛解肌湯
- 2 某男性患者，罹患慢性阻塞性肺病已 20 年，目前乾咳無痰，咳嗽以傍晚或晚上較嚴重，舌質紅絳，無苔，脈細數。治宜下列何法？  
(A)宣肺氣 (B)溫肺陽 (C)補肺氣 (D)滋肺陰
- 3 30 歲女性患者，來診時主訴頭痛 2 天，患者於 3 天前出現鼻塞、發熱、微感惡寒、流鼻水症狀，今日來診主訴痰黃、口苦，診其苔薄白，脈浮數。處以下列診斷何者最適合？  
(A)風寒頭痛 (B)風熱頭痛 (C)風濕頭痛 (D)肝陽頭痛
- 4 43 歲氣喘患者，常於夜間發作，今早來診，主訴昨夜氣喘發作，症見咳嗽，喘鳴，胸悶，咽痰梗，納呆，脘痞脹，噯氣而無食物腐敗味道，大便溏，舌苔白膩，脈浮滑，下列藥物組合何者最為適宜？  
(A)蘇子、半夏、當歸、前胡、厚朴、薑汁、肉桂、生甘草  
(B)麻黃、杏仁、半夏、厚朴、茯苓、紫蘇葉、藿香、佩蘭、薏苡仁  
(C)陳皮、半夏、黨參、炒白朮、茯苓、木香、砂仁、蘇子  
(D)陳皮、半夏、神麴、山楂、茯苓、連翹、蘿蔔子
- 5 60 歲男性患者，咳嗽已 2 個月，患者來診時訴說咳嗽不爽，痰多，腹脹滿，大便便秘，口乾，舌診苔薄白乾，舌質稍紅，脈診數脈，處以下列何方最適宜？  
(A)杏蘇散 (B)參蘇飲 (C)五仁橘皮湯 (D)加減萎蕤湯
- 6 60 歲女性患者，有多年吸菸史合併支氣管擴張病史，使用支氣管擴張劑控制，近 1 週來家屬發現患者的呼吸狀態呈現張口抬肩，無法平臥休息。其咳嗽痰多色白稠，胸悶，口渴喜溫飲，舌苔白膩，脈滑數，其肺功能檢查發現第一秒用力吐氣容積 (forced expiratory volume in 1 second, FEV<sub>1</sub>) 的預測值比率 (predicted FEV<sub>1</sub>%) 只剩下 50%。依中醫辨證，下列何者最適宜？  
(A)痰熱鬱肺 (B)痰濁阻肺 (C)肺氣鬱痹 (D)風寒襲肺
- 7 承上題，治以下列何方最適宜？  
(A)麻杏甘石湯 (B)二陳湯 (C)桑白皮湯 (D)小青龍湯
- 8 66 歲男性病患，胸痛如窒，氣促痰多喘咳，以栝蒌薤白白酒湯合血府逐瘀湯治之，症反而心悸喘甚，肢厥冷汗，神志淡漠，面色唇甲青紫，脈沉微欲絕。此時之證型以下列何者最適合？  
(A)氣虛血瘀 (B)痰濁閉阻 (C)心陽欲脫 (D)陰寒內結

- 9 有關血清陰性關節炎（seronegative spondyloarthritis）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)類風濕因子（rheumatoid factor）為陰性，但常出現 HLA-B27 基因陽性  
(B)僵直性脊椎炎為最常見的疾病，以下背痛和周邊大關節發炎為主  
(C)皮膚若出現乾癬病變，可能出現各種不同之乾癬性關節炎  
(D)若類風濕因子（rheumatoid factor）為陽性，合併有全身多處關節炎，即可診斷為類風濕性關節炎
- 10 56 歲男性，有二級房室傳導阻滯、心房早期收縮和心律不整病史。在運動時容易發生心悸，休息後自動緩解；平時神倦氣短，健忘，失眠，頭暈目眩，面色無華，自汗，舌淡紅、脈細弱。下列證型何者最適合？  
(A)心脾兩虛 (B)肝腎陰虛 (C)氣滯血瘀 (D)氣陰兩虛
- 11 承上題，治以下列何方最適合？  
(A)炙甘草湯 (B)歸脾湯 (C)血府逐瘀湯 (D)六味地黃丸
- 12 54 歲男性高血壓患者，平日常吃便當開會，易心煩易怒，眩暈頭痛，面紅目赤，服藥後血壓仍偏高。某日開會後，突然言強語蹇，偏身麻木，腦部斷層掃描發現有缺血性腦中風，下列敘述何者錯誤？  
(A)病因病機為肝火上炎 (B)可治以平肝瀉火 (C)此屬中臟腑 (D)可治以熄風通絡
- 13 承上題，本病證的臨床最佳處方為下列何者？  
(A)滌痰湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)大秦芄湯 (D)地黃飲子
- 14 32 歲男性患者，前日剛回國，自述在國外路邊攤吃東西後就開始腹瀉腹痛，瀉而不爽，糞色黃褐，氣味臭穢，肛門灼熱，但無發燒，苔黃膩，脈滑。治以下列何方最適宜？  
(A)四神丸 (B)葛根黃芩黃連湯 (C)痛瀉要方 (D)通幽湯
- 15 若見大便秘結，面色萎黃無華，頭暈目眩，心悸，唇舌淡，脈細，則下列何項治療最適當？  
(A)桃仁、麻子仁、枳殼、大黃、杏仁、黃耆、黨參  
(B)桃仁、麻子仁、杏仁、郁李仁、枳殼、生地、黃耆  
(C)桃仁、麻子仁、枳殼、升麻、川芎、杏仁、大黃  
(D)桃仁、麻子仁、杏仁、枳殼、當歸、生地、大黃
- 16 67 歲女性胃潰瘍患者，近日開始出現稍有勞倦即易嘔吐、時作時止，胃納不佳，口淡不渴，面白，倦怠乏力，舌質淡，苔薄白，脈弱。治以下列何方最適合？  
(A)藿香正氣散 (B)理中湯 (C)麥門冬湯 (D)小半夏湯合苓桂朮甘湯
- 17 32 歲女性，主訴慢性咽喉痛與心悸五年。面白體瘦，胸悶乾咳，食慾不振，少食胃脹，上腹嘈雜，心悸頭暈，口渴咽乾，大便三日一行偏硬，常覺咽喉疼痛伴隨聲音沙啞，脈細數，舌質紅，苔薄少，有剝苔。患者進行鼻鏡檢查，鼻部無異狀，咽喉下段水腫。心電圖及心臟超音波檢查無異常。下列診斷何者最正確？  
(A)二尖瓣脫垂 (B)自律神經失調 (C)胃食道逆流 (D)過敏性鼻炎
- 18 承上題，針對本例患者反覆咽喉痛及心悸之症狀，下列處方何者最適合？  
(A)銀翹散加山豆根 (B)半夏厚朴湯 (C)蘇子降氣湯 (D)一貫煎加大黃
- 19 有關「嘔吐」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)是由於胃失和降，氣逆於上所引起的病證  
(B)前人以無物有聲謂之嘔  
(C)前人以有物無聲謂之吐  
(D)「反胃」一證雖也有嘔吐的臨床表現，但反胃屬脾胃虛寒所致，「嘔吐」則有虛實之分

- 20 有關肝炎黃疸之敘述，下列何者錯誤？  
(A)病機關鍵是熱 (B)治療重在通利小便，使邪有出路  
(C)陽黃者，偏治在胃；陰黃者，偏治在脾 (D)久病者，治宜補慎利，或攻補兼施
- 21 有關鼓脹之敘述，下列何者錯誤？  
(A)鼓脹病名首見於《內經》  
(B)雞矢醴為治療鼓脹最早的方劑  
(C)《內經》所創立「中滿者，瀉之於內」之論點，對鼓脹的治療有指導意義  
(D)《金匱要略》提出治水的總則是：腰以下腫，當通大便；腰以上腫，當發汗乃癒
- 22 臨床上患者腹大堅滿，脘腹撐急，經診斷為肝硬化腹水，若症見煩熱口苦，渴不欲飲，小便赤澀，大便秘結或溏垢，舌邊尖紅，苔黃膩或兼灰黑，脈象弦數，或有面目皮膚發黃，則治以下列何方最適宜？  
(A)茵陳四苓散 (B)調營飲  
(C)膈下逐瘀湯合六味地黃湯 (D)茵陳蒿湯合中滿分消丸
- 23 68 歲慢性腎衰竭患者，近來噁心、嘔吐頻作，納呆、腹脹，大便溏，脈濡，舌淡胖、苔白。治以下列何方最適宜？  
(A)旋覆代赭石湯 (B)半夏瀉心湯 (C)四神丸 (D)益胃湯
- 24 張小姐近幾天外感，主訴眼瞼浮腫，至下午後手足水腫，惡風發熱，四肢痠痛，小便不利，舌苔薄白，脈浮緊。診斷以下列何者最適宜？  
(A)風水氾濫 (B)濕熱壅結 (C)脾不制水 (D)腎虛水泛
- 25 40 歲男性，體瘦，到診時抱怨少腹墜脹，解尿後仍有餘尿感，西醫診斷為慢性膀胱炎，並見納差，面色白，舌質淡，脈細無力。治以下列何方最適宜？  
(A)八正散 (B)沉香散 (C)少腹逐瘀湯 (D)補中益氣湯
- 26 對淋證的定義、分類和病因之敘述，下列何者錯誤？  
(A)淋證以小便頻急，尿道澀痛，小腹拘急，痛引臍中為特徵  
(B)淋證依據不同表現，可分為熱、血、氣、石、勞等淋  
(C)淋證初起多因肝經濕熱，其病在臟，屬於實證  
(D)淋證的病因，《金匱要略·五臟風寒積聚病脈證并治》認為是熱在下焦
- 27 有關癰閉證治之敘述，下列何者錯誤？  
(A)小便點滴不通，量少而短赤灼熱，小腹脹滿，口苦口黏，大便不暢，舌紅、苔黃膩，脈數者，八正散主之  
(B)小便涓滴不通，或點滴不爽，咽乾，煩渴欲飲，呼吸短促，咳嗽，苔薄黃，脈數者，沉香散主之  
(C)時欲小便而不得出，小腹墜脹，神倦，食慾不振，氣短而語聲低細，舌質淡，苔薄，脈細弱者，補中益氣湯合春澤湯主之  
(D)小便點滴而下或尿如細線，甚則阻塞不通，小腹脹滿疼痛，舌紫暗、瘀點舌，脈細澀者，代抵當丸主之
- 28 52 歲王女士工作壓力大，常發作頭暈神昏，伴頭部脹痛感；當頭疼時，兼見反胃。平時煩躁易怒，少腹易脹，小便常點滴不利，久坐後下肢水腫。診其舌紅苔薄黃但不厚膩，脈弦。診斷以下列何者最適宜？  
(A)肝鬱氣滯 (B)膀胱濕熱 (C)脾氣不升 (D)腎陽虛衰

- 29 與皮肌炎有關之中醫病名，下列何者最不相關？  
(A)痿症 (B)肌痹 (C)著痹 (D)皮痹
- 30 有關「痹證」之敘述，下列何者錯誤？  
(A)風、寒、濕、熱等外邪是引起痹證的主要原因  
(B)主要病機是外邪阻滯經絡，使氣血運行不暢  
(C)關節遊走疼痛，為行痹之特徵  
(D)關節腫大，是痛痹主要臨床表現
- 31 50 歲王先生罹患類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）多年，症見晨起關節僵硬，四肢多處關節腫痛且變形，活動時痛，屈伸受限，痛處不移，肌膚紫暗，舌質暗紅有瘀斑，苔白，脈弦澀，治以下列何方最適合？  
(A)烏頭湯 (B)薏苡仁湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)獨活寄生湯
- 32 某 40 歲男性，與友人步行至附近海產店吃完宵夜後入眠，到半夜突然足趾及足背關節紅腫熱痛甚，無法下床走動，則下列診斷何者最可能？  
(A)過敏 (B)痛風 (C)丹毒 (D)類風濕性關節炎
- 33 承上題，若患者症狀伴隨發熱，惡風，口渴，煩悶不安，小便黃少，舌質紅，苔黃，脈弦滑數，則下列診斷何者最可能？  
(A)風濕熱痹 (B)風寒濕痹 (C)濕熱下注 (D)痰瘀互結
- 34 承上題，以下列何方治療最適當？  
(A)烏頭湯 (B)白虎桂枝湯 (C)當歸拈痛湯 (D)身痛逐瘀湯
- 35 22 歲孫女，甲狀腺腫痛已 3 天，西醫診斷為亞急性甲狀腺炎，症見發熱微惡寒，咽痛，口乾，口苦，苔黃，脈弦數。治以下列何方最適宜？  
(A)溫膽湯加真人活命飲 (B)梔子清肝湯合藻藥散  
(C)銀翹散加小柴胡湯 (D)加味逍遙散加陽和湯
- 36 有關「三消」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)上消病情較輕，下消病情較重，上中二消病久失治，可傳為下消  
(B)上消病位在肺，下消病位在腎  
(C)中消病位在胃屬胃火者，其病機同於胃家實  
(D)三消雖有上中下之分，其實不外乎陰越陽亢、津涸熱淫
- 37 有關「中風」之中醫相關病名，下列何者錯誤？  
(A)卒中 (B)大厥 (C)癰風 (D)腦風
- 38 《傷寒論》白虎湯最適合下列那一種消渴的病證？  
(A)上消燥熱傷肺 (B)中消脾胃陰傷 (C)中消胃火燔煉 (D)下消虛火刑金
- 39 54 歲男性高血脂症患者，平時工作壓力大，就診時症見面紅目赤，口乾咽燥，煩躁易怒，脅肋悶脹，時頭暈頭痛，大便乾，每日 1 行，尿黃，舌質紅，舌苔黃燥，脈弦。診以下列何證型最適宜？  
(A)脾虛痰濕 (B)肝陽上亢 (C)肝鬱化火 (D)陰虛火旺

- 40 38 歲女性患者，主訴突然口眼喎斜，語言不利，口角流涎，手足麻木，兼見惡寒發熱，肢體拘急，關節疼痛，舌苔薄白，脈浮數無力。治以下列何方最適宜？  
(A)牽正散 (B)地黃飲子 (C)解語丹 (D)補陽還五湯
- 41 辨別頭痛，若能根據經脈循行部位加以判斷，則對審因施治均有所幫助。下列敘述何者錯誤？  
(A)太陽頭痛：多在頭後部，下連於項 (B)陽明頭痛：多在前額及眉稜  
(C)少陽頭痛：多在頭之兩側，連及耳部 (D)厥陰頭痛：在明堂部位，或連於目系
- 42 47 歲女性患者，主訴頭暈已兩年，症見經常頭暈、失眠、食納不香、飲食量少、神疲、倦怠乏力，理學檢查：血壓 90/65 毫米汞柱，診其面色略黃，薄白苔、淡紅舌，脈細。治以下列何方最適宜？  
(A)天麻鉤藤散加龍骨、牡蠣 (B)半夏天麻白朮湯加鬱金、石菖蒲  
(C)右歸丸加酸棗仁、阿膠 (D)歸脾湯加柏子仁、茯苓
- 43 有關中風之敘述，下列何者錯誤？  
(A)唐宋以前醫家對於中風的發病，多以正虛外邪入中立論，代表方如侯氏黑散、小續命湯等  
(B)唐宋以後醫家突出以「內風」立論  
(C)李東垣首次從病因學角度將中風分為「真中」、「類中」兩個類型  
(D)張介賓提出「非風」之論，強調「內傷積損」是導致本病的根本原因
- 44 有關痿證之敘述，下列何者錯誤？  
(A)脈痿乃心氣熱、脈虛，樞折挈、脛縱而不任地  
(B)皮痿乃肺氣熱，皮毛虛弱急薄而生痿癢  
(C)筋痿乃肝氣虛，筋膜乾，膽泄口苦、筋急  
(D)骨痿乃骨枯髓減，腰脊不舉
- 45 惡性淋巴瘤患者，於頸項、耳下及腋下發現明顯淋巴節結，不痛不癢，皮色正常，堅硬如石，推之可動，形寒肢冷，神疲乏力，小便清長，舌淡苔白脈沉細。治以下列何方最適合？  
(A)清氣化痰湯合消癰丸 (B)血府逐瘀湯合失笑散  
(C)六味地黃丸合失笑散 (D)陽和湯合消癰丸
- 46 王先生 34 歲，是位成功的化學產品業務員，平時推廣業務往往互相敬菸，致菸不離手已有 20 年。在外工作時不能隨時如廁而有忍尿的情況。有一天他突然發現小便都是紅色的，不痛，不腰痠，隔了幾日又沒有尿血了，小便順暢並不頻尿。如此反覆發作數個月。下列何者為最有可能的診斷？  
(A)膀胱癌 (B)泌尿道感染 (C)攝護腺腫大 (D)急性腎盂腎炎
- 47 某 56 歲男性患者，慢性 B 型肝炎病史多年，上週腹部超音波檢查發現肝臟有腫塊，理學檢查右上腹部積塊明顯硬痛，推之不移，症見面暗消瘦，納差乏力，舌質暗紫瘀點，脈細澀，下列診斷何者最適宜？  
(A)肝氣鬱滯 (B)食滯痰阻 (C)氣結血瘀 (D)痰濕阻滯
- 48 承上題，下列處方何者最適宜？  
(A)逍遙散 (B)膈下逐瘀湯 (C)枳實導滯丸 (D)導痰湯
- 49 有關奇經八脈與婦科系統之生理病理關係，下列敘述何者錯誤？  
(A)衝脈與月經的產生有關，為月經之本 (B)任脈有病，可形成「帶下瘕聚」的疾病  
(C)督脈生疾，可形成不孕 (D)衝、任、帶三脈同起於胞中，均與胞宮有關
- 50 35 歲女性月經先期，出血量多、色鮮紅、質黏稠，夾有血塊，其證型以下列何者最為適當？  
(A)虛熱 (B)血熱 (C)血瘀 (D)氣虛

- 51 18 歲女性，初經年齡為 15 歲，自初經開始就月經量少，月經往往只有一天就乾淨，經色黯淡，平常容易頭暈耳鳴，小腹冷，舌質淡，苔薄白，脈沉弱。下列關於此病患的證候分析以何者最適宜？  
(A)寒凝胞宮 (B)脾胃氣不足 (C)血虛失養 (D)腎精氣不足
- 52 承上題，治療此病患的處方，以下列何者最適宜？  
(A)《脾胃論》補中益氣湯 (B)《景岳全書》當歸地黃飲  
(C)《證治準繩》八珍湯 (D)《金匱要略》溫經湯
- 53 32 歲患者，每逢經期即衄血，衄血量少，色暗紅，頭暈耳鳴，手足心熱，咽乾，口渴，月經常常提前，經量少，舌紅，剝苔，脈細數。其治療原則下列何者最適宜？  
(A)疏肝清熱、止血調經 (B)疏肝解鬱、降逆止血  
(C)健脾養心、益氣攝血 (D)滋陰潤肺、清熱涼血
- 54 38 歲何女，五度生產之後，逢經行則大便泄瀉，經色淡質清，頭暈耳鳴，膝痠軟與畏寒肢冷，脈沉遲，臨床診療下列何者最不恰當？  
(A)為脾虛氣陷，但腎氣未損  
(B)可用黨參、白朮、茯苓、苡仁、吳茱萸、肉豆蔻、補骨脂等藥組方治療  
(C)治療時須避免過用疏肝理氣藥物  
(D)大便應無敗卵之臭味
- 55 當患者因「更年期綜合徵」就醫，醫師開立黃柏三錢，茯苓三錢，山藥四錢，丹皮二錢，山萸肉三錢，知母三錢，澤瀉三錢，生地八錢治療時，下列敘述何者最為恰當？  
(A)此方作用為滋腎瀉火與溫補腎陽  
(B)證屬腎陰陽兩虛時適用  
(C)其臨床主要症狀為月經週期不穩定，頭眩耳鳴，腰膝無力，兩足欠溫，時怕冷與時轟熱，舌淡，脈沉細  
(D)病機為腎陰虧損，肝陽偏亢，衝任不足
- 56 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》治療癥證，宜遵循下列何項原則？①宜審病勢之緩急 ②屬風寒凝瘀者，先溫其寒 ③若形證俱實，宜先攻其病 ④大積大聚，衰其大半而止  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 57 有關「熱入血室」之敘述，下列何者錯誤？  
(A)常晝日明了，暮則譫語 (B)其發熱伴隨每次月經週期而出現  
(C)其熱型多往來寒熱 (D)其發病與經行有關
- 58 《醫宗金鑑》中有關妊娠腹痛之敘述，下列何者錯誤？  
(A)若痛上在心腹之間者，多屬食滯作痛，宜平胃散  
(B)若痛下在腰腹之間者，多屬胎氣不安作痛，宜四物湯，君以延胡索  
(C)若痛在少腹之間者，則可能因胞血受寒，宜加味芎歸飲  
(D)若併見尿澀而痛，膀胱水病熱甚，宜五苓散
- 59 下列敘述何者錯誤？  
(A)難產的主要機理是脾腎虛損  
(B)轉胞的主要機理是胎氣下墜，壓迫膀胱  
(C)產後腹痛的主要機理是氣血運行不暢  
(D)子淋的主要機理是膀胱氣化不行

- 60 依《景岳全書·婦人規》，兒枕痛最當辨察下列何者？  
(A)寒熱 (B)虛實 (C)氣血 (D)陰陽
- 61 34 歲女性患者，每月逢月經前一週即出現乳房脹痛，觸之有硬塊，推之可移動。西醫診斷為乳房纖維腺瘤（breast fibroadenoma）。經前並伴見心煩易怒，太陽穴頭脹痛及兩少腹脹痛等症狀，月經來潮之後諸症減輕。診其脈弦，舌紅苔薄白，下列診斷何者最恰當？  
(A)乳癖，證屬肝氣鬱結 (B)乳粟，證屬熱毒內盛  
(C)拓乳，證屬肝鬱氣滯 (D)乳癰，證屬痰氣凝結
- 62 謝小姐自產後至今，睡覺時容易流汗，醒來自止，偶爾面色易潮紅，伴有頭暈現象，不時覺得口燥咽乾，並有腰膝痠軟情形，見其舌嫩色紅，無苔，脈細數無力，最適宜給予下列何方治療？  
(A)人參、麥冬、五味子、煅牡蠣、浮小麥、生地黃、白芍  
(B)黃耆、炙甘草、人參、當歸、陳皮、升麻、柴胡、白朮、杜仲  
(C)黃耆、煅牡蠣、浮小麥  
(D)防風、黃耆、白朮、生薑、人參、杜仲、白芍
- 63 下列那些是《傳青主女科》完帶湯之組成藥物？①山藥、陳皮 ②白朮、人參 ③白果、芡實 ④白芍、柴胡 ⑤蒼朮、車前子  
(A)僅②④ (B)僅①③⑤ (C)僅①②④⑤ (D)①②③④⑤
- 64 下列那些是《傳青主女科》易黃湯之組成藥物？①山藥、白朮 ②黃柏、芡實 ③車前子、白果  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 65 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，不乳，謂初出胞胎不吮乳也。若小兒出生後，因腹中臍糞未下，腹滿氣短，故嘔吐不乳，宜用下列何者治療？  
(A)一捻金 (B)勻氣散 (C)理中湯 (D)黑白散
- 66 有關小兒年齡的分期，下列何者錯誤？  
(A)胎兒期：指受孕到出生後一週內  
(B)新生兒期：從出生到 28 天  
(C)嬰兒期：從出生 28 天到一周歲  
(D)幼兒期：從一周歲到三周歲
- 67 有關生理性胎黃的敘述，下列何者正確？①嬰兒出生 1 天內出現黃疸 ②足月兒於出生 10~14 天黃疸自行消退 ③早產兒於出生 12~21 天黃疸自行消退  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列敘述何者錯誤？  
(A)小兒感冒容易夾食、夾熱、夾驚  
(B)小兒傷風感冒可以選用金沸草散解散外邪，繼用杏蘇飲開通氣逆  
(C)小兒傷寒感冒初宜九味羌活湯，如熱盛者，以雙解通聖湯治之  
(D)小兒傷寒感冒汗下不解而傳經者，可用柴葛解肌湯
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒症見頻頻咳嗽，面赤咽乾，痰黃氣穢，多帶黏稠，屬於下列何種證候咳嗽？  
(A)風熱 (B)痰熱 (C)燥痰 (D)肺熱
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關小兒食滯的診斷條件，下列何者錯誤？  
(A)頭涼 (B)腹熱 (C)便膿酸 (D)作渴

- 71 小兒泄瀉治療失當，出現傷陰之變證，有關瀉下無度後，傷陰之症狀，下列何者正確？①皮膚乾燥 ②眼眶或前囟凹陷 ③啼哭無淚 ④舌苔白  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 72 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關風癰的敘述，下列何者正確？①發時目青面紅，手如數物 ②治法先宜疏風清熱 ③輕則化風丹主之 ④風兼痰者，牛黃丸主之  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 73 10 歲陳小弟，至今常夜間尿床，神疲乏力，面色蒼白，肢涼怕冷，腰腿痠軟，小便清長，下列治療何者最適宜？  
(A)《醫宗必讀》菟絲子散 (B)《脾胃論》補中益氣湯  
(C)《濟生方》歸脾湯 (D)《本草衍義》桑螵蛸散
- 74 8 歲女童因食慾不振來中醫兒科看診，症見精神倦怠，嗜臥懶言，雙腳無力，噁心，身熱不揚，大便不調，小便色黃，舌苔白膩，脈濡數，經診斷為疳夏。治以下列何方最適宜？  
(A)《溫熱經緯》清暑益氣湯 (B)《內外傷辨惑論》生脈散  
(C)《和劑局方》香薷飲 (D)《醫原》藿朴夏苓湯
- 75 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》所述，小兒冬受寒邪，復感春風而發病也，名曰風溫，其主要症狀包括下列何者？①身重 ②睡憨 ③發熱自汗 ④膚癢  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 76 10 歲孩童紫癍反覆出現，久病不癒，癍點或癍斑色淡紫，面色蒼黃、神疲乏力、飲食不振、頭暈心慌、唇色淡，舌質淡胖，脈沉細無力。治以下列何方最適宜？  
(A)大補陰丸 (B)化斑湯 (C)歸脾湯 (D)清營湯
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，麻疹收沒證治，收沒太速毒攻內，若為熱毒壅盛而無法出透，治以下列何方？  
(A)柴胡四物湯 (B)人參敗毒湯 (C)托裏消毒飲 (D)荊防解毒湯
- 78 有關解顛的臨床表現，下列何者錯誤？  
(A)顛縫解開，叩之如破壺音 (B)目珠偏轉如弦月狀  
(C)多伴痴傻，意識不聰 (D)長必少笑，多愁少喜
- 79 有關幼兒玫瑰疹（*roseola infantum*）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)是一種病毒感染，以疱疹病毒第 6 型及第 7 型最常見  
(B)會出現發高燒，通常持續 3 至 5 天，一般無明顯咳嗽流鼻水  
(C)當高燒退的同時出疹，首先在軀幹出現紅色丘疹，然後再蔓延到上肢、臉和下肢  
(D)感染此病不具終身免疫，日後還可能再度感染
- 80 有關熱痙攣（*febrile convulsion*）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)為幼兒或孩童因發燒而引起似癲癇發作的現象，最常因上呼吸道感染而引起  
(B)一般發生在 6 個月到 5 歲的孩童時期，高峰期約 1 歲左右  
(C)家族性遺傳傾向很大，熱性痙攣家族之罹患率約為無熱性痙攣家族的 2 倍  
(D)單純性熱痙攣的診斷條件為痙攣發作的時間不超過 15 分鐘、單側的肢體抽搐、只有一次痙攣發作