

105 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105 年專門職業及技術人員
高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關中醫外科的調治之法，下列何者最正確？
(A)腫瘍內將成膿，總以補托為第一要務
(B)外瘍潰後，有火宜清，當用大劑涼血
(C)外風時熱，其證多在頸項腮頤等處，治必寒涼泄熱，行氣軟堅
(D)瘍之為病，氣血壅滯，消腫止痛，首推行血行氣
- 2 有關中醫外科選方用藥時的引經用藥，下列何者錯誤？
(A)手厥陰經用獨活、知母、細辛
(B)足陽明經用白芷、升麻、石膏
(C)手陽明經用升麻、石膏、葛根
(D)足少陽經用柴胡、青皮
- 3 有關中醫外科開刀法的敘述，下列何者錯誤？
(A)一般瘡瘍，宜循絡直開，刀頭向上，免傷血絡
(B)手指膿腫，從正上方切開，免生癰疤
(C)膿淺而深切，則內膿雖出，而好肉受傷
(D)膿熟而遲不切開，則腐爛加深，瘡口難斂
- 4 有關腫瘍的治療，腫瘍初起宜用下列何法？
(A)透托
(B)消散
(C)補托
(D)補益
- 5 有關「舌疳」的敘述，下列何者錯誤？
(A)別名：舌菌
(B)起因為心脾毒火上升，結於舌部而生
(C)初起腫赤時，服「導赤散」加黃連
(D)治法雖多，預後良好
- 6 患者在兩眉中間長一如疔瘡小胞，痛癢相兼，根腳堅硬，根據病情，下列敘述何者錯誤？
(A)此病是心肺兩經火毒結聚而生
(B)外治可用如意金黃散合紫金錠用蜜水調敷
(C)可用針刺，並擠出膿血，以瀉其毒
(D)初起可內服銀花解毒湯
- 7 有關乳癰治療的敘述，下列何者正確？
(A)初起紅腫疼痛，最宜服復元通氣散
(B)腫硬不消，最宜服栝蒌牛蒡湯
(C)膿脹痛者忌鍼之，最宜服仙方活命飲
(D)腫硬治之不消，時時跳動而勢將潰膿者，最宜用托裏透膿湯
- 8 小明 2 天前換了新鞋，感覺鞋子前端有些緊，今天開始出現右大趾外側焮腫破爛，時流黃水，脣肉高突，疼痛難忍，不能穿鞋，溲少便結，舌質紅苔白膩。根據上述病況，下列敘述何者正確？
(A)診斷應為敦疽，別名臭田螺
(B)原係好肉受傷，不宜用鹽湯燙洗
(C)外治可用神燈照法，脣肉消盡即癒
(D)可內服泄濕清裏、利水潤腸等藥

- 9 有關印堂疽之敘述，下列何者錯誤？
(A)起因由督脈經風熱壅結氣滯而成；或屬足太陽膀胱經風熱壅結，陰陽相滯而生
(B)初起色暗根平，腫硬疼痛，至 21 日，腐潰出稠膿者順
(C)生於眉棱
(D)有膿刺之，用升膏提毒，生肌散收口
- 10 下列何者不是發生於足心湧泉穴？
(A)足心發 (B)穿窬天蛇 (C)琉璃疽 (D)井泉疽
- 11 有一外傷患者，數日後牙關緊閉，身體強直，角弓反張，口吐白沫，不省人事，最可能為下列何病？
(A)痛風 (B)癲風 (C)癘風 (D)破傷風
- 12 一名嬰兒，在頭皮部及眉端部位皮膚起粟，搔癢無度，黃水浸淫，後來延及遍身。最可能的診斷為何？
(A)油風 (B)奶癬 (C)血風瘡 (D)白疔
- 13 承上題，宜內服下列何方加以治療最佳？
(A)清胃湯 (B)防風通聖散 (C)消風導赤湯 (D)神應養真丹
- 14 某 28 歲男性患者，某日晨起初醒，家人發現他的頭髮突然掉了一大片，局部皮膚不癢不痛，原因不明，臨床表現如圖所示，其最適合的診斷為下列何者？



- (A)髮際瘡 (B)白禿瘡 (C)斑禿 (D)白駁風
- 15 常發於夏秋季節，好發於幼兒，具傳染性，皮膚病灶多發於頭面、四肢，初起可見紅斑或水疱，疱液初透明後混濁，並迅速化膿，診斷為下列何者？
(A)肥瘡 (B)黃水瘡 (C)熱瘡 (D)蛇串瘡
- 16 有關蜘蛛瘡的證治敘述，下列何者錯誤？
(A)多由蜘蛛遺水或遊走染毒而成
(B)生於腰部等處者，必重用外發之藥，以免殘毒內積
(C)內服宜清熱解毒利濕之藥
(D)未破前，外用可以金黃散調敷
- 17 有關便毒之敘述，下列何者錯誤？
(A)俗稱橫痃、血疔
(B)好發於少腹之下或腿根之上摺紋縫中
(C)好發之部位屬於脾經
(D)為暴怒傷肝，氣滯血凝而發，或交合不潔，感染毒邪而成
- 18 下列病症何者不是因為濕寒下注血澀氣阻而成？
(A)穿踝疽 (B)穿拐瘡 (C)驢眼毒 (D)附陰疽
- 19 有關「帶狀皰疹」的中醫證治，下列治法何者最正確？
(A)病灶皮膚出現成群小水泡，灼熱刺痛，治宜龍膽瀉肝湯
(B)病灶皮膚出現大小不等黃白色水泡，治宜托裏透膿湯
(C)病灶生在腰肋者，屬腎陰虧虛火上炎，治宜清涼消毒散
(D)如毒氣入腰，令人膨脹悶嘔，治宜藿香正氣散

- 20 一名男士平素嗜食辛辣厚味，近日工作勞累，熬夜晚睡，軀幹出現皮疹如累累珠形，色紅赤，形如雲片，上起風粟，疼痛不已，其最可能的診斷為何？
(A)葡萄疫 (B)血風瘡 (C)臍癰 (D)纏腰火丹
- 21 拇指與小指不能對掌運動或對掌肌力減弱，可能係因何神經損傷？①橈神經 ②尺神經 ③正中神經
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 22 肱骨相當於《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中所稱的那一個結構？
(A)髑骨 (B)臂骨 (C)龍骨 (D)竹節骨
- 23 下列何者不屬足部蹠屈肌 (plantar flexors)？
(A)屈踇長肌 (flexor hallucis longus) (B)腓腸肌 (gastrocnemius)
(C)腓骨第三肌 (peroneus tertius) (D)脛骨後肌 (tibialis posterior)
- 24 肩脫位合併骨折，經整復後如圖所示，有關後續之治療，下列何者正確？①須再進手術房打鋼釘固定 ②一般以外固定即可 ③需固定加上皮膚牽引 3 週 ④3 週後不痛後，即可練習肩關節活動 ⑤一般 4 週後即可解除外固定 ⑥4 週後可配合中藥薰洗與練功活動以促進肩關節活動力



- (A)①③④ (B)②③⑤⑥ (C)僅②④⑥ (D)②④⑤⑥
- 25 有關參與肩關節屈曲 (flexion) 的肌肉群敘述，下列何者錯誤？
(A)肱二頭肌參與 (B)三角肌因連結鎖骨外 1/3，也參與肩部屈曲
(C)胸大肌只有負責內收內旋，並未參與屈曲 (D)喙肱肌參與
- 26 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》之加味健步虎潛丸服法為：
(A)夏日淡黃酒送下 (B)薑棗水煎送下 (C)空心淡鹽湯送下 (D)冬日童便老酒送下
- 27 下列何者是測試真正長短腳最適當的作法？
(A)髌前上棘到內踝的距離 (B)平躺後看足跟高低
(C)平躺後看內踝高低 (D)髌前上棘到足大趾尖的距離
- 28 有關腕隧道症候群之診斷治療，下列何者錯誤？
(A)是由於正中神經在腕管中受壓，而引起以手指麻痛乏力為主的症候群
(B)主要症狀是第 1、2、3、4 四個手指的麻木和刺痛，或呈燒灼樣痛，患手握力減弱
(C)按壓腕橫韌帶部時，可使症狀減輕
(D)手法以減輕腕管內壓力為主
- 29 有關「椎間盤」的敘述，下列何者錯誤？
(A)腰椎間盤突出好發於 20~50 歲青壯年，女多於男
(B)每個椎間盤是由纖維環、髓核、軟骨板三個部分組成
(C)椎間盤突出好發於 L4-5 及 L5-S1 之間
(D)髓核破裂，若突破後縱韌帶而壓迫神經，則以腿痛為主要症狀

- 30 28 歲男性患者，今天騎腳踏車時不慎跌倒，胸部撞擊到車把手。就醫時自述左脅區撞擊時一陣劇痛，經過 3 小時後，疼痛雖稍緩但深呼吸時仍有痛感，於是攜帶自行到檢驗所拍攝胸部正位 X 光片來求診。醫者仔細判讀該 X 光片，沒看到肋骨骨折。下列醫囑何者最不適當？①告訴病人，可當作嚴重瘀血來治療 ②告訴病人，休息即可，保證肋骨完整無損 ③如症狀未緩解，兩週後再照一次 X 光 ④告訴病人，檢驗所拍攝的胸部 X 光照片角度可能不完整，可換個角度再照一張

(A)僅①② (B)僅② (C)①②③ (D)④

- 31 有關錘狀指（mallet finger）之敘述，下列何者錯誤？

(A)遠端指間關節過伸，近端指間關節屈曲 (B)手指伸肌肌腱斷裂
(C)俗稱棒球指 (D)可合併骨折

- 32 某甲在悶氣緊閉聲門時，腹部突遭快速而且強力的撞擊，如圖所示。他的面部、頸部和雙臂出現出血斑點。他可能會有下列那些損傷？①腸道破裂 ②橫膈破裂 ③部分腸子移動到肋膜腔 ④創傷性窒息



(A)僅① (B)僅②③ (C)僅①②③ (D)①②③④

- 33 有關膝關節損傷敘述，下列何者錯誤？

(A)當暴力撞擊小腿上端的後方時，脛骨向前移位，造成後十字韌帶損傷，可能伴有外側副韌帶和外側半月板損傷
(B)後十字韌帶起於股骨髁間窩的內前部，向後外止於脛骨髁間隆突的後部，可以限制脛骨向後移位
(C)當前十字韌帶斷裂或鬆弛時，患膝向前移動度明顯增大
(D)抽屜試驗是診斷十字韌帶損傷的重要方法

- 34 下列何者不是參與髖關節外展運動之主要肌肉？

(A)臀中肌 (B)闊筋膜張肌 (C)股薄肌 (D)臀小肌

- 35 下列何者是踝扭傷最常受侵犯的韌帶？

(A)三角韌帶（deltoid lig.） (B)跟腓韌帶（calcaneofibular lig.）
(C)前距腓韌帶（anterior talofibular lig.） (D)後距腓韌帶（posterior talofibular lig.）

- 36 如 X 光片所示，下列敘述何者錯誤？




(A)本病好發於 12~18 歲的青少年，男多於女 (B)多因劇烈運動（如跑步、蹲跳、球類等）造成
(C)本病可自愈，疼痛症狀自消 (D)發病緊急，局部腫脹，壓痛明顯

- 37 承上題，本病名為下列何者？
(A) Sever 氏病 (B) Osgood-Schlatter 氏病
(C) Potts 氏病 (D) Jones 氏病
- 38 下列何者不屬於小腿後側深層肌群？
(A) 屈踇長肌 (flexor hallucis longus) (B) 屈趾長肌 (flexor digitorum longus)
(C) 比目魚肌 (soleus) (D) 脛骨後肌 (tibialis posterior)
- 39 測試腕隧道症候群時使用的 Tinel's test 是在下列何穴位處進行敲擊？
(A) 孔最 (B) 勞宮 (C) 太淵 (D) 大陵
- 40 50 歲男性工人，腰部酸痛 3 年，症狀時輕時重，近半年來出現走一段時間後腿痛，休息後症狀減緩，但再行走又出現下肢麻痛症狀，最可能的診斷為何？
(A) 僵直性脊椎炎 (B) 腰椎管狹窄症 (C) 腰椎間盤突出症 (D) 退化性關節炎
- 41 34 歲男性患者，因近日公司準備遷往大陸，連續數週以來均必須熬夜趕計畫，睡眠明顯不足，近兩日突覺胸痛徹背，伴隨有灼熱感，口乾欲飲，溲黃便乾，脈弦舌紅苔薄黃。下列處置何者應優先考慮？
(A) 抽血檢驗心肌酵素 (B) 掀開衣服，檢視胸背部皮膚
(C) 先刺太衝、內關 (D) 建議作心電圖檢查
- 42 王小姐 41 歲，某日不幸發生車禍，身體多處損傷，住院治療後抱怨大便不暢，腹中堅實，疼痛拒按，按之痛甚。其較可能的證型為何？
(A) 氣虛失運 (B) 血虛腸躁 (C) 熱盛津枯 (D) 瘀血蓄結
- 43 外損與內傷有著密切關係，人體受到外力影響而致急性損傷時，局部組織的損害會導致氣血、經絡、臟腑的功能紊亂。明代薛己即在《正體類要·序》中指出：「____損於外，則____傷於內，____有所不貫，____由之不和。」以上空格當依次填入：①氣血 ②經絡 ③肢體 ④營衛 ⑤臟腑 ⑥皮肉
(A) ⑥③④② (B) ④②⑤③ (C) ③①④⑤ (D) ②⑤①④
- 44 患者因磕碰致小腿皮下瘀青腫脹疼痛，同時有身熱口渴情形，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，先以針刺法後，再處以下列何方？
(A) 沒藥丸 (B) 身痛逐瘀湯 (C) 加味逍遙散 (D) 四物湯
- 45 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損大便秘結，裏實氣壯，腹痛堅硬，宜治以下列何方？
(A) 加味承氣湯 (B) 四物湯送潤腸丸 (C) 玉燭散 (D) 補中益氣湯
- 46 21 歲女性患者，受傷時出血過多，胸膈痛而發喘，是因氣虛血乘於肺，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，應治以下列何方？
(A) 二味參蘇飲 (B) 十味參蘇飲 (C) 當歸補血湯 (D) 獨參湯
- 47 患者損傷後，整日覺煩躁不安，自汗而覺頭暈，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，宜處以下列何方？
(A) 獨參湯 (B) 十全大補湯 (C) 參苓白朮散 (D) 六君子湯
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，六味地黃丸運用在傷科內傷雜症，不包括下列何者？
(A) 傷損作渴 (B) 傷損秘結 (C) 傷損腰痛 (D) 傷損肌肉作痛

- 49 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，王同學車禍後覺胸腹脹痛，大便不通，喘咳吐血，宜治以下列何方？
(A)小柴胡湯加青皮、山梔 (B)六君子湯加當歸
(C)當歸導滯散 (D)四物湯加參、耆、白朮

- 50 某 20 歲男性騎車跌倒，送醫後肘部 X 光如圖所示，下列敘述有幾項正確？①後脫位較常見 ②肘部的三點骨突標誌分別是肱骨內、外上髁及尺骨鷹嘴突 ③如圖所示 X 光片為前脫位 ④肘關節又名曲肘髹 ⑤《傷科補要》提及拔伸屈肘法復位：「其髹若出，一手捏住髹頭，一手拿其脈窩，先令直拔下，髹內有聲響，將手曲轉，搭著肩頭，肘骨合縫，其髹上矣」



- (A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
- 51 有關股骨頸骨折之敘述，下列何者正確？
(A)囊外骨折又稱股骨頸基底部骨折，血液供應不良，不易癒合
(B)頭下骨折，血液供應良好，易癒合
(C)囊內頸中部骨折，血液供應良好，易癒合，預後良好
(D)內收骨折較多見，常使下肢呈外旋位置，骨折不易癒合
- 52 有關指骨骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)末節指骨基底背側撕脫性骨折，整復固定為近側指間關節過伸、遠側指間關節屈曲
(B)近節指骨骨折，常因骨間肌與蚓狀肌牽拉而向掌側突起成角
(C)指骨幹骨折，拔伸牽引擠壓矯正移位後，將遠端屈曲，病患指握裹有 3~4 層紗布的小圓柱狀固定物，使手指屈向舟狀骨結節固定
(D)末節指骨基底背側骨折，是因指端受暴力彎曲引起撕脫性骨折，又稱錘狀指 (mallet finger)
- 53 有關腕舟狀骨骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)復位後，夾板固定範圍腕至掌橫紋處、拇掌指關節及指間關節
(B)X 光檢查除腕部正位、側位外，也需要照尺偏斜位照片
(C)陽谿穴部位（鼻煙窩處），局部有明顯壓痛
(D)骨折的位置若在腰部近端或體部，常導致遠側骨折塊發生缺血而影響骨折癒合
- 54 跟骨結節與後關節突的連線與前後關節的連線交叉成角，其後方夾角稱為跟骨結節關節角 (Böhler's angle)，正常該角大約為幾度？
(A) 5 (B) 40 (C) 80 (D) 90
- 55 踝關節脫位，手法整復時，膝關節採屈曲位，其目的是要放鬆下列那一條肌肉？
(A)脛骨前肌 (tibialis anterior) (B)脛骨後肌 (tibialis posterior)
(C)腓腸肌 (gastrocnemius) (D)比目魚肌 (soleus)

- 56 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，關於圖示整復手法的敘述，下列有幾項正確？①即「攀索疊磚法」
②保持脊柱於屈曲位 ③臨床多用於年老體弱胸腰椎壓迫骨折患者 ④施治中患者須直身挺胸
⑤治療後宜用墊枕法維持整復效果



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 57 下列何者俗稱「小兒牽拉肘」？
(A) 肱骨頭半脫位 (B) 橈骨頭半脫位 (C) 尺骨頭半脫位 (D) 橈尺下關節脫位
- 58 有關髌骨脫位的診斷要點，下列敘述何者錯誤？
(A) 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》曰：「若膝蓋骨離位，向外側者，則外筋腫大；向內側者，則筋直臃腫。」
(B) 膝關節呈微屈位，活動受限
(C) 膝前方凹陷，股骨下端的外側或內側可觸及移位的髌骨，股四頭肌和髌韌帶被拉緊
(D) X 光檢查可明確診斷
- 59 有關股骨頸與股骨幹形成之頸幹角，下列敘述何者錯誤？
(A) 正常值在 110 至 140 度之間 (B) 依角度改變，診斷髌脫位
(C) 大於正常值時為髌外翻 (D) 會隨年齡增加而減少
- 60 有關小兒橈骨頭半脫位的敘述，下列何者正確？
(A) 多發生於四歲以上的幼兒，是臨床中常見的肘部損傷
(B) 因幼兒橈骨頭發育尚不完全，環狀韌帶鬆弛，受外力作用下常容易發生
(C) 多因幼兒在肘關節屈曲旋轉位時發生
(D) 症見肘關節呈半屈曲、前臂呈旋後位，不敢旋前，不能抬舉與取物
- 61 足陽明筋病因寒拘急，導致下列何種眼病？
(A) 眼珠不能轉動 (B) 胞瞼不能張開 (C) 胞瞼不能閉合 (D) 口眼歪斜
- 62 中醫名稱「眼帶」相當於現代醫學所稱之：
(A) 視神經 (B) 眼瞼 (C) 眼外肌 (D) 懸韌帶
- 63 有關漏睛症之敘述，下列何者錯誤？
(A) 漏睛為邪毒長期存在，膿汁不盡，易轉為發生凝脂翳，甚至黃液上衝
(B) 心脾濕熱者，大眦微紅，小便黃赤，舌苔黃膩，可用竹葉瀉經湯，清心利濕
(C) 外治可用八寶眼藥點眼及淚道沖洗
(D) 風熱停留者，大眦紅腫痛，可用千金托裏散
- 64 關於流淚症，下列敘述何者正確？
(A) 肝血不足，頭暈面色少華，脈細無力，宜四物湯加減治之
(B) 肝火旺，肺陰虛，致陰液不斂，可以清燥救肺湯治之
(C) 常合見眼瞼閉合不良，眼瞼振跳，可以腎氣丸加減治之
(D) 淚竅未受阻者不宜溫針治療

- 65 黃小弟弟，年 12 歲，利用暑假時間到游泳池游泳。回家後不久，突然覺得眼睛澀癢，怕熱羞明，眵多膠結。母親見其白睛紅赤，原本只有左眼，後來連右眼亦出現紅赤，其最有可能之診斷為何？
(A)暴風客熱 (B)天行赤眼 (C)風赤瘡癢 (D)針眼
- 66 有關椒瘡之併發症與後遺症，下列敘述何者錯誤？
(A)可導致瞼弦內急外弛，瞼弦內翻，倒睫拳毛
(B)邪毒侵及黑睛，血翳包睛，患者澀痛，羞明流淚
(C)邪毒侵及淚竅，可致眼珠乾燥
(D)邪毒壅盛，脈絡瘀阻，上胞重墜難舉
- 67 下列何者屬於急性眼疾？
(A)白澀症 (B)瞼內結石 (C)雲霧移睛 (D)暴風客熱
- 68 目癢勢輕，時作時止，局部未見異常，形體不實，舌淡脈細，治以下列何方最適宜？
(A)四物湯 (B)驅風一字散 (C)四君子湯 (D)小續命湯
- 69 某患者平日較喜吃肥甘厚味。多年來黑睛星翳，反覆發作、纏綿不癒、頭重胸悶、溲黃便澇、口黏、舌紅苔黃膩、脈濡，應選用下列何方治療最適宜？
(A)銀翹散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)三仁湯 (D)荊防敗毒散
- 70 明代有關耳鼻喉相關醫學的論述，下列何者錯誤？
(A)《解圍元藪》是喉麻風的第一篇論述 (B)《紅爐點雪》首論喉結核
(C)《景岳全書》首載咽喉梅毒與溫疫病 (D)《保生秘要》載有鼻息肉摘除手術
- 71 手持耳鏡若欲檢查嬰兒與幼兒童耳道，耳廓下部須往下列那個方向牽拉，以使外耳道變直，利於觀察？
(A)後上 (B)後下 (C)前上 (D)前下
- 72 某患者耳周發生瘡瘍，出現紅腫，灼熱，糜爛，搔癢，滲液之症狀，處以下列何方最為適宜？
(A)銀花解毒湯 (B)地黃飲 (C)甘露飲 (D)消風散
- 73 鼻病治療，於迎香穴、印堂穴、百會穴等處懸灸，在臨床上常用於下列何證？
(A)實寒性 (B)實熱性 (C)虛寒性 (D)虛熱性
- 74 鼻病診斷要點中，鼻前孔處出現皮膚漫腫、潮紅、潰爛、浸淫流水、積結痂塊、灼熱癢痛的症狀，據此可以確診為下列何種鼻病？
(A)鼻疳 (B)鼻塞 (C)鼻槁 (D)鼻軌
- 75 鼻瘰肉，除主要症狀外，更兼有涕痰多，可選用何方加貝母、殭蠶、枳實、絲瓜絡，來發揮燥濕化痰，行氣散結的功效？
(A)二陳湯 (B)四君子湯 (C)清燥救肺湯 (D)黃芩湯
- 76 鼻軌，若見腰膝冷痛，遺精早泄，形寒怕冷，夜尿多，舌質淡嫩，苔白濕潤，脈沉細，應選用何方加減治療？
(A)左歸丸 (B)五苓散 (C)補中益氣湯 (D)金匱腎氣丸
- 77 咽喉病中，患部腐爛淺表分散，反覆發作，周圍淡紅，多屬下列何證？
(A)虛火 (B)風寒 (C)血瘀 (D)風熱
- 78 咽喉病紅腫痛加劇，並出現高熱，頭脹痛，腹脹悶，痰涎壅盛，溲黃，便結，脈洪數，舌紅絳，苔黃膩等，屬下列何證？
(A)胃腑熱盛 (B)肝火上炎 (C)肺經風熱 (D)肝氣鬱結
- 79 下列何者最不可能是引起牙宣的原因？
(A)胃火上蒸 (B)精氣虧虛 (C)氣血不足 (D)風熱侵襲
- 80 口齒唇舌病的疼痛辨證中，若患處出現牙齦浮腫，不紅而痛，牙齒浮動，咬物時痛，午後痛加劇，辨證應屬下列何者？
(A)陰虛火旺 (B)風熱相煽 (C)胃火實熱 (D)痰涎濕濁凝聚