

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3104
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：內外科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關病人心智狀態評估內容的敘述，下列何者錯誤？
(A)可以利用簡易心智狀況量表（Mini Mental State Examination, MMSE）進行測試
(B)可以依判斷力、定向感、記憶力、注意力、抽象思考能力、計算力進行評估
(C)詢問病人有關「人、時、地」的確認能力，主要是評估注意力
(D)詢問老年病人年輕時的基本資料如求學、求職等，主要是評估遠期記憶力
- 2 有關病人已出現顱內壓升高的護理處置，下列敘述何者錯誤？
(A)保持病人的頭頸在正中位置
(B)抬高床頭 30 度
(C)將抽痰、翻身拍背、擦澡等活動都集中一次完成
(D)應注意體溫的控制及維持排便正常
- 3 有關腰椎椎間盤突出的敘述，下列何者錯誤？
(A)俗稱為「下背疼痛」，此種疼痛會向下延伸至臀部、大腿後側及小腿
(B)進行直舉腿試驗（straight leg raising test）可伸展到 90 度
(C)進行 Kernig sign 試驗，病人將小腿往上伸展會覺得有阻力且感到劇烈疼痛
(D)病人咳嗽、提重物、彎腰、長時間站立或坐著都會使疼痛加劇
- 4 「走失」是阿茲海默氏症（Alzheimer's Disease）病人，那一期重要臨床表徵？
(A)極早期 (B)早期 (C)中期 (D)末期
- 5 有關巴金森氏症病人日常生活護理指導，下列何者錯誤？
(A)行走時可使用助行器來維持平衡 (B)衣服儘量選擇以魔鬼氈代替釦子
(C)儘量多休息以減少活動產生震顫 (D)馬桶可提高坐墊方便坐下或起身
- 6 有關頭部創傷之敘述，下列何者正確？
(A)腦震盪是因外力造成暫時性的神經功能缺失，且腦組織有實質性的損傷
(B)腦挫傷是因沒有腦組織的實質性損傷，所以受傷後常會出現腦震盪症候群
(C)若出現鼻漏且確認為腦脊髓液，表示病人的硬腦膜受損
(D)有鼻漏或耳漏的病人通常要儘快用抽吸管抽吸乾淨
- 7 有關腦波檢查的護理措施，下列何者錯誤？
(A)說明檢查可診斷腦腫瘤
(B)告知病人檢查前，需清洗頭髮
(C)確認腦波室內備有足夠的點滴及氧氣
(D)檢查後，留在頭皮及頭髮上的黏膠，可用丙酮清理
- 8 有關脊髓損傷導致「自主神經反射過度」的敘述，下列何者正確？
(A)常發生於 T6~T12 受傷的病人 (B)走路運動是可能的誘因
(C)出現嚴重的高血壓及搏動性頭痛 (D)心跳加速
- 9 有關腸阻塞的臨床表徵，下列何者正確？①嘔吐 ②腹脹 ③腹部絞痛 ④腹瀉
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 10 有關肝硬化引起腹水機轉之敘述，下列何者正確？
(A)微血管靜力壓下降 (B)血清白蛋白下降
(C)血漿膠體滲透壓上升 (D)有效循環血量上升
- 11 有關預防傾倒症候群（Dumping Syndrome）的護理指導，下列何者正確？
(A)鼓勵病人少量多餐，進食時採半坐臥姿勢 (B)鼓勵病人多進食富含水分的食物
(C)治療先從增加碳水化合物飲食開始 (D)建議採高脂肪、低蛋白、高糖食物

- 12 下列何者不是食道癌常見的臨床表徵？
(A)吞嚥困難 (B)食慾不振 (C)腹痛 (D)聲音沙啞
- 13 有關膈裂孔疝氣的敘述，下列何者正確？
(A)造成原因是胃自橫膈的食道裂孔往上進入縱膈腔內
(B)食道旁疝氣常出現反流症狀
(C)滑動疝氣發生率占所有膈裂孔疝氣的 20%
(D)膈裂孔疝氣的原因為橫膈肌痙攣或腹內壓降低所致
- 14 有關口腔炎的分類及臨床表徵，下列何者正確？
(A)單純性疱疹常因細菌感染導致 (B)缺乏維生素 C 會引發口角炎
(C)念珠菌感染好發於口腔衛生習慣不好者 (D)常有疼痛、吞嚥困難及口腔出血等症狀
- 15 有關癌症病人貧血問題之敘述，下列何者錯誤？
(A)全胃或脾臟切除手術會影響病人紅血球的生成
(B)貧血症狀包括蒼白、心跳變慢、血壓上升、易疲倦等
(C)鼓勵病人補充鐵質和含葉酸食物，如牛肉、綠色蔬菜
(D)集中護理可讓病人獲得充分的休息
- 16 有關膽結石好發之高危險群，下列何者最不可能？
(A)女性 (B)肥胖者 (C)口服避孕藥者 (D)曾接受胃部手術者
- 17 有關心口灼熱 (Heart Burn) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)是下食道括約肌異常所致 (B)病人常以痙攣痛或打結般形容此不適
(C)進食後平躺可緩解症狀 (D)是食道疾病的常見症狀
- 18 有關腕隧道症候群的敘述，下列何者正確？
(A)是指腕部正中神經受到壓迫所造成的現象
(B)主要發生在男性，以 50~60 歲居多
(C)臨床症狀是疼痛且腕部無法伸直
(D)可藉由膨脹徵象 (Bulge sign) 與霍曼氏徵象 (Homan's sign) 確定診斷
- 19 王先生開放性骨折日前出院返家，近日發燒、寒顫、躁動不安、患肢持續性疼痛及拒絕移動關節或觸碰患肢。下列何者為其最可能的合併症？
(A)肺栓塞 (B)骨髓炎 (C)脂肪栓塞 (D)低血容積休克
- 20 有關痛風藥物 Probenecis (Benemid) 的主要作用，下列何者正確？
(A)抑制尿酸形成 (B)增加尿酸排出 (C)降低普林排出 (D)抑制炎症反應
- 21 有關骨折的癒合過程，下列順序何者正確？①血腫形成期 ②骨化期 ③細胞增生期 ④重塑期 ⑤骨痂形成期
(A)①②③④⑤ (B)①③⑤②④ (C)②③①④⑤ (D)⑤④③②①
- 22 有關青光眼病人之護理措施，下列何者正確？
(A)眼內壓上升超過正常值且造成視神經受損，稱為青光眼
(B)準備病人接受晶狀體植入
(C)熬夜不會影響眼壓
(D)指導病人術後臥向手術側
- 23 有關中耳炎手術病人之術後護理指導，下列何者錯誤？
(A)手術後要觀察有無切斷顏面神經的合併症
(B)病人應採用軟質飲食
(C)禁做會阻塞耳咽管的伐氏操作法 (Valsalva's Maneuver)
(D)勿用力擤鼻子、用力咳嗽或打噴嚏
- 24 下列腫瘤何者源自結締組織？
(A)滑液膜肉瘤 (synovial-sarcoma) (B)軟骨肉瘤 (chondrosarcoma)
(C)血管肉瘤 (angiosarcoma) (D)淋巴管肉瘤 (lymphangiosarcoma)
- 25 有關聽力喪失病人的護理指導，下列何者錯誤？
(A)與別人溝通時，等待對方先開口 (B)採用適當的位置，使說話者面部採光良好
(C)要求對方先說明主題，當改變話題時先通知 (D)家中電話加裝擴音器，或家中電鈴加裝閃光

- 26 有關心臟復健 (Cardiac Rehabilitation, CR) 活動時應注意事項的敘述，下列何者錯誤？
(A)活動時應以漸進性方式增加強度
(B)活動初期的心跳速率以其最大心跳的 80%為原則
(C)活動時的心跳速率以不超過靜態休息時的 20 次/分鐘為原則
(D)活動後血壓上升以不超過正常血壓值 25 mmHg 為原則
- 27 王先生經醫生診斷為柏格氏病 (Buerger's Disease)，下列敘述何者正確？
(A)與抽菸有關
(B)主要是周邊靜脈之阻塞
(C)好發在上肢
(D)走路無異狀
- 28 有關心絞痛病人接受股動脈經皮穿腔冠狀動脈血管成形術 (PTCA) 之術後護理，下列何者錯誤？
(A)監測雙側肢體之脈搏
(B)監測心電圖
(C)鼓勵病人多飲水
(D)鼓勵病人行下肢全關節主動運動
- 29 有關裝置心臟節律器之護理指導，下列何者錯誤？
(A)心律變慢時，可能是電池快沒電的徵象
(B)每天需監測橈動脈至少 1 分鐘整
(C)持續打嗝時，可利用 Valsalva 運動減緩打嗝
(D)術後 6 週內避免抬重物
- 30 有關心因性休克之敘述，下列何者錯誤？
(A)心臟幫浦功能障礙造成循環衰竭
(B)最常見之致病原因為心肌梗塞
(C)最常見之症狀為呼吸停止
(D)心輸出量不符身體組織所需
- 31 有關聽診心音之敘述，下列何者錯誤？
(A)第一心音的產生是僧帽瓣與三尖瓣關閉血液撞擊所造成
(B)聽診心音的主動脈瓣區在胸骨右緣第 2 肋間
(C)聽到第二心音之後心動週期進入心室的舒張期
(D)心臟衰竭病人如出現第三心音會在心室的舒張末期聽到
- 32 下列血流動力學檢查結果何者正常？
(A)右心房壓力 130 mmHg
(B)右心室收縮壓 120 mmHg
(C)左心室舒張壓 40 mmHg
(D)上腔靜脈壓 8 mmHg
- 33 輸注下列何種藥物時，需以不透光錫箔紙包住點滴瓶及輸液管？
(A) Diazoxide (Hyperstat)
(B) Dobutamine (Dobutrex)
(C) Nitroglycerin (Tridil)
(D) Nitroprusside (Nipride)
- 34 下列何者是心肌梗塞最常見且會導致死亡的併發症？
(A)心因性休克
(B)心肌梗塞再度發生
(C)心律不整
(D)急性肺水腫
- 35 有關缺鐵性貧血病人的護理措施，下列何者正確？①教導病人使用吸管吸食液態鐵劑 ②鼓勵病人飯後服用鐵劑以增加鐵的吸收 ③鼓勵病人多攝取富含維生素 C 的食物 ④注射鐵劑後應避免立即拔出針頭
(A)①②③
(B)①②④
(C)①③④
(D)②③④
- 36 林先生接受骨髓移植後 2 週出現黃疸、腹水、體重增加，下列何者為最可能發生之合併症？
(A)感染
(B)間質性肺炎
(C)肝靜脈阻塞疾病
(D)慢性移植植物對抗宿主疾病
- 37 有關白血病人接受異體骨髓移植後出現合併症之敘述，下列何者錯誤？
(A)移植前曾罹患肝炎者會增加肝靜脈阻塞的機率
(B)急性移植植物對抗宿主疾病以皮膚、腸胃道及肝臟為主
(C)慢性移植植物對抗宿主疾病的發生率與年齡有關
(D)移植後 2 星期內的感染以巨細胞病毒感染最常見
- 38 有關特異性血小板減少性紫斑症之敘述，下列何者正確？①可能與自體免疫疾病有關 ②骨髓檢查可發現巨核細胞增加 ③須避免使用 Aspirin 的藥物 ④經常發生於細菌感染後
(A)①②③
(B)①②④
(C)①③④
(D)②③④
- 39 有關化學治療藥物作用機轉與副作用之敘述，下列何者錯誤？
(A) Cisplatin 屬鹼基化合物，常見副作用是噁心嘔吐、耳毒性和周邊神經病變等
(B) Fluorouracil (5-FU) 屬抗代謝藥物，常見副作用是口腔炎、骨髓抑制等
(C) Doxorubicin 屬類固醇藥物，可促進 G₀ 期癌細胞進入分裂期
(D) Vincristine 屬植物鹼類藥物，作用於 M 期，干擾有絲分裂

- 40 有關放射線治療病人照射處皮膚照護之敘述，下列何者錯誤？
(A)要用中性肥皂搓洗避免感染 (B)不可塗抹含酒精的乳液
(C)可依醫囑塗抹氧化鋅 (D)只能使用電動刮鬍刀
- 41 有關癌症病人出血問題之敘述，下列何者錯誤？
(A)血小板數目 8 萬/ μL 是正常的數據
(B)消化道出血時，可使用冰鹽水灌洗
(C)有出血傾向的病人要限制使用 Coumadin 和 Heparine
(D)要避免肌肉注射或量肛溫等侵入性處置
- 42 有關乳癌症狀與疾病分期之敘述，下列何者正確？
(A)好發部位在乳房的內上 1/4 處 (B) $\text{T}_2\text{N}_1\text{M}_0$ 屬於癌症分期的第三期
(C)最常見的症狀為疼痛性腫塊 (D)乳頭下腫塊會造成乳頭回縮或高低不一
- 43 有關前列腺癌之敘述，下列何者正確？
(A)藥物治療大多使用雄性素
(B)放射線治療時最常使用鈷 60 放射源
(C)鹼性磷酸酶值過高與前列腺癌之診斷有關
(D)前列腺特异性抗原 (PSA) 濃度可做為治療效果的參考
- 44 有關決定膚色的黑色素細胞主要分布在下列那一層？
(A)顆粒層 (B)棘狀層 (C)基底層 (D)網狀層
- 45 有關全身性紅斑性狼瘡之護理措施，下列何者錯誤？
(A)出門時應穿長袖衣物及穿戴寬邊帽子防曬
(B)出現血尿、蛋白尿等狀況時，應多下床活動
(C)慢性疲勞時，建議執行漸進式活動，如步行或游泳等
(D)若有生育考量，於病情控制良好 6 個月後，再與醫師討論懷孕計畫
- 46 有關感染疥瘡 (Scabies) 引起皮膚疾病之敘述，下列何者錯誤？
(A)人體接觸疥蟲後 2 週左右會出現症狀
(B)疥蟲感染者所使用的床單，在 2 週內具有傳染力
(C)劇癢症狀好發在頸部以下
(D)衣物用具加熱煮沸可以殺死疥蟲
- 47 有關燒傷深度的敘述，下列何者錯誤？
(A)一度燒傷是指表皮受到損害，會有疼痛感
(B)二度燒傷是指真皮層受到損傷，會有劇烈疼痛
(C)三度燒傷是指全皮層的損傷，會有劇烈疼痛
(D)四度燒傷是指全皮層、肌肉和骨骼的損傷，沒有疼痛感
- 48 有關後天免疫缺乏症候群 (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)不會經由握手、擁抱、共餐、共用馬桶、游泳、蚊蟲叮咬等途徑傳染病毒
(B)有皮膚疾患或懷孕的醫療人員不應直接對病人進行醫療照護
(C)由於病人容易產生伺機性感染，避免到人多擁擠的公共場所
(D)病人應定期接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR) 與流感疫苗
- 49 有關器官移植後之護理指導，下列何者錯誤？
(A)移植後應多做戶外運動、曬太陽，以增強抵抗力
(B)移植後避免出入公共場所，外出戴口罩
(C)移植後服藥出現藥物副作用，不可自行停藥，回診由醫師調整用藥
(D)移植後需要暫時避孕，若準備懷孕應事先與醫師討論
- 50 有關類風濕性關節炎之敘述，下列何者正確？①手部關節會出現尺側偏斜 ②活動後有僵硬的現象
③關節 X 光變化呈現關節腔變窄 ④關節腫脹呈現不對稱性
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 51 有關鞏皮症之敘述，下列何者正確？
(A)又稱「進行性系統性硬化症」，好發於男性 (B)常發生雷諾氏症候群 (Raynaud's syndrome)
(C)血液檢查 γ -球蛋白增加，主要是 IgA 增加 (D)侵犯臉部，造成臉部表情豐富現象

- 52 有關使用呼氣末期陽壓（PEEP）治療急性呼吸窘迫症候群的主要目的，下列何者正確？
(A)可避免肺纖維化的產生 (B)可使吸氣時有更多氣體帶入肺內
(C)可將 100%的氧氣帶入肺內 (D)可避免吐氣時肺泡塌陷
- 53 下列何者為肺水腫最典型的症狀？
(A)呼吸音出現肋膜摩擦音 (B)突然胸痛
(C)粉紅色泡沫痰 (D)杵狀指
- 54 病人行氣管內插管後聽診呼吸音時，發現左側肺部呼吸音減弱但右側正常，下列何者為導致此情形最可能的原因？
(A)氣管內管插到食道中 (B)氣管內管插到右主支氣管內
(C)氣管內管插到氣管分叉處上 (D)病人有左肺肺炎
- 55 有關呼吸器的使用，通常會設定每分鐘數次深呼吸，其所要預防之首要合併症，下列何者正確？
(A)氣胸 (B)肺栓塞 (C)肺炎 (D)肺擴張不全
- 56 照護右上肺葉肺炎病人之護理措施，下列何者不適當？
(A)協助病人右側臥 (B)教導病人抱胸咳嗽
(C)將病人床頭抬高 45 度 (D)鼓勵病人下床活動
- 57 有關肺栓塞的醫療處置，下列何者錯誤？
(A)給與氧氣治療，維持 PaO_2 在 60 mmHg 以上 (B)抬高下肢增加靜脈回流
(C)給與 Streptokinase 預防血栓形成 (D)在下腔靜脈放入腔靜脈過濾器
- 58 肺炎發生時，於肺實質所產生的病生理變化，不包括下列何者？
(A)肺塌陷 (B)支氣管擴張症 (C)肺積水 (D)發炎反應
- 59 胸腔手術後病人進行深呼吸運動之主要成效，下列何者正確？
(A)可以提高橫膈膜，使胸腔擴大且增加肺部進行氣體交換的表面積
(B)可增加到肺部的血流量，使術後復原較快
(C)可控制氣體的流速，使病人不會過度通氣
(D)可擴張肺泡，增加氣體交換的表面積
- 60 有關電解質失調之症狀評估結果，下列何者錯誤？
(A)高血鈉症會致肌肉軟弱無力 (B)低血鈣症常有凝血時間延長
(C)低血鉀症常有便秘腹脹現象 (D)低血鈣症易導致手足抽搐
- 61 林小姐食慾不振，嚴重水腫，無法平躺睡覺，至某醫學中心就診，抽血檢查結果血清 Creatinine=13.8 mg/dL，eGFR=9.2 mL/min/1.73 m²，依此結果，林小姐是處於慢性腎臟病（CKD）的第幾期？
(A)第二期 (B)第三期 (C)第四期 (D)第五期
- 62 承上題，下列何項為林小姐接下來的重要處理目標？
(A)減緩腎功能惡化 (B)尿毒症相關之護理指導
(C)建立血管通路 (D)開始透析治療或腎移植
- 63 張先生 50 歲，患有糖尿病腎病變，下列治療何項錯誤？
(A)鼓勵病人每天多攝取蛋白質（1.5~2.0 g/天）
(B)將糖化血色素控制在 7%以內
(C)將血壓控制在 130/80 mmHg 以內
(D)血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）可用來控制血壓
- 64 梁太太規律接受血液透析，因腎性貧血服用葉酸，其最恰當的服用時間為何？
(A)透析前半小時服用 (B)開始透析時立即服用
(C)透析當中服用 (D)透析結束後服用
- 65 有關酸鹼不平衡之敘述，下列何者錯誤？
(A)慢性阻塞性肺疾病病人易致呼吸性酸中毒
(B)歇斯底里症者、過度焦慮者，易致呼吸性鹼中毒
(C)嚴重腹瀉者，易致代謝性鹼中毒
(D)嚴重嘔吐者，易致代謝性酸中毒
- 66 有關腎臟活體組織切片檢查之敘述，下列何者錯誤？
(A)透過超音波導引取出組織切片，以確認腎實質疾病之病因
(B)通常穿刺時採俯臥姿，部位大約於第 12 肋骨與脊椎交角中間
(C)檢查前需確認凝血功能，以及暫停使用含 Aspirin 成分之藥物
(D)檢查後 24 小時內應臥床休息，避免下床活動

- 67 有關慢性腎衰竭的典型臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)氮血症 (B)高血脂 (C)低血磷 (D)代謝性酸中毒
- 68 有關經尿道前列腺切除術的敘述，下列何者錯誤？
(A)透過電刀切除前列腺，是良性前列腺肥大第一線最常用的治療方式
(B)若手術過程吸收過多沖洗液，容易引起腦水腫需注意病人意識狀態
(C)出血是最常見的合併症，術後需要持續用生理食鹽水做膀胱灌洗
(D)若尿道內括約肌有受損，可能導致性行為高潮時出現逆行性射精
- 69 有關黏液水腫昏迷之檢查結果，下列何者錯誤？
(A)血清中 T_4 下降 (B)血中 TSH 下降 (C)血鈉下降 (D)血糖下降
- 70 有關抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)通常是由泌尿道疾病引發 (B)最常出現症狀是食慾不振
(C)血鈉濃度會 $< 135 \text{ mEq/L}$ (D)病人會出現低尿酸血症
- 71 有關糖尿病病人足部護理，下列何者正確？①直線修剪趾甲緣 ②每日以溫水浸泡清洗足部 30 分鐘
③穿著色深、柔軟的尼龍襪，且每日更換 ④足部傷口沖洗後，消毒敷料覆蓋，紙膠固定，應儘速就醫
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 72 有關糖化血紅素 (HbA1c) 的敘述，下列何者正確？
(A)當 $< 10\%$ 表示控制良好 (B)反應過去 6 個月內血糖控制的情形
(C)不受禁食、驗血時間所影響 (D)正常人約 4~9%
- 73 有關甲狀腺功能低下症之護理措施，下列何者正確？
(A)服用甲狀腺素時採飯後使用，以避免胃酸增加
(B)使用甲狀腺素藥物時須監測血糖之變化
(C)給予病人電毯或熱水袋，以增加舒適及保暖
(D)鼓勵採高熱量、低纖維、低脂肪飲食
- 74 有關糖尿病酮酸中毒 (DKA) 與高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 之臨床處置，下列何者正確？
(A) HHS 需補充的水分較少 (B) HHS 需要較多的胰島素治療
(C) HHS 較 DKA 更需補充重碳酸鈉 (D) HHS 不需要補充鉀離子
- 75 有關使用 Spironolactone (Aldactone) 藥物指導之敘述，下列何者正確？①須注意鉀離子濃度 ②須注意鎂離子濃度 ③鼓勵多食用柑橘類食物 ④不宜食用芭樂
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 76 下列何者不是休克時會發生之代償機轉？
(A)刺激交感神經分泌腎上腺素，造成血管收縮
(B)刺激交感神經，使呼吸加速及加深
(C)刺激內分泌系統分泌血管緊縮素，促進血管收縮
(D)刺激消化道系統，促進腸胃蠕動
- 77 下列何種情況最可能引發神經性休克？
(A)蜜蜂螫傷引發休克 (B)張力性氣胸造成休克
(C)心肌梗塞造成休克 (D)車禍脊髓受損造成休克
- 78 有關敗血症之敘述，下列何者錯誤？
(A)血小板 $> 140,000 \text{ cells}/\mu\text{L}$ (B)尿量 $< 0.5 \text{ mL/kg/hr}$
(C)膽紅素 $> 4 \text{ mg/dL}$ (D)收縮壓 $< 90 \text{ mmHg}$
- 79 病人輸血 10 分鐘時出現蕁麻疹及哮喘之處置，下列何者錯誤？
(A)需密切監測生命徵象的變化 (B)暫停輸血 5 分鐘，再繼續進行輸血
(C)維持呼吸道暢通 (D)給予 Epinephrine 及 Aminophylline
- 80 有關腸病毒之敘述，下列何者錯誤？
(A)經由腸胃道、呼吸道或接觸病人皮膚水泡的液體而感染
(B)感染時會出現發燒、手足口症及疱疹性咽峽炎等症狀
(C)發病前 1 週內傳染力最強，成人感染發病時多無症狀，且無傳染力
(D)引起腸病毒感染併發重症之型別以腸病毒 71 型為主