

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列解表劑中何者組成有乾薑而無生薑？
(A)《傷寒論》桂枝湯 (B)《傷寒論》大青龍湯
(C)《傷寒論》小青龍湯 (D)《小兒藥證直訣》人參敗毒散
- 2 下列關於《景岳全書》濟川煎組成何者正確？
(A)當歸、牛膝、大黃、肉蓯蓉、枳殼、澤瀉
(B)當歸、牛膝、肉蓯蓉、澤瀉、升麻、枳殼
(C)生地黃、火麻仁、大黃、枳實、厚朴、杏仁
(D)生地黃、生甘草、人參、大黃、玄參、麥門冬、海參
- 3 下列何者是中國現存最古老的一部方書？
(A)《五十二病方》 (B)《黃帝內經》 (C)《風寒熱十六病方》 (D)《傷寒雜病論》
- 4 關於《傷寒六書》柴葛解肌湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)其組成藥物為柴胡、葛根、甘草、羌活、石膏、白芷、黃芩、芍藥、桔梗、生薑、大棗
(B)治療外感風寒，風寒鬱熱之證
(C)依原書作者敘述，石膏宜重用二兩
(D)依原書作者敘述，本證無汗，惡寒甚者，應去黃芩加麻黃
- 5 有關《醫學心悟》加味香蘇散之敘述，下列何者正確？
(A)相較於《傷寒論》麻黃湯，其發散風寒之能力較弱
(B)可用於治療風熱挾濕
(C)多用壯實之人外感風寒重證
(D)其組成為紫蘇、藿香、炙甘草、荊芥、淡竹葉、白芷
- 6 各方的功用，下列何者最不適宜？
(A)《傷寒論》麻杏石甘湯：清肺平喘 (B)《閻氏小兒方論》升麻葛根湯：解肌祛風
(C)《傷寒論》麻黃附子細辛湯：助陽解表 (D)《傷寒六書》柴葛解肌湯：解肌清熱
- 7 下列方劑主治「肺腎陰虛，咳痰帶血或咯血」之證，下列何者最不適宜？
(A)《慎齋遺書》百合固金湯 (B)《溫病條辨》沙參麥冬湯
(C)《醫學心悟》月華丸 (D)《洪氏集驗方》瓊玉膏
- 8 75 歲男性，血壓 165/92 mmHg，主訴眩暈 1 日，下肢無力，行走不穩，肢體發抖，手不能端碗，發音不清，雙下肢發冷，舌淡暗，苔薄黃稍偏黑，脈沉細弱。頭部電腦斷層顯示有右側小範圍腦栓塞。上述病證，治以下列何方最適宜？
(A)《醫林改錯》補陽還五湯 (B)《素問病機氣宜保命集》大秦芫湯
(C)《黃帝素問宣明論方》地黃飲子 (D)《太平惠民和劑局方》小活絡丹
- 9 關於《小兒藥證直訣》導赤散，下列敘述錯誤的有幾項？①組成含有生地黃、生甘草梢 ②方中具有利水導熱作用之藥物有 2 項 ③可治心胸煩熱，口渴面赤，舌紅，脈數之證 ④兼具利水瀉下之作用
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 10 55 歲女性患者，感冒 3 週後，食慾不振，口乾咽乾，舌紅少苔，脈細數，下列何方治療最適宜？
(A)《柳州醫話》一貫煎 (B)《溫病條辨》益胃湯
(C)《小兒藥證直訣》七味白朮散 (D)《蘭室秘藏》當歸六黃湯
- 11 有關《東垣試效方》普濟消毒飲，下列敘述幾項正確？①黃連、黃芩共為君藥，兩藥劑量相同，且為方中最大 ②本方是據風熱疫毒上犯，以頭面紅腫為特點而立法組方 ③本方有清熱解毒、消腫潰堅、活血止痛之功效 ④本方需加酒煎服，以利消散腫毒
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 12 下列何者可運用《傷寒論》白虎湯？
(A)脈浮弦而細 (B)血虛發熱 (C)陰盛格陽 (D)產後發熱
- 13 下列敘述共幾項正確？①《傷寒論》竹葉石膏湯與《傷寒論》白虎湯均有清熱生津的功效 ②白虎湯以知母、石膏共為君藥 ③枸杞子是《醫方集解》七寶美髯丹與《醫方考》龜鹿二仙膠共同的組成 ④七寶美髯丹的配伍有助陰陽並補，精血互生
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 14 《保命集》芍藥湯是治療濕熱內迫，下痢赤白的重要方劑，以下那一味清熱藥物不是其組成？
(A)大黃 (B)黃芩 (C)黃連 (D)黃柏
- 15 臨床上遇到病人反覆發熱多月，熱勢漸緩，但邪留未盡，津液已傷，肝腎陰虛，暮熱朝涼，舌紅苔少。選方時，下列那一方劑被考慮的機率最低？
(A)《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散 (B)《證治準繩》清骨散
(C)《蘭室秘藏》當歸六黃湯 (D)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯
- 16 莊小弟來診時主訴腸胃脹悶不適已 3 日，林醫師診療後開出以下處方：半夏三錢、黃連二錢、乾薑二錢、黃芩二錢、大棗四枚、甘草四錢。此方方名為何？
(A)《傷寒論》半夏瀉心湯 (B)《傷寒論》黃連湯
(C)《傷寒論》甘草瀉心湯 (D)《傷寒論》小陷胸湯
- 17 《醫方集解》金鎖固精丸的組成與證治，下列何者最不適當？
(A)主治腎虛精關不固的遺精 (B)沙苑蒺藜補腎益精為君藥
(C)山藥健脾益腎為佐，以益氣澀精 (D)龍骨、牡蠣專以收斂澀精
- 18 有關《東垣試效方》普濟消毒飲的方義與臨床應用，下列何者最不適宜？
(A)本方主治風熱疫毒壅於上焦，頭面紅腫痠痛。證：見目赤，口瘡，咽喉腫痛，口乾舌燥，苔黃舌紅，脈數有力
(B)方中以連翹、牛蒡子、升麻、薄荷、僵蠶疏散風熱，散結開滯為主藥
(C)方中以板藍根、馬勃、玄參、桔梗、甘草清熱解毒利咽，解上焦熱
(D)臨床常用於急性腮腺炎或急性扁桃腺炎的治療
- 19 關於《傷寒論》小建中湯的敘述，下列何者最不適宜？
(A)組成為《傷寒論》桂枝湯倍芍藥加飴糖 (B)再加入蜀椒與乾薑即為《傷寒論》大建中湯
(C)可治療裏虛傷寒，心悸而煩 (D)嘔家不可用小建中湯，以甘故也
- 20 下列解表劑之加減法何者最不適宜？
(A)《傷寒論》麻黃湯證若兼有身煩疼，加白朮
(B)《此事難知》引張元素方之九味羌活湯證，若無口苦而渴，兼見舌苔厚膩者，減黃芩、生地，加枳殼、厚朴
(C)《醫學心悟》加味香蘇散證，若患者經水適來，加當歸、丹參
(D)《溫病條辨》銀翹散證若見咳者，加紫菀、款冬花

- 21 陳小弟，9 歲男童，平時打籃球後喜歡喝大量飲料解渴，某日運動後跟同學一起去吃冰，突發嚴重胸腹痛，嘔吐，痛不可按觸，手足冰冷，診之舌苔白厚，脈伏按之帶緊，隨即被送至急診，診斷為腸套疊。此時若選擇以藥物治療，下列何方最適合？
(A)《傷寒論》四逆散 (B)《傷寒論》吳茱萸湯
(C)《傷寒論》大承氣湯 (D)《金匱要略》大建中湯
- 22 關於《丹溪心法》越鞠丸之敘述，下列何者最不適宜？
(A)總解六鬱
(B)組成中有川芎、神麴
(C)火鬱以山梔子為主藥，另可加黃芩、黃連來清熱瀉火
(D)組成中含香附、白朮
- 23 56 歲男性患者，突發性腰痠脹甚，至急診留觀時，先解小便變少，後解溲出血，熱澀痛難忍，西醫打了消炎鎮痛藥及平滑肌鬆弛劑後回家，但解溲仍紅赤及熱澀痛，舌質偏紅，脈數。下列何方治療最適宜？
(A)《小兒藥證直訣》導赤散 (B)《丹溪心法》小蓴飲子
(C)《傷寒論》豬苓湯 (D)《太平惠民和劑局方》清心蓮子飲
- 24 52 歲婦女因睡眠障礙求診，主訴煩躁不得眠，心悸盜汗，且容易頭暈目眩、口乾舌燥，脈診時發現脈細而弦。下列何方治療最適宜？
(A)《蘭室秘藏》當歸六黃湯 (B)《金匱要略》酸棗仁湯
(C)《醫宗金鑑》知柏地黃丸 (D)《傷寒論》炙甘草湯
- 25 有關《醫林改錯》血府逐瘀湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治胸中血瘀之證 (B)桔梗合枳殼，則升降上焦之氣而寬胸
(C)由桃紅四物湯合四逆湯，加桔梗、牛膝組成 (D)用於內熱贅悶，心悸怔忡，夜寐不安，入暮潮熱
- 26 下列方劑有用紅花者，共幾項正確？①《醫林改錯》血府逐瘀湯 ②《醫林改錯》膈下逐瘀湯 ③《醫林改錯》少腹逐瘀湯 ④《醫學發明》復元活血湯
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 27 一位 10 歲男童，主訴為咽喉腫痛 2 日，伴有發熱，並見鼻乾唇燥。望其咽喉，可見喉間起白如腐。納稍差，二便可，脈細數，舌紅苔少。下列處方何者最適宜？
(A)《小兒藥證直訣》六味地黃丸 (B)《醫門法律》清燥救肺湯
(C)《證治準繩》清咽利膈湯 (D)《重樓玉鑰》養陰清肺湯
- 28 關於《太平惠民和劑局方》八正散的組成，下列何者正確？
(A)大黃、燈心草 (B)滑石、澤瀉 (C)車前子、茯苓 (D)木通、生地黃
- 29 39 歲男性罹患多重抗藥性肺結核導致反覆發燒住院治療，因患者手足時伸時縮，抽動不止（癱瘓）。故會診中醫治療，於隔離病房見其精神倦怠，舌絳苔少，脈氣虛弱，有時時欲脫之勢，下列何方較適宜？
(A)《醫學衷中參西錄》鎮肝息風湯 (B)《傷寒論》炙甘草湯
(C)《重訂通俗傷寒論》羚角鉤藤湯 (D)《溫病條辨》大定風珠
- 30 劉先生主訴頭痛，身熱，乾咳無痰，氣逆而喘，胸悶脇痛，咽喉乾燥，心煩口渴，經醫師診察舌乾無苔，脈虛大而數，宜主下列何方？
(A)《金匱要略》麥門冬湯 (B)《溫病條辨》增液湯
(C)《重樓玉鑰》養陰清肺湯 (D)《醫門法律》清燥救肺湯
- 31 劉小姐來院門診，主訴頭痛，發熱，口渴，喝水即吐，小便不利，經醫師診察舌苔白，脈浮，下列何方最適宜？
(A)《傷寒論》五苓散 (B)《和劑局方》平胃散
(C)《和劑局方》藿香正氣散 (D)《傷寒論》苓桂朮甘湯

- 32 有關《金匱要略》麥門冬湯的敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治：火逆上氣，咽喉不利
(B)主治：虛熱肺痿，咳唾涎沫
(C)以大棗、生薑運脾，使中焦健運
(D)原方提及以水一斗二升，煮取六升，溫服一升，日三夜一服
- 33 下列何藥不是《溫病條辨》三仁湯與《醫原》藿朴夏苓湯均有的組成？
(A)杏仁 (B)澤瀉 (C)生薏苡仁 (D)白蔻仁
- 34 55 歲男性患者，就診發現咳嗽痰稀色白、喜唾、胸滿嘔逆、舌淡苔白滑、脈沉遲，治以下列何組成最適宜？
(A)茯苓、乾薑、甘草、五味子、細辛 (B)半夏、黃連、瓜蒌
(C)貝母、瓜蒌、天花粉、茯苓、陳皮、桔梗 (D)半夏、陳皮、茯苓、甘草、枳實、竹茹
- 35 44 歲女性，自訴脘腹痞悶，食少難消，大便溏薄，苔膩微黃，脈虛弱，治以下列何組成最適宜？
(A)人參、白朮、茯苓、甘草、山藥、肉豆蔻、山楂、神麴、麥芽、木香、砂仁、陳皮、黃連
(B)葛根、黃芩、黃連、甘草
(C)半夏、陳皮、茯苓、甘草、枳實、南星、生薑
(D)人參、白朮、茯苓、蓮子肉、炙甘草、山藥、薏仁、砂仁、桔梗、白扁豆
- 36 《醫宗金鑑·外科心法要訣》五味消毒飲之敘述，下列何者最不適宜？
(A)金銀花為主要藥物 (B)治感受溫熱火毒，蘊蒸肌熱，氣血壅滯所致疔腫
(C)局部紅腫熱痛，堅硬根深，舌紅、脈數 (D)連翹清熱解毒，為方中臣藥
- 37 24 歲女性，腰部新發蜂窩性組織炎，紅腫熱痛明顯，近日腫大迅速，略有發熱怕冷感，苔薄白略黃，脈數有力。下列何方最適宜？
(A)《備急千金要方》溫膽湯 (B)《校注婦人良方》仙方活命飲
(C)《萬病回春》托裏消毒飲 (D)《外科全生集》陽和湯
- 38 35 歲男性患者，大腿腫塊，漫腫無頭，膚色如常，脈遲細，下列何方最適宜？
(A)《外科全生集》陽和湯 (B)《外臺秘要》引崔氏方之黃連解毒湯
(C)《校注婦人良方》仙方活命飲 (D)《醫宗金鑑》五味消毒飲
- 39 《濟生方》滌痰湯之組成中具有「氣化，痰就化」功用之藥物為何？
(A)生薑、大棗 (B)陳皮、枳實 (C)茯苓、人參 (D)生薑、人參
- 40 有關《丹溪心法》礞石滾痰丸敘述，下列何者最適宜？
(A)主治寒痰久積不去之證 (B)其組成主以青礞石、朴硝為主藥
(C)以沉香來蕩滌除熱、大黃來調達氣機 (D)體虛及孕婦者須慎用
- 41 下列祛風濕、通經絡、止痹痛藥物中，何者性善走，最適合用於疼痛全身遊走性者？
(A)絡石藤 (B)防己 (C)秦艽 (D)威靈仙
- 42 下列何者有疏風透疹、利尿、祛濕止癢的功效？
(A)柴胡 (B)浮萍 (C)麻黃 (D)荊芥
- 43 關於小茴香的主治應用，下列敘述何者最不適宜？
(A)用於脇肋脹痛、腹部脹氣，陰虛火旺者 (B)疏肝理氣，溫腎祛寒，而能止痛
(C)用於胃寒嘔吐食少、脘腹脹痛等證 (D)用於寒疝疼痛、睪丸偏墜等證
- 44 下列藥物之敘述，何者正確？
(A)威靈仙用於骨哽咽喉，噎膈痞塊，以其寬中快氣
(B)漢防己用於水腫腳氣，小便不利，以其祛濕止痛
(C)豨薟草用於脾腎兩虛，陰血不足，以其祛風通絡
(D)絡石藤用於陽虛畏寒，半身不遂，以其祛風通絡

- 45 款冬花為治嗽要藥，用於欬逆上氣，常與下列何藥相須為用？
(A)貝母 (B)百合 (C)紫菀 (D)白前
- 46 濕溫初起，身熱不暢，身重肢倦，胸脘痞悶，兼有口氣腐臭、多涎。下列何藥最適宜選用？
(A)砂仁 (B)佩蘭 (C)白豆蔻 (D)草果
- 47 肺熱咳嗽痰多又見小便淋瀝澀痛，下列何藥最適宜？
(A)滑石 (B)車前子 (C)木通 (D)通草
- 48 下列何藥治療各種熱性腹痛最為適宜？
(A)川楝子 (B)高良薑 (C)五靈脂 (D)荔枝核
- 49 沉香的功效應用，下列何者最不適宜？
(A)行氣通陽散結，行氣導滯止痛 (B)行氣止痛，可用於胸腹脹悶作痛
(C)降逆調中，可用於上盛下虛之痰飲咳嗽 (D)大腸氣滯，虛閉不行
- 50 關於濕阻中焦證，舌苔濁膩，寒濕偏重者的治療，那一組藥最適宜選用？
(A)蒼朮、陳皮 (B)烏梅、玫瑰花 (C)茯苓、黃耆 (D)枳實、蓮子
- 51 能涼散風熱兼能息風定驚止癇，下列何藥物最適宜？
(A)蜈蚣 (B)蚤休 (C)升麻 (D)蟬蛻
- 52 具瀉膀胱相火，補腎水不足，除濕清熱之功能，下列何藥物最適宜？
(A)地骨皮 (B)梔子 (C)黃柏 (D)黃芩
- 53 用於時行熱病，熱入血分，神昏，熱毒發斑等證，下列何者最適宜？
(A)知母 (B)金銀花 (C)石膏 (D)大青葉
- 54 具清熱解毒、消癰散結、通經下乳、風疹搔癢、歷節風痛，下列何者最適宜？
(A)王不留行 (B)蒲公英 (C)漏蘆 (D)連翹
- 55 苦、辛，微寒，用於解毒、斂瘡、生肌、癰疽未潰，下列何者最適宜？
(A)茜草 (B)山豆根 (C)白蘞 (D)紫花地丁
- 56 關於王不留行的功能，下列何者最適宜？
(A)活血通經，下乳，利尿 (B)破血逐瘀，通經下乳
(C)行血補血，舒經活絡 (D)養血和血，通經下乳
- 57 下列何藥具有利尿通淋，破血通經的功效？
(A)劉寄奴 (B)瞿麥 (C)蒲公英 (D)石韋
- 58 關於白及的敘述，下列何者最適宜？
(A)為薔薇科植物 (B)主要用於肺、胃出血之證
(C)具有溫經止血的功效 (D)具有止血不留瘀的功效
- 59 關於三七的敘述，下列何者最適宜？
(A)常用於血熱妄行所致的出血病證 (B)具有化瘀利尿功效
(C)具有涼血止血功效 (D)具有補虛強壯的作用
- 60 乳香、沒藥均有的功效，下列何者最適宜？
(A)行氣解鬱 (B)通經活絡 (C)消腫生肌 (D)涼血消腫
- 61 某女性患者血虛經閉，手足麻木，關節酸痛，下列何者最適宜？
(A)雞血藤 (B)雙鉤藤 (C)忍冬藤 (D)夜交藤
- 62 具有滋補肝腎、清熱解毒、涼血止血之功效，下列何藥物最適宜？
(A)何首烏 (B)墨旱蓮 (C)桑椹 (D)枸杞子
- 63 龜板的敘述，下列何者最不適宜？
(A)滋陰潛陽 (B)益腎強骨 (C)孕婦安胎 (D)養血補心

- 64 阿膠的敘述，下列何者最不適宜？
(A)滋陰潤燥 (B)安神增智 (C)補血安胎 (D)養血止血
- 65 巴戟天的敘述，下列何者最適宜？
(A)陰虛火旺 (B)宮冷不孕 (C)血虛畏寒 (D)濕熱內盛
- 66 具有溫腎壯陽，強壯筋骨，祛寒除濕之功效，下列何藥物最適宜？
(A)肉蓯蓉 (B)補骨脂 (C)菟絲子 (D)仙茅
- 67 有關白芍的功效敘述，下列何者最不適宜？
(A)養血斂陰 (B)潤腸通便 (C)柔肝止痛 (D)平抑肝陽
- 68 患者心悸不安、失眠多夢，且有小便不利，下列何藥物最適宜？
(A)龍骨 (B)琥珀 (C)遠志 (D)磁石
- 69 紫蘇子的敘述，下列何者最不適宜？
(A)降氣化痰，止咳平喘 (B)降氣化痰，潤腸通便
(C)十字花科紫蘇的成熟種子 (D)脾虛便溏者慎用
- 70 石決明的敘述，下列何者最不適宜？
(A)平肝息風潛陽之要藥 (B)補益肝陽
(C)入煎劑，宜打碎先煎 (D)脾胃虛寒者，不宜
- 71 天麻：性平，味甘。下列應用，何者最不適宜？
(A)驅風勝濕，溫經除痹 (B)肝陽上亢，頭痛眩暈
(C)肝風內動，驚癇抽搐 (D)血液衰少，類中風者
- 72 全蠍的敘述，下列何者最不適宜？
(A)辛，平；有毒。歸肝、心經 (B)息風止癇，解毒散結
(C)與蜈蚣相須為用 (D)血虛生風者慎用
- 73 治痰阻心竅及咳嗽痰多等證，下列何者最適宜？
(A)紫蘇子 (B)遠志 (C)桃仁 (D)浮海石
- 74 功專止汗，有表邪者忌用，且外用時研末做粉撲，下列何藥物最適宜？
(A)麻黃根 (B)浮小麥 (C)滑石 (D)牡蠣
- 75 性味：酸、辛，寒。內服：湧吐風痰；外用：解毒收濕，下列何藥物最適宜？
(A)明礬 (B)皂礬 (C)膽礬 (D)硼砂
- 76 下列何藥常用於食滯不化或兼感風寒者？
(A)建麴 (B)麥芽 (C)穀芽 (D)萊菔子
- 77 麥芽之應用，下列何者最不適宜？
(A)飲食積滯，噯腐吞酸 (B)乳汁瀯留，乳房脹痛
(C)肝胃不和，脇肋脹痛 (D)肝鬱氣滯，痰火哮喘
- 78 下列何種藥物是蟲癭所形成的？
(A)冬蟲夏草 (B)五倍子 (C)豬苓 (D)天麻
- 79 下列針對藥材品質鑑別的敘述，何者錯誤？
(A)三七：以體重、質堅、表面光滑、斷面色灰綠或黃綠者為佳
(B)乳香：以淡黃色、顆粒狀、半透明、無砂石樹皮雜質、粉末粘手者為佳
(C)丹參：以條粗、內紫黑色、有菊花狀白點者為佳
(D)桔梗：以根肥大、色白、質充實、味甜者為佳
- 80 下列何種藥物，中醫用於熱結便秘，其主成分也用於現行西醫臨床上的便秘？
(A)番瀉葉 (B)何首烏 (C)甘遂 (D)巴豆