

105年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：6311

類科名稱：物理治療師

科目名稱：心肺疾病與小兒疾病物理治療學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 當關閉容量（closing volume）接近或大於功能性肺餘容積時表示：
 - A. 吸入之氣體主要分布在上肺，但因灌流量在下肺較多，故造成換氣灌流不平衡（ $\dot{V}/\dot{Q}$ mismatch）
 - B. 吸入之氣體主要分布在下肺，但因灌流量在上肺較多，故造成換氣灌流不平衡（ $\dot{V}/\dot{Q}$ mismatch）
 - C. 吸入之氣體主要分布在上肺，但因灌流量在上肺較多，故造成換氣灌流較平衡（ $\dot{V}/\dot{Q}$ match）
 - D. 吸入之氣體主要分布在下肺，但因灌流量在下肺較多，故造成換氣灌流較平衡（ $\dot{V}/\dot{Q}$ match）
2. 有關健康人運動時解剖死腔對潮氣量比值，下列敘述何者正確？
 - A. 約為 0.5
 - B. 較安靜狀態增加
 - C. 較安靜狀態減少
 - D. 與安靜時相同
3. 下列敘述何者不是慢性心衰竭之表徵？
 - A. 運動高血壓
 - B. 呼吸困難
 - C. S3 心音
 - D. 下肢水腫
4. 糖尿病前期（pre-diabetes）是指患者的空腹血糖值介於何範圍？
 - A. 大於 90 mg/dL，小於 106 mg/dL
 - B. 大於 90 mg/dL，小於 116 mg/dL
 - C. 大於 100 mg/dL，小於 126 mg/dL
 - D. 大於 120 mg/dL，小於 136 mg/dL
5. 下列敘述何種血液中的離子濃度升高會使血壓上升？
 - A. 鉀
 - B. 鈉
 - C. 磷
 - D. 鈣
6. 臨床上常利用心率與下列敘述何種參數來計算心肌攝氧量指標？
 - A. 脈壓
 - B. 收縮壓
 - C. 舒張壓
 - D. 平均血壓
7. 一位氣喘病人，因為車禍造成肋骨骨折，胸口疼痛、呼吸困難、 $FEV_1=43\%$ 預期值、 $FVC=58\%$ 預期值、 $FEV_1 / FVC=62\%$ ，請問這屬於下列何種肺疾病？
 - A. 限制型
 - B. 阻塞型
 - C. 限制合併阻塞型
 - D. 肺心症
8. 病人在評估時呈現呼吸困難、尖銳性胸痛，且胸縱膈偏移。這個病人最可能是：
 - A. 氣胸
 - B. 肺炎
 - C. 慢性支氣管炎
 - D. 肺部腫瘤
9. 肺部手術後常見的併發症，包括：①肺塌陷 ②心跳過慢 ③傷口疼痛 ④皮下氣腫

- A.僅②③④
B.僅①②③
C.僅①③④
D.僅①②④
- 10.有關叩診（percussion），下列敘述何者正確？①敲擊肋骨可以用來區辨肺實質密度的變化 ②通常以慣用手的中指進行敲擊 ③有肺葉塌陷時，敲擊聲會出現較大且長的回音 ④叩診橫膈肌位移（excursion）正常約為3-5公分
A.僅①③
B.僅①②④
C.僅②③④
D.僅②④
- 11.因緊張而導致過度換氣之呼吸型態最類似於：
A.陳施氏呼吸（Cheyne-Stokes breathing）
B.克什摩呼吸（Kussmaul breathing）
C.拜歐特呼吸（Biot's breathing）
D.門檻式呼吸（Doorstop breathing）
- 12.心臟復健第一階段的成效評估不包括下列何者？
A.最大運動能力
B.執行自我照顧能力
C.需要協助或監視以執行活動的程度
D.二級預防的能力
- 13.王先生在 6 天前急性心肌梗塞，住院治療後情況已經穩定。目前照會物理治療師幫王先生測試其活動功能，結果發現王先生在一般家事活動上容易引起疲倦、心悸、呼吸困難及心絞痛。則王先生運動耐力約為多少METs？
A.6~10
B.4~6
C.2~3
D.<2
- 14.根據美國心臟學會建議，冠狀動脈和其他血管病患二級預防之指引，下列敘述那些錯誤？①心臟衰竭或腎臟功能不足者，血壓控制<130/80 mmHg ②脂肪控制之主要目標三酸甘油酯（TG）<50 mg/dL ③體重控制建議BMI為18.5~24.9 kg/m² ④ HbA1c介於8~10%
A.僅①④
B.僅②③
C.僅①②④
D.僅②③④
- 15.病人在運動後覺得很累、很喘、有流汗情形，運動量讓病人感到吃力，其自覺用力係數（RPE）應為多少？
A.11
B.13
C.15
D.17
- 16.有關心臟疾病患者在出院前進行低限運動測試（low-level exercise test），下列敘述何者錯誤？
A.以年齡預估最大心率90%為協助篩檢出高危險群患者之條件
B.提供居家活動是否安全之訊息
C.提供運動治療處方設定之參考
D.評估藥物控制病情之安全與成效
- 17.對於心肌梗塞病患之第一期心臟復健，由平躺坐起來的變化，下列敘述何者正確？
A.增加中央靜脈壓
B.增加肺血管充血
C.增加靜脈引流
D.減輕呼吸困難之症狀
- 18.30歲吳先生從事有氧運動訓練時，下列那兩種運動強度不相當？
A.50%最大心率，與40%最大攝氧量
B.70%最大心率，與自覺用力係數12~13
C.85%最大攝氧量與自覺用力係數14

- D.60%心率儲備量與60%最大攝氧量
- 19.一位患者的病歷診斷為 xenograft failure s/p MVR & TVP，其術後第二天之 CO（cardiac output）：4.2 L/min，CI（cardiac index）：2.02 L/min/m²，下列敘述何者正確？
- A.患者之前曾接受生物瓣膜置換
 - B.患者主要接受三尖瓣膜置換
 - C.患者此次接受兩個瓣膜置換手術
 - D.CI是利用CO除以身高（公尺）平方
- 20.對慢性心臟病患為期三個月的耐力訓練後，下列敘述何者將會增加？
- A.休息時的心率
 - B.最大運動量時的動靜脈氧差（a-v O₂ difference）
 - C.中低強度運動時的心率
 - D.休息時的心跳壓力乘積（rate-pressure product）
- 21.李先生於 2 個月前發生心肌梗塞，因長時間臥床缺乏活動，關於其可能產生之不良生理效應，下列敘述何者正確？①降低胰島素阻力 ②增加活動時心跳 ③血液體積上升 ④降低休息時心搏量
- A.僅①②
 - B.僅②④
 - C.僅①③④
 - D.僅②③④
- 22.48 歲病患接受心肺運動測試後，得知最大心率（HRmax）為 160 bpm，而休息心率為 80 bpm，達到無氧閾值時心率約為 135 bpm，就設定運動處方時，有氧訓練之熱身期之適當心率強度約為：
- A.90~100bpm
 - B.105~120bpm
 - C.125~135bpm
 - D.140~150bpm
- 23.陳先生於接受冠狀動脈繞道手術（CABG）後，接受第二期的心臟復健，下列運動處方之訓練強度，何者較有心血管系統正面效果？①最大攝氧量的30% ②最大心率的70% ③心率貯存量的60%加上休息心率 ④無氧閾值界限
- A.僅①②
 - B.僅①③④
 - C.僅②③④
 - D.①②③④
- 24.肺癌患者左側全肺葉切除，且因病灶的侵犯及粘黏進行部分心包膜切除，下列有關術後物理治療的敘述何者錯誤？
- A.進行扣擊時，可以一手扶住患者傷口，以減輕其疼痛
 - B.宜加強腹式橫膈呼吸
 - C.要引流右側痰液可側躺在患側（左下右上）
 - D.引流瓶內看到大量氣泡時，宜暫停所有深呼吸運動治療
- 25.有關指導患者從事噴霧治療之重點，下列敘述何者錯誤？
- A.吐氣後，以口做最大吸氣
 - B.吸氣速度要快速
 - C.吸氣後屏住呼吸數秒
 - D.施用時患者可成 90度直立坐姿
- 26.慢性阻塞性肺部疾病患者在運動過程中，於下列何情況時應考慮給予氧氣？
- A.PaO₂小於或等於88 mmHg，血氧飽和度小於55%
 - B.PaO₂小於或等於88 mmHg，血氧飽和度小於88%
 - C.PaO₂小於或等於55 mmHg，血氧飽和度小於88%
 - D.PaO₂小於或等於55 mmHg，血氧飽和度小於55%
- 27.下列敘述那些疾病會出現限制型肺部功能障礙（restrictive lung dysfunction）？ ①肌萎縮側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis） ②肺氣腫 ③T5完全性脊髓損傷 ④類肉瘤病（Sarcoidosis） ⑤肋膜膿胸（pleural empyema）
- A.僅②④⑤
 - B.僅①③④
 - C.僅①③④⑤
 - D.僅③④⑤

28. 評估脊髓損傷患者的呼吸型態的結果，下列配對何者最不可能發生？
- A. 高頸髓損傷患者：三分頸部、一分橫膈的呼吸方式
 - B. 低頸髓損傷：四分橫膈的呼吸方式
 - C. 中胸髓損傷：一分橫膈、三分胸式的呼吸方式
 - D. 低胸髓損傷：二分橫膈、二分胸式的呼吸方式
29. 下列那些是新生兒進行頭高腳低（Trendelenburg position）姿位引流的絕對禁忌症？ ①急性心肺衰竭 ②Grade I腦室內出血（intraventricular hemorrhage） ③近期内接受過氣管食道瘻管修補手術（tracheoesophageal fistula repair） ④開放性動脈導管 (Patent Ductus Arteriosus)
- A. 僅①③④
 - B. 僅②③④
 - C. 僅①③
 - D. 僅①②④
30. 關於下肢動脈功能不全引起的動脈瘡，下列敘述何者錯誤？
- A. 潰瘍常發生在足踝外側
 - B. 傷口缺乏肉芽組織
 - C. 傷口外圍有黑色壞死皮膚
 - D. 架高下肢可減低痠疼感
31. 下肢中重度動脈阻塞的患者不適合採用下列敘述何者運動型態？
- A. 登山
 - B. 走路
 - C. 游泳
 - D. 固定式腳踏車
32. 下列有關下肢慢性動脈與靜脈病變之敘述，何者錯誤？
- A. 步行對兩者皆屬合適的運動治療型態
 - B. 兩者皆可藉由反應性充血時間進行評估
 - C. 下肢的被動運動也可預防靜脈血栓的發生
 - D. 兩者早期發炎時，運動皆會產生疼痛加劇現象
33. 心臟移植病患的運動處方，有關訓練強度的考量，下列敘述何者較不恰當？
- A. 自覺用力係數
 - B. 攝氧量
 - C. 心率
 - D. 瓦特數
34. 下列有關無氧閾值的敘述，何者正確？
- A. 乳酸超過 3 mM時，稱為乳酸閾
 - B. 抽血測量乳酸值增高，也稱為換氣閾
 - C. 超過無氧閾值表示乳酸增加，重碳酸鹽下降
 - D. 超過無氧閾值時，呼吸頻率變化不大
35. 下列何種非侵入性機械換氣輔助方式，可以引入藥物及用以促進咳嗽？
- A. 連續氣道正壓（CPAP）
 - B. 呼氣末正壓（PEEP）
 - C. 間歇式正壓呼吸（IPPB）
 - D. 雙相正壓（BiPAP）
36. 有關T5完全性脊髓損傷的患者之肺部功能及其表現與正常人相比，下列敘述那些正確？①呼氣儲備容積下降 ②肺餘容積下降 ③肺餘容積上升 ④直立時橫膈休息位置較高 ⑤直立時橫膈休息位置較低
- A. 僅①③⑤
 - B. 僅③④
 - C. 僅①②⑤
 - D. 僅①②④
37. 下列有關老年人的運動訓練計畫之敘述，何者錯誤？
- A. 訓練目標是提升極限運動的能力
 - B. 計畫需考慮個別差異
 - C. 以較低量開始，進展通常較年輕人為慢
 - D. 以增加運動頻率代償較低的運動強度
38. 治療肥胖的運動處方，下列敘述何者正確？

- A.在熱量消耗效果上，阻力型運動比有氧運動更好
B.在相同的熱量消耗下，快走比散步的效果更好
C.兒童及青少年肥胖的建議量是每天 60 分鐘的高強度運動及減少上網的時間
D.每週至少有 150 分鐘的中強度運動量可有長期維持體重的效果
- 39.根據美國運動醫學會對一般健康成人運動量的建議，下列敘述何者正確？
A.每週 5 天、每天至少 30 分鐘的中度有氧運動，或每週 3 天、每天至少 20 分鐘的高強度運動，再加上每週 2 次肌力訓練
B.每週 5 天、每天至少 60 分鐘的中度有氧運動，或每週 3 天、每天至少 30 分鐘的高強度運動，再加上每週 1 次肌力訓練
C.每週 3 天、每天至少 30 分鐘的中度有氧運動，或每週 5 天、每天至少 20 分鐘的高強度運動，再加上每週 2 次肌力訓練
D.每週 3 天、每天至少 60 分鐘的中度有氧運動，或每週 5 天、每天至少 30 分鐘的高強度運動，再加上每週 1 次肌力訓練
- 40.承上題，針對大於 65 歲之老年族群的身體活動建議與上述一般成年人有所不同，下列敘述何者正確？
A.老年族群建議增加平衡運動與柔軟度運動
B.老年族群因心血管因素不建議從事阻力訓練
C.老年族群若有慢性疾病則不建議從事一般身體活動
D.老年族群從事低強度運動即可，不須達到目標心率
- 41.評估一個發展遲緩兒童之訊息處理與學習能力時，根據「訊息處理理論」，下列敘述何者錯誤？
A.學習初期，大部分的任務一開始的認知運思多，也會占據很多容量。在有限容量假設下，可處理之訊息量較少且速度較慢
B.與學習初期相比，在學習後期，進行同樣的任務，所需的心智努力會較少，占用較少容量，因而留下較多的容量來進行其他運思。在有限容量假設下，可處理之訊息量較多且速度較快
C.長期儲存的容量可由記憶廣度（memory span）來測試
D.選擇性知覺（selective perception）屬於感覺紀錄器（sensory register）功能之一
- 42.根據協同理論（synactive theory），嬰兒出現手指緊握的現象，是由那個系統所發出的窘迫訊息（distress sign）？
A.生理（physiological）
B.動作（motor）
C.行為（behavioral）
D.注意力互動（attention/interaction）
- 43.根據動作學習理論，下列有關動作學習的敘述，何者正確？
A.連續性任務（continuous task）沒有回饋修正效果
B.在動作學習之語言－認知期，以開放性任務（open task）訓練效果較好
C.在動作學習之語言－認知期，段落（blocked）訓練比隨機（random）訓練之立即學習效果差
D.就成人簡單動作之長期學習效果，隨機（random）訓練比段落（blocked）訓練好
- 44.依據動態系統理論（Dynamical Systems Theory），當一個發展遲緩兒童在某一動作發展之轉換階段（transitional phases）或不穩定期，是治療介入之最好時機，這是指下列何者？
A.下一個動作發展里程碑階段
B.兒童執行該動作有情緒不穩定現象
C.兒童有時會出現但不會穩定表現之動作行為
D.在兒童生理年齡應有之動作行為
- 45.皮亞傑之發展階段論中提到兒童認知發展之階段順序，下列敘述何者正確？ ①形式運思期 ②感覺動作期 ③具體運思期 ④前運思期
A.①②④③
B.②①③④
C.②④③①
D.③②④①
- 46.下列兒童動作表現，若依照平均出現年齡，何者是較高的發展能力？
A.單腳站 2 秒
B.單腳向前連續跳 3 步（hopping）
C.雙腳向前連續跳 3 步（jumping）

- D.雙腳交替向前跳 3 步（skipping）
- 47.根據美國小兒神經科醫學會於西元2003年提出「全面發展遲緩兒童（Children with Global Developmental Delay）」的評估指引中指出，下列敘述何者不是必要的？
- A.詳細詢問病史與發展史
 - B.照會聽力與視力篩檢
 - C.對遲緩兒童進行腦波檢查
 - D.對遲緩兒童的家庭進行評估
- 48.若全班的身高呈現常態分布，則身高位於平均數的人，其身高的百分位等級（percentile rank）為何？
- A.第 100
 - B.第 75
 - C.第 50
 - D.第 25
- 49.與成人相比，一名 3 歲兒童在運動時心肺功能變項之反應性，下列敘述何者正確？
- A.兒童有較高的血中乳酸量
 - B.兒童有較低的血紅素濃度
 - C.兒童有較低的心率
 - D.兒童有較高的心搏量
- 50.下列那一項評估測驗工具最適用於篩檢發展性協調障礙兒童？
- A.皮巴迪動作發展量表（Peabody Development Motor Scales）
 - B.兒童動作ABC量表（Movement Assessment Battery for Children）
 - C.早期介入評估量表（Early Intervention Developmental Profile）
 - D.粗大動作功能量表（Gross Motor Function Measure）
- 51.下列有關接受者作業特性曲線（Receiver operating characteristics curve，簡稱ROC曲線）之敘述，何者正確？
- A.由無數切截點值求出的無數對（1－敏感度）和特異度作圖構成曲線
 - B.ROC曲線下面積可視為測驗之敏感度
 - C.可由ROC曲線找出最佳切截點
 - D.根據最佳切截點之（敏感度）／（1－特異度）公式可算出陰性概率比
- 52.對於一位 17 歲腦性麻痺青少年的粗大動作分類系統，下列敘述何者錯誤？
- A.階級 I，可在室外和社區中獨立行走，可以跑步和跳躍
 - B.階級 II，大部分環境可以獨立步行
 - C.階級 III，必須使用電動輪椅移動
 - D.階級 IV，在室外和社區中可能需要他人協助移位
- 53.湯瑪士氏測試（Thomas test）可用於檢查兒童的肌肉攣縮程度，此方法主要是測量下列何者？
- A.髖關節屈曲肌
 - B.髖關節伸直肌
 - C.膝關節屈曲肌
 - D.膝關節伸直肌
- 54.關於兒童髖角度量測方法（亦稱為被動膝蓋伸直測試，popliteal angle），下列敘述何者正確？
- A.孩童平躺，髖關節彎曲 90 度，並將膝關節慢慢伸直
 - B.孩童平躺，髖關節完全彎曲，並將膝關節慢慢伸直
 - C.孩童平躺，髖關節彎曲 90 度，並將膝關節慢慢彎曲
 - D.孩童平躺，髖關節完全彎曲，並將膝關節慢慢彎曲
- 55.一位 3 歲成骨不全症（osteogenesis imperfecta）的男孩，當出現下列何種症狀時，最可能有骨折發生？
- A.感覺喪失
 - B.紅腫熱痛
 - C.皮膚先變白，再變紫，最後發紅
 - D.該部位流汗異常
- 56.下列有關頭部外傷兒童急性期擺位的原則，何者最適當？
- A.儘量採側姿，因較不易受原始反射的影響
 - B.儘量採仰姿，因較有利於胃腸道功能
 - C.儘量採俯姿，因生命跡象較不受影響

- D.儘量採 90 度直立坐姿，因較有利於頸部控制
- 57.下列有關唐氏症兒童的先天性心臟病之敘述，何者錯誤？
- A.約有 4 成的唐氏症兒童有此疾病
- B.此疾病較常為心室中隔（ventriculoseptal defect）或房室通道缺損（atrioventricular canal defects）
- C.此先天性心臟病大部分可以接受手術治療
- D.在先天性心臟病治癒前，不可以接受物理治療
- 58.對於患有脊髓膜膨出（myelomeningocele）的新生兒應避免下列何種擺位方法？
- A.俯臥
- B.仰臥
- C.側臥
- D.半側臥
- 59.高危險嬰兒在新生兒加護病房中的正確擺位原則為：
- A.頸部放在後伸姿勢，以利呼吸通暢
- B.下肢維持伸直，以利未來載重站立
- C.軀幹及四肢擺在屈曲的姿勢，以增加屈曲張力
- D.平躺時頭部儘量水平，以增加頭部血流供應
- 60.下列敘述何者是極低體重（出生體重低於1500公克）早產兒常見的臨床問題？
- A.性染色體異常
- B.發展性髖部發育障礙
- C.先天性肢體缺損
- D.呼吸窘迫症
- 61.一般正常兒童，約在幾歲時可觀察到在站姿時足弓開始形成？
- A.2
- B.4
- C.7
- D.10
- 62.針對先天性髖關節脫臼（congenital hip dysplasia and dislocation）的患童，下列敘述何者錯誤？
- A.大多數在出生時就可以檢測出來
- B.不需要做處理，隨年齡會慢慢變好
- C.可以用巴羅氏測試（Barlow maneuver）檢測股骨頭是否滑出髖臼外
- D.成因有許多可能，包含基因或在子宮內的環境
- 63.一位腦性麻痺兒童走路呈現屈膝步態（crouch gait），其膝踝足關節活動度不受限，也無變形，則下列何種支架最合適？
- A.動態式踝足支架（dynamic ankle-foot orthosis）
- B.固定式踝足支架（solid ankle-foot orthosis）
- C.地面反作用力式踝足支架（floor reaction orthosis）
- D.踝上式支架（supramalleolar orthosis）
- 64.一位 8 歲腦性麻痺兒童有髖關節脫臼情形，針對下列何種肌肉進行肌腱手術最適合？
- A.髖內收肌
- B.髖外展肌
- C.比目魚肌
- D.腓腸肌
- 65.下列敘述何者較不屬於腦性麻痺患者的原發性機能障礙？
- A.過高肌肉張力
- B.本體感覺異常
- C.關節攣縮
- D.構音不全
- 66.一位 5 歲腦性麻痺兒童在室內使用助行器行走，但在戶外長距離或不平路面則需他人協助，以粗大動作功能分類系統補充及修正版（GMFCS-E&R）評估，應屬何種等級？
- A.V級
- B.IV級
- C.III級
- D.II級

- 67.要評估智能不足兒童之問題行為，以作為使用行為改變技術前後之成效比較時，需含幾個項目，其中不包括：
- A.問題行為發生的頻率
 - B.問題行為嚴重度
 - C.專業人員本身或照顧者對問題行為的感受及容忍度
 - D.兒童照顧者之社經地位
- 68.發展性協調障礙（developmental coordination disorder）兒童較不會出現下列那個問題？
- A.有退縮傾向
 - B.容易焦慮
 - C.暴力傾向
 - D.容易自卑
- 69.下列有關自閉症（Autism）兒童之敘述，何者正確？
- A.主要是由於環境剝奪或主要照顧者教養方式不當所致
 - B.女多於男
 - C.通常不會有認知障礙
 - D.與人溝通有障礙
- 70.一位 12 歲四肢痙攣型腦性麻痺患童不一定有下列何種徵狀？
- A.粗大動作和精細動作發展遲緩
 - B.異常的姿勢和張力
 - C.異常的平衡反應
 - D.智力障礙
- 71.患有脊髓畸形（myelodysplasia）兒童的引流管（shunt）失能，會出現那些狀況？①出現尿失禁或情況變嚴重 ②痙攣情況加劇 ③個性改變 ④活動力增加 ⑤容易叫起床
- A.僅①②③
 - B.僅①③④
 - C.僅①④⑤
 - D.僅①③⑤
- 72.下列有關提高腦性麻痺兒童肌力訓練效果的敘述，何者錯誤？
- A.家長願意支持兒童和訓練計畫
 - B.兒童可以依要求一致地產生最大或接近最大力量
 - C.兒童對於訓練的活動有興趣
 - D.採用增加痙攣的肌力訓練模式
- 73.有關裘馨氏肌肉失養症（Duchenne Muscular Dystrophy），下列敘述何者錯誤？
- A.是性聯隱性遺傳
 - B.早期症狀常為下肢肌肉無力
 - C.不會出現關節攣縮
 - D.多於一至四歲發病
- 74.關於唐氏症，下列敘述何者錯誤？
- A.成年個案有提早衰老
 - B.寰樞頸椎不穩定（atlantoaxial instability）
 - C.成年後，過度肥胖
 - D.女性個案停經期延後
- 75.依世界潮流，早期介入人員對於 0~2 歲特殊嬰幼兒的最佳模式稱為：
- A.個別化父母服務計畫
 - B.個別化托育服務計畫
 - C.個別化教育服務計畫
 - D.個別化家庭服務計畫
- 76.下列關於物理治療師在早期療育中提供的服務方式，何者錯誤？
- A.到宅療育
 - B.巡迴輔導
 - C.經濟支持
 - D.時段療育
- 77.依據西元2013年之特殊教育支援服務與專業團隊設置及實施辦法第4條，下列何者不屬於特殊教育相關專業人員？
- A.專科醫師
 - B.物理治療師

- C.物理治療生
- D.臨床心理師

78.在兒童的早期療育服務中，專業間有良好合作關係的最明顯特徵為：

- A.各專業可獨立訂定治療目標，不需要知道其他專業之目標
- B.專業間可互相分享療育目標與進度
- C.可隨意組成專業團隊的成員
- D.只需一位專業人員與家長有良好之關係

79.對於兒童物理治療師所參與之專業團隊服務模式，下列敘述何者錯誤？

- A.多專業團隊模式強調各專業治療師各自進行兒童評估及家長面談
- B.專業間團隊模式強調專業人員彼此分享各自所擬定之目標
- C.跨專業團隊模式強調由一位直接服務提供者執行團隊擬定的計畫
- D.跨專業團隊模式強調專業間要避免跨領域學習，以免妨礙各自專業的發展

80.下列那個作為不符合以家庭為中心的早期介入的中心思想？

- A.與家長討論發展遲緩兒童家庭生活狀況，並教導家長如何利用家庭環境誘發兒童發展
- B.早產兒出院前，讓主要照顧者了解嬰兒的發展狀況與注意事項
- C.治療師與家長討論轉銜相關事宜
- D.治療師獨自進行發展測驗後，即可著手治療