

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述，葛根黃芩黃連湯治喘的病機，下列何者正確？
(A)下後表邪不解，肺氣上逆 (B)太陽病誤下，表裏邪熱迫肺，肺氣不利
(C)傷寒表不解，水飲內停，上逆於肺 (D)太陽病下後，表證未除，兼胸陽不足
- 2 依《傷寒論》所述，太陽病，發汗後，大汗出所導致的五苓散證，其中出現消渴的病機，下列何者正確？
(A)汗出太過，損耗津液 (B)水氣內停，氣不化津
(C)寒水內停，陽虛不化 (D)熱與水結，飲水以自救
- 3 12 歲陳男就診時症見：發熱惡寒，頭項強痛，汗不出，大便泄瀉，舌苔白。宜以下列何方治之？
(A)葛根黃芩黃連湯 (B)黃芩湯 (C)桂枝人參湯 (D)葛根湯
- 4 《傷寒論》有關於吳茱萸湯證的記載共有三條：一為陽明食穀欲嘔；一為少陰，吐利手足逆冷，煩躁欲死；一為乾嘔吐涎沫，頭痛。其共同的病機為下列何者？
(A)氣虛下陷 (B)肝血不足，無法循經通巔頂
(C)陰寒內盛，濁陰上逆 (D)陽虛不運，肝陽犯胃
- 5 依《傷寒論》所述，梔子豉湯的臨床見症，下列那些正確？①虛煩不得眠 ②反覆顛倒，心中懊惱 ③煩熱，胸中窒 ④心中結痛
(A)僅①②③ (B)僅①③ (C)僅②④ (D)①②③④
- 6 依《傷寒論》所述，大陷胸湯之組成，含有下列何種藥物？
(A)杏仁 (B)巴豆 (C)甘草 (D)甘遂
- 7 依《傷寒論》所述，傷寒與霍亂皆屬感受外邪，所以也可發熱惡寒，頭痛身體疼痛，下列有關霍亂證的敘述何者錯誤？
(A)霍亂，吐利止而身痛不休者，宜桂枝湯小和之
(B)霍亂初病，即見嘔吐下利
(C)霍亂的表裏同病，以吐利的裏證為主
(D)當邪氣內傳，才會影響裏氣不和，脾胃升降失常時，才見嘔吐下利
- 8 李小姐冬日得傷寒證，胸中異常煩躁，醫者以麻黃湯治之，胸中煩躁益甚，診其脈洪滑而浮，治以下列何方最適宜？
(A)白虎湯加人參 (B)竹葉石膏湯 (C)大青龍湯加天花粉 (D)梔子豉湯

- 9 依《傷寒論·陽明病脈證并治》所述，宜抵擋湯治療之症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)喜忘 (B)大便色黑 (C)血瘀熱結 (D)陽明腑實證
- 10 依《傷寒論》所述：「陽明病，汗出多而渴者，不可與豬苓湯」，其理由為下列何者？
(A)利小便 (B)滋陰 (C)清熱之力不足 (D)潤燥之力不足
- 11 依《傷寒論》所述，陽明裏熱太盛，津氣兩傷之病機，治以下列何方最適宜？
(A)白虎湯 (B)白虎加人參湯 (C)調胃承氣湯 (D)大承氣湯
- 12 依《傷寒論·陽明病脈證并治》所述，陽明急下證，下列敘述何者錯誤？
(A)傷寒六、七日，目中不了了，睛不和，無表裏證，大便難，身微熱者，此為實也
(B)目中不了了，睛不和者，是因肝陰為腎陽所竭，水不能制火，火上燠於目
(C)陽明病，發熱，汗多
(D)發汗不解，腹滿痛
- 13 依《傷寒論》所述：「傷寒，醫下之，續得下利，清穀不止，身疼痛者，當急救裏」，救裏宜治下列何方？
(A)四逆湯 (B)理中湯 (C)白通湯 (D)小建中湯
- 14 依《傷寒論》所述：「少陰病，陽已虛」，若見尺脈如何，不可下之，為下列何者？
(A)浮數 (B)弱澀 (C)弦細 (D)浮弦
- 15 依《傷寒論》所述：「少陰病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之」之病機敘述，下列何者正確？
(A)腹中痛乃脾虛氣滯
(B)四逆散乃主治陽鬱致厥之證
(C)小便不利乃因少陰陽虛，膀胱氣化不利，水氣內停
(D)悸乃因陰寒逆犯心陽
- 16 依《傷寒論》所述，真武湯證當中有很多個或然症，其加減法中之敘述，下列何者錯誤？
(A)若咳者，加五味子半升，細辛、乾薑各一兩 (B)若小便不利者，去白朮
(C)若下利者，去白芍加乾薑二兩 (D)若嘔者，去附子加生薑足前成半斤
- 17 暑熱病邪的特點，下列敘述何者錯誤？
(A)酷暑高溫的氣候，人體毛竅大開而汗出，是導致暑熱病邪侵犯的重要原因
(B)初起逕犯陽明氣分，但不直犯心、肝，引起猝然昏迷、痙厥的病變
(C)過程中極易出現津氣兩傷證
(D)暑濕兼寒證，多與夏季恣食生冷，貪涼露宿有關
- 18 下列何者為辛開苦泄，宣降濕熱之邪的最常用方劑？
(A)達原飲 (B)黃連溫膽湯 (C)藿朴夏苓湯 (D)王氏連朴飲
- 19 溫病「氣營兩燔」的定義、主證、及治療方劑，下列敘述何者錯誤？
(A)邪已入營而氣熱仍盛，稱為氣營兩燔
(B)以壯熱，口渴，煩躁，苔黃舌紅絳，或發斑為主證
(C)加減玉女煎，化斑湯為常用之治療方劑
(D)化斑湯組成乃白虎湯加犀角（現以水牛角代）、生地

- 20 溫病證，症見壯熱煩渴，頭痛如劈，煩躁不安，肌膚發斑，吐血衄血，舌絳苔黃、脈數。則其病變階段最可能屬下列何者？
(A)氣分 (B)氣、營分 (C)血分 (D)氣、營、血分
- 21 溫病白苔，有厚、薄、潤、燥等情況，下列敘述何者錯誤？
(A)薄苔，多為病邪在表 (B)厚苔，多為病邪在裏
(C)潤苔是津液未傷，燥苔為津液已傷 (D)厚濁黏膩的苔，多係兼濕熱痰瘀
- 22 溫病「三寶」方劑，下列何者較長於清心豁痰？
(A)紫雪丹 (B)蘇合香丸 (C)至寶丹 (D)安宮牛黃丸
- 23 風溫證，症見潮熱便秘、痰涎湧盛、喘促不寧、苔黃膩、脈右寸實大，最宜用下列何組方藥治療？
(A)生石膏、生大黃、杏仁、桔蘤皮
(B)黃連、桔蘤、枳實、半夏
(C)大黃、芒硝、甘草、山梔子、薄荷、黃芩、連翹、淡竹葉
(D)玄參、麥冬、生地、大黃、芒硝
- 24 治風溫的方劑，下列何者解表散邪之力最強？
(A)桑菊飲 (B)銀翹散 (C)梔子豉湯 (D)白虎湯
- 25 有關春溫後期，邪熱極易深入下焦，劫燄肝腎之陰，其證候、治則與處方，下列敘述何者錯誤？
(A)證屬熱灼真陰者，若真陰虧損，治宜滋補肝腎，潤養陰液，予加減復脈湯
(B)證屬陰虛動風，治宜滋陰養血，潛陽熄風，予三甲復脈湯或大定風珠
(C)證屬熱與血結，治宜滋陰泄熱，涼血通絡，予鱉甲煎丸
(D)證屬邪留陰分，治宜滋陰清熱，搜邪透絡，予青蒿鱉甲湯
- 26 60 歲男性，於 1 月 10 日就診，主述咽喉腫痛已兩日，伴隨惡寒發燒，左耳前後腫起一日，頰腫，局部發紅疼痛，現覺身熱煩躁，口渴引飲。下列敘述何者錯誤？
(A)可診斷為大頭瘟 (B)可用透表清熱，解毒消腫的方法治療
(C)可使用普濟消毒飲為主要治療方劑 (D)配合清熱解毒、行瘀止痛之方外敷的效果不佳
- 27 下列何者提出「生脈散是傷暑之後，存津液之方也，用此方者，須詳審其邪之有無，不可循俗而謂治暑之劑也」之說？
(A)王孟英 (B)張鳳達 (C)吳鞠通 (D)徐靈胎
- 28 濕溫患者，症見熱蒸頭脹、小便不通、渴不多飲、苔白膩，依《溫病條辨》以下列何方治療最適宜？
(A)三仁湯 (B)黃芩滑石湯 (C)茯苓皮湯 (D)宣清導濁湯
- 29 下列敘述何者最符合濕熱中阻的證候表現？
(A)寒熱起伏、胸悶、脘痞、腹脹、溲短、苔膩
(B)發熱汗出不解、口渴不欲多飲、脘痞嘔惡、心中煩悶、便溏色黃、小便短赤、苔黃膩、脈濡數
(C)身熱不退、胸脘痞悶、腹微痛、大便溏而不爽、舌苔黃濁
(D)身熱面赤、口渴咽乾、渴欲飲水、脘痞便秘、苔黃燥、脈沉實
- 30 28 歲呂男，症見身熱不退，朝輕暮重，神識昏蒙，似清似昧，或時清時昧，時或譫語，舌苔黃膩，脈濡滑而數，最宜用下列何方治療？
(A)白虎湯 (B)大承氣湯 (C)溫膽湯 (D)菖蒲鬱金湯

- 31 陳先生，患秋燥，初起喉癢乾咳，繼則因咳甚而痰黏帶血，胸脅作痛，腹部觸之灼熱甚，大便溏泄而臭，舌紅，苔薄黃而乾，脈數。病機為下列何者最適宜？
(A)燥熱化火，損傷肺絡；肺中燥熱下移大腸 (B)燥熱化火，肺絡受傷；腸中濕熱阻滯
(C)肺燥化熱，氣陰兩傷；肺中燥熱下移大腸 (D)肺燥化熱，氣陰兩傷；腸中濕熱阻滯
- 32 承上題，最適宜的處方為：
(A)阿膠黃芩湯 (B)黃連阿膠湯 (C)枳實導滯湯 (D)黃芩湯
- 33 依《金匱要略》所述：「病腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故」，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝湯 (B)厚朴七物湯 (C)芍藥甘草湯 (D)大黃附子湯
- 34 依《金匱要略》有關五臟死臟的敘述，下列何者正確？
(A)肝死臟，浮之實如丸豆，按之益躁急者，死
(B)心死臟，浮之大堅，按之如覆杯，漚漚狀如搖者，死
(C)脾死臟，浮之弱，按之如索不來，或曲如蛇行者，死
(D)肺死臟，浮之虛，按之弱如蔥葉，下無根者，死
- 35 依《金匱要略》有關太陽中暈的敘述，下列何者正確？
(A)太陽中濕者，暈是也 (B)若數下之，則惡寒甚
(C)若加溫針，則淋甚 (D)汗出惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主之
- 36 依《金匱要略》所述：「病歷節，不可屈伸，疼痛」，以下列何方主之？
(A)桂枝芍藥知母湯 (B)烏頭湯 (C)附子湯 (D)防己黃耆湯
- 37 依《金匱要略》所述：「病溢飲者，當發其汗」，治以下列何方最適宜？①十棗湯 ②小青龍湯
③大青龍湯 ④五苓散
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③
- 38 依《金匱要略》所述：「婦人有漏下者，有半產後因續下血都不絕者，妊娠下血者」，下列敘述何者正確？
(A)為胞阻，膠艾湯主之 (B)為胞阻，當歸芍藥散主之
(C)為半產，膠艾湯主之 (D)為半產，當歸芍藥散主之
- 39 依《金匱要略》有關胸痹之證治，下列敘述何者錯誤？
(A)胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，枳實薤白桂枝湯主之，人參湯亦主之
(B)胸痹不得臥，心痛徹背者，栝蒌薤白白酒湯主之
(C)胸痹，胸中氣塞，短氣，茯苓杏仁甘草湯主之，橘枳薑湯亦主之
(D)胸痹緩急者，薏苡附子散主之
- 40 依《金匱要略》有關五苓散及豬苓湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)脈浮發熱，渴欲飲水，水熱互結，鬱熱傷陰者，可用五苓散
(B)五苓散以化氣利水為主
(C)豬苓湯以滋陰利水為主
(D)熱傷陰分的淋病小便不利，可用豬苓湯

- 41 依《金匱要略》有關嘔吐的敘述，下列何者錯誤？
(A)夫嘔家有癰膿，不可治嘔，膿盡自愈
(B)嘔家本渴，今反不渴者，以心下有支飲故也，此屬支飲
(C)先渴卻嘔，此為欲解；先嘔卻渴者，為水停心下，此屬飲家
(D)病人欲吐者，不可下之
- 42 依《金匱要略》有關水飲在五臟，其中水在心的敘述，下列何者正確？
(A)心下堅築，短氣，惡水不欲飲
(B)吐涎沫，欲飲水
(C)少氣，身重
(D)脅下支滿，噦而痛
- 43 依《金匱要略·黃疸病脈證》所述：「穀疸之為病」，下列何者錯誤？
(A)寒熱不食
(B)食即頭眩
(C)心胸不安
(D)小便通利
- 44 依《金匱要略·嘔吐噦下痢病脈證治》所述：「乾嘔，吐涎沫，頭痛者」，治以下列何方最適宜？
(A)茱萸湯
(B)半夏瀉心湯
(C)小柴胡湯
(D)四逆湯
- 45 脅痛的相關敘述，下列何者錯誤？
(A)脅痛的病證有虛有實，實證以濕熱為主，虛證以血虛為多見
(B)實證脅痛以濕熱、血瘀、氣滯為主，三者又以濕熱為先
(C)凡以一側或兩側脅肋疼痛為主要臨床表現者，皆可診斷為脅痛
(D)由於病因病機的不同，有脹痛、刺痛及隱痛的不同
- 46 病患楊小姐身目俱黃，黃色鮮明，發熱口渴，小便短少黃赤，腹脹便秘，舌苔黃膩，下列治法何者最適宜？
(A)清熱解毒，涼血開竅
(B)利濕化濁，佐以清熱
(C)清熱利濕，佐以瀉下
(D)健脾和胃，溫化寒濕
- 47 有關「臌脹」證治的敘述，下列何者錯誤？
(A)若證屬寒濕困脾而見痰濕蒙閉心包時，可先用蘇合香丸芳香開竅後再依法調治
(B)如水脹滿太甚，脈弦數有力，可任攻逐者，可暫用舟車丸攻逐水氣，水氣退後再依法調治
(C)《沈氏尊生書》以「先令卻鹽味，厚衣衾，斷妄想，禁忿怒」說明本病須注意精神及生活之調攝
(D)服舟車丸常有不同程度的泛噁、嘔吐、腹痛、頭暈等反應，且水瀉後常覺異常疲乏
- 48 一患者不寐，自覺胸悶心煩，偶而會泛噁、噯氣，也會頭重目眩，診其脈滑數，苔黃膩，宜選用下列何方治療？
(A)溫膽湯
(B)半夏秫米湯
(C)黃連阿膠湯
(D)硃砂安神丸
- 49 有關癲狂的病因，下列何者錯誤？
(A)氣血凝滯，腦氣與臟腑之氣不相連接
(B)肺經素有鬱熱，隨經隧上移於腦
(C)痰氣上擾，以致神志逆亂，狂躁不寧
(D)陰陽失調，以致陰虛於下，陽亢於上，心神逆亂而發狂
- 50 患者出現精神抑鬱，表情淡漠，寡言呆滯，苔膩，脈弦滑。依其病情，則下列敘述何者正確？
(A)屬癲證，心脾兩虛
(B)屬癲證，痰氣鬱結
(C)屬癲證，肝鬱氣滯
(D)屬癲證，痰火上擾

- 51 46 歲王董平素應酬多，盛夏時節因誤食不潔之物，出現腹痛，裏急後重，下痢赤多白少，肛門灼熱，小便短赤，苔膩微黃，脈滑數，宜用下列何種方劑治療？
(A)白頭翁湯 (B)駐車丸 (C)連理湯 (D)桃花湯
- 52 有關便血的鑑別，下列何者錯誤？
(A)先便後血，此遠血；先血後便，此近血 (B)血少者為近血；血多者為遠血
(C)色鮮紅者為近血；色紫黯者為遠血 (D)肛門直腸出血為近血；胃與小腸出血為遠血
- 53 凡是語聲嘶嘎，甚者不能發聲者，統謂之失音。古代將失音稱為瘖或喑。下列何本典籍說明了五臟皆可以為瘖，而以心、肺、腎三臟為主，失音的辨證要分虛實，實邪易治，虛邪難為？
(A)《醫學綱目》 (B)《醫學入門·卷四·癆瘵》
(C)《景岳全書·聲瘖》 (D)《重樓玉鑰》
- 54 有關肺癰症狀的敘述，下列何者錯誤？
(A)咳吐腥臭濁痰，甚則膿血痰 (B)發病急，常突然出現惡寒或寒戰，咳嗽胸痛
(C)若有膿血大量排出，則預後不佳 (D)若久病不癒，則易發低燒，出汗，形體消瘦
- 55 68 歲石先生，活動易喘促已有 20 年，氣不接續，呼多吸少，身體消瘦足腫，四肢冰冷唇紫暗，咳痰無力，痰色白稀薄，臨床診斷為喘證，下列證型與治療方劑的敘述，何者正確？
(A)肺氣虛，生脈散 (B)腎氣虛，金匱腎氣丸
(C)肺氣鬱閉，三子養親湯 (D)表寒裏熱，麻杏甘石湯
- 56 23 歲施先生，今日突發喘促，呼吸急促，喉中哮鳴有聲，胸膈滿悶，惡寒無汗出，咳痰色白稀薄有泡沫，苔白滑，脈弦緊，經診斷為哮證，下列證型與治療方劑的敘述，何者正確？
(A)寒飲伏肺肺失宣暢，小青龍湯 (B)痰熱壅肺肺失清肅，定喘湯
(C)痰氣壅肺肺失肅降，三子養親湯 (D)陰虛痰熱，麥門冬湯
- 57 有關淋證的敘述，下列何者正確？
(A)氣淋：尿血而痛
(B)石淋：小便澀痛尿，如脂膏或米泔水
(C)熱淋：起病多急，或伴發熱，小便赤熱，尿時灼痛
(D)膏淋：小便窘急不能卒出，尿道刺痛，痛引少腹，尿出砂石而痛止
- 58 關格病入血分者，下列敘述何者正確？
(A)屬早期階段 (B)有牙宣、鼻衄以及肌衄等現象
(C)口渴與否即可區分病入氣分或血分 (D)未見出血症狀但氣血虛損明顯者表示病已入血分
- 59 有關「消渴」的論述，下列何者錯誤？
(A)本證近似於「糖尿病」 (B)可因情志失調及飲食不節引發
(C)主要的基本病機為氣分實熱 (D)常見多尿、多飲食、乏力消瘦等症狀
- 60 李姓病患，因泌尿道感染併發敗血症，目前血壓不穩定、嗜睡偶神昏，清醒時煩躁頭痛、腹脹不欲飲食、大便色偏黯、小便色較深、舌質絳紅有瘀、脈弦滑細數。會診中醫後，依辨證病患適合以下列何類型方藥論治？
(A)養血活血，聖愈湯，當歸、阿膠、雞血藤等
(B)攻下逐瘀，桃核承氣湯，大黃、芒硝、柴胡等
(C)涼血化瘀，犀地清絡飲（牛角代替犀角），生地、丹皮、玄參等
(D)解毒活血，解毒活血湯，銀花、黃連、蒲公英等

- 61 51 歲女性病患，自訴常覺得肌肉及皮膚麻木，肢體關節重著，苔白膩，脈濡緩，治以下列何方最宜？
(A)烏頭湯 (B)薏苡仁湯 (C)宣痹湯 (D)身痛逐瘀湯
- 62 有關痿證的主要病機，下列何者最少見？
(A)肝腎虧損 (B)脾胃虧虛 (C)肺熱津傷 (D)心腎不交
- 63 有關頭痛的敘述，下列何者正確？①「腦為髓之海」，故內傷頭痛主與心、肝、腎三臟有關 ②陽明頭痛，多在前額及眉稜處，連於目系 ③氣血俱虛頭痛，可用調中益氣湯加川芎、蔓荊子、細辛 ④朱丹溪認為頭痛多主於痰
(A)①② (B)①③ (C)③④ (D)②④
- 64 某女性患者每於午後覺疲倦時，先覺頭暈，隨後頭顱側隱隱作痛，吹冷氣或冷風更甚，休息後頭痛緩解，病程已多年，則下列診斷何者最適宜？
(A)頭痛每於午後發生，故可診為陰虛頭痛 (B)屬少陽經外感風寒頭痛
(C)屬寒實頭痛 (D)屬虛性頭痛
- 65 75 歲劉太太，來診時主訴高血壓多年，持續靠西藥控制，最近一年來感覺特別疲倦與頻尿，望之身材中等，面色黃白少華，自訴喝一點水就頻有尿意，尿量少，尿色清澈，遇冷症劇，疲倦時血壓容易偏高，來診血壓 BP:156/104 mmHg，近十年來易下肢冰冷，脈沉而無力，舌苔薄白潤，舌質淡紅，下列何者是本病的最佳診斷？
(A)脾肺氣虛 (B)心腎兩虛 (C)陰虛陽亢 (D)腎陽虛
- 66 有關五色主病中，黃色病證的敘述，下列何者正確？
(A)面色淡黃，枯槁無光，稱「萎黃」；常見於心肺氣虛，氣血不足者
(B)面色虛浮，稱「黃胖」；多是脾氣虛衰，濕邪內阻所致
(C)一身黃而鮮明如橘子色者，屬「陽黃」，為寒濕鬱阻之故
(D)黃而枯瘦者，胃病虛寒
- 67 耳部望診，主要是觀察耳殼色澤、形態以及分泌物的變化，下列敘述何者錯誤？
(A)耳厚而大是形盛，屬腎氣足；耳薄而小是形虧，屬腎氣虧
(B)耳腫起者是邪氣實，多屬少陽相火上攻
(C)耳瘦削者是肺虛，多屬心肺氣虛或肺陰虛
(D)耳輪萎縮，是腎氣竭絕，多屬死證；耳輪甲錯，是久病血瘀，或有腸癰
- 68 形成有根舌苔變化的乳頭是下列何者？
(A)蕈狀乳頭 (B)葉狀乳頭 (C)絲狀乳頭 (D)輪廓乳頭
- 69 病人高熱後，津液傷，其舌象最可能出現下列何者變化？
(A)青紫苔膩 (B)青紫濕潤 (C)淡白乾枯 (D)絳紫乾枯
- 70 某患者若有口乾但不多飲的症狀，則下列何者最不可能出現？
(A)五心煩熱 (B)自汗出喜吹風 (C)身熱不揚 (D)食少便溏

- 71 有關「飲食」在辨證上的敘述，下列何者錯誤？
(A)渴喜熱飲，飲量不多，或水入即吐，屬痰飲內停
(B)口乾，但欲漱水而不欲咽，兼見舌質隱青，屬內有瘀血
(C)知飢但不欲食，胃中嘈雜，屬胃強脾弱
(D)大渴引飲，小便量多，兼見能食消瘦者，屬腎陰虧虛
- 72 某患者因頭痛就診，發作時前額疼痛感牽連腦部與牙齒，則下列診斷何者最不適宜？
(A)此患者可能為三叉神經痛 (B)屬少陰頭痛
(C)屬陽明頭痛 (D)屬太陰頭痛
- 73 有關小兒脈診的敘述，下列何者錯誤？
(A)5、6 歲小兒，以一息五至為平脈，六至及六至以上為數脈
(B)小兒脈診主病，只診浮沉、遲數、強弱、緩急，以別陰陽寒熱，邪正盛衰，不詳二十八脈
(C)小兒腎氣未充，脈氣止於中候，不論脈體素浮素沉，重按多不見
(D)小兒脈診常用一指三部診法
- 74 有關「動脈」的敘述，下列何者正確？
(A)痛症、驚恐易出現動脈 (B)出現動脈的病因，主要因濕與熱所致
(C)浮大無根，應指散漫為動脈的特徵 (D)動脈為脈來有如牽繩轉索，形繃急
- 75 有關「脾虛夾食」兼症的敘述，若見不思飲食、納穀不香，下列何者正確？
(A)偏於胃虛 (B)偏於脾虛 (C)胃強脾弱 (D)肝胃不和
- 76 《內經》指出，內傷病邪以七情為主要致病因子，若受驚嚇，常易使氣出現下列何種現象？
(A)消索 (B)混亂 (C)結聚 (D)下沉
- 77 下列各種體內有熱的臨床表現與病徵對應，何者正確？
(A)日晡潮熱，是陽明經證的病徵
(B)身熱不揚，是血瘀潮熱的病徵
(C)上熱下寒，是太陰病的病徵
(D)心煩不得臥，口燥咽乾，是少陰熱化證的病徵
- 78 44 歲男性患者，主訴小便澀痛不順暢，口燥咽喉甚乾，心情煩躁，不太好睡，舌尖紅赤，脈細數，其證型以下列何者最適宜？
(A)少陽病證 (B)陽明病經證 (C)厥陰病證 (D)少陰病熱化證
- 79 28 歲產婦於坐月子期間內出現手指關節拘急不利，四肢麻木感，下肢容易抽筋，頭暈耳鳴，爪甲不榮等症狀，下列診斷何者最適宜？
(A)腎精不足 (B)腎陰虛 (C)肝血虛 (D)寒滯肝脈
- 80 「病有內同外異，亦有內異而外同」，醫師診病要不受外部現象迷惑，必須診候以審之，為下列何醫家的主張？
(A)華佗 (B)朱丹溪 (C)李時珍 (D)孫思邈