

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。


- 1 有關瘡瘍順證和逆證之敘述，下列何者正確？
(A)逆證：瘡起腫處頂高根束，色赤發熱，焮腫疼痛
(B)順證：瘡先高腫而後漫腫，腫堅色紫，無膿不潰
(C)順證：膿成腫勢焮起，皮薄光亮，易腫易腐，飲食知味
(D)順證：瘡頂平根散，色暗微腫，不熱不痛，身體倦怠
- 2 證見腫堅硬如石，或邊緣起稜角，形如岩突，或現青筋，不紅不熱，最可能的診斷為何？
(A)瘀血作腫 (B)痰腫 (C)鬱腫 (D)氣腫
- 3 下列有關中醫外科開刀法的敘述，何者錯誤？
(A)藥線使用以淺部膿瘍傷口為主
(B)一般瘡瘍，宜循絡直開，刀頭向上，免傷血絡
(C)膿腫範圍大，肌肉豐富而膿腔深，切口宜大
(D)切口位置應選擇在膿腫稍低的部位，切開後引流通暢
- 4 生於唇稜偏裏，由脾胃積熱上升結聚而生，重則引起腐爛，應按疔瘡治之，最可能為下列何者？
(A)反唇疔 (B)龍泉疔 (C)虎鬚疔 (D)鎖口疔
- 5 下列何者為乳癰最常見之病因？
(A)榮衛不調，感受風邪 (B)肝氣鬱結，胃熱壅滯
(C)脾失健運，濕熱下注 (D)心經火毒
- 6 36 歲女性，數日前左食指受傷，昨日在左前臂發現皮膚上有紅絲一條出現，且有迅速向軀幹方向走竄的趨勢。根據其病情，則下列敘述何者錯誤？
(A)最可能的診斷為紅絲疔 (B)內治法主要以大劑清熱解毒藥為主
(C)飲食方面宜多食油炸燒烤之品 (D)此病人如伴有噁心嘔吐，屬毒盛，勢將走黃
- 7 關於敦疽之敘述，下列何者錯誤？
(A)多生於足趾，而手指亦間有生 (B)由脾腎損傷，更兼濕熱壅盛而成
(C)此證既無敗色，故潰後不須調理 (D)潰腐之後，可換搽生肌玉紅膏，生肌斂口
- 8 下列何者不是發生在胸部？
(A)甘疽 (B)脾發疽 (C)衝疽 (D)井疽
- 9 氣血為毒邪所阻滯不行，潰後如蜂巢狀的化膿性疾病，稱為：
(A)癰 (B)疽 (C)疔 (D)癤
- 10 治療油風以下列何項最適宜？
(A)內服「防風通聖散」 (B)外擦「黃連膏」
(C)外擦「諸瘡一掃光」 (D)內服「神應養真丹」

- 11 一名嬰兒，自出生後一個月時，頸面部癢起白屑，形如癬疥，反覆發生，家族中，母親有過敏性鼻炎，哥哥有氣喘病史，則此病患最可能的診斷為下列何者？
(A)奶癬 (B)白屑風 (C)葡萄疫 (D)風疹
- 12 承上題，下列處方何者最適宜？
(A)導赤湯 (B)消風導赤湯 (C)化斑湯 (D)藿香正氣散
- 13 某男性患者某天晚上交際應酬，喝了許多烈酒，回家後發覺身上起了許多成片狀的紅疹，而且越抓越癢越腫（如圖所示）。則此病的臨床診斷，以下列何者最恰當？



- (A)火赤瘡 (B)風疹 (C)面遊風 (D)纏腰火丹
- 14 有關黃水瘡的敘述，下列何者正確？
(A)只發於腰胯皮膚皺摺處 (B)因風邪客於皮膚，血燥不能榮養所致
(C)因日曬風吹，暴感濕熱而生 (D)只生於手臂項胸等處
- 15 筋瘤條狀型，病人自覺下肢沉重作痕，以通經活血為治則，氣虛者最宜下列何方？
(A)通經活血丸 (B)桃紅四物湯 (C)補中益氣湯 (D)散腫潰堅湯
- 16 關於便毒，下列何者錯誤？
(A)又名血痔 (B)又名便癰 (C)俗名橫痃 (D)俗稱魚口
- 17 內痔如因飽食久坐而成者，宜下列何方？
(A)香砂六君子湯 (B)補中益氣湯 (C)二神散 (D)三神丸
- 18 下列何者病症的成因與其他病症明顯不同？
(A)附骨疽 (B)咬骨疽 (C)股陽疽 (D)附陰疽
- 19 下列有關「骨癆」的證治何者錯誤？
(A)初期宜補益肝腎，溫通經絡，散寒化痰。如內服陽和湯加減
(B)未成膿時，可以「回陽玉龍膏」或「陽和解凝膏」外敷
(C)陰虛火旺者，宜養陰除蒸，以「大補陰丸」合「清骨散」加減
(D)膿熟者，忌切開引流
- 20 下列何種疾病不會造成傳染？
(A)大頭瘟 (B)蛤蟆瘟 (C)白駁風 (D)禿瘡
- 21 關於神經損傷與特殊手指變形之敘述，下列何者錯誤？
(A)猿手指畸形：正中神經麻痺 (B)爪型手指：尺神經
(C)天鵝頸變形：尺神經 (D)垂腕畸形：橈神經
- 22 關於肩關節周圍炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)可因創傷、勞損及外感風寒濕邪所誘發 (B)症狀初起以活動受限為主，後期以疼痛為主
(C)發病年齡層，以中老年人為常見 (D)壓痛點廣泛，肩周均可有壓痛

- 23 有關僵直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis）之敘述，下列何者正確？①好發於 40 歲以下男性 ②血中 HLA-B21 陽性 ③早期 X 光檢查，可見椎體輪廓模糊呈竹節狀改變 ④X 光檢查，小關節骨質增生清晰 ⑤前縱韌帶多鈣化 ⑥急性期 ESR（Erythrocyte sedimentation rate）、ASLO（Anti-streptolysin O）增高
- (A)①③⑤⑥ (B)②③④⑥ (C)①③④⑤ (D)僅①⑤⑥
- 24 下列何種損傷較易伴隨腋神經傷害？
- (A)肱骨頸骨折 (B)鎖骨骨折 (C)五十肩 (D)網球肘
- 25 關於股骨大轉子滑囊炎之敘述，下列何者錯誤？
- (A)是因為臀大肌與股骨大轉子長期持續摩擦引起
(B)發病一般無明顯外傷史
(C)患者為減輕痛苦，常將患肢放在內收內旋位以減輕痛苦
(D)患肢做被動內旋時大轉子部疼痛增加
- 26 40 歲男性工人，腰部疼痛 2 年，症狀時輕時重，半個月前腰痛加重，並出現左下肢放射性疼痛，大使用力時疼痛不已，最可能的診斷是：
- (A)馬尾腫瘤 (B)腰部勞損 (C)隱性骰裂 (D)腰椎間盤突出症
- 27 關於膝關節的側副韌帶的敘述，下列何者正確？①內側副韌帶起於股骨內髁結節，與內側半月板相連，下止於脛骨內髁的側面 ②外側副韌帶起於股骨外髁結節，可防止膝內翻 ③屈膝時側副韌帶較緊張 ④伸膝時側副韌帶較鬆弛 ⑤內側副韌帶損傷時，壓痛點位在股骨內上髁 ⑥外側副韌帶損傷時，壓痛點位在腓骨小頭或股骨外上髁
- (A)②③④⑤ (B)①②⑤⑥ (C)①③④⑤ (D)②③④⑥
- 28 某甲 2 年前在高速公路駕一部有安全帶但無頭靠枕的老車發生連環車禍，他遭後車追撞，再撞前車，狀況如圖所示，當時 X 光檢查正常，僅短暫出現吞嚥困難歷數小時，但後來持續出現頸部疼痛痠麻傳至手臂現象，反覆發作迄今。依此病情判斷，造成目前症狀的損傷主因應是何者？①鞭繩傷害（Whiplash Injury） ②頸椎伸展-屈曲合併傷害 ③食道傷害 ④縱隔傷害



- (A)僅① (B)僅①② (C)僅②③ (D)①②③④
- 29 有關單發性肋骨骨折，下列所述何者正確？①單發性肋骨骨折通常可當作嚴重瘀血來治療 ②可發生在直接撞擊之後 ③發生骨折時，病人感到胸部一陣突發性疼痛，而後在深呼吸時會有疼痛感 ④醫者彈壓肋骨時會使病人感到疼痛 ⑤老年人劇咳後也易發生
- (A)僅②③⑤ (B)僅①②④ (C)僅①③④⑤ (D)①②③④⑤
- 30 15 歲學生經常以雙手托住下巴上課，某日發現右肘尖部腫脹疼痛來院醫治，檢查發現「右肘尖局部囊狀紅腫疼痛，按壓疼痛厲害，關節輕度活動受限」，由以上症狀，其較可能的診斷為何？
- (A)橈骨莖突韌鞘炎 (B)鷹嘴滑囊炎 (C)肱骨外上髁炎 (D)肘關節創傷性關節炎

- 31 關於半月板的敘述，下列何者正確？
(A)內側較小，好似新月形，後半部與內側副韌帶相連
(B)外側稍大，似“O”形，不與外側副韌帶相連
(C)當膝關節完全伸直時，內外側副韌帶緊張，半月板損傷的機會少
(D)研磨性外力多發生在內側半月板
- 32 下列何者不是參與髖關節內收運動的主要肌肉？
(A)股方肌 (B)股薄肌 (C)恥骨肌 (D)臀小肌
- 33 如圖所示，54 歲女性常感腰酸背痛，自訴無外傷史，不能久站，最適當的診斷為何？



- (A)椎間盤突出症 (HIVD) (B)脊椎解離 (Spondylolysis)
(C)腰椎椎管狹窄症 (Lumbar spinal stenosis) (D)脊椎滑脫 (Spondylolisthesis)
- 34 如 X 光片標示所示，下列敘述何者錯誤？




- (A)多因足踝內翻造成 (B)常因外踝瘀腫而延遲診斷
(C)常因長途跋涉造成 (D)X 光應拍攝足部正面及斜位照以確診
- 35 承上題，常因下列何者拉扯造成？
(A)蹠肌 (Plantaris) 肌腱 (B)腓骨短肌 (Perones Brevis) 肌腱
(C)前距腓韌帶 (Anterior Talofibular lig.) (D)後距腓韌帶 (Posterior Talofibular lig.)
- 36 承上題，本病又名為下列何者？
(A)Sever 氏骨骺炎 (B)Osgood-Schlatter 氏骨骺炎
(C)Potts 氏骨折 (D)Jones 氏骨折

- 37 下列何者與僵直性脊椎炎的診斷無關？
(A)腰椎運動範圍受限 (B)擴胸範圍受限
(C)血清 HLA-B21 陽性反應 (D)X 光呈現腸薦關節炎
- 38 有關膝十字韌帶損傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)前十字韌帶斷裂常伴隨脛骨髁間棘骨折
(B)外展力致內側副韌帶斷裂常合併前十字韌帶斷裂
(C)後抽屜試驗可測試前十字韌帶損傷
(D)X 光檢查，屈膝 90°，手法推拉下拍攝，並與健側對照
- 39 「大七厘散」何時忌服？
(A)子時 (B)卯時 (C)午時 (D)酉時
- 40 患者因少腹損傷並且牽引陰莖作痛，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》此乃瘀血不行，兼肝經鬱火所致，治以下列何者最適當？
(A)地龍散 (B)血府逐瘀湯
(C)加味逍遙散 (D)小柴胡湯加大黃、黃連、山梔
- 41 28 歲男性不慎跌倒受傷，損傷後大便秘結，裏實氣壯，腹痛堅硬，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，宜治以下列何方？
(A)四物湯送潤腸丸 (B)復元活血湯 (C)玉燭散 (D)大承氣湯
- 42 傷後引起的神志躁動不安、夜臥不寧，多見於頭部內傷等患者。下列的症狀、治法與方劑配合，何者正確？
(A)若見頭暈目眩，面色無華，倦怠無力，舌質淡紅，脈細弱，治宜補血養心，益氣安神，用知柏八味丸
(B)若心悸不寧，心煩不寐，頭暈目眩，手足心熱，舌紅脈細數，宜滋陰清火，養心安神，用生脈散
(C)若脈結代，氣虛血少者，宜補心養陰，用歸脾湯
(D)若心煩不安，患處疼痛、腫脹，有瘀斑，指甲青紫，治宜活血祛瘀，用血府逐瘀湯加減
- 43 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損作渴，若煩熱作渴，小便淋瀝者，乃腎經虛熱，非用下列何方不能救？
(A)地黃丸 (B)生脈散 (C)地黃飲子 (D)犀角地黃湯
- 44 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損之證，大便秘結，若因大腸血虛火熾者，宜用四物湯送服下列何方？
(A)麻子仁丸 (B)玉燭散 (C)潤腸丸 (D)地黃丸
- 45 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，損傷之證，或患處或諸竅出血者，此肝火熾盛，血熱錯經而妄行也，治以下列何者最適當？
(A)柴胡疏肝湯 (B)黃連上清丸 (C)加味逍遙散 (D)龍膽瀉肝湯
- 46 內傷後期治法以「補法」為主，《正體類要》中提到可治損傷中後期氣血俱虛，創面膿汁清稀，久不收斂者，宜下列何種臨床常用方劑？
(A)八珍湯 (B)六味地黃丸 (C)正骨紫金丹 (D)右歸丸
- 47 「少林武功銅人簿」的傷科流派在臺灣係起源於何地？
(A)關西 (B)竹塘 (C)大甲 (D)西螺

- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》傷損之證，胸腹痛悶者，下列何者正確？①痰氣不利，脾肺氣滯，用二陳湯加白朮、芎、歸、山梔、天麻、鉤藤鉤 ②胸腹不利，食少無寐，脾氣鬱結，加味歸脾湯 ③胸脅悶痛，飲食少思，肝脾氣滯，用四物湯加芎、歸、柴、梔、丹皮 ④胸腹脹滿，飲食少思，肝脾氣滯，六君子湯加柴胡、芎、歸 ⑤胸腹悶痛喜手摸，肝脾氣傷，加味逍遙散 ⑥胸腹悶痛畏手摸，肝經血滯，四君子湯加柴胡、山梔、桃仁、紅花
(A)①②⑤ (B)①②④ (C)①④⑥ (D)②③⑤
- 49 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，王先生運動受傷，傷及右脅肋疼痛，如大便通利，喘咳吐痰者，下列病機何者最可能？
(A)瘀血停滯 (B)肝火傷脾 (C)肝火侮肺 (D)脾肺氣滯
- 50 跌倒時，腕關節背伸，手掌撐地，結果手第 1、2、3 指麻麻的，其原因是下列那一塊骨頭脫位，壓迫正中神經？
(A)舟狀骨 (B)月狀骨 (C)三角骨 (D)頭狀骨
- 51 治療肘關節脫位，解除固定後，開始自動肘關節屈伸活動，禁止粗暴的被動活動，其目的是防止下列何種後遺症？
(A)併發骨折 (B)陳舊性脫位 (C)習慣性脫位 (D)骨化性肌炎
- 52 有關肩胛骨骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)肩胛盂骨折，多發生於跌倒時，或肩關節前脫位時，肱骨頭撞擊肩胛盂前緣而發生骨折
(B)喙突骨折在臨床上較罕見，多併發於肩關節脫位或肩鎖關節脫位
(C)肩胛頸骨折的肩關節活動較肩關節脫位為差，且搭肩試驗（Dugas 徵）陽性
(D)當骨折發生於肩峰基底部時，其遠端骨折塊向下方移位
- 53 「拳擊骨折」（Boxer's Fracture）是指何部位骨折？
(A)第一掌骨基底部骨折脫位 (B)第五掌骨頸骨折
(C)第一掌骨基底部骨折 (D)第二、三掌骨幹骨折
- 54 關於橈、尺骨幹雙骨折之敘述，下列何者正確？
(A)若橈、尺骨折相互靠攏者，可採用抱骨墊放置在兩骨之間
(B)8 歲以下的兒童，20°以內的畸形一般可通過再塑形獲得糾正
(C)固定後，前臂原則上放置中立位，上 1/3 骨折前臂可放置稍旋前位
(D)成人橈尺骨幹雙骨折，因為功能代償良好，所以復位要求較低，不要求解剖對位，也不需要接近解剖對位
- 55 全身各大關節脫位，最常見為下列何者？
(A)肩關節 (B)肘關節 (C)膝關節 (D)踝關節
- 56 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中「正骨紫金丹」屬於下列何種傷科內治法之常用方劑？
(A)溫經通絡法 (B)補氣養血法 (C)清熱涼血法 (D)和營止痛法
- 57 「蘑菇頭樣大頭墊夾板」用於固定下列何種骨折？
(A)肱骨髁上骨折 (B)肱骨外科頸骨折 (C)股骨髁上骨折 (D)股骨頸骨折

58 如附圖所示，X 光診斷下列何者正確？



- (A)右肩關節脫位 (B)左肩關節脫位 (C)右肩鎖關節脫位 (D)左肩鎖關節脫位
- 59 下列何者不是關節脫位的特有體徵？
(A)關節畸形 (B)關節孟空虛 (C)異常活動 (D)彈性固定
- 60 有關腕關節前上脫位手法整復過程之敘述，下列何者正確？
(A)患者仰臥，一助手以兩手按壓腸骨後上棘處 (B)一助手持膝部，順勢牽引患肢至外展 30°左右
(C)術者站於患側，用兩手推股骨頭向外 (D)術者在保持牽引力的情況下將患肢前屈外旋
- 61 依據八廓學說，下列何者錯誤？
(A)抱陽廓即火廓，火廓屬心，依附於陽，位在內眦，屬離火
(B)清淨廓即澤廓，三焦者，為外眦，小眦，屬艮山
(C)會陰廓，三焦者，陽相火也，位於二胞屬坤
(D)水穀廓，地廓屬脾，與胃相表裏
- 62 下列何書為現存醫書中，最早記載五輪內容？
(A)《黃帝內經》 (B)《神農本草經》 (C)《太平聖惠方》 (D)《銀海指南》
- 63 下列何者為我國最早的五官科醫生？
(A)淳于意 (B)岐伯 (C)扁鵲 (D)華佗
- 64 關於胞輪振跳的敘述，下列何者錯誤？
(A)時疏時頻，胞瞼振跳 (B)可以當歸活血飲加減，養血熄風
(C)常因外感風邪而起，屬外風 (D)可以歸脾湯加減補養心脾
- 65 患者大眦紅腫高起，堅硬痛甚，拒按，紅腫或蔓延至面頰及胞瞼，伴有身熱口渴，大便燥結，舌質紅，苔黃燥，脈洪數，其最可能的診斷為何？
(A)針眼 (B)胞腫如桃 (C)胞虛如球 (D)漏睛瘡
- 66 患者眼睛乾澀畏光，雙目頻眨，視物欠清，久視時諸症加重，檢視白睛隱隱淡紅，平日口乾少津，腰膝痠軟，頭暈耳鳴，夜寐多夢，舌紅苔薄，脈細，其最可能的診斷及治療為何？
(A)目箭，內治宜肥兒丸加減 (B)胞輪振跳，內治宜歸脾湯加減
(C)白澀症，內治宜杞菊地黃丸加減 (D)椒瘡，內治宜除風清脾飲加減
- 67 關於白睛青藍的敘述，下列何者錯誤？
(A)病久正虛邪留，宜益氣滋陰，養肝退翳，使正氣儘快恢復
(B)病初期或高潮期，外用法可參考火疳的外治法
(C)嚴重者，可導致瞳神緊小
(D)白睛青藍卻不腫痛，只覺患眼沙澀不適，視物不明，此乃因飲食不節，嗜好菸酒

- 68 金井按照眼科五輪學說歸屬，下列何者正確？
(A)肉輪 (B)氣輪 (C)風輪 (D)水輪
- 69 有關蟹睛症的敘述，下列何者錯誤？
(A)相當西醫之角膜穿孔，虹膜脫出
(B)常因凝脂翳治不及時，病變向深層發展引起
(C)因黑睛潰破，邪毒外泄，疼痛較緩解
(D)癒後角膜遺留瘢痕，致神水流行受阻，繼發高風內障
- 70 在耳鼓膜的耳鏡檢查中，下列何種情況為罹患「急性化膿性中耳炎」之症狀？
(A)多呈裂縫狀、銳角狀不規則
(B)鼓膜有邊緣性穿孔，特別是穿孔位於鼓膜鬆弛部，穿孔內有臭膿和膽脂瘤
(C)中央性大穿孔或鼓膜大部分消失，穿孔內有膿液、肉芽組織和腐爛的聽骨等
(D)鼓膜有中央性小穿孔，並有搏動現象
- 71 下列治療耳鼻咽喉口齒科常見腫瘤的中草藥，何者不屬於「瀉火解毒」類？
(A)白花舌蛇草 (B)半枝蓮 (C)山豆根 (D)石斛
- 72 下列敘述何者不為膿耳發生之好發病機？
(A)風熱外侵、腎經有熱 (B)肝膽火盛、邪熱外侵
(C)脾虛濕困、上犯耳竅 (D)腎元虧損、邪毒停聚
- 73 下列有關旋耳瘡症之敘述，何者正確？
(A)病變部位以耳道為重
(B)風熱濕邪浸漬時可用當歸飲子
(C)血虛生風化燥選用當歸、何首烏養血
(D)宜清熱利濕，疏風止癢；熱邪偏重者，可用消風散
- 74 某患者罹患耳病，兩耳蟬鳴不息，有閉塞感，聽音不清，頭昏沉重，胸悶脘滿，咳嗽痰多，二便不暢，舌紅苔黃膩，脈弦滑，宜用何方治之？
(A)清氣化痰丸 (B)逍遙散加減 (C)龍薈丸加減 (D)左慈丸
- 75 鼻病證見鼻內肌膜腫脹較甚，光滑色淡，涕白量多，下列何者辨證最適當？
(A)偏於熱者 (B)偏於燥者 (C)偏於寒者 (D)偏於濕者
- 76 脾統血，鼻為血脈多聚之處。在臨床上常有用鼻來候脾病的，倘若脾風病，鼻會顯現何種色澤？
(A)青色 (B)赤色 (C)黃色 (D)白色
- 77 咽喉是經脈循行之處，在十二經脈中，大部分經脈直接通達咽喉，下列那兩經脈是間接通於咽喉？
(A)手太陰肺經和手陽明大腸經 (B)手少陰心經和手太陽小腸經
(C)手厥陰心包經和足太陽膀胱經 (D)足少陽膽經和足厥陰肝經
- 78 下列何者為「陰虛喉癰」之主要治則？
(A)益氣開音，行氣祛痰 (B)疏風清熱，解毒消腫
(C)滋陰降火，養血潤燥 (D)疏風解表，宣肺開暗
- 79 患者因口腔內突然出現血泡於上腭，呈紫色或暗紅色，泡壁薄，容易潰破者，經診斷後應屬下列何病引起？
(A)雪口 (B)飛揚喉 (C)鵝口瘡 (D)口疳
- 80 風熱外邪侵犯而致牙痛、牙癰、口瘡、發熱惡寒，使用下列何種藥物最為恰當？
(A)黃連、梔子、丹皮、生地、紫草、淡竹葉、蓮子心
(B)澤瀉、車前子、茵陳、冬瓜仁、木通
(C)瓜蔓、貝母、竹茹、半夏、桔梗
(D)牛蒡子、菊花、桑葉、連翹、金銀花、薄荷、地丁