

110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 下列那個藥物在所屬方劑中為反佐藥？
(A)《太平惠民和劑局方》參蘇飲中的人參 (B)《醫方集解》龍膽瀉肝湯中的生地黃
(C)《丹溪心法》虎潛丸中的黃柏 (D)《丹溪心法》左金丸中的吳茱萸
- 2 關於清代程鍾齡提出之治病八法，下列敘述何者錯誤？
(A)所謂八法即：汗法、吐法、下法、利法、溫法、清法、消法、補法
(B)麻疹初起，疹點隱而不透可以汗法治療
(C)下法是通過蕩滌腸胃，瀉出腸中積滯，使宿食、冷積、瘀血、結痰、停水等從下竅而出
(D)清法治療溫病後期應避免純用苦寒直折之法治療
- 3 45歲男性患者，平素痰多。昨日受寒後今晨起出現發燒，體溫為攝氏37.8度，並伴有鼻塞聲重、咳嗽痰多、微惡寒、無汗諸症，未見煩躁及口渴，二便調，納可。兩寸浮微緊略數，舌淡紅苔薄白，下列那個湯劑處方最適宜？
(A)桂枝三錢，芍藥三錢，炙甘草兩錢，生薑三錢，大棗六枚
(B)麻黃三錢，杏仁三錢，炙甘草兩錢，桂枝三錢，白朮四錢
(C)麻黃二錢，杏仁二錢，桑白皮二錢，紫蘇子二錢，赤茯苓二錢，陳皮二錢，炙甘草一錢
(D)蘇葉二錢，半夏二錢，茯苓二錢，前胡二錢，桔梗二錢，枳殼二錢，炙甘草一錢，生薑一錢，杏仁二錢，大棗二枚
- 4 一位72歲男性，三週前因肺部感染住院治療，經兩週治療後，現已無發燒。但出現大便乾結難解，腹脹滿，口乾咽燥，舌紅苔黃，脈細數有力，下列處方何者最適宜？
(A)麻子仁五錢，白芍二錢半，枳實二錢半，大黃五錢，厚朴二錢半，杏仁二錢半
(B)生地黃五錢，生甘草二錢，人參一錢五分，生大黃三錢，芒硝一錢，玄參五錢，麥門冬五錢，當歸一錢五分，海參二條，薑汁六匙
(C)玄參一兩，麥門冬八錢，生地黃八錢，大黃三錢，芒硝一錢五分
(D)大黃三錢，芒硝三錢，枳實三錢，厚朴三錢，甘草一錢，人參二錢，當歸三錢，生薑二錢，大棗二枚，桔梗一錢
- 5 有關《景岳全書》濟川煎之功用，下列何者最適宜？
(A)清營透熱，養陰活血 (B)清心養陰，利水通淋
(C)益氣健脾，養血安胎 (D)溫腎益精，潤腸通便
- 6 38歲男性患者，咳嗽伴有胸脇痛，呼吸困難，頭痛，大便每日一解偏乾，苔滑，脈沉弦，X光檢查發現左側胸腔積水。宜治以下列何者所組成的方藥？
(A)大黃、芒硝、甘遂
(B)甘遂、大戟、芫花、紅棗
(C)大黃、芒硝、甘草
(D)黑丑、甘遂、芫花、大戟、大黃、青皮、陳皮、檳榔
- 7 關於《太平惠民和劑局方》四物湯之敘述，下列何者最適宜？
(A)加入人參、黃耆主治妊娠胎漏
(B)可治月經不調、臍腹疼痛之症
(C)加阿膠、艾葉為完整《金匱要略》芎歸膠艾湯
(D)《金匱要略》溫經湯之組成包含完整四物湯

- 8 關於《內外傷辨惑論》當歸補血湯之敘述，下列何者正確？①當歸與黃耆用量之比率為當歸5：黃耆1 ②由勞倦內傷，氣血不足，浮陽外越所致 ③證見肌熱面赤，口乾不欲飲水 ④可治產後血虛發熱頭痛 ⑤脈洪大而虛
(A)①②③ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- 9 下列各方劑之敘述，正確的有幾項？①《小兒藥證直訣》六味地黃丸主治肝腎陰虧，虛火上炎之證 ②《醫級》八仙長壽丸主治肺腎陰虛，咳嗽喘逆之證 ③《傷寒論》炙甘草湯可主治肺痿咳嗽，痰少帶血之證 ④《慎齋遺書》百合固金湯方中之沙參助二地滋陰潤肺止咳
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 10 關於《金匱要略》腎氣丸之敘述，下列何者最不適宜？
(A)桂枝、附子用量重，其意在於溫腎補火 (B)加鹿茸、五味子為《濟生》十補丸
(C)主治腎陽不足，腰痛腳軟外，尚可治痰飲 (D)若晚上頻尿者，可加五味子
- 11 《景岳全書》之方劑組成，下列何者最適宜？
(A)右歸丸：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、菟絲子、鹿角膠、龜板膠、杜仲、肉桂、附子
(B)左歸丸：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、菟絲子、鹿角膠、當歸、牛膝
(C)右歸飲：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、杜仲、炙甘草、肉桂、附子
(D)左歸飲：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、牛膝、茯苓、炙甘草
- 12 《溫病條辨》清營湯之組成中，下列那一組藥皆入心，為方中使藥？
(A)竹葉、梔子、羚羊角 (B)天麻、丹參、鉤藤
(C)犀角、連翹、黃連 (D)丹參、黃連、竹葉
- 13 下列何種情況最不宜使用解表法治療？
(A)腰以上水腫 (B)麻疹初起且有惡寒發熱
(C)頭身疼痛 (D)完穀不化
- 14 關於《傷寒論》理中丸的臨床應用時機，下列何者錯誤？
(A)主治中焦虛寒，自利，或嘔吐腹痛
(B)亦治小兒急驚，真寒假熱者
(C)飲食不節，或暴受風寒所致之吐利，亦可以本方治療
(D)亦治胸痹證，由中焦虛寒所致者
- 15 在下列那一個清熱方劑的組成藥物中沒有生地？
(A)《蘭室秘藏》當歸六黃湯 (B)《景岳全書》玉女煎
(C)《小兒藥證直訣》導赤散 (D)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯
- 16 關於肺虛久咳，病人的治療用藥選擇，下列那一組藥物最少被考慮？
(A)人參、蛤蚧 (B)阿膠、五味子 (C)赤石脂、乾薑 (D)款冬、貝母
- 17 《外臺秘要引崔氏方》黃連解毒湯主治熱毒充斥三焦之證，有關其組方加減與臨床應用原則，下列何者最不適宜？
(A)瀉火必先瀉心，故本方以黃連直解心經火毒為主藥
(B)熱毒壅盛，若上擾神明，則證見煩躁，錯語，失眠
(C)熱毒壅於肌肉，則可見癰疽、疔毒
(D)本方去黃柏、梔子，再加半夏、炙甘草、大棗、生薑，即是《傷寒論》半夏瀉心湯
- 18 63歲吳先生，多年咳嗽不癒，經西醫檢查疑似感染肺結核。經以西藥控制，症狀穩定；但患者自訴容易疲倦，體力明顯減退，肌肉消瘦，來診時面頰兩顴泛紅，食慾不振，午後身體容易發熱，夜眠盜汗，舌苔少舌質光紅，脈來細數無力。經使用《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散治療，諸證改善。下列敘述何者錯誤？
(A)本方用治風勞證
(B)本方功效為滋陰養血，清熱除蒸
(C)方中以鱉甲：滋陰潛陽，退熱除蒸；配當歸和血；知母滋陰降火；烏梅：生津清熱，斂陰止汗
(D)方中以秦艽：祛風透邪，清退虛熱；配青蒿：清熱除蒸，透邪外出；桑白皮：清肺涼血，退蒸熱；柴胡以透邪解熱

- 19 50歲丁女士，主訴兩側胸脇悶痛已二個月，望之面黃少華，體格中等，問之近半年來月經來的頻率漸漸稀少，現約三個月一行，三餐尚規則，但食慾稍減退，尤其是工作壓力大時易感頭痛，伴隨右乳房脹不舒，排便順暢日一行。睡眠偶多夢，舌苔薄白潤舌質稍紅，脈沉細，兩關帶弦，若以中醫辨證論治原則，下列處方何者最適宜？
(A)柴胡，枳實，赤芍，炙甘草
(B)炒白朮，廣陳皮，炒白芍，防風
(C)柴胡，炒白芍，當歸，炒白朮，炙甘草，薄荷，煨薑，茯苓
(D)人參，炒白朮，茯苓，炙甘草，柴胡，炒白芍
- 20 64歲女性病患，1月10日來院門診，前至合歡山賞雪，回來後覺胸悶不舒，至西醫檢查無異狀，處方以肌肉鬆弛劑及鎮痛消炎藥，效不佳，故尋求中醫治療來院求診。證見胸悶痛，嚴重時會連至背痛，苔白膩，舌淡紅，脈沉弦。下列何方劑治療最適宜？
(A)《景岳全書》柴胡疏肝散
(B)《素問病機氣宜保命集》金鈴子散
(C)《金匱要略》瓜蒌薤白白酒湯
(D)《醫學發明》天臺烏藥散
- 21 關於《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)組成含有當歸、炙甘草
(B)其病機為腎陽不足致不能納氣，氣機上逆，寒痰上泛
(C)以半夏、蘇子為主藥（君藥），降逆祛痰止咳
(D)以肉桂溫補下元
- 22 下列何者為《丹溪心法》咳血方中的組成？
(A)瓜蒌仁、訶子 (B)瓜蒌根、訶子 (C)瓜蒌仁、黃連 (D)瓜蒌根、黃連
- 23 《傷寒論》桃核承氣湯，下列敘述何者最不適宜？
(A)可治少腹急結，小便自利，脈沉實之證
(B)可治下焦蓄血，譫語煩躁
(C)方中桃仁、紅花破血祛瘀
(D)若治少腹急結，至夜發熱，小便自利，脈沉澀，乃因血行不暢、瘀熱互結
- 24 《金匱要略》半夏厚朴湯、《症因脈治》丁香柿蒂散、《傷寒論》旋覆代赭石湯之比較，下列何者最不適宜？
(A)三方皆有胃氣虛之證
(B)丁香柿蒂散以人參益氣補虛；旋覆代赭石湯則以人參、大棗、甘草益氣扶正，和中補虛
(C)三方中皆有生薑
(D)半夏厚朴湯與旋覆代赭石湯二方皆有半夏
- 25 下列何藥不包含在《十藥神書》十灰散的組成中？
(A)蒲黃 (B)梔子 (C)大黃 (D)荷葉
- 26 《醫學發明》天台烏藥散與《景岳全書》暖肝煎的藥物組成，相同的藥物有幾個？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 27 關於《醫門法律》清燥救肺湯與《金匱要略》麥門冬湯比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩方組成中均有麥門冬、人參、甘草
(B)清燥救肺湯之功用為清燥潤肺；麥門冬湯則為滋養肺胃，降逆和中
(C)清燥救肺湯中的桑葉有清宣肺燥之用；麥門冬湯中的半夏有降逆化痰的作用
(D)清燥救肺湯主要用於治療虛熱肺痿；麥門冬湯則主要用於治療虛勞乾咳
- 28 小陳是25歲的男性。盛暑之際，喜飲貪涼，而出現了如下症狀：頭痛，輕微發熱惡寒，脘腹脹滿，嘔吐泄瀉。候其脈見浮細而軟，望舌則見舌淡紅苔白微膩。下列處方何者最適宜？
(A)《溫熱經緯》清暑益氣湯 (B)《太平惠民和劑局方》藿香正氣散
(C)《溫病條辨》三仁湯 (D)《內外傷辨惑論》羌活勝濕湯
- 29 《和劑局方》八正散與《溫熱經緯》甘露消毒丹的組成中皆有下列何藥？
(A)甘草 (B)梔子 (C)滑石 (D)車前子

- 30 有關《溫病條辨》杏蘇散的敘述，下列共幾項正確？①主治外感溫燥證 ②本方乃《和劑局方》參蘇飲去人參、葛根、木香加杏仁而成 ③方中桔梗、枳殼，一升一降，助杏仁宣利肺氣 ④方中含《和劑局方》二陳湯以燥濕化痰止咳 ⑤忌生冷、油膩、辛辣、烤炸食物
(A)5 (B)4 (C)3 (D)2
- 31 下列滋陰潤燥方劑之組成皆含有「玄參、麥門冬、生地黃」，何者除外？
(A)《重樓玉鑰》養陰清肺湯 (B)《慎齋遺書》百合固金湯
(C)《金匱要略》麥門冬湯 (D)《溫病條辨》增液湯
- 32 臨診時以眩暈、頭痛、失眠、舌紅苔黃、脈弦數為方證，下列何者為其主藥？
(A)天麻、鉤藤 (B)夜交藤、茯神 (C)黃芩、梔子 (D)石決明、牛膝
- 33 方劑的藥物組成中含有川芎、防風和羌活者，下列共幾項正確？①《傷寒六書》再造散 ②《和劑局方》川芎茶調散 ③《備急千金要方》獨活寄生湯 ④《此事難知》引張元素方九味羌活湯
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 34 66歲患者，求診主訴為咳嗽氣逆，胸悶，食欲不佳，痰多，胃納不佳，舌苔厚白膩，脈滑有力，治以下列何組成最適宜？
(A)瓜蒌、貝母、桔梗、黃芩、梔子、陳皮、桑白皮、麥冬、知母、茯苓、甘草
(B)桔梗、甘草、梔子、黃芩、連翹、薄荷
(C)白芥子、蘇子、萊菔子
(D)貝母、玄參、牡蠣
- 35 關於《醫學心悟》止嗽散，下列敘述何者錯誤？
(A)辨證為風邪犯肺，導因於外感風邪犯肺，肺失清肅，雖經發汗解表，但仍見咽癢咳嗽
(B)組成為：紫苑、百部、桔梗、陳皮、荊芥、白前、甘草、生薑
(C)陰虛勞嗽和肺熱咳嗽仍可使用
(D)無表邪，僅存內傷咳嗽者，可去荊芥
- 36 關於《溫病條辨》新加香薷飲，下列敘述何者錯誤？
(A)組成為香薷、銀花、鮮扁豆花、厚朴、連翹
(B)功用為祛暑解表，清熱化濕，滋陰益氣
(C)身熱盛，可考慮加石膏以清熱
(D)以惡寒無汗，口渴，面赤，舌苔白膩為運用主證
- 37 《醫宗金鑑·外科心法要訣》五味消毒飲之組成，下列何者最不適宜？
(A)金銀花 (B)野菊花 (C)紫草 (D)紫背天葵
- 38 臨診時以咳嗽痰多，色白易咯，脛悶納差，噁心嘔吐，舌苔白滑或膩為主證，其組方時以下列何者為主（君）藥？
(A)茯苓 (B)製半夏 (C)苡仁 (D)竹茹
- 39 《醫方考》清氣化痰丸是以下列何種原料泛成丸劑的？
(A)水 (B)醋 (C)蜂蜜 (D)薑汁
- 40 有關《醫方考》指迷茯苓丸之敘述，下列何者最適宜？
(A)其組成有茯苓、半夏、枳殼、風化硝
(B)主治風邪上攻、氣血兩虛、阻滯兩臂經絡
(C)此方乃以茯苓為主藥；枳殼寬胸行氣為輔藥
(D)棗肉糊為丸，鹽湯下
- 41 關於細辛主治應用，下列敘述何者最不適宜？
(A)《本經》列為上品，研末服，毒性較小，用量無顧慮
(B)肺寒咳喘，痰多清稀
(C)口舌生瘡，胃火牙痛，與他藥同用
(D)頭痛，風濕痹痛，鼻淵常流清涕
- 42 下列何者非《臺灣中藥典》收載之毒劇中藥？
(A)生附子 (B)生巴豆 (C)生白附子 (D)薑半夏

- 43 能祛風勝濕兼有止痛解痙的作用，下列何藥物最適宜？
(A)紫蘇、荊芥 (B)香薷、生薑 (C)白芷、藁本 (D)蒼耳子、辛夷
- 44 能發散風寒濕邪而解表，適用於腰腿疼痛，兩足痠痹，下列何藥物最適宜？
(A)秦艽 (B)獨活 (C)威靈仙 (D)防風
- 45 有關秦艽主治，下列敘述何者最適宜？
(A)口噤牙痛，濕勝風淫 (B)久痛虛羸，下部虛寒
(C)濕熱黃疸，洩多便滑 (D)脾虛便溏，小便不禁
- 46 用於止嘔，下列何者最不適宜？
(A)草豆蔻 (B)砂仁 (C)吳茱萸 (D)茯苓
- 47 肺熱咳嗽痰多，小便短數、熱赤澀痛，下列何者最適宜？
(A)海金沙 (B)通草 (C)石韋 (D)葫蘆
- 48 下列祛風濕強筋骨藥物中，何者最適宜用於胎漏下血等證？
(A)桑寄生 (B)五加皮 (C)豨薟草 (D)千年健
- 49 用於「行氣止痛，引心包相火下行，亦能入肝舒筋，且能殺蟲」，下列何藥最適宜？
(A)細辛 (B)川楝子 (C)附子 (D)烏藥
- 50 枳實的功效，下列何者最適宜？
(A)溫中散寒，順氣止痛 (B)破氣消積，化痰除痞
(C)升提益氣，補脾益氣，消食化積 (D)舒肝理氣，溫補脾腎，和中化痰
- 51 主治心煩，懊憹不眠，紫癍白癰，皰疹瘡瘍，下列何藥物最適宜？
(A)梔子 (B)黃芩 (C)丹皮 (D)黃柏
- 52 玄參之禁忌，下列何者最適宜？
(A)溫、熱病，熱入營分者 (B)脾虛泄瀉者
(C)外感風熱引起之咽喉腫痛者 (D)陰虛火旺者
- 53 主治傷寒，煩熱，蓐勞骨蒸，燥渴虛煩，下列何者最適宜？
(A)牡丹皮 (B)白芍 (C)荊芥 (D)知母
- 54 具散熱解毒、補虛、療風、養血、止渴之功能、治癰疽疥癬、楊梅惡瘡、腸澼血痢、五種尸症，下列何藥物最適宜？
(A)蒲公英 (B)紫花地丁 (C)白頭翁 (D)金銀花
- 55 有關瀉下藥之敘述，下列何者最不適宜？
(A)引起腹瀉或滑利大腸 (B)適用於裏虛證，使虛熱下泄
(C)作用峻者，於月經期應慎用或忌用 (D)此類藥易傷胃氣，奏效即止
- 56 具有涼血止血，清熱利尿，清肺胃熱的功效，下列何藥物最適宜？
(A)白茅根 (B)蘆根 (C)冬瓜皮 (D)側柏葉
- 57 用於治療脾不統血，衝脈不固之崩漏不止，常配伍益氣固澀之品以益氣健脾，固衝攝血，下列何藥物最適宜？
(A)棕櫚炭 (B)荊芥炭 (C)五靈脂 (D)三七
- 58 關於鬱金的描述，下列何者最適宜？
(A)活血止痛、行氣解鬱 (B)養血斂陰，柔肝止痛
(C)補血活血，調經止痛 (D)通陽散結、行氣導滯
- 59 具有破血行氣，消積止痛的功效，下列何藥物最適宜？
(A)青皮 (B)鬱金 (C)烏藥 (D)三棱
- 60 關於川芎的描述，下列何者最適宜？
(A)辛香行散，溫通血脈，乃氣中之血藥
(B)尤善「下行血海」，而「下調經水」，故為婦科活血調經之要藥
(C)具有通經，利尿的功效
(D)為良好的補血藥，能養血以安神，故適用於血虛引起的各種證候

- 61 有關五加皮應用，下列何者最不適宜？
(A)久病體虛，水腫腳氣 (B)肌膚瘀血，筋骨拘攣
(C)陰痿囊濕，女子陰癢 (D)肝腎不足，陰虛火旺
- 62 白朮的敘述，下列何者最適宜？
(A)陰虛內熱 (B)津液虧耗 (C)脾氣虛的胎動不安 (D)氣滯脹悶
- 63 具有滋陰潤肺、鎮咳祛痰、益胃生津、清心除煩之功效，下列何者最適宜？
(A)五味子 (B)黃精 (C)玉竹 (D)麥門冬
- 64 淫羊藿的敘述，下列何者最不適宜？
(A)溫肺定喘 (B)補腎壯陽 (C)強筋健骨 (D)祛風除濕
- 65 補骨脂的敘述，下列何者最適宜？
(A)口乾舌燥 (B)陰虛火旺 (C)腰膝冷痛 (D)大便秘結
- 66 菟絲子的敘述，下列何者最適宜？
(A)胎動不安 (B)陰虛火旺 (C)大便燥結 (D)小便短赤
- 67 具有潤肺止咳、清心安神之功效，下列何者最適宜？
(A)沙參 (B)天冬 (C)石斛 (D)百合
- 68 患者外傷骨折，抑鬱不眠，下列何藥最為適用？
(A)龍骨 (B)合歡皮 (C)遠志 (D)酸棗仁
- 69 桔梗的敘述，下列何者最不適宜？
(A)不適用於陰虛，久咳氣逆、咳血 (B)對於胃病患者，慎服
(C)陰虛火旺，咳血，可配薄荷 (D)內服過量，會引起噁心嘔吐
- 70 半夏為治濕痰的要藥，下列敘述何者最不適宜？
(A)生半夏多外用，消腫散結 (B)清半夏長於陰虛燥咳
(C)薑半夏偏於降逆止嘔 (D)法半夏善和胃燥濕
- 71 凡以平肝潛陽或息風止癇，治療肝陽上亢或肝風內動病症為主要作用的藥物，稱為平肝息風藥，下列敘述何者最適宜？
(A)平抑肝陽藥多為蟲類藥物
(B)息風止癇藥多為質重之介類或礦石類藥物
(C)此類藥中的動物甲殼、礦物藥質地堅硬，在煎藥時應打碎後下
(D)蟲類藥物有毒者，用量不宜過大，以免中毒
- 72 草薢的功効，下列何者最不適宜？
(A)止嘔 (B)止痛 (C)止瀉 (D)止癇
- 73 古籍中鉤藤常與羚羊角相須為用，用於治療下列何者？
(A)痘疹後，餘毒未清 (B)肺經血熱，咯血、吐血
(C)肝膽濕熱所致的頭痛、目赤 (D)肝風內動、驚癇抽搐
- 74 下列驅蟲藥物中，何種藥材受熱容易破壞有效成分？
(A)苦楝皮 (B)雷丸 (C)檳榔 (D)鶴蟲
- 75 成熟果實的藥物，具止咳、開音、止渴藥効，下列何藥物最適宜？
(A)五倍子 (B)五味子 (C)烏梅 (D)訶子
- 76 檳榔主治痰癰癥瘕，瘡癤瘡痢，且包含下列何者？
(A)蟲疥惡瘡 (B)腰膝冷痛 (C)水腫腳氣 (D)脾虛便溏
- 77 有關藜蘆的敘述，下列何者最不適宜？
(A)研細末外用，可治疥癬禿瘡 (B)可以滅蝨、殺蚊蠅幼蟲
(C)善治寒痰 (D)治中風不語，可製丸以溫酒下
- 78 下列何種藥物的植物，其嫩枝葉可做成蜀漆？
(A)鹽膚木 (B)常山 (C)乾漆 (D)五倍子
- 79 下列何藥的來源是經由植物的枝幹或枝葉煎汁濃縮而成乾燥浸膏？
(A)血竭 (B)松香 (C)孩兒茶 (D)樟腦
- 80 下列藥物製霜的目的，何者與其他三者不同？
(A)巴豆 (B)瓜蒌仁 (C)鹿角 (D)大風子