

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。


(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述，下列有關桂枝加葛根湯證之敘述，何者最不適當？
(A)項背強几几之病機為太陽經氣不舒
(B)葛根之作用為升津舒經，並無解表作用
(C)桂枝加葛根湯之組成為桂枝湯加葛根
(D)汗出惡風亦為其症狀
- 2 依《傷寒論》所述：「傷寒，醫下之，續得下利清穀不止，身疼痛者，急當救裏；後身疼痛，清便自調者，急當救表。」，下列敘述何者正確？
(A)救裏宜四逆湯，救表宜麻黃湯
(B)救裏宜四逆湯，救表宜桂枝湯
(C)救裏宜理中湯，救表宜麻黃湯
(D)救裏宜理中湯，救表宜桂枝湯
- 3 依《傷寒論》所述：「太陽病，下之後，胸滿，若微惡寒者」，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝加附子湯
(B)桂枝附子湯
(C)桂枝去芍藥湯
(D)桂枝去芍藥加附子湯
- 4 依《傷寒論》所述，關於結胸死證之敘述，下列何者正確？①結胸證悉具，煩躁者 ②結胸證，其脈浮大者，下之 ③結胸者，項強如柔痙狀，下之 ④結胸證，其脈沉而緊，下之
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 5 依《傷寒論》所述：「傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐」，治以下列何方最適宜？
(A)吳茱萸湯 (B)白虎加人參湯 (C)竹葉石膏湯 (D)小柴胡湯
- 6 依《傷寒論》所述：太陽病，發汗，汗出不解，其人仍發熱，心下悸……真武湯主之，「其人仍發熱」的病機，下列何者正確？
(A)虛陽外越 (B)風邪犯表，表邪未解
(C)正邪相爭 (D)陰陽氣不相順接
- 7 依《傷寒論》所述，治療熱痞，以下列何方最適宜？
(A)半夏瀉心湯 (B)大黃黃連瀉心湯 (C)生薑瀉心湯 (D)甘草瀉心湯
- 8 依《傷寒論》所述，下列有關黃連湯證之敘述，何者最不適當？
(A)胸膈有邪熱 (B)脾有寒氣
(C)嘔吐之病機為寒邪在腹，逼使胃氣上逆 (D)用乾薑溫脾之寒氣
- 9 依《傷寒論》所述：「傷寒六七日，發熱，微惡寒，支節煩疼，微嘔，心下支結，外證未去者」，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝湯 (B)小柴胡湯
(C)柴胡桂枝湯 (D)先與小建中湯，不瘥者，再與小柴胡湯

- 10 依《傷寒論·陽明病篇》所述，下列敘述何者錯誤？
(A)陽明病，口燥，但欲漱水，不欲嚥者，必衄
(B)陽明病，脈浮，發熱，口乾，鼻燥，能食者則衄
(C)陽明病，下後，脈數而解，而不下利，必協熱便膿血
(D)陽明病，下血，譫語者，此為熱入血室
- 11 依《傷寒論》有關調胃承氣湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)瀉熱和胃，潤燥軟堅 (B)通用於陽明燥熱結實
(C)陽明痞滿不甚 (D)攻下實熱，蕩滌燥結
- 12 依《傷寒論·少陽病脈證并治》所述，有關小柴胡湯或然證加減用藥，下列敘述何者正確？①若胸中煩而不嘔，去半夏、人參加枳實一枚 ②若渴，去半夏加麥冬 ③若咳者，去人參、大棗、生薑，加五味子、乾薑 ④若脇下痞鞭，去大棗，加牡蠣
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 13 依《傷寒論》所述：「太陰病，脈浮者，可發汗」，宜用下列何方？
(A)麻桂各半湯 (B)桂枝加芍藥湯 (C)桂枝湯 (D)葛根湯
- 14 依《傷寒論》所述：「少陰病，始得之，反發熱，脈沉者」，下列何者正確？①少陰本不發熱，今「反發熱，脈沉」說明本證為「太陽、少陰兩感」 ②本證少陰裏虛寒，又兼太陽表證，故需「溫經解表」方能兩解 ③宜以麻黃附子甘草湯主之 ④治本證附子宜生用，溫經走表之力較速
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②④
- 15 關於《傷寒論》「除中」之敘述，下列何者錯誤？
(A)「傷寒，始發熱六日，厥反九日而利。凡厥利者，當不能食；今反能食者，恐為除中」
(B)「除中」是指「胃氣垂絕，而反能食的反常現象」
(C)測試「除中」的方法是餵病人「索餅」
(D)食用「索餅」後而不發熱者，表胃氣全無
- 16 依《傷寒論》所述：「病人手足厥冷，心下滿而煩，饑不能食，脈乍緊者」，有關此厥證之敘述，下列何者錯誤？
(A)手足厥冷之病機乃痰食阻滯，抑遏胸陽，不能外達四肢
(B)病在胸中，當須吐之
(C)脈乍緊之病機為邪結於胸之寒象
(D)宜瓜蒂散主治
- 17 下列何者最宜用在溫病濕鬱化熱，鬱遏於裏，濕熱並重，互結於中焦，具有辛開苦降、清化濕熱之功用？
(A)藿朴夏苓湯 (B)雷氏芳香化濁法 (C)黃連溫膽湯 (D)王氏連朴飲
- 18 以臨床特點命名的溫病是：
(A)冬溫 (B)濕溫 (C)暑溫 (D)爛喉痧
- 19 關於溫病瘥後調理之敘述，下列何者最正確？
(A)溫病瘥後，邪熱雖除而氣血虧損，須補益氣血，宜用集靈膏
(B)濕熱證瘥後，餘邪未淨，胃氣失健，宜用竹葉石膏湯
(C)溫病瘥後，如僅胃腸津液未復，宜用三才湯
(D)溫病瘥後，若氣液雖虛而餘熱未清，宜用薛氏參麥湯

- 20 下列關於「溫病學發展史」之敘述，何者錯誤？
(A)自戰國到唐代，尚無論述溫病的專論
(B)《素問·刺法論》提出防疫的關鍵在於「正氣存內」與「避其毒氣」
(C)從唐代開始，在溫病的治療方面，突破了法不離傷寒，方必遵仲景的框架
(D)劉河間在熱性病治療方面大膽地創新論、立新法、訂新方
- 21 舌苔如附圖，下列何者為最可能的診斷？



- (A)氣分鬱熱 (B)燥熱傷陰 (C)濕熱鬱蒸 (D)氣分熱盛，胃津已傷
- 22 溫病證，症見手足蠕動、甚或瘈瘲、心中憺憺大動、舌絳苔少，神倦脈虛，時時欲脫，最宜用下列何組方藥治療？
(A)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、牡蠣
(B)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁、牡蠣、鱉甲
(C)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁、牡蠣、鱉甲、龜板
(D)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁、牡蠣、鱉甲、龜板、五味子、雞子黃
- 23 葉天士在《三時伏氣外感篇》提到：風溫證若初因發熱喘嗽，首用清涼清肅上焦……。若色蒼、熱勝、煩渴……，最宜用下列何組方藥治療？
(A)薄荷、連翹 (B)桑葉、沙參 (C)石膏、竹葉 (D)黃芩、黃連
- 24 風溫邪熱入血分，引起肝經熱盛動風，下列相關敘述何者錯誤？
(A)身熱壯盛，頭暈脹痛，手足躁擾 (B)甚則瘈瘲，狂亂瘡厥
(C)腹部脹滿硬痛或拒按 (D)舌紅苔燥無津，脈象弦數
- 25 承上題，下列何者是最適宜的處方？
(A)牛黃承氣湯 (B)羚角鉤藤湯
(C)白虎湯加羚羊、鉤藤 (D)調胃承氣湯加羚羊、鉤藤
- 26 下列何者治法較少用於春溫證？
(A)苦寒清泄裏熱 (B)表裏兩解 (C)辛涼解表 (D)清熱生津
- 27 治溫病之暑傷津氣證常選用「王氏清暑益氣湯」，原方中使用的參為下列何者？
(A)高麗參 (B)西洋參 (C)黨參 (D)太子參
- 28 有關暑穢的論述與治法，下列何者錯誤？
(A)因感受暑濕穢濁之氣，而致猝然悶亂煩躁的病證
(B)宜用雷氏芳香化濁法
(C)暑熱偏重者，以雷氏芳香化濁法加滑石、甘草
(D)穢濁蒙蔽清竅，可先用通關散吹鼻取嚏，並服蘇合香丸芳香辟穢開竅

- 29 下列醫家何人最早提出溫疫病的致病原因為「雜氣」？
(A)余師愚 (B)戴天章 (C)薛生白 (D)吳又可
- 30 有關《溫病條辨》中五個加減正氣散之敘述，下列何者正確？
(A)五個加減正氣散均有藿香梗、蒼朮、苡仁、通草
(B)一、二、三加減正氣散是治療濕重於熱的方劑
(C)四、五加減正氣散是治療熱重於濕的方劑
(D)濕溫患者，濕鬱三焦致三焦升降失司且見苔黃脛悶，宜四加減正氣散
- 31 張先生，患伏暑，初起時見惡寒發熱，無汗，頭痛欲裂，一身痠痛，脛痞嘔噦，心煩口渴甚，溲短而赤，舌質偏紅，苔膩，脈濡數。以上見證，下列敘述何者錯誤？
(A)惡寒發熱，無汗，頭身痛為邪在表所致
(B)心煩口渴，脛痞嘔噦，溲短而赤，舌紅苔膩，脈濡數為濕熱內鬱之象
(C)治宜辛散解表，清熱化濕
(D)方宜銀翹散加丹皮、麥冬
- 32 下列關於「秋季外感涼燥初起證治」之敘述，何者錯誤？
(A)較之溫燥初起，惡寒較重，發熱較輕
(B)較之風寒外感，證候類似，但燥象較顯
(C)本證化熱之後，其病機演變與證治原則與溫燥不同
(D)宜治以杏蘇散《溫病條辨》
- 33 依《金匱要略》所述：「虛勞諸不足，風氣百疾」，治以下列何方最適宜？
(A)黃耆建中湯 (B)薯蓣丸 (C)炙甘草湯 (D)酸棗仁湯
- 34 依《金匱要略》所述：「發汗後，臍下悸者，欲作奔豚」，治以下列何方最適宜？
(A)奔豚湯 (B)桂枝加桂湯
(C)桂枝加龍骨牡蠣湯 (D)茯苓桂枝甘草大棗湯
- 35 依《金匱要略》所述：「肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水」，治以下列何方最適宜？
(A)射干麻黃湯 (B)葶藶大棗瀉肺湯 (C)小青龍加石膏湯 (D)越婢加半夏湯
- 36 依《金匱要略》所述：「青龍湯下已，多唾口燥，寸脈沉，尺脈微，手足厥逆，氣從小腹上衝胸咽，手足痺，其面翕熱如醉狀，因復下流陰股，小便難，時復冒者」，治以下列何方最正確？
(A)茯苓、桂枝、白朮、甘草 (B)茯苓、桂枝、甘草、大棗
(C)茯苓、澤瀉、桂枝、白朮、豬苓 (D)茯苓、桂枝、五味子、甘草
- 37 依《金匱要略》所述：「嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也」，治以下列何方最適宜？
(A)小半夏湯 (B)生薑半夏湯 (C)半夏乾薑散 (D)橘皮竹茹湯
- 38 依《金匱要略》所述：「大逆上氣，咽喉不利，止逆下氣者」，治以下列何方最適宜？
(A)麥門冬湯 (B)澤漆湯 (C)厚朴麻黃湯 (D)射干麻黃湯
- 39 依《金匱要略·婦人雜病》所述：「婦人少腹滿如敦狀，小便微難而不渴，生後者」，治以下列何方最適宜？
(A)大黃、甘遂、芒硝 (B)大黃、甘遂、桃仁 (C)大黃、甘遂、厚朴 (D)大黃、甘遂、阿膠

- 40 依《金匱要略》所述，對於腸癰主治以薏苡附子敗醬散的敘述，下列何者最正確？①其身甲錯 ②腹皮急，按之硬如石狀 ③身熱 ④脈數
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)②④
- 41 依《金匱要略》有關水飲在五臟，其中水在肺之敘述，下列何者正確？
(A)心下堅築，短氣，惡水不欲飲 (B)吐涎沫，欲飲水
(C)少氣，身重 (D)脇下支滿，噎而痛
- 42 依《金匱要略·水氣病脈證》，有關石水的敘述，下列何者正確？
(A)脈自浮，外證骨節疼痛，惡風
(B)脈浮，外證肘腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴
(C)脈自沉，外證腹滿不喘
(D)脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫
- 43 依《金匱要略·嘔吐噦下利》所述：「下利後更煩，按之心下濡者，為虛煩也」，治以下列何方最適宜？
(A)梔子、香豉 (B)赤石脂、乾薑、粳米 (C)大黃、厚朴、枳實 (D)大黃、甘草
- 44 依《金匱要略》有關「下利」的敘述，下列何者錯誤？
(A)下利便膿血者，桃花湯主之
(B)熱利下重者，白頭翁湯主之
(C)下利已差，至其年月日時復發者，此病不盡故也，當溫之，宜理中湯
(D)下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之
- 45 眩暈多屬本虛標實之證，下列敘述何者錯誤？
(A)肝腎陰虧，氣血不足，為眩暈之本
(B)痰、瘀、風、火，為病之標
(C)風性主動，火性上炎，痰性留著，瘀性黏滯等需加以辨識
(D)其中以肝風、肝火之眩暈證，為病最急
- 46 隔壁林太太訴說，脇肋隱痛，悠悠不休，近日為女兒準備婚事，操勞忙碌，脇肋隱隱作痛加重，口乾咽燥，心中煩熱，下列敘述何者正確？
(A)屬血虛不能養肝，脈絡失養所致 (B)屬肝鬱氣滯，氣阻脇絡所致
(C)屬氣滯血瘀，痹阻脇絡所致 (D)屬肝膽疏泄失常，脇絡不和所致
- 47 有關黃疸的治療，下列何者正確？
(A)黃疸屬濕邪為患，所以治療重在通利小便
(B)急黃之人，胃火偏旺，偏治在胃，清熱解毒利濕為主
(C)陽黃之人，脾陽不足，偏治在脾，健脾溫中利濕為主
(D)陰黃之人，寒濕阻滯，膽汁外溢，溫中化寒燥濕為主
- 48 一婦女長期胸悶心煩不寐，腸胃也不適，容易泛惡噯氣，常覺得頭重目眩，脈為滑數，苔黃膩。下列有關證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型—心膽氣虛 (B)病機—肝鬱化火，上擾心神
(C)治法—益氣鎮驚，安神定志 (D)主方—溫膽湯
- 49 一病人為心痛主證：常覺胸悶隱痛，喉中常有痰黏不易咯出，其舌暗紫有瘀斑，苔為白膩，診其脈為濡滑。最有可能為下列何種證型？
(A)痰濁閉阻 (B)陰寒內結 (C)痰瘀交阻 (D)血瘀氣滯

- 50 下列何者不是癲癇的病因？
(A)七情失調主責於驚恐
(B)小兒臟腑嬌嫩，元氣未充，驚則心腎奪氣而神不守舍
(C)病從胎氣而得，胎兒在母腹中，母有所大驚所致
(D)出生時難產，導致顱腦受傷
- 51 關於吐酸病證敘述，下列何者錯誤？
(A)吞酸辨證要點首當辨明寒熱
(B)「酸久成噎」之論點，告誡後人不要因為吐酸是小疾，而延誤治療，以致日後變成膈噎反胃，故應重視本證及時治療與護理
(C)患者吞酸時作噯臭腐氣胃脘飽悶、大便臭穢、口乾舌質紅、苔黃厚、脈弦滑，宜用黃連配吳茱萸，溫中散寒、和胃治酸
(D)脾胃虛寒所致的吐酸宜用香砂六君子湯加吳茱萸治療
- 52 虛弱病人，服食補氣藥過多而頻頻呃逆者，治以下列何方最適宜？
(A)烏賊骨、煅瓦楞子煎水溫服
(B)生薑、吳茱萸煎水溫服
(C)橘皮、竹茹煎水溫服
(D)旋覆花、代赭石煎水溫服
- 53 有關便秘的敘述，下列何者錯誤？
(A)《內經》稱便秘為「後不利」、「大便難」
(B)《內經》認為便秘與脾受燥熱侵襲有關
(C)《石室秘錄·大便閉結》認為便秘與肺有關
(D)《雜病源流犀燭·大便秘結源流》認為便秘與腎病有關
- 54 某患者有復發性口腔潰瘍，灼熱疼痛，瘡瘍周圍紅腫，口燥咽乾，失眠多夢，心悸健忘，手足心熱，舌紅少苔，脈細數。下列處方何者最適宜？
(A)瀉黃散合導赤散
(B)附子理中湯
(C)涼膈散
(D)知柏八味丸
- 55 痰飲是指水液在體內運化輸布失常，停積在某些部位的一類病證。下列何本典籍將痰證與飲證作了鑑別：「痰之與飲，雖曰同類，而實有不同也。……若痰有不同於飲者，飲清澈而痰稠濁，飲惟停積腸胃，而痰則無所不到。……故治此者，當知所辨而不可不察其本也。」
(A)唐·孫思邈《千金方·痰飲第六》
(B)王燾《外臺秘要》
(C)宋·嚴用和《濟生方·痰飲論治》
(D)明·張景岳《景岳全書·痰飲》
- 56 陳先生，昨日午後頭昏重脹痛，四肢痠重，伴隨身熱稍有出汗，鼻涕白濁，咳嗽痰黏色白稍黃，小便短赤，胸悶泛噯便溏，口渴不欲飲，苔黃膩脈濡。經診斷辨證給予方劑治療，下列何者正確？
(A)風寒束表肺衛失宣，荊防敗毒散
(B)風熱犯表肺衛失和，銀翹散
(C)暑濕傷表肺衛失暢，新加香薷飲
(D)痰濁阻肺肺氣失降，三子養親湯
- 57 有關遺精的敘述，下列何者錯誤？
(A)皆因虛證而起
(B)有夢而遺者為夢遺
(C)不因性交而精液自出
(D)滑精亦為遺精的一種
- 58 小便熱赤帶血，色鮮紅，發病前先見心煩不寐，口舌生瘡，舌尖紅苔黃，脈數，其發病之病因以下列何者最適宜？
(A)火毒迫血
(B)膀胱濕熱
(C)心火亢盛
(D)肝膽濕熱

- 59 有關「汗證」的概念敘述，下列何者錯誤？
 (A)因陰陽失調，腠理不固所引發 (B)大汗淋漓如油者為「自汗」
 (C)寐中汗出，醒來自止者為「盜汗」 (D)自汗、盜汗可能與人體之陰陽虛損有關
- 60 「癰病」治療原則，下列何者並非針對局部病灶部位？
 (A)理氣化痰 (B)活血化癥 (C)養心安神 (D)消癰散結
- 61 關於歷代醫家對癰病之認識，下列敘述何者錯誤？
 (A)朱丹溪認為癰病屬內風，宜用息風之藥 (B)王清任認為癰病的病因病機是氣虛血瘀
 (C)張景岳認為癰病是陰虛血少不能養營筋脈 (D)吳鞠通認為癰病當分虛、實、寒、熱四大綱
- 62 有關痿證的敘述，下列何者錯誤？
 (A)痿證是手足痿軟的一種疾病，大多病在下肢
 (B)臨床上痿證多屬五臟內傷，精血受損，陰虛火旺，一般是寒證、虛證居多
 (C)如病人原有痿證，經久不癒，導致脾胃虛弱，則痿證可能更加嚴重
 (D)痿證常常涉及諸臟，而不侷限於一經一臟
- 63 李士材《醫宗必讀》對於痺證治法之主張，下列何者正確？①行痺以散風為主，佐以祛寒理濕 ②著痺以散寒為主，而佐以祛風利濕 ③行痺須參以補血之劑 ④著痺須參以理脾補氣
 (A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②④
- 64 關於痺證的敘述，下列何者錯誤？
 (A)熱痺用白虎加桂枝湯
 (B)某患者右膝關節灼熱紅腫、發熱、口渴、舌紅苔黃燥、脈滑數，當用薏苡仁湯，不可用溫燥藥
 (C)濕熱痺證用宣痺湯清熱利濕通絡
 (D)發作期以祛邪為主，緩解期以補肝腎為主
- 65 臨床上診脈，診得脈來急數而時一止，止無定數者，是下列何種脈象的特徵？
 (A)促脈 (B)結脈 (C)代脈 (D)動脈
- 66 48 歲柳先生，來診時主訴最近 8 個月經常頸項緊痛，伴血壓偏高，望之精神緊張，面色偏紅，平時工作忙碌，常加班熬夜，三餐常無法按時進食，白天工作時容易腰部痠軟，晚上容易耳鳴，而且多思慮很難入睡，來診時量得血壓 BP:158/92 mmHg，脈來細弦數，舌苔白乾，質稍紅，下列何者是本病最佳辨證？
 (A)陰虛陽亢證 (B)痰火上擾證 (C)肝氣鬱結證 (D)心脾兩虛證
- 67 有關前後陰之病證敘述，下列何者錯誤？
 (A)陰挺：婦女陰戶中有物突出如梨狀，多由中氣不足，脾虛下陷所致
 (B)肛裂：肛門裂口疼痛，便時流血，多因大腸熱結，燥屎撐裂，或伴有痔瘡
 (C)痔瘡：乃由腸道虛寒，氣滯血瘀而成
 (D)脫肛：多因中氣不足，氣虛下陷所致，常見於老人，小兒及婦女產後，或見於泄痢日久的病人
- 68 關於望診，下列敘述何者錯誤？
 (A)腮腫：腮部突然腫起，面赤咽痛，或喉不腫痛，但外腫而兼耳聾，此為「痄腮」，是溫毒證
 (B)若顴骨之下，腮頰之上，耳前一寸三分，發疽腫起，名為「發頤」，屬少陽、陽明經熱毒上攻
 (C)癭瘤：頸前頰下結喉之處，有腫物如瘤，或大或小，可隨吞嚥移動，多由心肺氣虛、氣滯血瘀所致，或與地方水土有關
 (D)瘰癧：頸側頰下，腫塊如壘，累累如串珠，多由肺腎陰虛，虛火灼津，結成痰核，或感受風火時毒，致氣血壅滯，結於頸項

- 69 舌診中關於「舌苔的剝脫」之敘述，下列何者正確？
(A)舌苔的剝脫，乃蕈狀乳頭萎縮所造成，一般表示陰虛、血虛，與胃陰、胃氣之存亡無關
(B)部分人的舌苔生下即剝，且剝落成菱形而位于舌面後半者，稱為菱形舌，對臨床疾病診斷深具意義
(C)舌苔多塊剝落，餘處斑駁殘存舌苔，界限明顯，稱之為花剝舌，多為邪實陰虛
(D)地圖舌舌苔規則脫落，多發生于舌面後半，多見于健康成人，非週期性呈現
- 70 紅星舌為下列何者腫脹充血造成？
(A)蕈狀乳頭 (B)絲狀乳頭 (C)輪廓乳頭 (D)葉狀乳頭
- 71 關於胸腹部位之中醫名稱，下列述敘何者正確？
(A)兩乳中之上，謂之脇 (B)鳩尾之下至中脘，謂之大腹
(C)肋骨盡處之下，謂之季脇 (D)胸下兩乳間至鳩尾，謂之上腹
- 72 患者語言有時錯亂，但語後自知言錯，是因下列何者？
(A)傷寒蓄血 (B)陰證癲病 (C)心氣虛弱 (D)痰熱擾心
- 73 下列關於「脈象」的敘述，何者錯誤？
(A)沉類脈中，牢脈與伏脈均重按始得，但伏脈會暫時伏而不見，牢脈則推筋著骨始得
(B)芤脈與革脈都有中空之象，但前者浮大無力，後者浮大搏指，弦急中空
(C)「細、微、弱、濡」四脈都是脈形細小且軟弱無力
(D)弦脈與長脈類似，《醫述》：長類於弦而盛於弦，弦脈帶急，長脈帶緩
- 74 寸口脈分候臟腑，下列何者錯誤？
(A)右關候肝 (B)左尺候腎 (C)右寸候肺 (D)左寸候心
- 75 有關「血熱妄行」所致出血的特點，下列何者最不適宜？
(A)出血量常較多，血色鮮紅或紫黑
(B)出血反覆發作，外候常見肌膚甲錯，腹壁青筋暴露
(C)可出現紅色斑疹
(D)多伴有心煩、口渴、舌紅絳、脈滑數等全身熱象
- 76 關於濕邪在上中下三焦的敘述，下列何者最不適宜？
(A)濕蒙上焦，頭脹頭重，胸脘痞悶 (B)濕阻中焦，治則著重燥濕健脾
(C)濕注下焦，以開鬼門為主要治則 (D)濕蒙上焦，著重宣氣化濕
- 77 某 55 歲男性患者，因糖尿病相關併發症住院治療，主訴口乾舌燥，喝 2000 毫升的水仍不能解渴，心浮氣躁，面色紅，身熱直冒汗，舌苔偏黃乾，脈滑數，其辨證以下列何者最適宜？
(A)少陽病證 (B)少陰病熱化證 (C)陽明病腑證 (D)陽明病經證
- 78 關於溫病「溫邪內陷心包」證與「痰濁蒙蔽心包」證比較之敘述，下列何者錯誤？
(A)神志方面，前者多昏迷兼癡厥，後者多昏迷或似明似昧
(B)熱象方面，前者為熱不甚高或外熱不壯，後者為日晡潮熱
(C)大便方面，前者一般無明顯變化，後者可能溏泄
(D)脈象方面，前者多細數或弦數，後者多滑數或濡數
- 79 下列何者不是心氣虛臨床常見症狀？
(A)自汗 (B)心悸 (C)氣短 (D)肢冷
- 80 某 32 歲女性患者，來診時主訴反覆口破已 5 年，西醫診為 Behcet's disease，服西藥控制仍不癒。望之口腔黏膜有多處黃白色潰瘍。潰瘍經常在熬夜後、失眠後或月經來潮之前發作，疼痛影響進食；夜間常覺口咽乾，過勞則容易失眠，易腰膝痠軟；苔薄少而乾，舌質紅，脈細數。本病的臨床辨證以下列何者最適當？
(A)脾胃積熱口瘡 (B)中氣不足口瘡 (C)陰虛火旺口瘡 (D)心火口瘡