

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列有關感冒的辨證論治，何者錯誤？
(A)惡寒發熱，頭痛、身重、苔薄白，脈浮緊者屬風寒證
(B)風熱證可見鼻塞、流黃濁涕，咽痛，咳痰白黏或黃，銀翹散主之
(C)暑濕證可見頭昏重脹痛，肢體痠楚，舌淡黃膩，脈濡數
(D)暑濕證兼心煩口渴，小便短赤，胸悶，脘痞，泛惡，便溏，口中黏膩，渴不多飲，藿香正氣散主之
- 2 下列何者為木火刑金的最主要見症？
(A)梅核氣 (B)咳嗽痰多而稀 (C)右寸脈弦 (D)嗆咳
- 3 蔡小姐因上呼吸道感染，昨天咽癢咳甚，今天亦咽癢而咳至咽痛，咽不紅腫，痰白黏稠，微惡寒，脈浮緊，苔白。下列診斷何者最適宜？
(A)風寒束肺 (B)風熱襲肺 (C)痰熱壅肺 (D)寒飲束肺
- 4 65 歲男性患者，自訴在西醫初步診斷疑有肺結核，近半年來咳嗽、痰少質黏，有時痰中有血色鮮紅，伴隨傍晚容易身體潮熱感，見其咳喘氣急、顴紅，舌質紅絳、苔薄黃，脈細數。下列證型何者最適合？
(A)痰熱鬱肺 (B)痰濁壅肺 (C)陰虛火旺 (D)氣陰兩虛
- 5 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)生脈散 (C)溫膽湯 (D)瀉白散
- 6 小威平時就容易感冒，之前與女朋友去爬山，假期過後上課時，出現咳嗽，鼻塞，痰白黏，發熱惡寒，頭痛，嘴唇乾燥，咽喉乾的症狀，舌診苔薄白，津少，脈診弦，治以下列何方最適合？
(A)九味羌活湯 (B)桑菊飲 (C)杏蘇散 (D)大青龍湯
- 7 40 歲邱姓女患者，主訴咳嗽 1 個月，咳嗽型態為嗆咳發作頻仍，痰少色黃黏稠，咳時牽引脇痛，咳嗽嚴重時，咳到面紅赤，咽喉乾燥，口渴喜飲水，舌診舌紅苔黃，脈弦數，治以下列何方最適合？
(A)加減瀉白散合黛蛤散 (B)桑菊飲合桔梗湯
(C)銀翹散合沙參麥冬湯 (D)柴葛解肌湯
- 8 就辨病而論，下列何者是冠心病的主要病機？
(A)心膽虛怯 (B)心脾兩虛 (C)心血瘀阻 (D)陰虛火旺
- 9 50 歲女性患者，主訴胸痛近半年，呈悶痛，且伴有心悸盜汗，心煩不寐，腰膝痠軟，頭暈耳鳴，舌紅或有紫斑，脈細數或見細澀，下列何者是最適合的診斷？
(A)痰濁壅塞 (B)心血瘀阻 (C)心腎陰虛 (D)陽氣虛衰

- 10 67 歲男性病患右下肢疼痛，麻木乏力，活動疼痛加劇，間歇跛行，舌質紫暗瘀點，苔薄白，脈沉細澀，局部皮膚蒼白，喜暖畏寒，有多年吸菸與高血壓糖尿病史。下列證型何者最適合？
(A)寒痹血瘀 (B)風寒濕邪阻滯經絡
(C)氣虛血瘀 (D)氣血虧虛
- 11 64 歲女性患者，主訴過去有氣喘病史，近無哮喘急性發作，症見氣短，呼吸急促、動則較甚，痰白黏有泡沫，肢冷畏寒，頭暈、耳鳴，腰痠腿軟，舌質胖嫩、淡白舌、薄白苔，脈沉弱。治以下列何方最適合？
(A)玉屏風散 (B)金匱腎氣丸 (C)六君子湯 (D)生脈散
- 12 30 歲女性病患健康檢查有貧血 (Hb10 g/dL)，主訴為動則心悸氣短，倦怠乏力，懶言聲低，舌淡白、脈細弱。治以下列何方最適合？
(A)人參養榮湯 (B)生脈散 (C)一貫煎 (D)六味地黃丸
- 13 46 歲女性業務員，罹患中風已 3 個月，中風後口眼歪斜，右側偏癱而麻，常覺肢軟乏力，易身倦，見其舌質淡暗，苔薄白，舌下絡脈怒張，脈澀、無力。下列證型何者最適合？
(A)風痰阻絡 (B)氣虛血瘀 (C)氣滯血瘀 (D)腎精虧損
- 14 承上題，治以下列何方最適合？
(A)通竅活血湯 (B)地黃飲子 (C)補陽還五湯 (D)牽正散
- 15 52 歲女性胃炎患者，主訴胃脘痞悶已 2 年，胃脘痞塞脹滿、反覆發作，不欲食，喜熱喜按，得溫則舒，氣短懶言，大便溏，舌淡、苔白，脈虛大乏力。治以下列何方最適宜？
(A)越鞠丸 (B)平胃散 (C)補中益氣湯 (D)保和丸
- 16 吸菸可能導致逆流性食道炎、慢性胃炎和消化性潰瘍。中醫可思考之辨證方向，因吸菸所導致之胃炎，以下列何者最為少見？
(A)胃陰虛 (B)胃熱 (C)肝鬱氣滯 (D)脾氣虛
- 17 56 歲男性患者，主訴便下黏液臭穢，夾有膿血，肛門灼熱，口乾口苦，舌紅苔黃膩，脈數，治以下列何方最適宜？
(A)白頭翁湯 (B)痛瀉要方 (C)藿香正氣散 (D)龍膽瀉肝湯
- 18 34 歲黃小姐因近日感悶悶不樂，胸脇悶脹就診，平時個性求完美性子急，發現胃酸逆流，口苦口乾。診其舌紅苔黃，脈弦數，診斷以下列何者最適合？
(A)胃陰虛 (B)肝鬱氣滯 (C)肝腎陰虛 (D)肝火犯胃
- 19 42 歲女性患者，主訴黃疸，頭重身困，胸脘痞滿，食慾減退，噁心嘔吐，腹脹便溏。診其舌苔厚膩微黃，脈弦滑。最宜以下列何方治療？
(A)藿香正氣散 (B)茵陳五苓散 (C)甘露消毒丹 (D)茵陳朮附湯
- 20 肝炎患者，若出現脇肋刺痛，最宜加入下列何藥治療？
(A)川棟子、延胡索 (B)蒲黃、五靈脂 (C)柴胡、香附 (D)乾薑、附子
- 21 有關「水腫」的預後，下列何者非難治之徵？
(A)缺盆平 (B)肚臍腫滿 (C)少尿 (D)足下平滿

- 22 22 歲女性，主訴突發頻尿量少、尿急、小便困難、解尿疼痛等症狀，尿色黃，下腹悶痛，下背脹痛，反覆惡寒高熱，口渴欲飲冷水，口苦，便秘，脈數，舌紅苔白，尿液檢查 WBC:100/HPF。治以下列何方最適合？
- (A)小薊飲子 (B)八正散 (C)知柏八味丸 (D)五皮飲
- 23 遺精因「火強久曠，夢而後遺」引起者，下列何方治療最適宜？
- (A)龍骨遠志丸 (B)知柏地黃丸 (C)右歸丸 (D)補中益氣湯
- 24 尿毒症屬關格者，下列衛教及護理何者錯誤？
- (A)避免居住濕地，飲食不節，勞倦過度 (B)給予高熱量、低脂肪、高蛋白的飲食
(C)皮膚發癢者，不能用肥皂和酒精 (D)注意冷熱，預防感冒
- 25 有關痹證及關節炎的敘述，下列何者錯誤？
- (A)痛風（Gout）是最常見的急性單一性關節炎之一
(B)退化性關節炎（OA），常好發於下肢的大關節
(C)關節周圍及肌肉或肌腱附著點疼痛發炎，並不屬於中醫痹證的範圍
(D)病史、理學檢查、實驗室檢查皆有助於臨床診斷之確立
- 26 下列何者屬「五痹」中之筋痹？
- (A)肢寒 (B)血凝而不流 (C)重著 (D)屈而不伸
- 27 中醫認為僵直性脊椎炎病變過程中的基本病理要素，下列何者正確？①腎虛 ②熱 ③毒 ④痰 ⑤瘀
- (A)僅①②③ (B)僅①④⑤ (C)僅②③④⑤ (D)①②③④⑤
- 28 30 歲王小姐因紅斑性狼瘡就診，近來發現周身關節紅腫熱痛，兩膝為甚，心煩易躁，小便色深，大便不易解，舌質紅暗有紫斑，苔黃燥，脈滑數，診斷以下列何者最適宜？
- (A)熱痹 (B)行痹 (C)寒痹 (D)著痹
- 29 承上題，該患者經自行在外服藥後，出現神昏譫語、四肢抽搐、高熱、煩躁、舌質紅絳等情形，此時應治以下列何方最適宜？
- (A)清瘟敗毒飲 (B)黃連解毒湯 (C)荊防敗毒散 (D)甘露消毒丹
- 30 甲狀腺機能亢進易出現心悸、失眠、緊張、煩躁等症，此與下列何臟最有關係？
- (A)脾腎 (B)心肝 (C)肝脾 (D)心肺
- 31 下消的病因錯綜複雜，從中醫的觀點，下列敘述何者正確？①過度飲食肥美和甘味食物 ②飲酒過度 ③勞神縱欲過度 ④藥物不良反應
- (A)僅①③ (B)僅②④ (C)僅①②④ (D)①②③④
- 32 50 歲李男科技業高級主管，工作壓力大，近日煩躁口渴，體重減 10 公斤，西醫診斷為糖尿病，症見心悸怔忡，失眠，溲赤，唇紅，身體潮熱，脈細數。下列何方治療最適宜？
- (A)天麻鉤藤飲 (B)六味地黃丸 (C)清心蓮子飲 (D)黃連阿膠雞子黃湯

- 33 朱女年方 18 歲，患消渴病，每夜需大飲十多次，每飲且兩大杯，小便之多亦如是。大便不行，時方炎夏，需灌腸方下，怕熱，身倦，脈數、舌紅，治以下列何方最適宜？
(A)六味地黃丸 (B)白虎加人參湯 (C)甘露飲 (D)調胃承氣湯
- 34 50 歲男性患者，糖尿病已 5 年，近日身熱，多汗，心胸煩悶，反胃，口乾喜飲，虛煩不寐，脈虛數，舌紅少苔，治以下列何方最適宜？
(A)天王補心丹 (B)竹葉石膏湯 (C)一貫煎 (D)白虎加人參湯
- 35 癭病頸前腫塊瀰漫對稱，光滑柔軟，胸悶善太息，胸脇竅痛者，治以下列何方最適宜？
(A)海藻玉壺湯 (B)加味逍遙散 (C)柴胡疏肝湯 (D)四海疏鬱丸
- 36 汪小姐因頸部腫脹感前來求診，病灶腫塊瀰漫對稱、光滑柔軟，沒有結節，且可隨吞嚥動作而上下移動。患者平素情緒抑鬱，常覺胸脇悶痛，並無煩熱、易怒、多汗、心悸、眼突、手指顫抖等症狀。診斷以下列何證型最適合？
(A)心肝陰虛 (B)肝火亢盛 (C)痰結血瘀 (D)氣鬱痰阻
- 37 63 歲男性患者於今天早上在廁所突然昏倒，不省人事，四診可見牙關緊閉，口噤不開，舌謇語澀，兩手握固，大小便閉，肢體僵硬，面白唇暗，四肢不溫，咽有痰涎上壅，舌苔白膩，脈象沉滑緩。治以下列何方最適宜？
(A)三生飲 (B)安宮牛黃丸 (C)參附湯 (D)局方至寶丹
- 38 下列有關癰瘤之治療，何者錯誤？
(A)癰症初發，多為陽癰，治以熄風滌痰瀉火為主
(B)陰癰不宜以開竅定癰
(C)可加入全蠍、蜈蚣，以熄風解痙
(D)痰濁盛者，可加菖蒲、遠志以開竅化痰止癰
- 39 《難經》曾提出老人失眠最主要原因為下列何者？
(A)思慮過傷，心神不寧 (B)氣血衰，榮衛之道澀
(C)飲食不節，食積痰熱 (D)膽涎沃心，神不歸舍
- 40 楊小姐常患眩暈，症見頭重如裹，胸悶噁心，食少多寐，舌苔白膩，脈濡緩，治以下列何方最適合？
(A)歸脾湯 (B)天麻鉤藤飲 (C)左歸丸 (D)半夏白朮天麻湯
- 41 45 歲女性患者，主訴失眠近 1 個月，其症狀有頭重目眩，痰多胸悶，惡食噯氣，吞酸噁心，心煩口苦，苔黃膩，脈滑數。診斷以下列何者最適合？
(A)肝鬱化火 (B)痰熱內擾 (C)陰虛火旺 (D)心脾兩虛
- 42 承上題，治以下列何方最適合？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)黃連溫膽湯 (C)黃連阿膠湯 (D)歸脾湯
- 43 下列有關急性白血病的敘述，何者錯誤？
(A)常見貧血，3 天以上的高燒不退，40%病人出現皮膚紫癜、點狀出血、或牙齦出血不止、全身倦怠
(B)緩解期多見熱毒亢盛證候
(C)氣虛引起的出血多見雙下肢瘀斑、瘀點、月經過多
(D)體檢時可見淋巴結、肝脾腫大及胸骨壓痛

- 44 58 歲張女士，是努力的媽媽，要照顧家庭又要外出工作。近來容易疲勞，經過睡眠亦不見變好，身體變瘦，胃口變差，常會有心悸、健忘、短氣、不畏寒，面上多有萎黃有色斑產生，脈細弱。診以下列何證型最適合？
- (A)心陰虛，肝血不足，脾胃陰虛 (B)心氣虛，心血不足，脾氣虛
(C)心陰陽兩虛，脾陰虛，腎精不足 (D)心陽虛不足，肝腎陰虛，脾氣耗虧
- 45 通常約有 3 成的癌症患者會有身心俱疲的中重度疲憊感，參與社會的活力及意願降低，身體上會有四肢無力，健忘、無法專注等情況發生，若患者合併了腸鳴，腹痛，便溏，畏寒，肢冷，筋脈攣急，呼吸短促等症狀。病機以下列何者最適宜？
- (A)脾陽虧虛，中焦虛寒 (B)肺氣虧虛，表衛不固
(C)心血虧虛，血不養心 (D)腎陰虧虛，髓海不足
- 46 右側乳房惡性腫瘤（臨床分期：T2N3M0、Stage III C、病理分期：T2N2M0、Stage III A）2013/12/XX 開刀（右側乳房並部分腋下淋巴摘除），2014/2/XX 第 1 次化療。化療後出現明顯面色㿗白，精神頹廢，噁心嘔吐，胃區悶脹，腹瀉便溏，食慾減退等症狀。以下列何方治療最適宜？
- (A)吳茱萸湯 (B)藿香正氣散 (C)參苓白朮散 (D)人參養榮湯
- 47 56 歲胃癌病患，長年胃脘隱痛，綿綿不斷，食生冷則痛，得熱食則緩，時嘔清水，大便溏泊，面色㿗白，神疲肢冷，舌淡胖，有齒痕，苔白水滑，脈沉細或沉緩。診以下列何證型最適合？
- (A)痰濕阻胃 (B)脾胃虛寒 (C)氣血兩虛 (D)脾腎陽虛
- 48 承上題，治以下列何方最適宜？
- (A)二陳湯 (B)保和丸 (C)參苓白朮散 (D)理中湯
- 49 33 歲女性月經先期，色淡量多，質清稀，少腹有下墜感，脈細軟無力，治以下列何方最適宜？
- (A)先期湯《證治準繩》 (B)芩連四物湯《醫宗金鑑》
(C)兩地湯《傅青主女科》 (D)聖愈湯《蘭室秘藏》
- 50 42 歲女性，語音低微，氣短懶言，自訴月經量多數年，每次經行時間都超過 14 天，經色淡而質清稀如水，近日測得血色素為 7.2 g/dL，CA-125 為 13.4 U/mL，舌質淡，苔薄白，脈虛弱。下列關於此病患的證候分析以何者最適宜？
- (A)氣虛失攝，衝任不固 (B)肝腎陰虛，帶脈不固
(C)肺腎陰虛，虛火上炎 (D)血熱妄行，氣機不暢
- 51 承上題，治療此病患的處方，以下列何者最適宜？
- (A)固經丸《婦人良方》 (B)補中益氣湯《脾胃論》
(C)順經湯《傅青主女科》 (D)逍遙散《太平惠民和劑局方》
- 52 依《醫宗金鑑·婦科心法》，治療「經來發熱有表邪證者」，下列何者正確？
- (A)六神湯 (B)柴胡桂枝湯 (C)桂枝四物湯 (D)玉屏風散

- 53 33 歲女性，經期頭痛，頭暈，心悸少寐，身倦，舌淡苔薄，脈虛細，經血無塊，下列敘述何者最恰當？
(A)易併見煩躁易怒與口乾，但不會巔頂頭痛
(B)其頭痛，應為頭痛如刺，痛有定處，宜杞菊地黃丸治療
(C)病機為肝鬱氣滯與氣鬱化火，肝氣上逆
(D)若經量偏少，治療可用八珍湯加減
- 54 加味逍遙散普遍用於治療婦科疾病，下列何者不符其方義？
(A)月經先後不定期之肝氣鬱結證
(B)經前乳脹之肝鬱氣滯證
(C)經閉之肝腎陰虛證
(D)更年期綜合徵之脾虛肝旺證
- 55 閉經的治療原則為虛者補而通之，實者瀉而通之，虛實不可不分，下列何者不屬「實者瀉而通之」？
(A)化痰除濕
(B)活血化瘀
(C)補益肝腎
(D)理氣行滯
- 56 下列有關「不孕症」的歷代文獻，何者錯誤？
(A)薛己《校注婦人良方》：「當審男女之尺脈，若左尺俱微細，或虛大無力者，用八味丸；右尺洪大，按之無力者，用六味丸」
(B)武之望《濟陰綱目》：「論求子須知先天之氣，男以補腎為要，女以調經為先」
(C)武之望《濟陰綱目》：「論求子必知絪縕之時」
(D)吳謙《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：「大補丸，治婦人瘦弱，多由血少不能受孕，宜常服此方」
- 57 有關治療「帶下」之方劑的敘述，下列何者錯誤？
(A)完帶湯中用柴胡疏肝及黑荊芥祛風勝濕
(B)龍膽瀉肝湯中用生地及當歸滋陰養血
(C)易黃湯中用土茯苓清下焦濕熱
(D)清白散中用黃柏清下焦濕熱
- 58 李小姐每逢月經來潮前 2~3 天即出現外陰搔癢難耐，夜寐尤甚，並伴隨易怒、胸悶、乳脹、難入眠，望其舌紅苔黃，診其脈細弦，依其四診表現下列何者最適宜？
(A)肝腎陰虛
(B)心肝鬱熱
(C)濕熱下注
(D)血瘀下焦
- 59 30 歲女性懷孕 8 週，頭暈，噁心，食不下，身倦已 2 週，脈緩滑無力。下列何方治療最適宜？
(A)香砂六君子湯
(B)藿香正氣散
(C)平胃散
(D)二陳湯
- 60 據《沈氏女科輯要箋正》的說法，下列何者不是造成「子煩」的主要病機？
(A)痰
(B)火
(C)陰虧
(D)氣虛
- 61 在診斷產後疾病時，除運用四診八綱外，古人有所謂的「三審」之法，下列何者不包括在內？
(A)審少腹痛與不痛
(B)審大便通與不通
(C)審乳汁行與不行，與飲食之多少
(D)審小便利與不利
- 62 關於乳病之敘述，下列何者錯誤？
(A)患者產後哺乳 2 週後斷奶，導致乳汁蓄積，乳房脹大，硬結疼痛拒按，皮膚微紅稍熱，身有寒熱，口渴煩躁，溺黃便結，舌紅苔黃，脈弦數，治宜通乳丹《傳青主女科》
(B)患者產後哺乳導致乳頭破損，加上護理不潔，乳房腫塊逐漸增大，高熱、疼痛持續十餘天不減，有持續性搏動性疼痛，察其舌脈見舌質紅，苔黃，脈弦數，治宜托裡消毒散《外科正宗》
(C)患者懷孕 8 個月時，患乳結塊腫痛，乳房腫痛，皮色不變，7 日後患部皮膚逐漸轉紅，形寒發熱，頭痛，舌紅苔黃，脈弦滑數，治宜逍遙散加蘇梗、蒲公英、全瓜蒌
(D)《瘍醫心得錄》指出：「乳中結核，形如丸卵，不疼痛，不發寒熱，皮色不變，其核隨喜怒為消長，此名乳癖」

- 63 下列何者並非《傳青主女科》通乳丹的組成藥物？
(A)黃耆 (B)桔梗 (C)柴胡 (D)麥冬
- 64 熟地、人參（黨參）、白朮、黃耆、當歸、炮薑組成之方出自《傳青主女科》，其名為何？
(A)清經止血湯 (B)固本止崩湯 (C)固陰煎 (D)定經湯
- 65 下列何者提出「肝常有餘、脾常不足、心常有餘、肺常不足、腎常虛」的觀點？
(A)錢乙 (B)萬全 (C)徐謙 (D)曾世榮
- 66 有關小兒感冒的敘述，下列何者錯誤？
(A)氣候變化及冬春兩季發病率較高 (B)神氣怯弱，感邪之後，可能有感冒夾驚
(C)常見夾痧、夾痰、夾驚等兼證 (D)感冒夾驚，又稱傷風發搐
- 67 某 5 歲患者，症見咳嗽，痰少而黏，不易咯出，口渴咽乾，喉癢聲嘶，手足心熱，午後潮熱，舌紅少苔，脈細數。以下列何者治療最適宜？
(A)桑葉、杏仁、麥冬、石膏、人參、阿膠、胡麻、枇杷葉、甘草
(B)桑葉、杏仁、沙參、貝母、豆豉、梔子、梨皮
(C)麥冬、半夏、人參、粳米、大棗、甘草
(D)沙參、甘草、玉竹、桑葉、麥冬、扁豆、天花粉
- 68 關於燥痰，根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，下列敘述何者錯誤？
(A)輕者用枳桔二陳湯
(B)重者用蘇葶滾痰丸
(C)痰因火動
(D)症見痰多燥黏，氣逆喘咳，夜臥不寧，面赤口乾，小便黃赤
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，有關疳證的敘述「面黃肌消瘦，身熱暍倦喜睡眠，心下痞硬滿腫脹，臥冷食泥腹痛堅，頭大頸細食懶進，吐瀉煩渴便腥黏」歸屬於下列何種疳證？
(A)肝疳 (B)心疳 (C)脾疳 (D)肺疳
- 70 有關夏季熱的敘述，下列何者正確？①多見於 3 歲以上的小兒 ②發病季節多集中在 6、7、8 三個月 ③臨床以長期發熱、多尿、汗閉為特徵 ④又有「陽明經熱」、「暑熱證」等別名
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 71 徐小弟，今年 8 歲，家屬發現他小便黃赤短少挾血尿已 5 日，身體稍有浮腫，舌質紅苔黃，脈偏數，關於證型下列何者正確？
(A)風水相搏 (B)濕熱內侵 (C)脾腎兩虛 (D)水毒內閉
- 72 關於小兒常見傳染病的敘述，下列何者錯誤？
(A)流行性感冒的潛伏期最短，僅數小時至 4 日 (B)流行性腮腺炎隔離時間必須等到腺腫消失為止
(C)水痘隔離時間必須等到退燒後 (D)流行性乙型腦炎的傳染途徑是蚊子叮咬

- 73 疫毒痢在病程發展過程中，如表現為毒邪內閉之證，其治則下列何者正確？①開 ②泄 ③清 ④固
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 74 關於小兒衄血，根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，下列敘述何者錯誤？
(A)傷寒失汗衄血，其身無汗，宜以麻黃湯汗之
(B)傷寒失汗衄血，其身有汗，宜以桂枝湯解之
(C)內熱而衄血者，宜以桃仁承氣湯清之
(D)熱盛者，四物三黃瀉心湯瀉之
- 75 8 歲沈小弟弟，咽痛後，皮膚下肢出現瘀點、瘀斑，壓之不褪色，斑色紅赤，伴有腹痛，口渴，汗出，舌質紅少津苔白，檢查有血尿，體溫 39℃，心跳每分鐘跳 100 次。治以下列何者最適宜？
(A)石膏、知母、甘草、水牛角、粳米、玄參
(B)麻黃、石膏、杏仁、甘草、細茶
(C)銀花、連翹、豆豉、牛蒡子、荊芥、薄荷、桔梗、蘆根、竹葉、甘草
(D)竹葉、石膏、半夏、麥門冬、人參、甘草、粳米
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》瀉證門，臍寒瀉，臨床上呈現「糞色青白腹痛鳴」，以下列何法何方治療？
(A)先用和氣飲溫散之；再以調中湯溫補之 (B)先用藿香正氣散溫散之；再以調中湯溫補之
(C)先用和氣飲溫散之；再以理中湯溫補之 (D)先用藿香正氣散溫散之；再以理中湯溫補之
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，麻疹引起衄血，外用以下列何方治療最適宜？
(A)髮灰散 (B)兒茶散 (C)白茅根散 (D)燕脂膏
- 78 2 歲小男童因成長遲緩來中醫兒科就診，經診察發現其頭項軟弱傾斜，不能抬舉，口軟唇弛，咀嚼乏力，常有流涎，手軟下垂，不能握舉，足軟弛緩，不能站立，肌肉鬆弛，活動無力，唇淡苔少，治以下列何方最適宜？
(A)六味地黃丸合補中益氣湯 (B)補腎地黃丸合補中益氣湯
(C)補腎地黃丸合參苓白朮散 (D)六味地黃丸合參苓白朮散
- 79 兒童特發性血小板低下紫斑症 (idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)是兒童最常見的血小板缺乏症，好發於 1~4 歲的兒童
(B)通常發病前的 1~4 週曾遭病毒感染
(C)病症為突然出現皮下出血點、紫斑、瘀血
(D)病程通常在 6 個月以上
- 80 有關腦性麻痺 (Cerebral palsy) 的症狀，下列何者錯誤？
(A)所有類型的腦性麻痺會有運動功能失常的症狀
(B)手足徐動型腦性麻痺與核黃疸有關
(C)最常見的是運動失調型腦性麻痺
(D)運動失調型腦性麻痺是因肌感覺病變或小腦病變而出現步態不穩的症狀