

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

1 中醫外科之辨痛中，若患部痛無定處，忽彼忽此，走勢甚速，甚則刺痛，此屬下列何者？

- (A)膿痛 (B)虛痛 (C)氣痛 (D)風痛

2 下列有關中醫外科善、惡、順、逆證的敘述，何者錯誤？

- (A)初起漫腫，核不動，及成頂平或陷，瘡大而深為善證
(B)瘡色紅，瘡外色華，潰後肉色紅活，似見新肉為善證
(C)潰後膿稠色鮮不臭，腐肉易脫，腫勢漸消，身輕痛減為順證
(D)初起患部頂平根散，色暗微腫，不熱不痛，身體倦怠為逆證

3 下列何者不是清代的外科著作？

- (A)顧世澄的《瘍醫大全》 (B)高錦庭的《瘍科心得集》
(C)王洪緒的《全生集》 (D)陳實功的《外科正宗》

4 下列有關腫瘍治療的敘述，何者錯誤？

- (A)惡寒畏風，舌淡白無華，適合溫養治療
(B)濕痰盛，舌多白膩或厚膩，舌光邊不紅絳，適合溫養治療
(C)附骨疽初宜清熱治療
(D)年高病人，患如腦疽、背疽而局部雖紅腫發熱，亦可用溫托法治療

5 下列有關人中疔之敘述，何者錯誤？

- (A)又名龍泉疔 (B)生於上唇溝中，屬任脈
(C)此疔易毒散，能劇變 (D)此處忌針

6 舌疳之起因，皆由下列何經毒火上升，結於舌部而生？

- (A)心腎 (B)心肝 (C)心肺 (D)心脾

7 牙癰生於牙床堅腫疼痛，身發寒熱，腮頰浮腫，初起最宜服下列何方治療？

- (A)荊防敗毒散 (B)珍珠散 (C)雙解貴金丸 (D)冰硼散

8 大小腸癰似現代醫學的何病？

- (A)膀胱炎 (B)急性腸胃炎 (C)急性闌尾炎 (D)胃穿孔

9 關於下搭手的敘述，下列何者正確？

- (A)屬膀胱經三焦俞穴
(B)由肝陰不足，肝火旺以致營衛失和所生
(C)若氣血虛，瘡不能發長者，宜一粒金丹溫下之
(D)如初起身熱往來，口渴煩躁，骨節疼痛，瘡高紅腫者，宜仙方活命飲宣解毒火

- 10 下列何者不是發生於局部的疾患？
(A)乾疽 (B)肩中疽 (C)過肩疽 (D)石榴疽
- 11 患者初起膝中疼痛，數日後腿足不能屈伸，膝部周圍皆腫，伴有惡寒發熱。繼而皮色微紅，焮熱光亮，腿形漸覺瘦削。最可能的診斷為下列何者？
(A)骨槽風 (B)鶴膝風 (C)漏底風 (D)四彎風
- 12 一名中年男子，平素喜浴熱湯，近來陰囊乾燥癢極，起疙瘩，形如赤粟麻癢，搔破後浸淫脂水，皮熱痛如火燎，此患者最可能的診斷為下列何者？
(A)鵝掌風 (B)漏底風 (C)腎囊癰 (D)繡毬風
- 13 承上題，最可能的起因為下列何者？
(A)脾肺燥熱兼表虛 (B)肝經濕熱，風邪外襲皮裏
(C)楊梅餘毒未盡，又兼血燥 (D)心肺二經火毒結聚而生
- 14 有關桃花癬的敘述，下列何者正確？
(A)全身皆可患 (B)多發於夏月
(C)初如癰疹，或漸成細瘡，時作痛癢 (D)大都由傳染而生
- 15 關於白禿瘡的病因，歸屬於下列那一大類？
(A)瘡毒 (B)風毒 (C)濕毒 (D)中毒
- 16 蛇串瘡累累珠形，色紅赤，形如雲片，上起風粟，作癢發熱，最宜下列何方治之？
(A)消核散 (B)消風散 (C)防風湯 (D)龍膽瀉肝湯
- 17 疳瘡初起，陽物癢痛堅硬，漸生疙瘩，色紫腐爛，血水淋漓，不時興舉，最宜下列何方治之？
(A)柴胡疏肝湯 (B)黃連解毒湯 (C)五淋散 (D)知柏地黃丸
- 18 下列有關瘰癧之敘述，何者錯誤？
(A)生於項前者屬太陽經主濕 (B)多生於耳前、耳後及項間
(C)亦有延至前胸腋下等處 (D)生於左右兩旁者屬少陽經主氣
- 19 70 歲男性，一年來經常自傍晚起就皮膚發癢，皮損鮮紅灼熱劇癢（如附圖），白日則較無症狀，下列那一種疾病診斷較為正確？




- (A)風疹 (B)紫癰風 (C)血風瘡 (D)赤遊丹毒

- 20 寒邪入絡，在腿股與環跳穴附近形成的「流注」，其治則宜溫經通絡，解散寒凝。處方以下列何者最恰當？
(A)人參敗毒散 (B)陽和湯 (C)復元活血湯 (D)通經導滯湯
- 21 八段錦練功法有個招式，叫做五勞七傷往後瞧，對於五勞的敘述，下列何者正確？①久視傷血 ②久臥傷氣 ③久坐傷筋 ④久立傷骨 ⑤久行傷肉
(A)①②⑤ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 22 關於俗稱錘狀指之敘述，下列何者錯誤？
(A)多為外傷造成，傷後疼痛、腫脹明顯
(B)乃伸指肌腱斷裂，可見遠端指間關節不能伸直
(C)臨床上可見末節指骨撕脫性骨折
(D)治療時遠端指間關節應以屈曲位固定
- 23 有關肱骨外上髁炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)肱骨外上髁部多不紅腫，較重時局部可有微熱、壓痛明顯，病程長者偶有肌萎縮
(B)當作抗阻力的腕關節屈腕時，可引起患處疼痛
(C)多因長期勞累，伸腕肌起點反覆受到牽拉刺激，引起部分撕裂和慢性炎症，或局部的滑膜增厚、滑囊炎等變化
(D)偶感肘外側疼痛，壓痛明顯，提熱水瓶、扭毛巾、甚至掃地等動作均感疼痛乏力，疼痛甚至可向上臂及前臂放散
- 24 下列有關肩部扭挫傷之敘述，何者錯誤？
(A)臨床表現可見瘀腫、疼痛、功能障礙 (B)肩關節結構不穩，制動時間宜長
(C)肩部挫傷多發生在肩部上方及外側方 (D)肩部扭傷多發生於肌腱韌帶等的起止點
- 25 關於扁平足的敘述，下列何者錯誤？
(A)扁平足是指足弓扁平、彈性消失引起的足痛，包括先天性及後天性扁平足
(B)為了行走和吸收震盪，足形成內、外兩個橫弓和一個縱弓。足弓由足骨、韌帶及肌肉維持
(C)疲勞或慢行勞損可以造成後天性扁平足，患者多為發育尚未完全的青少年，如長期站立、負重過多、過胖、久病臥床而起床行走過多，可引起足部韌帶的勞損，足內、外在肌萎縮，繼之使內側縱弓降落
(D)最常見的是內側三角韌帶和跟舟韌帶勞損，若過度牽拉後可以變長，使跟骨載距突與舟狀骨間的距離變寬，導致距骨頭下降，足內緣突起，引起足部疼痛
- 26 關於膝關節十字韌帶之敘述，下列何者正確？
(A)後十字韌帶的損傷多於前十字韌帶
(B)膝受外翻外力引起內側副韌帶斷裂可能合併後十字韌帶斷裂
(C)屈膝脛骨被猛力往後推時可能造成前十字韌帶的損傷
(D)十字韌帶損傷臨床症狀，常有明顯外傷史，傷後關節立即有錯動感，關節呈半屈曲狀態
- 27 30 歲男性運動訓練強度大，因膝關節疼痛就醫，檢查發現右膝關節 Apley 氏壓迫（研磨）測驗陰性，但是 Apley 氏拉離測驗陽性。此結果最有可能為何者結構損傷？
(A)半月板 (B)側副韌帶 (C)十字韌帶 (D)髕韌帶

28 依《傷科大成》之引經藥，下列何藥物適合用於手臂損傷？

- (A)桂枝 (B)五加皮 (C)桑枝 (D)木瓜

29 有關氣胸分類，依圖所示應是何種氣胸？



- (A)血氣胸 (B)張力性氣胸 (C)單純氣胸 (D)開放性氣胸

30 半月板損傷的鑑別診斷，以下列何種測驗最適當？

- (A)McMurray 氏測驗（迴旋擠壓測驗） (B)Apley 氏拉離測驗
(C)髕骨股骨研磨測驗 (D)浮髕測驗

31 下列何者不是參與膝關節伸展運動之主要肌肉？

- (A)股直肌 (B)股內側肌 (C)股外側肌 (D)縫匠肌

32 有關下肢傷筋骨病，下列組合何者錯誤？

- (A)Osgood Schlatter 氏病－脛骨粗隆骨骺炎
(B)Sever 氏病－跟骨骨骺炎
(C)外踝最強韌帶－後距腓韌帶（Posterior Talofibular ligament）
(D)足部最有力之背屈肌（Dorsiflexors）－脛骨後肌（Tibialis posterior）

33 下列何種動作最容易引發肱骨外上髁炎惡化？

- (A)排球托球 (B)搶籃板球 (C)打羽球反手吊球 (D)高爾夫發球

34 下列何穴位距離奧斯古德氏病（Osgood Schlatter's disease）的病灶處最近？

- (A)內關 (B)足三里 (C)三陰交 (D)手三里

35 某患者因意外致肘挫傷，診察發現為肱骨中段骨折，整復固定後，患者抱怨手掌無法背伸而處於屈曲位，下列何者為最可能原因？

- (A)尺神經損傷 (B)橈神經損傷 (C)腋神經損傷 (D)正中神經損傷

36 有關頸部疼痛的敘述，下列何者正確？①車禍造成頸部伸展傷害，大部分可在頸部 X 光片發現頸椎排列異常 ②落枕常與手臂麻痛等症狀有關連 ③姿勢性頸部疼痛常與職業有關 ④急性頸部扭傷多見於青少年

- (A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

37 生脈散適用於下列損傷血虛中的那一種證型？

- (A)傷後脾胃虛弱，胃納不佳，飲食減少者
(B)血虛氣亦虛，精血虧損者
(C)氣虛血脫，脈微欲絕之證
(D)血虛生熱，陰虛陽浮，虛火妄動，骨蒸潮熱，日晡發熱，盜汗，面紅耳鳴，多夢等

38 根據《醫宗金鑑·正骨心法》傷損之證，因榮衛氣滯所致，將導致下列何種疼痛？


- (A)骨傷作痛 (B)胸腹痛悶 (C)瘀血作痛 (D)肌肉作痛

- 39 一位中年婦女，騎機車買菜的路上發生車禍，從機車跌下時，手掌過度伸展撐地，至醫院就診時，患者於解剖鼻咽壺（Anatomical snuffbox）處壓痛伴有腫脹，腕部 X 光檢查有骨折現象，依 X 光所示，為下列何骨折？



- (A)大多角骨（Trapezium bone） (B)小多角骨（Trapezoid bone）
(C)舟狀骨（Scaphoid bone） (D)月狀骨（Lunate bone）
- 40 凡損傷以後，血液離經妄行，屬熱、屬實者居多，法當涼血止血。下列常用方劑及主治何者錯誤？
(A)犀角地黃湯：上部諸竅出血 (B)四生丸：肺、胃傷後之吐血、咯血
(C)槐花散：腸道出血 (D)小薊飲子：眼目出血
- 41 損傷之後頭目眩暈，若因服剋伐之劑太過，中氣受傷，以致眩暈，兼有腹脹嘔吐者，依《正骨心法要旨》記載，應治以下列何方？
(A)保和丸 (B)六君子湯 (C)參苓白朮散 (D)加味歸脾湯
- 42 暴力撞擊擠壓或用力負重所致之胸脇部損傷，均可造成胸脇蓄血，應治以疏肝理氣，活血化瘀之法，下列何者為常用方劑？
(A)血府逐瘀湯 (B)柴胡清肝湯
(C)抑肝散 (D)柴胡加龍骨牡蠣湯
- 43 依《醫宗金鑑·正骨心法》傷損腰痛脊痛之證，瘀血留於太陽經中，應治以下列何方？
(A)復元活血湯 (B)沒藥丸 (C)復元通氣散 (D)地龍散
- 44 根據《醫宗金鑑·正骨心法》凡跌打損傷，墜墮之證，惡血留內，則不分何經，皆以何臟為主？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 45 王小弟打籃球造成踝腫痛，脹而重墜，皮色青黑，發熱口渴出汗，醫者先刺去惡血，後給四物湯調理，依《正骨心法要旨》之分類，其證型為何？
(A)傷損出血 (B)瘀血泛注 (C)血虛作痛 (D)瘀血作痛
- 46 有關傷後癰閉之敘述，下列何者正確？
(A)健康成人每天排尿量約在 500~1000 ml 之間
(B)血虛腸燥為傷後癰閉的病因之一
(C)骨盆骨折合併膀胱破裂、尿道破裂後，可造成癰閉
(D)癰閉的主要表現為神昏氣閉
- 47 依《靈樞·邪氣藏府病形》篇中提到，「有所墜墜，惡血留內，若有所大怒，氣上而不下，積於脇下」，則傷下列何臟腑？
(A)肝 (B)心 (C)肺 (D)腎
- 48 兩骨折面因旋轉移位而反疊，即有背向移位的斜形骨折，單用拔伸手法難以復位，應施用下列何手法復位？
(A)折頂手法 (B)搖擺觸碰 (C)夾擠分骨 (D)回旋手法

49 如圖所示，下列為何種脫位整復手法？



- (A)拔伸托入法 (B)臥位槓桿整復法 (C)膝頂推拉法 (D)拔伸足蹬法
- 50 下列何者為肩關節脫位，可能伴有的神經損傷？
(A)橈神經 (B)正中神經 (C)尺神經 (D)腋神經
- 51 下列何部位之骨折最易發生損傷性骨化（骨化性肌炎 *myositis ossificans*）？
(A)肘關節 (B)腕關節 (C)肋骨 (D)脊椎
- 52 關於脛骨幹骨折、腓骨幹骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)間接或傳導暴力造成的脛骨幹骨折，骨折線多在中、下 1/3 交界處
(B)脛骨幹骨折，若骨折段重疊較大，則腓骨多發生彎曲或腓骨頭向上脫位
(C)腓骨疲勞骨折，多見於腓骨頭、頸部位
(D)脛骨幹骨折在 10 歲以下兒童，可發生青枝骨折或裂紋骨折
- 53 造成膝關節前脫位，其暴力方向和作用點，下列何者正確？
(A)前方，股骨下段 (B)前方，脛骨上端 (C)後方，股骨下段 (D)後方，脛骨上端
- 54 《傷科彙纂》引《陳氏秘傳》云：「凡頭從高墮下頓縮者，先用消風散或住痛散加麻藥服之，令患人仰臥，用布巾帶兜住下頰直上，又將患人頭髮解散，用巾帶扭作一把，令患人頭放平正，醫者自伸兩足，踏在患人肩上，徐徐用力拔伸歸原。或者患人坐在低處，醫者坐高處，亦用前法，徐徐拔之歸原。」以上敘述為下列何部位的拔伸牽引法？
(A)項骨 (B)背脊骨 (C)玉堂骨 (D)地閣骨
- 55 髖關節後上方脫位，整復後開始功能鍛鍊，尤其要鍛鍊下列那一肌肉？
(A)臀大肌 (B)臀中肌 (C)臀小肌 (D)股四頭肌
- 56 下列何種類型之肱骨外科頸骨折，斷端外側嵌插而內側分離，多向前、內側突起成角？
(A)裂縫骨折 (B)嵌插骨折 (C)內收型骨折 (D)外展型骨折
- 57 下列有關原始骨痂期內服藥物的敘述，何者正確？
(A)以活血祛瘀為主 (B)以接骨續筋為主，以活血祛瘀為佐
(C)以補肝腎、養氣血、壯筋骨為主 (D)以理氣止痛為主
- 58 關於傷科疾患，下列敘述何者正確？
(A)4 歲小兒，上肢受牽拉後疼痛，致肘關節無法屈伸，診為小兒橈骨頭半脫位，X 光檢查常見橈骨頭向上移位畸形
(B)病人臀中肌損傷，以患肢進行 Trendelenburg 氏測驗時，常見骨盆傾斜向患側
(C)顳顎關節脫位，常因過度張口、大笑引起，《傷科大成》及《傷科補要》皆認為「氣虛」是其中病因
(D)肩關節脫位，出現關節盂空虛的症狀，常在肩後方觸診到突出的肱骨頭，以肘關節屈曲，手臂貼及胸壁，手指可觸摸到對側肩部

- 59 17 歲男學生打橄欖球跌倒，致右髕骨骨折。經整復固定後，為避免制動產生之肌肉痠縮，應教導患者作下列何種運動？
(A)米字運動 (B)等張收縮 (C)等長收縮 (D)湯瑪士旋轉
- 60 有關「骨折」之敘述，依《醫宗金鑑·正骨心法》對應於現代解剖學，下列何者正確？
(A)手腕跌仆損傷致「輔骨」遠端骨折，且向掌面位移，形成餐叉樣，應稱 Colles 氏骨折
(B)肘關節損傷腫脹，且病人四、五指屈曲，無法伸展，可以判斷為「橈骨」外上髁損傷
(C)手部損傷致遠端「竹節骨」屈曲下垂無法主動伸展，可能為錘狀指（Mallet finger）
(D)肩部跌仆損傷致「鎖子骨」骨折，外 1/3 部分，因重力和小圓肌附著關係，故向前下方移位
- 61 關於五輪辨證之敘述，下列何者錯誤？
(A)輪屬標，臟屬本。輪有病多由臟腑失調所致
(B)五輪辨證中，臨證時尚需與八綱、病因、氣血津液等理論結合運用
(C)如先發白睛紅赤，繼而出現黑睛星翳，常屬腎虛
(D)瞳神為水輪，病變卻不止於腎，常與其他臟腑失調有關
- 62 關於眼科病因之敘述，下列何者錯誤？
(A)癘氣，來勢急驟具較強傳染性，眼睛疾病者只發生在夏季，如天行赤眼
(B)火為陽邪，其性上炎，易於侵目，外邪易化火，易表現眵多黃稠，紅赤焮熱，腫痛生瘡
(C)燥易傷津，可單獨為害，亦可與他邪相兼侵害人體，導致目乾澀，白睛紅赤，視物不爽
(D)風為陽邪，如客於經絡，可致胞瞼下垂，目偏視
- 63 下列何者將「黃膜上衝」病症名改為「黃液上衝」？
(A)傅仁宇《審視瑤函》 (B)黃庭鏡《目經大成》
(C)顧錫《銀海指南》 (D)孫思邈《銀海精微》
- 64 患者大眦頭皮色如常，自覺隱澀不舒，但無痛感，不時淚下，眦頭常濕，拭之又生，按之則見黏液膿汁自淚竅流出，其診斷及治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)乃因肝血不足，外感風邪所致之迎風冷淚症
(B)此症常為椒瘡的一種合併症，還可能演變成漏睛瘡
(C)內治當以白薇丸加蒲公英治之
(D)患者若眦部稍有隆起，壓之不痛，頭昏眼花，腰膝痠軟者，可加菊花、枸杞子、補骨脂
- 65 關於胞生痰核的敘述，下列何者正確？
(A)眼瞼內隱起硬結，初起外觀不顯，漸長大後，可見皮膚有侷限性隆起，生長緩慢
(B)為肝熱風盛，眼部脹痛
(C)自覺視物昏朦
(D)黑睛混濁，眼底水腫
- 66 有關上胞下垂的敘述，下列何者正確？
(A)命門不足，自幼上胞下垂，視物時仰首，可以右歸飲加減，溫腎陽益化源
(B)氣滯血瘀，視力下降，眼前黑花飛舞
(C)濕熱蘊蒸，視物昏朦，宜以三仁湯加減
(D)虛火傷絡，心煩少寐，舌紅少苔，宜滋陰化痰
- 67 患者白睛及瞼內紅赤，瞼內黃白色顆粒累累，胞腫，眵淚膠結，癢痛難開，其最可能的診斷為何？
(A)金疳 (B)粟瘡 (C)火疳 (D)白睛青藍
- 68 承上題，有關證治之敘述，下列何者正確？
(A)證屬肺陰不足，內治宜養陰清肺湯加減 (B)證屬濕熱兼風，內治宜除風清脾飲加減
(C)證屬虛火上炎，當養陰清肺，兼以散結 (D)證屬濕邪阻絡，內治宜甘露消毒丹，清熱利濕

- 69 黑睛疾病常易造成瞳神乾缺，故外治常用下列何者治療？
(A)八寶眼藥 (B)散瞳劑 (C)退雲散 (D)黃連西瓜霜眼藥水
- 70 對於耳前庭功能檢查之敘述，下列何者錯誤？
(A)瘻管試驗的目的在於檢查水平半規管的骨壁是否病變
(B)檢查時若出現眼球震顫，其慢相乃因為迷路受刺激所產生
(C)前庭病變若無視覺輔助，而有定位紊亂現象產生，稱之為偏過定位
(D)臨床上觀察眼球震顫情形，慢相要較快相易於觀察
- 71 下列那一個朝代成立了太醫署，讓耳目口齒科成為一個獨立的醫學專科？
(A)漢朝 (B)唐朝 (C)宋朝 (D)明朝
- 72 鬆脫骨鯁可用下列何藥加醋徐徐含嚥？
(A)烏賊骨 (B)骨碎補 (C)淫羊藿 (D)威靈仙
- 73 耳耳若有耳道肌膚損傷，紅腫，糜爛，焮痛者，下列何方治療效果最佳？
(A)荊防敗毒散 (B)梔子清肝散 (C)左慈丸 (D)益氣聰明湯
- 74 陳先生眩暈時心下悸動，腰痛背冷，咳嗽咯痰稀白，肢體不溫，頻尿，舌質淡白，脈沉細弱，治以下列何方最宜？
(A)歸脾湯加減 (B)真武湯加減
(C)苓桂朮甘湯加減 (D)半夏白朮天麻湯加減
- 75 鼻疔症狀診斷要點，下列敘述何者錯誤？
(A)鼻疔是侷限性紅腫疼痛
(B)鼻疔形小根緊，堅硬如釘
(C)鼻疔頂會有黃白色小膿點
(D)鼻疔會表現出鼻孔處皮膚潮紅、糜爛、流水、結痂等
- 76 鼻損傷致鼻梁骨折，其內治法則，下列何者錯誤？
(A)內治要把握「血不活則瘀不去，瘀不去則骨不能接」的要點
(B)受傷初期，應活血去瘀，行氣止痛為主，用活血止痛湯加減
(C)受傷中期，應行氣活血，和營生新為主，用正骨紫金丹
(D)受傷後期，應補氣養血，調理心肺為主，用補中益氣湯加減
- 77 某患者咽部乾癢不適，微痛，微癢，乾咳無痰或痰少而黏，哽哽不利，喉核上有黃白色膿點。午後症狀明顯，精神疲乏，講話乏力，舌質紅少苔，脈細數，治宜下列何方？
(A)養陰清肺湯 (B)補中益氣湯 (C)香薷飲 (D)半夏厚朴湯
- 78 咽喉疾病的形成，都具有不同程度的氣滯血瘀，經脈痹阻的病理變化，古人稱「喉痹」最早見於何書？
(A)《喉科心法·單蛾雙蛾》 (B)《素問·陰陽別論》
(C)《諸病源候論》 (D)《雜病源流犀燭》
- 79 患者因牙齒劇烈疼痛，牙齦紅腫，出膿滲血，腮頰腫痛，頭痛，口臭，口渴引飲，大便秘結，舌苔黃厚，脈洪數者。此症狀在臨床上應診斷為下列何種牙痛？
(A)風熱牙痛 (B)虛火牙痛 (C)胃火牙痛 (D)齲齒牙痛
- 80 患者牙齦萎縮顏色淡白，牙根宣露，牙齒鬆動，咀嚼無力，牙齦經常滲血，刷牙及吮吸時易出血，口發酸，畏寒倦怠，頭昏眼花，失眠多夢，胃呆納少，舌質淡，苔薄白，脈沉細，下列有關其證候分析的敘述，何者錯誤？
(A)氣血不足，久之則出現齒齦萎縮 (B)氣虛不攝血，血不循經，故易出血
(C)血虛不能榮於上，則頭昏眼花 (D)心火上炎，則失眠夢多