

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 60 歲男性患者，罹患氣喘病史 30 餘年，平時接受中西藥治療，昨日清晨開始咳嗽，喘鳴發作，胸緊悶，痰稀有泡沫，口乾喜溫飲，脈滑緊，白滑苔、舌質淡紅。治療以下列何方最適宜？
(A)小青龍湯 (B)定喘湯 (C)八味地黃丸 (D)荊防敗毒散
- 2 20 歲患者主訴 3 日前淋雨後，覺得畏寒、頭痛、肢體酸痛、鼻塞、流清涕，無其它過去病史。診其舌質淡紅、苔薄白而潤，脈浮緊。關於此患者感冒之中醫辨證，下列何者正確？
(A)風寒證 (B)風熱證 (C)暑濕證 (D)風燥證
- 3 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)荊防敗毒散 (B)新加香薷飲 (C)清燥救肺湯 (D)桑菊飲
- 4 上呼吸道感染從病程上，由開始到康復會歷經初期、發作期和恢復期；若在急性發作期時，下列何種證型最少見？
(A)寒飲伏肺 (B)氣虛瘀阻 (C)痰濕蘊肺 (D)痰熱鬱肺
- 5 若見 9 月外感之患者，在初起發病時，出現口渴引飲，唇焦咽燥，痰黏難咳，偶帶血絲，脈數，舌紅苔白乾，下列何方治療最宜？
(A)杏蘇散 (B)清燥救肺湯 (C)瀉白散 (D)桑杏湯
- 6 50 歲有氣喘病史許姓患者，咳嗽喘鳴 3 天，來診時患者呼吸氣急，喉中痰鳴，痰色黃，舌乾舌質紅，脈診浮滑數，處以下列何方最適宜？
(A)麻杏石甘湯 (B)銀翹散 (C)射干麻黃湯 (D)定喘湯
- 7 62 歲的勇伯罹患氣喘已超過 10 年，近幾年常反覆發作，兩星期前因外感又誘發氣喘，經過診療後喘咳已緩解，今日勇伯來診，自訴腰痠，神情疲憊，怕冷，四肢冷，口淡，舌診苔薄白，脈診弱脈。下列何方調理最適宜？
(A)右歸丸 (B)六味地黃丸 (C)補中益氣湯 (D)小青龍湯
- 8 咳甚而喘促，若治療須宣肺平喘為主者，宜用下列何藥為主？
(A)麻黃、杏仁 (B)人參、黃耆 (C)葶藶子、桑白皮 (D)五味子、白果
- 9 75 歲男性冠心病患者，主訴自覺心悸怔忡，胸悶氣短，面色不華，伴隨冷汗，舌紅苔少，脈細數且至數不勻。治宜下列何方？
(A)參附湯 (B)天王補心丹 (C)補中益氣湯 (D)炙甘草湯
- 10 有關高血壓病因病機的敘述，下列何者錯誤？
(A)高血壓的致病原因，可從「風、火、痰、瘀、虛」五個方面加以分析
(B)無論實火、虛火，火性炎上的致病特點在高血壓的病理過程中表現明顯，病機關鍵在「心、腦」
(C)內源性的痰，多是由於臟腑功能失調，水穀運化輸佈失常而滋生
(D)「陰虛」主要是腎陰虛，「陽亢」主要是肝陽上亢

- 11 有關心臟衰竭的敘述，下列何者錯誤？
(A)血脈瘀阻是心臟衰竭最常見的證型
(B)端坐呼吸為左心心臟衰竭的常見症狀
(C)心臟衰竭的中醫基本病理為虛、瘀、飲為主
(D)急性心臟衰竭常見心輸出量突然降低、低血壓，而沒有周邊水腫
- 12 胃痛應辨別寒熱、氣血、虛實、緩急，下列有關胃病辨證的敘述何者正確？
(A)痛勢綿綿，喜按，得食痛減，痛處不定，以實證為多
(B)以刺痛為主，痛有定處，夜間加重，為在氣者多
(C)以脹痛為主，疼痛不定，為在血者多
(D)拘急而痛，得溫痛減，苔白，脈弦緊，多為寒證
- 13 82 歲男性患者，主訴長期腹瀉。每日清晨及飯後感到便意，漉瀉一日 4~6 行，解便前有腹脹及攪動感，無腹痛。疲倦頭暈，胸悶少氣，四肢沉重，不渴，食慾不振，少食胃脹，腰膝痠軟，面色淡黃少華，脈沉弱，舌淡紅苔白。下列處方何者最不適宜？
(A)補中益氣湯 (B)理中湯 (C)參苓白朮散 (D)藿香正氣散
- 14 56 歲男性患者因胃炎就診，症見嘔吐反覆發作，但嘔吐量不多，或僅吐唾涎沫，時作乾嘔，口咽乾燥，胃中嘈雜，大便乾燥，舌紅少津，脈細數。治以下列何方最宜？
(A)半夏瀉心湯 (B)橘皮竹茹湯 (C)香砂六君子湯 (D)麥門冬湯
- 15 54 歲林女士腹瀉已多年，症見大便溏、一日多行，尤其早上 5 點多即腹瀉約 2 次，便稀不臭，口不渴，偶而可見大便有未消化食物，腰酸，兼見舌淡、齒痕舌、中根白濕，脈沉遲。治則以下列何者最適合？
(A)祛寒濕 (B)利小便，實大便 (C)芳香化濕 (D)溫補脾腎
- 16 36 歲廖先生，自訴平時腸胃正常，近日因口渴而多喝椰子汁後就噯氣頻作，納呆，脘痞悶痛，時覺口水多又清，苔白滑，淡暗紅舌，脈滑有力。治以下列何方最適合？
(A)安中散 (B)保和丸 (C)半夏瀉心湯 (D)香砂六君子湯
- 17 67 歲男性患者，主訴鼓脹，症見腹大堅滿，脈絡怒張，脅腹刺痛，面頸胸臂有血痣，手掌赤痕，唇色紫褐，大便黑，舌紫黯，脈細澀。治以下列何方最適合？
(A)實脾飲 (B)調營飲
(C)茵陳蒿湯合中滿分消丸 (D)胃苓湯合柴胡疏肝散
- 18 67 歲男性患者罹患肝癌，經常右脅痛以脹痛為主，走竄不定，疼痛每因情志變化而增減，胸悶不舒，飲食減少，噯氣頻作，苔薄白、脈弦，則診斷為下列何證最適宜？
(A)肝鬱脾虛 (B)肝鬱氣滯 (C)膽火上擾 (D)肝膽濕熱
- 19 某 36 歲女性患者，罹患慢性 B 型肝炎 3 年，前日因倦怠無力，至醫院檢查，血液生化檢查顯示 AST:480 IU/L，ALT:862 IU/L，total bilirubin:1.4 mg/dL。症見胃脘悶脹，食納不佳，倦怠，大便稀溏，口不乾，脈濡緩，舌淡紅，苔薄白，治療以下列何方最適宜？
(A)茵陳朮附湯 (B)甘露消毒丹 (C)中滿分消湯 (D)藿香正氣散

- 20 26 歲女性患者有發燒、咽痛等感冒症狀，接下來眼瞼浮腫，繼而迅速四肢及全身皆腫，且肢節酸痛，小便短少，下列敘述何者最適宜？
(A)治當利小便為主 (B)宜以用胃苓湯主之 (C)此證屬風水泛濫 (D)宜以疏鑿飲子主之
- 21 下列有關中醫腎臟的生理及腎病的概念，何者錯誤？
(A)臨床症見遺精、陽痿、不育，此屬腎不藏精的範圍
(B)腎主納氣的功能可能與現代醫學中的酸鹼平衡有關
(C)腎的氣化功能不包含膀胱氣化
(D)中醫腎病的範圍包含現代醫學之腎泌尿系統、代謝、內分泌、生殖、呼吸、消化等系統疾病
- 22 41 歲男性患者近日突發遍體浮腫，皮膚繃急光亮，煩熱，常覺口渴口苦，小便短赤，舌紅，苔黃膩，脈滑數，治以下列何方最適宜？
(A)疏鑿飲子 (B)實脾飲 (C)麻黃連翹赤小豆湯 (D)越婢加朮湯
- 23 70 歲農夫，平時以種稻為生，近幾年覺腰部以下有冷痛感，腰重如裹，下雨天則症加，且四肢關節疼痛，關節僵硬感，苔白滑，脈濡緩，治以下列何方最適合？
(A)甘薑苓朮湯 (B)復元活血湯 (C)六味地黃丸 (D)黑神散
- 24 66 歲患者，抱怨小便點滴不盡，解尿時需久站，解完仍有餘尿，表現出面色白，說話有氣無力，診其脈象為脈沉細而尺弱。辨證以下列何種證型最適合？
(A)肝腎陰虛 (B)脾氣不升 (C)腎陽虛衰 (D)尿道阻塞
- 25 55 歲謝先生最近小便不順，常會點滴不通伴有灼熱感。口苦口黏苔黃膩不欲多飲，沉數脈。診斷以下列何者最適宜？
(A)肺熱壅盛 (B)脾腎氣虛 (C)膀胱濕熱 (D)陰虛火旺
- 26 52 歲女性，因關節漫腫 3 年前來求診，視其僵硬變形，活動屈伸受限，疼痛處固定於周邊關節，每日晨僵持續 1 小時以上，先前檢驗得知 RF(+)，X-ray 顯示指關節多處受損變形，診斷為類風濕病關節炎，二便正常，舌質紫暗苔白膩，脈細澀，應以下列何方為主方？
(A)清瘟敗毒飲 (B)桂枝芍藥知母湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)白虎湯
- 27 免疫缺陷的機轉，於中醫的病因病機敘述，下列何者相關性最低？
(A)毒邪侵襲 (B)後天失養，五臟不堅
(C)肝經虧損 (D)稟賦不足、正氣虛損
- 28 下列何者為紅斑性狼瘡可能出現的表現及中醫病名？①痹證 ②喘證 ③腹痛 ④癲狂 ⑤鬼臉瘡
(A)僅②③⑤ (B)僅①②④ (C)僅①③④⑤ (D)①②③④⑤
- 29 某男性患者經診斷為「僵直性脊椎炎」，其臨床證型表現強硬疼痛，頸項強硬喜溫，舌質淡紅，苔白厚而膩，脈沉緊或弦緊，治以下列何方最適合？
(A)《傷科補要》疏筋活血湯 (B)《醫學發明》當歸拈痛湯
(C)《金匱要略》烏頭湯 (D)《張氏醫通》三痹湯
- 30 有關張仲景《傷寒論》中太陽風濕的辨證及治療，下列何者錯誤？
(A)傷寒八、九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，脈浮虛而澀者，桂枝附子湯主之
(B)風濕相搏，骨節煩疼掣痛，不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣或身微腫者，甘草附子湯主之
(C)桂枝附子湯證為表陽虛而風邪偏勝，風濕相持在表
(D)甘草附子湯證為表裏陽氣皆實，風寒濕邪痹於關節

- 31 40 歲女性患者甲狀腺機能亢進 1 年多，煩躁不安，惡熱多汗，面赤口苦，心悸失眠，手抖，便秘，舌質紅，苔薄黃，脈弦數，治以下列何方最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)加味逍遙散 (C)知柏地黃丸 (D)溫膽湯
- 32 40 歲女性，原發性甲狀腺機能亢進，經服用抗甲狀腺藥物效果不明顯。主訴工作思慮勞心，心悸不寧，容易緊張，坐立不安，近 2~3 個月加重。症見面紅，神情緊張，手足心熱，雙手平伸稍抖動，少寐多夢，頭暈目眩，腰痠耳鳴，進食速度快，食量增加體重卻略微下降，月經稍提前，經血量減，色紅稍暗，舌質紅苔薄黃，脈細數。TSH 數值：0.15 mU/L（正常參考值 0.3~5.5 mU/L），T3 數值：220 ng/dL（正常參考值 60~180 ng/dL）。治以下列何方最適宜？
(A)黃連阿膠湯 (B)加味逍遙散 (C)安神定志丸 (D)黃連溫膽湯
- 33 45 歲柯女糖尿病多年，血糖不穩，煩渴，善飢，身體消瘦，腰酸膝軟，小便頻數量多，怕冷，舌淡紅，苔薄白，脈沉無力。下列敘述何者錯誤？
(A)可加強補腎之品 (B)可加燥濕化痰之品
(C)可佐斂津固澀之品 (D)治以白虎加人參湯合桂附地黃丸
- 34 下列消渴病的症狀，何者最適合使用白虎加人參湯？
(A)心煩口渴，咽乾鼻燥，潮熱盜汗，舌質紅少津，苔燥，脈細數
(B)多食易飢，口渴多飲，舌苔黃燥，脈滑實有力
(C)飲食無度，渴飲喜冷，胃中痞滿嘈雜，口乾唇焦，大便燥結，苔黃燥，脈滑數
(D)雖飢不欲多食，雖渴不能多飲，多飲則腫，稍飢則餒，易疲乏力，大便易溏，舌淡，脈弱
- 35 有關消渴證之病機，下列何者錯誤？
(A)劉河間主陽燥 (B)張介賓提倡命門火衰
(C)朱丹溪主腎水虛 (D)張子和主火虧
- 36 45 歲罹患痛風之男性，昨晚喝啤酒後引發右足第一趾關節疼痛急性發作。症見面紅，右足第一趾關節灼熱紅腫疼痛，發熱，口渴喜冷飲，色質紅，舌苔黃燥，脈滑數。治以下列何者最適宜？
(A)防風湯 (B)薏苡仁湯 (C)白虎桂枝湯 (D)烏頭湯
- 37 中風突然昏倒不省人事，牙關緊閉兩手握固，大小便閉，肢體強瘓，面白唇暗，靜臥不煩，四肢不溫，舌苔白膩，脈沉滑緩，治以下列何方最適宜？
(A)蘇合香丸 (B)安宮牛黃丸 (C)至寶丹 (D)羚羊角湯
- 38 72 歲男性患者主訴偏廢不仁，患側筋骨痠軟，足難任地，伴見眩暈耳鳴，虛煩失眠，面赤唇紅，舌瘡不語。診其舌質紅絳，苔少，脈弦細數。治以下列何方最適宜？
(A)地黃飲子 (B)牽正散 (C)補陽還五湯 (D)解語丹
- 39 16 歲小華每次朝會校長、訓導主任、教官連番訓話時，常發生頭昏、噁心、臉色蒼白、冒冷汗、視力模糊。其他四診有面色蒼白或萎黃、心悸怔忡、氣短懶言、四肢倦怠、頭暈目眩、舌淡苔白、脈細弱。治以下列何方最適合？
(A)半夏白朮天麻湯 (B)六味地黃丸 (C)八珍湯 (D)四物湯
- 40 下列有關中風之敘述，何者錯誤？
(A)王清任從張景岳之說，專以血虛立論
(B)《千金要方》指出中風大法有四：一曰偏枯，二曰風痺，三曰風懿，四曰風痺
(C)葉天士創立肝陽化風之說
(D)嚴用和《濟生方》對本病的治療提出了以「調氣」為主的觀點

- 41 60 歲男性患者，突然於家中發生昏仆，不省人事，眼睛閉著，嘴巴張開，鼻鼾息微，四肢無力，肢體冰冷，流汗多，大小便自遺，舌痿，脈細弱，經送往醫院檢查診斷為腦幹出血，其辨證為下列何者最適宜？
(A)中臟腑，脫證 (B)中臟腑，陽閉 (C)中臟腑，陰閉 (D)中經絡
- 42 承上題，治療宜選用下列何方最適宜？
(A)補陽還五湯 (B)安宮牛黃丸 (C)蘇合香丸 (D)參附湯合生脈散
- 43 38 歲楊姓男性患者平日情緒急躁，工作壓力較大，心煩失眠，近日癲癇舊疾發作，每次持續數分鐘，屬大發作，發作時昏仆抽搐吐涎，或有叫吼，醒來又如常人。患者口苦而乾，便秘，診其舌紅苔黃膩，脈弦滑數，治以滌痰湯與下列何方共同使用最適合？
(A)定癇丸 (B)導赤散 (C)大補元煎 (D)龍膽瀉肝湯
- 44 口咽癌患者放療之副作用，下列敘述何者最不適宜？
(A)容易出現造血功能異常之氣血雙虧證型 (B)皮膚出現熱邪灼傷之徵
(C)大都會出現口乾咽燥津傷現象 (D)後期可能出現軟組織傷害之氣滯血瘀證型
- 45 肝癌患者脅肋腫脹而痛，胸悶納呆，口苦，噁心嘔吐，目黃赤，身黃。醫師處以龍膽瀉肝湯加茵陳、黃柏、大黃、芒硝治療。方義以下列何者最適宜？
(A)活血祛瘀，通經活絡，消堅破瘀 (B)清瀉肝火，泄熱通便，清熱利濕
(C)清瀉胃火，泄熱通便，利濕消瘀 (D)疏肝理氣，活血止痛，滋陰清熱
- 46 48 歲王女士近來觸摸到頸部有腫塊，她覺得項痛，耳鳴，聲音嘶啞，吞咽如有物受梗塞，胸悶，發憋，心悸，眼乾，目眩，情緒煩躁，少寐，口乾，體重減少，持續的咳嗽，但沒感冒，舌質紅，脈弦細數。病機以下列何者最適合？
(A)氣鬱痰凝，痰熱擾心 (B)痰氣壅結，火鬱傷陰
(C)陽氣不足，虛火上擾 (D)痰熱鬱肺，氣失攝納
- 47 某 32 歲女性罹患甲狀腺腫瘤，外觀柔軟、光滑，伴有急躁易怒，面熱口苦，眼突手顫，舌紅、苔黃、脈數，診斷以下列何證型最適合？
(A)氣鬱痰阻 (B)肝火亢盛 (C)痰結血瘀 (D)心腎陰虛
- 48 承上題，治以下列何方最適合？
(A)溫膽湯 (B)天王補心丹 (C)海藻玉壺湯 (D)梔子清肝湯
- 49 張景岳《婦人規·經脈類》所用之婦人用藥 16 個補陣新方，那味藥物的使用頻率最高，也是張景岳填補真陰精血的常用藥物？
(A)淮山藥 (B)山茱萸 (C)熟地黃 (D)當歸
- 50 《景岳全書》固陰煎中那味中藥既可健脾又可補腎？
(A)山萸肉 (B)菟絲子 (C)熟地 (D)山藥
- 51 42 歲女性，接受過 2 次剖腹生產，生產後數年開始嚴重經行下腹痛，伴隨乳房脹痛，經血色暗且有大量血塊。超音波發現子宮肌腺症，CA-125 為 111.2 μml 。舌黯，苔薄白，脈弦。下列關於此病患的證候分析以何者最適宜？
(A)寒濕阻滯 (B)氣血虛弱 (C)氣滯血瘀 (D)肝經濕熱

- 52 關於經前乳脹之辨證與治療，下列何者錯誤？
(A)經前乳脹實證為多
(B)虛證，乳房脹痛而軟，常伴隨腰酸
(C)肝氣鬱結，宜用逍遙散加雞內金、茯苓、麥芽、路路通
(D)肝腎陰虛，宜用健固湯加夏枯草、海藻、昆布
- 53 44 歲黃女，於經期或經後時發潮熱與五心煩熱，煩躁眠差，舌紅少苔，脈細數，其治療以下列何者最適宜？
(A)加味地骨皮飲《醫宗金鑑》清熱養陰 (B)先期湯《證治準繩》清熱涼血
(C)補中益氣湯《脾胃論》甘溫除熱 (D)玉屏風散《世醫得效方》固表和營
- 54 29 歲女性病患，多年不孕，月經先後不定期，經來腹痛，行而不暢，量少色暗有血塊，經前乳房脹痛，精神抑鬱，煩躁易怒，舌質暗紅苔薄白，脈弦，下列何者正確？①主要證型為「肝鬱」 ②治法「疏肝解鬱，養血理脾」 ③乳房脹痛有塊，可酌加王不留行、橘葉、橘核、路路通 ④小腹脹痛，經期或勞累後加重，痛時拒按，處方可用「定經湯《傅青主女科》」
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 55 關於閉經的病因病機，下列何者錯誤？
(A)先天腎氣不足，天癸未充，或多產房勞，以致精虧血少，衝任失養而成經閉是屬於肝腎不足
(B)飲食勞倦，損傷脾氣，化源不足；或因大病、久病，或產後失血傷津而成經閉是屬於氣血虛弱
(C)肥胖之人，多痰多濕而成經閉是屬於水飲
(D)鬱怒傷肝，肝氣鬱結，氣機不利，血滯不行而成經閉是屬於實證
- 56 40 歲患者陰道常常氣出有聲，伴隨腹脹、大便乾硬，舌紅苔黃，脈弦滑。治以下列何方最適宜？
(A)麻子仁丸 (B)四逆散 (C)六君子湯 (D)四磨飲子
- 57 某女士最近時常覺精神不振，可是又很容易情緒激動，不能自控的無故悲傷欲哭，心中煩亂，睡眠不安，舌質紅苔少，脈細弦。下列何方治療最適宜？
(A)《景岳全書》化肝煎 (B)《金匱要略》甘麥大棗湯
(C)《續名醫類案》一貫煎 (D)《濟陰綱目》柏子仁丸
- 58 29 歲女性懷孕 29 週，因行房後導致陰道出血，腰痠腹墜，脈沉弱。下列病機何者正確？
(A)衝脈鬱熱 (B)氣血兩虛 (C)腎虛而衝任不固 (D)勞力過度而損傷氣血
- 59 《金匱要略》：「婦人病，飲食如故，煩熱不得臥而反倚息者，何也？師曰：此名轉胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病，但利小便則癒。」宜下列何方治療？
(A)腎氣丸 (B)葵子茯苓散 (C)豬苓湯 (D)五苓散
- 60 患者懷孕 6 個月，常覺心胸煩悶不舒。問診發現患者常覺頭暈心悸，胸脘滿悶，甚至噁心嘔吐。望其舌苔黃而膩，脈細數。下列何者最適宜治療此患者？
(A)半夏、竹茹、枳實、陳皮、茯苓、甘草 (B)黨參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、薑半夏
(C)紫蘇葉、厚朴、茯苓、半夏、生薑、大棗 (D)竹瀝、麥冬、黃芩、茯苓、浙貝母
- 61 關於產後腹痛之敘述，下列何者正確？
(A)產婦分娩以後，以小腹疼痛為主證者，稱為「子懸」
(B)主要是氣血運行不暢，遲滯而痛
(C)產後小腹隱隱作痛而軟，喜按，惡露量少，色淡，面色蒼白，腹痛，畏寒喜熱者，宜予溫清飲
(D)產後小腹疼痛，拒按，惡露量少，澀滯不暢，色紫黯有塊，胸脅脹痛，面色青白，四肢不溫，宜予溫經湯

- 62 王小姐昨日生產時失血較多，身有微熱，午後較熱，兩顴紅赤，口渴喜冷飲，大便乾燥，小便黃赤，舌質紅，苔薄黃而乾，脈細數，最宜以下列何者治療？
(A)黃耆、黨參、熟地、山藥、山茱萸、菟絲子、遠志、五味子、炙甘草
(B)熟地、黃連、黃芩、白芍、當歸、川芎
(C)黃連、大黃、黃芩
(D)白芍、麥冬、甘草、生地、熟地、知母、地骨皮
- 63 28 歲女性患者自然生產後 3 日，寒熱時作，惡露量少，色紫黯有血塊，伴隨小腹疼痛，按之痛劇，口乾不欲飲。舌淡紅，邊有瘀點，脈弦澀，最宜下列何者為主方治療？
(A)柴胡桂枝湯 (B)人參敗毒散 (C)四物湯 (D)生化湯
- 64 《傳青主女科》所載之固本止崩湯的藥物組成中包含下列何者？
(A)黃耆 (B)升麻 (C)炙甘草 (D)阿膠
- 65 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》四診總括，望診中出現何種症狀主「驚風」？
(A)天庭紅暗 (B)太陽白
(C)風池在眉下，氣池在眼下，二處黃 (D)指紋色青
- 66 有關小兒感冒常見的兼證，下列何者正確？①夾瘀 ②夾痰 ③夾滯 ④夾驚
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 67 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒證見咳嗽面色晄白，痰多清稀，鼻流清涕，治以下列何方最適宜？
(A)初宜加味華蓋散，日久不愈者，須以參蘇飲
(B)初宜金沸草散，日久不愈者，須以參蘇飲
(C)初宜聖惠橘皮散，日久不愈者，須以補肺阿膠散
(D)初宜加味華蓋散，日久不愈者，須以補肺阿膠散
- 68 有關小兒肺炎喘嗽的敘述，下列何者正確？①風寒閉肺證型最常見 ②重症病兒，常有氣滯血瘀證象 ③臨床上有常證和變證之不同 ④病位主要在肺，常累及脾，可內竄肝腎
(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)③④
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》積滯門：「嬰兒乳滯睡不安，多啼口熱吐驚煩，肚脹腹熱便酸臭」，治以下列何方最適宜？
(A)保和丸 (B)消乳丸 (C)保安丸 (D)肥兒丸
- 70 馬小弟 2 歲，因口舌潰瘍不能進食至中醫求診，經察其潰瘍處稀疏散色淡，不甚疼痛，口流清涎，神疲顴紅，口乾不渴，舌淡紅苔少，脈細數，宜治以下列何方？
(A)導赤散 (B)涼膈散 (C)六味地黃丸 (D)三黃瀉心湯
- 71 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關食癰的敘述，下列何者正確？①食癰者，其病在胃 ②初病面黃腹滿，吐利酸臭，宜用妙聖丹主之 ③痰盛者，宜用朱衣滾痰丸主之 ④最後用清熱和胃丸調理
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 72 關於小兒遺尿主要病因病機，下列何者錯誤？
(A)下元虛寒，腎氣不足 (B)脾肺氣虛，膀胱失約
(C)瘡毒內歸，毒陷入腎 (D)肝經濕熱，火熱內迫
- 73 疰夏又稱注夏，是春夏之交所發生的一種季節性疾病，下列有關疰夏的敘述何者正確？①主要表現為全身倦怠、飲食不振、大便不調 ②秋涼後可逐漸好轉 ③有明顯的發熱口渴、多飲、多尿等特徵 ④濕困脾胃及脾胃虛弱為常見的證型
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 74 暑厥，由夏令發熱，熱邪閉塞孔竅，必見下列何症狀為特徵？
(A)頸強 (B)手足逆冷 (C)手足抽搐 (D)角弓反張
- 75 小兒紫癍，分布於下肢，症見手心發熱、潮熱盜汗，心煩少寐，大便乾燥，小便黃赤，舌紅，苔少，脈細數。下列何方最為適宜？
(A)六味地黃丸 (B)大補陰丸 (C)歸脾湯 (D)黃連解毒湯
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》瀉證門臍寒瀉，臨床上呈現「糞色青白、腹痛鳴」，以下列何方治療最適宜？
(A)先以人參敗毒散溫散之，後以補中益氣湯溫補之
(B)先以和氣飲溫散之，後以調中湯溫補之
(C)先以補中益氣湯溫補之，後以人參敗毒散溫散之
(D)先以調中湯溫補之，後以和氣飲溫散之
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，麻疹非熱不出，若疹已沒落後持續發燒者，以下列何方治療最適宜？
(A)柴胡四物湯 (B)柴胡清熱飲 (C)柴胡疏肝湯 (D)小柴胡湯
- 78 下列何者為小兒夜啼脾臟虛寒之證型治以《小兒藥證直訣》烏藥散的組成？①白芍 ②香附 ③乾薑 ④小茴香
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 79 有關泌尿道感染之敘述，下列何者錯誤？
(A)大腸桿菌 (E. coli) 是最常見的致病細菌
(B)新生兒的泌尿道感染可能會出現食慾差、腹瀉、哭鬧不安等症狀
(C)身體理學檢查時偶會發現腰部敲擊痛 (Knocking tenderness)
(D)尿液檢查時尿離心沉澱物高倍鏡檢下 WBC>5/HPF，表示有膿尿，確定是泌尿道感染
- 80 過敏性紫斑症 (Henoch-Schönlein purpura, HSP) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)侵犯微血管及後微血管小靜脈的過敏性血管炎
(B)臨床症狀主要是可觸摸的血管炎性紫斑，發燒及關節炎
(C)致病機轉尚未明確，但可能與自體免疫反應引起之血管炎症反應有關
(D)約 25~50%的病童會有腎臟侵犯，但其中只有 3~4%的病童會有腎功能衰竭產生