

102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、
特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3103
頁次：10-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師、中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 真人養臟湯，屬於「十劑」中之下列何法？
(A)宣 (B)通 (C)補 (D)澀
- 2 滋陰降火湯為四物湯加下列何者？
(A)黃柏、知母、玄參 (B)黃柏、黃芩、甘草 (C)黃連、胡黃連 (D)阿膠、艾葉、甘草
- 3 下列敘述，何者正確？①麻杏石甘湯適用之病證為伏熱壅肺，漸及陰分 ②瀉白散適用之病證為風熱襲肺 ③麻杏石甘湯與瀉白散均可治肺熱咳嗽
(A)② (B)③ (C)①③ (D)①②③
- 4 下列何方之組成含淡豆豉？①《溫病條辨》銀翹散 ②《外台秘要》葱白七味飲 ③《重訂通俗傷寒論》加減葳蕤湯
(A)① (B)①② (C)②③ (D)①②③
- 5 60 歲患者，大便 7 日未解，腹脹，腹痛繞臍不止，手足不溫，苔白，脈沉弦而遲，宜治以下列何方？
(A)大黃附子湯 (B)小承氣湯 (C)麻子仁丸 (D)溫脾湯
- 6 下列何藥物為五味消毒飲的君藥？



- 7 下列敘述，正確的有幾項？①大陷胸湯與礞石滾痰丸之組成藥物均含大黃 ②大陷胸湯與礞石滾痰丸均治大便秘結 ③大陷胸湯之功用為瀉火逐痰 ④礞石滾痰丸治實熱老痰，久積不去
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- 8 如圖所示之兩種藥物，為下列何方之組成？①炙甘草湯 ②補中益氣湯 ③參苓白朮散 ④歸脾湯



- (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 9 《小兒藥證直訣》六味地黃丸三補肝脾腎的藥物用量比例，依序為何？
(A)1：3：8 (B)2：3：8 (C)3：4：8 (D)4：4：8
- 10 《宣明論方》地黃飲子主治證的病機，下列何者正確？①痰濁上泛 ②下元虛衰 ③虛陽上浮
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 11 下列何者為七味白朮散的組成藥物？①木香 ②香附 ③藿香 ④沈香
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 12 下列有關補陰方劑的敘述，何者錯誤？
(A)六味地黃丸以熟地為君，其與山藥、山茱萸的配伍劑量比為2：1：1
(B)《丹溪心法》所載之大補陰丸可滋陰降火，治療病人的尺脈數而有力
(C)左歸丸的組成配伍兩味血肉有情之品，均係取其陰中求陽之意
(D)《續名醫類案》所載之一貫煎的藥物組成包括有川楝子
- 13 下列各項敘述，何者正確？
(A)《宣明論方》及《丹溪心法》當歸龍薈丸與《小兒藥證直訣》瀉青丸的組成藥物均含梔子、大黃、黃芩
(B)火鬱發之為《小兒藥證直訣》瀉黃散重用防風的方義
(C)口瘡口臭，口燥唇乾，舌紅少苔，脈虛數是《小兒藥證直訣》瀉黃散的運用主證
(D)《宣明論方》及《丹溪心法》當歸龍薈丸與《醫方集解》龍膽瀉肝湯均主治肝膽實火或濕熱下注證
- 14 桑螵蛸散有調補心腎，澀精止遺之功用，夜臥以何湯調下最佳？
(A)人參湯 (B)薑湯 (C)淡鹽湯 (D)米泔水
- 15 下列何方之主治證是因少陽熱重，濕熱痰濁中阻所致？
(A)《傷寒論》半夏瀉心湯 (B)《霍亂論》蠶矢湯
(C)《溫熱經緯》甘露消毒丹 (D)《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯
- 16 下列各項敘述，何者正確？①《和劑局方》八正散之主治證乃因濕熱下注膀胱 ②《小兒藥證直訣》導赤散能導心經之熱由小便而出 ③《和劑局方》八正散和《小兒藥證直訣》導赤散的組成均有生地
(A)① (B)①② (C)②③ (D)①②③
- 17 下列何者之主治證是因胃中虛寒，濁陰上逆所致？
(A)人參三兩、吳茱萸一升、乾薑六兩、大棗十二枚、炙甘草三兩
(B)人參三兩、乾薑三兩、白朮三兩、炙甘草三兩
(C)人參二兩、蜀椒二合、乾薑四兩、飴糖一升
(D)人參三兩、吳茱萸一升、生薑六兩、大棗十二枚
- 18 某45歲女性，3天前因飲食不潔而開始腹痛，繼而便膿血、赤白相兼、日行數次，伴裏急後重、肛門灼熱、小便短赤，舌苔黃膩，脈滑數，最宜使用下列何方？
(A)烏梅丸 (B)芍藥湯 (C)藿香正氣散 (D)黃芩湯
- 19 以柴胡疏肝解鬱的方劑，下列正確的有幾項？①小柴胡湯 ②四逆散 ③敗毒散 ④逍遙散 ⑤補中益氣湯
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

- 20 下列敘述，有幾項是錯誤的？①《證治準繩》清骨散之主治證乃因溫病後期，陰液耗傷，熱伏陰分所致 ②《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散主治風勞，骨蒸潮熱 ③《溫病條辨》青蒿鱉甲湯的組成藥物包含柴胡、地骨皮 ④《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散與《證治準繩》清骨散的組成藥物均含青蒿、地骨皮、柴胡、秦艽
- (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 21 下列何者為柴胡疏肝散與越鞠丸共同之組成？
- (A)香附、甘草 (B)枳殼、蒼朮 (C)川芎、神麴 (D)香附、川芎
- 22 下列敘述，何者正確？
- (A)定喘湯主治肺腎陰虛之哮喘 (B)丁香柿蒂湯主治胃熱之呃逆
(C)橘皮竹茹湯主治虛寒之呃逆 (D)旋覆代赭石湯主治胃虛痰阻之噯氣
- 23 有關越鞠丸之敘述，下列何者錯誤？
- (A)全方各單味藥劑量等分，可水泛為丸或可作湯劑
(B)以香附行氣解鬱為方中主藥
(C)食、濕、痰三鬱多責之於脾
(D)以當歸行血中之氣，治血鬱
- 24 有關《傅青主女科》生化湯之敘述，下列何者錯誤？
- (A)重用當歸八錢，以補血活血，化瘀生新，為方中主藥
(B)童便當佐藥，以益陰化瘀，且引敗血下行
(C)此乃產後血虛受寒，惡露不行，故以炮薑及黃酒溫經散寒止痛，為方中次藥
(D)炙甘草調和諸藥，為方中使藥
- 25 下列何者為血府逐瘀湯之組成之一？①柴胡、白芍 ②當歸、川芎 ③桃仁、紅花 ④枳實、牛膝 ⑤桔梗、甘草 ⑥延胡索、枳殼 ⑦生地、赤芍
- (A)①③⑤⑦ (B)②③⑤⑦ (C)①②③④⑤⑥ (D)①②③④⑤⑦
- 26 半夏厚朴湯與厚朴溫中湯之比較，下列何者正確？
- (A)二方皆可用於脾胃寒濕證
(B)二方皆有厚朴、茯苓、乾薑
(C)半夏厚朴湯以厚朴、茯苓為次藥，厚朴溫中湯以草豆蔻、乾薑為次藥
(D)半夏厚朴湯以生薑為佐藥，厚朴溫中湯則以陳皮、木香、生薑為佐藥
- 27 40 歲患者，外感之後，出現頭痛，惡寒，身重疼痛，胸悶不飢，午後身熱，無口渴，醫師檢查時見其面色淡黃，苔白，脈弦細濡。最宜下列何方治療？
- (A)蒼朮、半夏、藿香、厚朴、陳皮、甘草
(B)藿香、大腹皮、白芷、紫蘇、茯苓、半夏、白朮、陳皮、厚朴、桔梗、甘草
(C)蒼朮、厚朴、陳皮、甘草
(D)半夏、杏仁、滑石、白蔻仁、竹葉、厚朴、通草、苡仁
- 28 下列何者為《外科正宗》消風散的藥物組成之一？①荆芥 ②牛蒡子 ③白朮 ④通草
- (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 29 下列何者具有溫陽健脾、行氣利水之功用？
- (A)苓桂朮甘湯 (B)真武湯 (C)實脾飲 (D)五苓散
- 30 下列何者為鎮肝熄風湯的主治證候？①頭目眩暈，目脹耳鳴，腦部熱痛，心中煩熱，面色如醉 ②肢體漸覺不利，口角漸形歪斜 ③甚至眩暈顛仆，昏不知人，移時始醒，或醒後不能復原 ④舌強不能言，足廢不能用，口乾不欲飲，脈沉細弱
- (A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 31 下列何者是桑杏湯的主治證候？①身不甚熱 ②脈浮數 ③氣逆咯血 ④咽乾口渴
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 32 下列各方的功用，何者正確？①羚角鉤藤湯涼肝熄風，增液舒筋 ②清燥救肺湯滋腎潤燥，化痰止咳 ③藿香正氣散解表化濕，理氣和中 ④平胃散燥濕運脾，行氣和胃
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 33 下列何方的藥物組成中含有桔梗與枳殼？①荆防敗毒散 ②杏蘇散 ③人參敗毒散 ④血府逐瘀湯
(A)④ (B)①③ (C)①②③ (D)①②③④
- 34 組成中含有杏仁的方劑，下列正確的有幾項？①麻子仁丸 ②清氣化痰丸 ③冷哮丸 ④藿朴夏苓湯 ⑤大陷胸丸
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 35 有關指迷茯苓丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)可治痰濕內停，肩背痠痛，兩手疲軟 (B)可治痰停中脘，上攻於臂
(C)方中以半夏燥濕化痰為主藥 (D)方中以風化硝瀉下清熱為佐藥
- 36 香薷飲與新加香薷飲之比較，下列何者正確？
(A)二方皆有香薷、厚朴、扁豆、連翹
(B)二者皆可祛暑解表；香薷飲另可化濕和中，而新加香薷飲則另有清熱化濕之功
(C)二方中以扁豆祛暑化濕為佐藥
(D)使用二方之時機均為中暑發熱汗出，口渴面赤，苔白膩
- 37 下列敘述，正確的有幾項？①神麴是保和丸的君藥 ②枳實是枳實導滯丸的君藥 ③枳實消痞丸以神麴消食和胃 ④山楂善消肉食油膩之積 ⑤消食劑與瀉下劑均能消除有形之實邪
(A)2 (B)3 (C)5 (D)都不正確
- 38 下列何者為王氏清暑益氣湯的君藥？①西洋參 ②西瓜翠衣 ③知母 ④麥冬 ⑤竹葉
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 39 32 歲男性患者，結婚 4 年仍未有小孩，經西醫檢查為精蟲數不足，自行購服補腎填精藥後反而胃脘不舒；現症見形瘦面黃，脘腹痞滿，不思飲食，倦怠無力，大便溏薄等，經醫生診察苔膩微黃，脈虛弱。最宜下列何方？
(A)枳朮丸 (B)健脾丸 (C)保和丸 (D)枳實導滯丸
- 40 《內外傷辨惑論》枳實導滯丸中的消食化滯藥是下列何者？

(A)



(B)



(C)



(D)



41 具清熱解毒，涼血消斑功效的藥物，下列何者正確？

- (A)金銀花 (B)板藍根 (C)連翹 (D)大青葉

42 下圖藥材的敘述，下列何者正確？



- (A)發汗解熱，鎮咳祛痰 (B)小便不利，淋濁帶下
(C)肺熱咳喘，通淋 (D)解毒，消癰散結

43 下列何者並非夏枯草之功效？

- (A)清肝火 (B)散鬱結 (C)退虛熱 (D)抗腫瘤

44 清熱解毒藥中，下列何藥尤善治疔毒，頭面部癰腫？

- (A)黃花地丁 (B)紫花地丁 (C)三棱 (D)紫草

45 下列何者為淡竹葉之功效？

- (A)清熱除煩，通利小便 (B)清熱生津，活血排膿
(C)清熱利濕，涼血解毒 (D)清熱養陰，解毒散結

46 治療濕熱淋濁或濕熱黃疸，宜選用大黃的何種炮製品？

- (A)生大黃 (B)熟大黃 (C)酒浸大黃 (D)炭大黃

47 吳茱萸從治之用，用於下列何證？

- (A)除濕解鬱 (B)血痺陰疝 (C)開腠理，逐風寒 (D)陰毒腹痛

48 下列何者不具有潤腸通便的作用？

- (A)肉蓯蓉 (B)益智仁 (C)火麻仁 (D)柏子仁

49 下列何者非巴豆功用？

- (A)寒積便秘 (B)寒實結胸 (C)腹水臌脹 (D)喉痹熱腫

50 下列何種藥材配滋陰藥和清熱藥，治虛勞發熱，骨蒸潮熱？



51 下列何種藥材用於治風濕痹痛，經行腹痛、牙痛，咽喉疼痛？



52 陽衰氣脫、大汗淋漓而氣促喘急者，附子宜配伍下列何種藥材？

- (A) 人參 (B) 細辛 (C) 麻黃 (D) 乾薑

53 下列何藥可用於冷痢寒瀉之霍亂轉筋？

- (A) 木瓜 (B) 附子 (C) 砂仁 (D) 藿香

54 乾薑引以黑附，主用於下列何者？

- (A) 逐寒邪而發表 (B) 入腎而祛寒濕 (C) 去惡生新 (D) 定嘔消痰

55 下列何藥不用於外感風寒、內停水飲，證見惡寒發熱、痰飲咳喘者？

- (A) 細辛 (B) 乾薑 (C) 蒼朮 (D) 半夏

56 下列何者忌服瓜蒌？

- (A) 孕婦 (B) 腸癰 (C) 遺尿 (D) 便溏


57 下列何者不是虎杖之適應症？

- (A)淋濁帶下 (B)脾虛便秘 (C)濕熱黃疸 (D)水火燙傷

58 三稜之何作用較莪朮強？

- (A)消積 (B)止痛 (C)行氣 (D)破血

59 下列何藥能用於梅核氣或噁心嘔吐、痰厥頭痛等症狀？



60 下列何藥為活血調經之要藥，並為治頭痛之要藥？



61 下列藥物中，何者能開竅醒腦，對中風口噤有作用？

- (A)石膏粉 (B)石決明粉 (C)冰片 (D)乳香

62 陽起石的功效為何？

- (A)治療腎陽虛寒 (B)收斂止血 (C)濕熱所致帶下、崩漏 (D)有收斂止汗功效

63 有關鹿角霜的敘述，下列何者正確？

- (A)為鹿角熬膏後所存殘渣物 (B)不具益腎助陽功能
(C)成品為膠狀物，需加溫烱化服 (D)為未骨化的幼角

64 下圖藥材不適用於何證？



- (A) 半身不遂 (B) 高熱抽搐 (C) 關節紅腫熱痛 (D) 遺精夢洩

65 下列參類藥物中，何者屬於補氣藥，唯補氣藥力稍弱，體質虛弱和屬陰虛者較適宜？




66 下圖藥物之炮製，下列何者正確？



- (A) 醋拌蒸 (B) 黃酒拌蒸 (C) 黑豆汁拌蒸 (D) 蜂蜜拌蒸

67 依《本草備要》記載，有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？





- (A) 導諸濕熱由小便出 (B) 汗多者禁用
(C) 瀉腎經之火邪，功專利濕行水 (D) 君火宜，相火不宜

- 68 依《本草備要》，肉桂下列敘述何者錯誤？
(A)辛苦大熱，氣厚純陽。治痼冷沉寒
(B)補命門相火之衰，益陽消陰
(C)疏通血脈，宣導百藥，去營衛風寒
(D)治欬逆結氣之藥理，欬逆亦由氣不歸元，桂能引火歸宿丹田
- 69 下列何藥物不具益腎助陽、固精，縮尿的功效？
(A)桑螵蛸 (B)覆盆子 (C)金櫻子 (D)山藥
- 70 依《本草備要》，柏子仁辛甘而潤，其氣清香，功能為何？
(A)養心氣，潤腎燥 (B)補中益氣 (C)能透心腎而悅肝 (D)膽虛不眠
- 71 依《本草備要》，下列何者為走散之藥，冷利大腸，虛者慎用？
(A)旋覆花 (B)百部 (C)白前 (D)天南星
- 72 依《本草備要》，下列有關澤瀉之敘述，何者錯誤？
(A)入膀胱，利小便 (B)有聰耳明目之功 (C)通氣上達利三焦 (D)瀉腎經之火邪
- 73 依《本草備要》，白芷常用之功效，下列何者錯誤？
(A)芳香通竅而表汗 (B)太陽頭目昏痛，眉稜骨痛
(C)治三經風熱濕熱之病 (D)活血排膿，生肌止痛
- 74 依《本草備要》，傷寒及補劑加用大棗，其目的為何？
(A)補氣生血 (B)燥濕健脾 (C)清肺熱及補肝腎 (D)發脾胃升騰之氣
- 75 依《本草備要》，下列何藥大瀉血分濕熱，下有形積滯？
(A)大黃 (B)防己 (C)牽牛子 (D)巴豆
- 76 依《本草備要》，下圖藥材何證慎用？



- (A)脾腎兩虛、陰血不足者、汗多者
(B)汗多相火盛者
(C)肺氣虛及風寒作嗽者
(D)瞳子散大者

- 77 依《本草備要》，下列何種藥材能行氣而不傷氣？



78 依《本草備要》，下列何種藥材為療風水之要藥，治水腫風腫。然濕熱在上焦氣分者禁用？

(A)



(B)



(C)



(D)



79 依《本草備要》，下列何藥為肺家主藥，能去營中寒邪？

(A)



(B)



(C)



(D)



80 依《本草備要》，下列何種藥材能定魄安魂，治憂恚驚悸，心下結痛，水腫淋瀝？

(A)



(B)



(C)



(D)

