

110年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：7-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關《傷寒論》中「水氣為病」證治之敘述，下列選項何者最不適當？①心下有水氣，發熱有汗，煩渴引飲，小便不利者，屬小青龍湯證 ②心下有水氣，發熱無汗，乾嘔不渴，小便不利者，屬五苓散證 ③少陰病，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，屬真武湯證 ④少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者，屬理中湯證
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②④
- 2 依《傷寒論》，下列選項何者為「結胸」死證？①結胸證悉具，煩躁者 ②結胸證，其脈浮大者，下之 ③結胸者，項亦強，如柔痙狀，下之 ④結胸熱實，脈沉而緊，心下痛，按之石鞕者，下之
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 3 依《醫宗金鑑·傷寒論》，太陽病，身黃，脈沉結，少腹硬滿，小便自利，其人如狂者，下列何方治療最適當？
(A)調胃承氣湯 (B)抵當湯 (C)大黃蟪蟲丸 (D)桃核承氣湯
- 4 依《醫宗金鑑·傷寒論》，傷寒大下後，復發汗，心下痞，無惡寒者，下列何方治療最適當？
(A)桂枝湯 (B)生薑瀉心湯 (C)甘草瀉心湯 (D)大黃黃連瀉心湯
- 5 依《醫宗金鑑·傷寒論·瘥後勞復食復陰陽易病篇》指出，傷寒瘥已後，更發熱，下列何方治療最適當？
(A)小柴胡湯 (B)小建中湯 (C)桂枝加人參湯 (D)白虎加人參湯
- 6 依《傷寒論》，桂枝加桂湯方「更加桂枝二兩」之目的，下列何者最適當？
(A)祛風除濕 (B)增加解表之力 (C)增加調和營衛之力 (D)助心陽而降逆平衡
- 7 依《傷寒論》所述，下列何者最適當？
(A)凡兩經或三經的證候同時出現者，稱為并病
(B)凡一經的病證未罷，而又出現另一經證候者，稱為合病
(C)外邪不經三陽，而直接表現出三陰的證候，稱為傳變
(D)互為表裏的陰陽兩經同時發病，稱為兩感
- 8 依《傷寒論》，有關能用桂枝湯治療的病症，下列選項何者最適當？①病人藏無他病，時發熱，自汗出而不愈者 ②太陽病，下之後，其氣上衝者 ③太陽與陽明合病，喘而胸滿者 ④傷寒發汗已解，半日許復煩，脈浮數者
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 9 依《傷寒論》所述：「陽明病，不能食，攻其熱必嘔。」所以然者，其原因為下列何者最適當？
(A)客氣動膈 (B)表虛裡實 (C)熱結在裡 (D)胃中虛冷
- 10 依《傷寒論》所述：「傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐者」，治以下列何方最適當？
(A)半夏、黃芩、乾薑、人參、炙甘草、黃連、大棗
(B)柴胡、黃芩、半夏、枳實、大黃、芍藥、生薑、大棗
(C)柴胡、黃芩、人參、炙甘草、半夏、生薑、大棗
(D)黃連、炙甘草、乾薑、桂枝、人參、半夏、大棗
- 11 依《傷寒論·厥陰病脈證并治》所述：「下利清穀，不可攻表」，誤用汗法，可見下列何症？
(A)厥逆 (B)大汗淋漓 (C)腹脹滿 (D)身振振搖

- 12 依《傷寒論》所述：「病人小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘冒不能臥者，……宜大承氣湯。」
遵原意其原因為下列何者最適當？
(A)欲作穀疸 (B)胃中空虛，客氣動膈
(C)瘀熱在裏 (D)有燥屎也
- 13 依《傷寒論》所述：「傷寒無大熱，口燥渴，心煩，背微惡寒者」，下列敘述何者最適當？
(A)傷寒無大熱，口燥渴，心煩是指邪雖入陽明，但裏熱未盛
(B)心煩是因腑實內結，熱擾神明
(C)背微惡寒是太陽表證未解
(D)治以白虎加人參湯
- 14 依《傷寒論》，有關麻黃升麻湯證之敘述，下列何者最適當？
(A)肝熱脾寒 (B)肺熱脾寒，喉咽不利，唾膿血
(C)寸脈沉細，下部脈不至 (D)方中麻黃配升麻意在溫潤養血
- 15 門診時某婦人得少陰病，出現手足仍厥冷，下利清穀，脈微欲絕。以通脈四逆湯治之，下列何種藥物不是其組成之一？
(A)附子 (B)乾薑 (C)甘草 (D)蔥白
- 16 依《傷寒論·少陰病篇》，四逆散可治肝胃氣滯陽鬱所產生的手足輕微厥冷，若併發瀉利下重者應加下列何藥物？
(A)附子 (B)黃連 (C)薤白 (D)茯苓
- 17 小陳在病房照顧一高熱患者，發現患者齒齦流血，觸壓疼痛，初步判斷何者最適當？
(A)胃火衝激，其病屬實 (B)少陽氣熱
(C)腎火上炎 (D)腎陰下竭，虛火上浮
- 18 溫病中，絳舌的發生，多主危重症候，相關的證候敘述，下列何者最不適當？
(A)舌純絳鮮澤，為邪在營血或熱入心包 (B)舌絳而有濁苔，是膈間痰濁
(C)舌絳無苔，中心乾燥為純虛無實，熱灼心營 (D)舌絳而光亮如鏡，心營被灼，胃陰已傷
- 19 江老先生因為感冒高燒住院，數日後出現手指不自主蠕動，甚至上下肢還會反覆抽動，望診發現神情疲倦，舌體痿瘦色紅且乾燥，切診呈現虛細脈。依據溫病治法原則，最適合江老先生目前狀況的治療方法，下列何者最適當？
(A)涼肝息風 (B)滋陰息風 (C)滋養真陰 (D)益氣斂陰
- 20 溫病脈診，弦脈所代表的臨床意義，下列敘述何者最不適當？
(A)脈弦細朮遲，為暑傷氣分 (B)脈弦細而緩，為病後胃氣未復
(C)脈弦而數，為熱鬱少陽，膽火熾盛 (D)脈弦勁而數，主熱邪亢盛，肝風內動
- 21 舌診若見苔白，舌邊尖紅，下列何圖最適當？



- 22 患者證見：「發熱，惡寒，無汗，頭痛，身重脘痞，心煩口渴，舌紅苔白膩，脈象濡數」等證候，根據這些臨床表現下列那一項為最適當之診斷？
(A)風熱在衛證 (B)燥熱在衛證 (C)濕熱在衛證 (D)暑濕在衛證
- 23 風溫熱邪入陽明，有關無形熱盛證，下列敘述何者最不適當？
(A)白虎湯為清泄陽明裏熱之主方 (B)壯熱、汗出、渴飲、脈大是辨證關鍵
(C)苔黃膩，脈洪大有力 (D)脈洪大而芤者，宜清熱益氣生津
- 24 風溫證，症見身熱神昏、舌謬、肢厥便秘、腹部按之硬痛，舌絳苔黃燥、脈數沉實，下列敘述何者最適當？
(A)證屬邪在血分 (B)證屬陽明腑實而引動肝風
(C)證屬肝經熱盛動風 (D)證屬手厥陰心包與手陽明大腸俱病
- 25 溫病易損陰液，熱邪久羈每多深入下焦，劫燬肝腎之陰，故溫病後期多易出現下焦真陰欲竭，邪少虛多之候，此階段發熱類型，下列敘述何者最適當？
(A)持續低熱 (B)發熱夜甚 (C)夜熱早涼 (D)身熱不甚或不發熱
- 26 有關春溫與風溫之比較，下列敘述何者最不適當？
(A)兩者皆發生於春季
(B)春溫屬於伏邪，初起以裡熱症為主
(C)風溫屬於新感溫病，以肺衛表熱症為主
(D)風溫的病變過程中，後期易出現腎陰耗損，虛風內動
- 27 下列關於暑溫的敘述何者最不適當？
(A)暑溫症「發自陽明」，熱盛氣傷，古人認為治暑必補氣，不補氣不足以言治暑
(B)暑溫瘥後，證見舌紅無苔，不饑欲嘔，胃氣不振，可使用竹葉石膏湯治療，但半夏性燥故去之不用
(C)夏月暑溫熱盛於胃或是暑瘥熱渴咳血之證，均可食用西瓜，頗有滌暑解渴止血之效
(D)小兒體稟純陽，因受暑熱而導致暑風者頗多，症見四肢抽搐，屬肝風內動，治宜涼肝熄風
- 28 春溫見身熱，心煩懊惱，坐臥不安，舌苔微黃，脈數，用下列何方劑治療最適當？
(A)葱豉桔梗湯 (B)梔子豉湯 (C)涼膈散 (D)清營湯
- 29 關於吳又可《溫疫論》對於溫疫初起證治，下列敘述何者最不適當？
(A)證見先惡寒發熱，後但熱不寒，晝熱夜涼，日晡益甚，頭身疼痛
(B)認為溫疫初起不可強發其汗，亦不可下，因為汗之徒傷表氣，下之則徒傷胃氣
(C)認為達原飲能直達膜原，知母、白芍、黃芩、甘草此四味用其調和
(D)臨床應用須隨證加減，如侵及太陽，證見腰背項痛者，加羌活一錢
- 30 關於余師愚之《溫熱經緯》疫病篇中，對於「論妊娠病疫」，下列敘述何者最不適當？
(A)妊娠病疫主因是熱疫毒邪，熱毒入營動血，最易損胎
(B)藥應針對病因清除病邪，以涼血解毒為主
(C)使母病去而胎可保，亦即邪去而正自安之意
(D)產後以及病中適逢經至，當禁用涼劑
- 31 伏暑「熱在心營、下移小腸」之證治以導赤清心湯，有關邪在「營分」的敘述，下列何者最不適當？
(A)口乾，渴不欲飲 (B)發熱日輕夜重
(C)心煩，小便短赤熱痛 (D)舌絳
- 32 下列關於「秋季溫燥」證治之敘述何者最不適當？
(A)大原則如《素問·至真要大論》所言：燥者濡之
(B)邪在肺衛，法宜辛涼甘潤
(C)秋燥病化熱化火，仍宜苦寒清熱以保津
(D)汪瑟庵指出：燥證路徑無多，故方法甚簡，始用辛涼，繼用甘涼與溫熱相似

- 33 依《金匱要略·瘧病脈證并治第四》所載，其脈以弦為主。有關瘧病的複合脈相關敘述，下列何者最適當？
(A)弦小緊者寒瘧 (B)弦緊者下之瘧 (C)沉弦細者當溫通 (D)弦遲者多寒
- 34 58 歲江先生，為上市公司老闆。平素工作忙碌，應酬多，睡眠不足，運動量少、身形肥胖，稍勞動則汗出疲倦。自述近 3 週身體明顯酸麻，吹冷氣時症狀更加重，脈寸口關上微，尺中小緊，下列處方何者最適當？
(A)四逆湯 (B)當歸四逆湯 (C)小建中湯 (D)黃耆五物湯
- 35 55 歲孫女士，長年疲倦，腰膝軟弱，心悸，自汗，下腹痛，裡急煩熱，舌質淡苔薄白，脈弱。依《金匱要略·血痹虛勞病脈證并治第六》，下列處方何者最適當？
(A)炙甘草湯 (B)黃耆建中湯 (C)腎氣丸 (D)桂枝加龍骨牡蠣湯
- 36 依《金匱要略·肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七》，有關造成「肺痿」之可能原因，下列何者最不適當？
(A)飲冷 (B)汗出、嘔吐 (C)小便利數 (D)被快藥下利
- 37 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關當歸生薑羊肉湯的敘述，下列何者最不適當？
(A)可治寒疝，腹中痛，及脅痛裡急者 (B)為治寒疝之溫劑，以散寒為本，養正為次
(C)若寒多者，加重生薑 (D)痛多而嘔者，加橘皮、白朮
- 38 依《金匱要略》所述：「嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也」，治以下列何方最適當？
(A)半夏、生薑、茯苓 (B)半夏、生薑
(C)茯苓、桂枝、白朮、生薑 (D)澤瀉、白朮、半夏
- 39 依《金匱要略·痰飲咳嗽》，有關四飲之敘述，下列何者最適當？
(A)其人素瘦今盛，咳唾引痛，當汗出而不汗出，謂之痰飲
(B)飲後水流在脅下，歸於四肢，謂之溢飲
(C)飲水流行，水走腸間，瀝瀝有聲，身體疼重，謂之懸飲
(D)咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之支飲
- 40 有關《醫宗金鑑·金匱要略》黃汗病的敘述，下列何者最不適當？
(A)身體腫，發熱，汗出而渴，狀如皮水 (B)以汗出入水中浴，水從汗孔入得之
(C)久不愈，必致癰膿 (D)黃耆芍藥桂枝苦酒湯可治之
- 41 依《金匱要略》所述，有關常見的產後病，下列何者最適當？①瘧 ②小便不利 ③鬱冒 ④大便難
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 42 依《金匱要略》所述，小半夏加茯苓湯主治病脈證，下列敘述何者最適當？
(A)卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸 (B)心下有痰飲，胸脅支滿，目眩
(C)心下有支飲，苦冒眩 (D)臍下有悸，吐涎沫而癰眩
- 43 依《金匱要略》所述：「心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作」，治以下列何方最適當？
(A)防己黃耆湯 (B)防己茯苓湯 (C)麻黃附子湯 (D)枳實白朮湯
- 44 依《金匱要略》，有關黃疸的敘述，下列何者最適當？
(A)脈沉，渴欲飲水，小便不利者，皆發黃 (B)疸而不渴者，其疸難治
(C)發於陰部，其人振寒而發熱 (D)發於陽部，其人必嘔
- 45 蔡老闆半年前中風，送醫治療，現在舌體瘦小，痿軟不用，甚者音啞失語，下列選項何者最適當？
①病機是風痰上阻，舌絡失和 ②病機是腎虧精虛，不能上承 ③治法宜祛風除痰，宣竅通絡
④治法宜滋補肝腎，利竅開音
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 46 有關外感脅痛之論述，下列何者最不適當？
(A)多屬濕熱蘊於肝膽所致
(B)若病久不去，可致邪毒久羈而耗劫肝血肝陰之虛證
(C)臨床可見發熱，惡寒，噁心，嘔吐
(D)初起舌象可見舌質紫暗，脈象細弦而數

- 47 患者白睛及周身皮膚發黃，黃色鮮明，心中懊惱，口渴欲飲，噁心嘔吐，大便數日未行，小便黃赤短小，舌紅苔黃膩，脈弦數。治以下列何方最適當？
(A)茵陳五苓散 (B)茵陳蒿湯 (C)茵陳朮附湯 (D)犀角散
- 48 下列何者最符合「濕熱入絡」的證型？
(A)時時發瘧，手足蠕動，心中憺憺大動，神倦癢癢，脈滑數，舌淡紅，苔膩
(B)項背強直，四肢抽搐，頭目昏眩，神疲，氣短，自汗，脈弦細，舌淡紅
(C)項背強立，口噤不得語，甚則四肢抽搐，惡寒較重，發熱，頭痛，無汗，脈浮緊，苔薄白
(D)身熱，筋脈拘急，或口噤甚則角弓反張，胸脘脹滿，渴不欲飲，小便短赤，脈滑數，苔黃膩
- 49 42 歲王小姐素有肺疾，近 3 個月頻發心悸、怔忡、胸悶氣短、稍動自汗、夜眠潮熱盜汗，甚至咳嗽又再復發加重，痰帶血絲。診時見其雙顴色暗、面色不華，舌紅少苔，脈細數，至數不勻。治療上使用下列何方最適當？
(A)歸脾湯 (B)黃連阿膠湯 (C)桃仁紅花煎 (D)炙甘草湯
- 50 有關「心痛」此一病症的辨證論治，下列敘述何者最適當？
(A)陰寒內結：主證氣短與氣促，心悸胸悶時疼，腰痠畏寒肢冷；兼證面色蒼白，唇甲淡白，舌青或紫暗，苔白，脈沉細或結代；治法辛溫通陽，開痺散結；主方四逆湯
(B)陽氣虛弱：主證胸痛徹背，受寒加重，形寒肢冷；兼證心悸，舌苔白滑或白膩，脈沉遲；治法益氣溫陽，活血通絡；主方枳實薤白白酒湯
(C)氣虛血瘀：主證心悸喘甚，肢厥冷汗；兼證神志淡漠，面色唇甲青紫，脈沉微欲絕；治法益氣活血；主方人參黃耆湯
(D)血瘀氣滯：主證胸痛如刺或絞痛陣作，痛有定處；兼證痛引肩背、左臂，胸悶如窒，舌紫暗或有瘀斑，脈弦或有歇止；治法活血化瘀，行氣通絡；主方血府逐瘀湯
- 51 口糜反覆纏綿難癒，滿口白屑斑片，白屑之下鮮紅糜爛，身熱體倦，舌紅苔白厚膩滑，脈滑數。治以下列何方最適當？
(A)甘露消毒丹 (B)犀角地黃湯合黃連解毒湯
(C)補中益氣湯 (D)甘露飲
- 52 「癲癇」是以突然仆倒，昏不知人，口吐涎沫，兩目上視，肢體抽搐，或口中如作豬羊叫聲等神志失常，為主要臨床表現的一種發作性的疾病；又稱為癇證、癲疾、俗稱「羊癇風」。有關其治療原則，下列何者最不適當？
(A)本病發作期，無論陽癇、陰癇，均當以開竅定癇為急務
(B)大抵癇證初發，多為陽癇，治以熄風滌痰瀉火為主；癇證日久，多屬陰癇，以補益氣血，調理陰陽為大法
(C)肝虛者養其血，腎虛者補其精，脾氣虛者助其運，心氣不足者，安其神，總以補虛為本
(D)治癇當重行痰，而行痰又當降氣。頑痰膠固，需辛涼開導，痰熱膠著須清化降火
- 53 29 歲林小姐某次外食後數小時，發生腹痛腸鳴，脘脹痞滿，糞便奇臭如腐敗雞蛋、帶有不消化之物，瀉下痛減。苔厚膩，脈滑。治以下列何方最適當？
(A)保和丸 (B)葛根黃芩黃連湯 (C)藿香正氣散 (D)痛瀉要方
- 54 「痞滿」屬於脾胃系統病證，請問金元時期是那一位醫家把痞滿與脹滿作出了區分，認為二者相類似而痞滿輕，脹滿重？
(A)李東垣 (B)劉完素 (C)張從正 (D)朱丹溪
- 55 活絡效靈丹合失笑散治療胃痛效佳，此胃痛的特點，下列何者最適當？
(A)脹痛 (B)灼痛 (C)隱痛 (D)刺痛
- 56 有關哮喘的辨證治療，下列何者最適當？
(A)痰涎壅盛，喉如曳鋸，咯痰黏膩，治以溫肺散寒
(B)呼吸氣促，痰色白、稀薄，治以清熱宣肺
(C)氣短聲低，自汗、怕風，易感冒，治以滌痰利竅
(D)痰多質稠色白，倦怠食少，治以健脾化痰

- 57 有關鼻淵的病因病機，下列選項何者最不適當？
(A)七情內傷 (B)膽熱上犯 (C)脾經濕熱 (D)正氣虧虛
- 58 咳嗽常見證候的臨床特點敘述，下列何者最不適當？
(A)濕邪傷肺：咳嗽、身體沉重、頭昏如蒙，骨節痠疼
(B)風邪傷肺：咳嗽、形寒怯冷或遇寒即發
(C)肝火犯肺：咳嗽氣逆，胸脇疼痛
(D)痰濁犯肺：咳嗽痰多，痰出嗽止
- 59 黃疸之發生，主要是濕邪為患，下列治療何者最不適當？
(A)陽黃應配以清熱解毒之法 (B)陰黃應配以健脾溫化之法
(C)治療黃疸，重在通利小便 (D)急黃則以瀉下通腑，祛瘀散結之法
- 60 有關癰閉的敘述，下列選項何者最適當？①癰閉的病位，雖在膀胱，但與三焦、肺、脾、肝的關係最為密切 ②因濕熱蘊結，濁瘀阻塞、肝鬱氣滯、肺熱氣壅所致者，多屬實證 ③40 歲女性，主訴小便點滴不通 3 日，伴見咽乾煩渴欲飲，呼吸急促，咳嗽，苔薄黃而不膩，脈數，治以清熱利濕而通小便，處方為《太平惠民和劑局方》八正散 ④60 歲男性，主訴小便不通 1 週，伴見脇腹脹滿，多煩善怒，脈弦，治以疏利氣機，通利小便，處方為《三因極一病證方論》沉香散
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 61 有關腰痛的敘述，下列選項何者最適當？①腰為腎之府，乃腎之精氣所溉之域，故內傷不外乎腎虛，而外感風寒濕熱諸邪，以濕性黏滯，最易痺著腰部，故外感總不離開濕邪為患 ②40 歲肥胖男性，主訴腰痛多年，腰痛只在一處，痛而有形，時有冷感，不受氣候影響，舌苔厚膩，脈滑，治以破瘀通絡，活血止痛，處方為《醫學發明》復元活血湯 ③50 歲女性，主訴腰以下冷痛多年，重著如帶五千錢，麻痺不仁，骨節痛，屈伸不利，天陰加重，苔白滑，脈濡緩，治以溫腎健脾，行水化濕，處方為《傷寒雜病論》甘薑苓朮湯 ④60 歲男性，主訴腰痠隱痛 1 年，喜得按揉，遇勞加重，休息減緩，脈細弱，治以補腎壯腰，處方為《太平惠民和劑局方》青娥丸
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 62 62 歲男性患者，因胸痛前來求診，主述心胸痺悶，時而刺痛，疼痛部位固定不移，有時痛引肩背，得溫痛減輕，胸口痞悶食少，腹脹，舌紫暗，苔薄白，下列辨證何者最適當？
(A)氣虛血瘀 (B)血虛血瘀 (C)瘀阻心脈 (D)瘀阻胃腸
- 63 有關「虛勞」的治療，下列敘述何者最不適當？
(A)虛損不甚而又兼有積聚痰瘀等宿病者，則宿病為本，虛損為標
(B)虛勞有新感外邪者，則新感為標，虛損為本，當急則先治標而後圖本
(C)虛損及於脾腎者，則脾腎之損為本，他臟之損為標，治療重在脾腎
(D)陰損及陽者，當補陽為主，補陰為輔
- 64 有關瘧證治療原則，下列何者最不適當？
(A)邪壅經絡治以祛風散寒 (B)熱盛動風治以滋液熄風止瘧
(C)熱盛發瘧治以泄熱存津 (D)柔瘧治以和營養津
- 65 《內經》指出，人若見癰腫，有關其致病因子的敘述，下列何者最適當？
(A)風 (B)寒 (C)熱 (D)燥
- 66 患者納差、腹脹、倦怠、便溏、體重大減，此患者診斷為脾證的依據，下列何者最不適當？
(A)脾主升清 (B)脾主運化 (C)脾主肌肉 (D)脾藏意
- 67 關於望形質的敘述，下列何者最不適當？
(A)肉的堅軟，可知胃氣的虛實 (B)理的疏密，可知肝血的盈虧
(C)肌的滑澀，可知津液的盛衰 (D)骨的大小，可知腎氣的強弱

- 68 望診中若見患者手如猿掌，拇指尖不能與小指尖接觸，則可能為下列何神經癱瘓引起？
(A)橈神經 (B)正中神經 (C)尺神經 (D)腋神經
- 69 舌診中關於「刮舌與揩舌」，探察的目的是為了釐清下列何者？①舌面的潤燥 ②舌質的瘀裂 ③舌苔的鬆腐與堅斂 ④舌苔的有根與無根
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 70 關於紅絳舌的敘述，下列何者最適當？
(A)可見於陽亢熱盛、陰液不足
(B)虛熱者，舌紅絳，口渴喜飲
(C)常在外感溫熱病初起可見
(D)絲狀乳頭萎縮或減少，蕈狀乳頭數目增多，為光滑舌
- 71 頭痛在顛頂，牽引頭角，自覺有氣上逆，甚則作嘔，屬於下列何經的頭痛？
(A)太陽經 (B)太陰經 (C)少陽經 (D)厥陰經
- 72 王先生常常容易飢餓，但又食不多或不欲食，求診於中醫。診見舌紅少苔，脈弦細，胃中灼熱感，大便一二日一行不溏，口稍乾，則下列診斷何者最適當？
(A)胃陰虛 (B)胃熱 (C)胃強脾虛 (D)肝火犯胃
- 73 針對不同情境下，下列脈象之敘述何者最不適當？
(A)南方地處低下，氣候偏溫，脈多細軟或數 (B)北方地勢高，氣候偏寒，脈多表現沉實
(C)婦女脈象多較男子濡弱而略遲 (D)小兒，可以一指總候三部法
- 74 有關脈診的敘述，下列何者最適當？
(A)最早出現寸口診法的中醫典籍是《難經》
(B)《景岳全書·脈神章論獨》說：「獨之為義，有部位之獨也，有臟氣之獨也，有脈體之獨也，部位之獨者，謂諸部無恙，惟此稍乖，乖處藏奸，此其獨也。」
(C)寸口診法的部位為正中動脈經過之處
(D)《診家樞要》：「持脈之要有三：……輕手循之曰尋，重手取之曰按，不輕不重，委曲求之曰舉。」
- 75 關於鬱火病機的敘述，下列何者最不適當？
(A)表症不解，熱勢內盛 (B)熱邪內伏，斑疹未透
(C)夾痰夾濕，痰火互結 (D)暑熱中內，耗氣傷津
- 76 關於寒瀉臨床表現，下列敘述何者最不適當？
(A)《素問·至真要大論》：「諸病水液，澄澈清冷，皆屬於寒」
(B)特徵為糞便清稀如水樣，並可夾不消化食物
(C)腹痛拒按，喜熱，四肢溫，體溫較低
(D)苔白，脈弦緊或沉遲
- 77 關於氣分證，較常表現出脘腹脹悶，下列何者最適當？
(A)氣分初熱 (B)肺胃熱盛 (C)氣分大熱 (D)濕熱蘊蒸腸胃
- 78 有關「太陽病的主脈主症」之敘述，下列何者最適當？
(A)頭項強痛而惡寒，脈浮
(B)發熱，惡風，頭痛，鼻鳴乾嘔，自汗出，脈浮緩
(C)發熱，惡寒，頭項強痛，體痛，無汗而喘，脈浮緊
(D)發熱惡寒，頭痛，汗出而喘，脈浮數
- 79 關於辨別心陰虛與心火上炎，下列何者最適當？
(A)脈細數 (B)舌紅 (C)心煩 (D)失眠
- 80 有關脾氣虧虛進一步發展的證候，下列何者最不適當？
(A)脾不統血 (B)脾陽虛 (C)中氣下陷 (D)寒濕困脾