

110年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：7-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 林先生罹患慢性阻塞性肺疾病，就診時出現喘咳上氣、目如脫狀、氣粗、胸滿、煩躁、痰黃黏難咯、身熱、微惡寒、有汗不多、苔黃膩，脈浮大，治以下列何方最適當？
(A)蘇子降氣湯 (B)滌痰湯 (C)小青龍加石膏湯 (D)越婢加半夏湯
- 2 謝先生因罹患肺膿瘍住院，西醫會診中醫時出現咳吐膿血痰、胸部滿脹、喘不得臥、大便秘結、脈滑數有力，治以下列何者最適當？
(A)桔梗、黃芩、枳實、大黃 (B)黃芩、黃連、黃柏、梔子
(C)半夏、陳皮、茯苓、甘草 (D)麻黃、杏仁、甘草
- 3 張先生於 8 月中旬出現咳嗽就診，症見咳嗽痰黏、鼻流濁涕、身熱、微惡風、心煩、汗少、渴不多飲、泛噁、小便短赤、苔薄黃膩、脈數，治以下列何方最適當？
(A)銀翹散 (B)新加香薷飲 (C)清暑益氣湯 (D)甘露消毒丹
- 4 關於哮喘的敘述，下列何者最不適當？
(A)病因病機為宿痰內伏於肺，復加外感、氣候或飲食等因素而發病
(B)辨治原則可依發作期或緩解期，分虛實論治
(C)可配合運用穴位貼敷、針灸、五音治療，以提高控制療效
(D)發作季節在夏秋較頻繁，冬天較少見
- 5 6 歲幼童就診，其母親主訴幼童反覆性夜間咳嗽已半年，並有氣喘家族史，近 1 個多月來易夜間咳嗽，伴有痰色黃黏、咳吐不利，平日常口乾、喜冷飲，望其面紅、汗出，呼吸時痰鳴聲大，舌質紅苔黃，脈滑數。治以下列何法最為適當？
(A)辛涼解表 (B)清熱宣肺 (C)燥濕化痰 (D)潤肺止咳
- 6 承上題，治以下列何方最適當？
(A)定喘湯 (B)二陳湯 (C)銀翹散 (D)麥門冬湯
- 7 89 歲許女士 2 個月前中風，現今舌體短胖，強硬不安，語言謇澀，口角流涎，伴見肢體麻木，肌膚不仁，脈象弦滑，舌苔黏膩。治以下列何方最適當？
(A)滌痰湯 (B)清心牛黃丸 (C)地黃飲子 (D)解語湯
- 8 下列有關眩暈辨證論治之敘述，何者最不適當？
(A)太陰證，宜刺大椎，肺俞，肝俞 (B)陽明腑實證，宜大承氣湯
(C)陽虛水泛證，宜真武湯 (D)痰飲證，宜苓桂朮甘湯
- 9 有關肺膿瘍辨證論治之敘述，下列何者較適當？
(A)初期，宜加味桔梗湯 (B)成癰期，宜仙方活命飲
(C)潰膿期，宜桔梗杏仁煎 (D)恢復期屬陰傷氣耗證者，宜《千金》葶苈湯
- 10 下列有關心悸脈證相應之敘述，何者最不適當？
(A)心膽虛怯者，脈沉遲 (B)陰虛火旺者，脈細數
(C)水飲凌心者，脈弦滑 (D)氣陰兩虛者，脈至數不均

- 11 48 歲王先生高血壓、高脂血症五年，西藥控制中，來診時主訴陣發心悸伴隨胸悶痛已多年，運動心電圖檢查心肌缺血反應(+)，拒絕心導管檢查，自覺多在天氣變冷後發作胸痛，易胸痛劇烈，後感喘促。診其苔白滑，脈沉遲，本病主要病機，下列何者最適當？
(A)心氣虧虛，胸陽不振 (B)痰濁不化，氣機升降不利
(C)寒邪阻絡，胸陽不振 (D)血脈瘀阻，氣機升降不利
- 12 承上題，治以下列何方最適當？
(A)瓜蒌薤白半夏湯 (B)瓜蒌薤白白酒湯 (C)生脈散 (D)血府逐瘀湯
- 13 32 歲吳先生，主訴昨日和朋友去歐式自助餐吃大餐慶生，回家後脘腹脹滿疼痛，腹瀉稀便，伴有不消化食物，容易腸鳴，瀉後痛減，噯腐酸臭，苔厚膩，脈滑，治以下列何方最適當？
(A)保和丸 (B)參苓白朮散 (C)痛瀉要方 (D)四神丸
- 14 65 歲楊先生罹患大腸癌，剛做完化學治療，主訴近日開始食慾差，胃脘隱痛，口乾口渴，大便乾，舌紅，苔光剝，脈弦細，治以下列何方最適當？
(A)一貫煎 (B)香砂六君子湯 (C)半夏瀉心湯 (D)柴胡疏肝散
- 15 40 歲陳先生為公司主管，數日來出現胃脘痛連脅，胸悶噯氣，喜嘆息，得噯氣則舒，遇煩惱鬱怒則痛更厲害，下列證型何者最適當？
(A)氣滯血瘀 (B)飲食積滯 (C)肝氣犯胃 (D)寒邪克胃
- 16 42 歲鄭女士，平日喜食咖啡，甜食，主訴近日吃完下午茶後，覺胃脘灼熱疼痛，嘈雜泛酸，口覺黏濁，噁心，不想吃東西，大便黏，舌紅，苔黃膩，脈滑數，治以下列何方最適當？
(A)黃連溫膽湯 (B)甘露飲 (C)甘露消毒丹 (D)大柴胡湯
- 17 62 歲劉先生，近幾月進食梗阻，食物吞不下，食入即吐，面色暗黑，肌膚枯燥，形體消瘦，舌質紫暗，脈細澀，治以下列何方最適當？
(A)通幽湯 (B)沙參麥冬湯 (C)啟膈散 (D)右歸丸
- 18 46 歲男性科技新貴，工作飲食時間不正常，最近發現吃飯前噁心欲嘔感覺增加，噯氣，泛酸，食後上腹脹不舒，大便時瀉時秘，苔黃膩、質偏紅，脈濡。治以下列何者最適當？
(A)逍遙散 (B)半夏瀉心湯 (C)平胃散 (D)香砂六君子湯
- 19 某患者 B 型肝炎急性發作，若見身倦重、身熱，口乾苦，納差，脘痞悶，大便秘，溲黃，黃疸，脈滑數有力，苔黃膩，質紅，邊齒痕者，此診斷以下列何者最適當？
(A)寒濕 (B)濕熱 (C)氣虛 (D)陰虛
- 20 關於癭病癭腫的症狀表現，下列那些是預後較好的徵象？①癭腫較大 ②癭腫較小 ③質地柔軟 ④質地堅硬 ⑤可以移動 ⑥癭腫移動性差
(A)①③⑤ (B)①④⑥ (C)②③⑤ (D)②④⑥
- 21 80 歲廖女士因泌尿道不適就診，症見尿意頻作，下墜感，小便餘瀝，走路咳嗽即尿失禁，平日腰腹發涼，倦怠怕冷乏力，面色晄白，舌淡紅齒痕，苔薄，脈沉緩。治以下列何方藥最適當？
(A)黨參、白朮、當歸、陳皮、柴胡、黃耆、升麻、仙茅、淫羊藿、菟絲子、補骨脂、茯苓、甘草
(B)瞿麥、扁蓄、滑石、梔子、大黃、木通、苦參、車前子、馬齒莧、陳皮、枳殼、川牛膝、黃柏、甘草梢
(C)知母、黃柏、澤瀉、熟地黃、山藥、丹皮、茯苓、山茱萸、苦參、生地黃、旱蓮草、女貞子
(D)黃耆、川芎、當歸、白芍、白朮、銀花、茯苓、白芷、皂刺、山甲、蒲公英、敗醬草、黨參、甘草
- 22 89 歲男性患者近數月來小便點滴不爽，排出無力，面色白，畏寒怕冷，腰痠軟無力，舌淡，苔薄白，脈沉，下列敘述何者最不適當？
(A)可能為攝護腺肥大症 (B)此證屬於脾氣不升
(C)此病屬癰閉 (D)可用濟生腎氣丸

- 23 42 歲王先生有性功能障礙問題，近來看完恐怖片後臨房舉而不堅，晚上睡眠不安穩，膽怯多疑，心悸，情緒不佳的症狀，脈細，苔薄膩，舌質淡，治以下列何方加減最適當？
(A)天麻鉤藤飲 (B)贊育丹 (C)知柏地黃丸 (D)大補元煎
- 24 55 歲男性患者菸不離手已超過 20 年。在外跑業務又不能隨時方便如廁而有忍尿的習慣。有一天他突然見到小便都是紅色的，不痛，而且排尿次數很頻繁，小便時不順暢還有點滴不盡的感覺。在食療方面以下列何者最適當？
(A)羊肉 (B)茼菜 (C)西瓜 (D)榴槤
- 25 22 歲男性因為髖關節不適，來中醫門診求診，半年前因左眼疼痛，白睛紅，而至眼科求診，被診斷為虹彩炎，下列敘述何者最不適當？
(A)如果患者有下背痛，抽血見到 HLA-B27 為陽性反應，僵直性脊椎炎的可能性最高
(B)若此患者之後手肘、膝關節輪流疼痛發炎（migratory oligoarthritis），必須考慮血清陰性關節炎
(C)中醫屬於痹證的範疇，屬行痹，可選用烏頭湯治療
(D)如果頭皮出現紅疹脫屑嚴重，不能排除有乾癬性關節炎的可能
- 26 60 歲游先生有長期痛風病史，主訴反覆性右側大拇趾趾蹠關節疼痛，但無紅腫，兼見肢體倦怠，腰脊冷痛，舌淡，苔白，脈沉弱等，治以下列何方最適當？
(A)薏苡仁湯 (B)白虎桂枝湯 (C)獨活寄生湯 (D)烏頭湯
- 27 下列有關類風濕性關節炎之敘述，何者最不適當？
(A)中醫屬於痹證的範疇，原因常與風寒濕夾雜而至有關
(B)一般以侵犯手指近端關節為主，可用羌活、桑枝治之
(C)好發於中年，女性多於男性，會有口乾、眼乾等症狀
(D)不會併發繼發性乾燥症
- 28 關節炎，若見濕熱相搏，肢節煩痛，肩背沉重，腳氣腫痛等症，治以下列何方最適當？
(A)蠲痺湯 (B)桂枝芍藥知母湯 (C)知柏地黃丸 (D)當歸拈痛湯
- 29 有關類風濕病關節炎治療原則，下列敘述何者最不適當？
(A)以祛風、散寒、清熱、除濕、扶正、逐瘀，通絡為基本大法
(B)病日久者，則著重於三焦分證論治
(C)早期、急性期以邪實為主者，著重於濕、熱分證論治
(D)中、後期則正虛邪戀、虛實夾雜者，著重於寒虛分證論治
- 30 16 歲男性慢性下背痛超過 3 個月，下背痛為漸進式的發生，晨間脊椎僵硬，運動過後則改善，X 光有薦腸關節炎，是血清檢驗風濕免疫相關因子呈陰性，符合下列何種風濕免疫疾病的診斷？
(A)系統性紅斑性狼瘡 (B)類風濕性關節炎
(C)僵直性脊椎炎 (D)乾燥症候群
- 31 50 歲王太太罹患甲狀腺功能低下，常覺疲倦，眩暈，目糊，皮膚變乾，容易抽筋，舌紅苔少，脈細數。下列診斷何者最適當？
(A)心腎陰虛 (B)肝腎陰虛 (C)心肝陰虛 (D)肺腎陰虛
- 32 承上題，下列處方何者最適當？
(A)沙參麥冬湯 (B)參苓白朮散 (C)天王補心丹 (D)六味地黃丸
- 33 62 歲王先生患有糖尿病已 17 年，飯前血糖 145 mg/dl，糖化血色素 7.2%，常覺煩渴飲多，口乾舌燥，飲多至頻尿，氣粗，舌紅，苔黃，脈洪數，下列診斷何者最適當？
(A)燥熱傷肺 (B)胃火消中 (C)脾胃氣虛 (D)腎虛火亢
- 34 承上題，下列處方何者最適當？
(A)左歸飲 (B)消渴方 (C)白朮散 (D)知柏地黃丸

- 35 68 歲王先生患有糖尿病已 18 年，糖尿病控制不佳，飯前血糖 229 mg/dl，糖化血色素 9.6%，常覺口乾煩躁，腰膝痠軟，小便渾濁，失眠，舌紅，脈細數。治以下列何方最適當？
(A)沙參麥冬湯 (B)益胃湯 (C)參苓白朮散 (D)左歸飲
- 36 38 歲謝男工作勞累常應酬，右足踝紅腫痛，西醫診斷為痛風症已 5 年，天氣變冷病情加重，口乾，大便正常，小便黃，下列何方最為適當？
(A)五積散 (B)桂枝芍藥知母湯 (C)八味地黃丸 (D)獨活寄生湯
- 37 《千金要方·論雜風狀》，中風大法有四，其中「風懿」的臨床表現為奄忽不知人，咽中塞，窒窒然，舌強不能言，若疾病已過半年，依《醫宗金鑑·雜病心法要訣》，治以下列何方最適當？
(A)小續命湯 (B)蘇合香丸 (C)黃耆桂枝五物湯 (D)地黃飲子
- 38 74 歲賴先生，長期被膝關節痠軟無力所苦，症見行走及蹲起無力，天氣變冷則痠麻加重，舌偏淡，脈沉細無力。下列何方治之最適當？
(A)白虎桂枝湯 (B)當歸拈痛湯 (C)六味地黃丸 (D)獨活寄生湯
- 39 52 歲李先生，罹患頭痛多年，主訴前額頭痛及鼻塞為主，下列何方治之最適當？
(A)吳茱萸湯 (B)小柴胡湯 (C)桑菊飲 (D)蒼耳散
- 40 27 歲馬先生為精神官能症之患者，就診時主訴焦慮，急躁易怒，頭痛，頭部烘熱汗出，目赤，耳鳴，口苦，嘈雜吞酸，胸悶脅脹，口乾，大便難解，舌紅苔黃，脈象弦數。治以下列何方最適當？
(A)歸脾湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)甘麥大棗湯 (D)滋水清肝飲
- 41 一位 65 歲已婚男性病人，高血壓已有 10 年病史，不規則的服用抗高血壓藥物治療，曾多次發生梗塞型腦中風，這次來院治療神識尚可、嚥下困難 (dysphagia) 和發音困難 (dysarthria)。此屬下列何者最適當？
(A)風懿 (B)中臟 (C)中腑 (D)瘖痺
- 42 38 歲廖先生就診時主訴右半身汗出多已一週，汗出時伴見惡風、肢體酸楚。觸之手心溫而不熱，四末亦不甚冷，詢之並無盜汗之象，望之面色雖不甚紅潤，但亦不甚蒼白；舌淡紅，苔薄白，脈緩。診斷以下列何者最適當？
(A)氣血虧虛 (B)心血不足 (C)營衛不和 (D)邪熱鬱蒸
- 43 56 歲楊先生罹患大腸癌經手術和化療後出現大便泄瀉之後遺症，主訴每日大便 6 次，清晨 5、6 點時易大便泄瀉，大便質清稀而不臭，腸鳴即瀉，便前腹不適，瀉後即安，形寒肢冷，腰膝痠軟，脈沉弱，苔白滑，舌淡紫。治以下列何方最適當？
(A)四神丸 (B)參苓白朮散 (C)逍遙散 (D)金匱腎氣丸
- 44 42 歲林小姐罹患大腸癌，近來大便出血，同時症見腹部隱痛，喜熱飲，面色不華，神倦懶言，便溏，舌質淡，脈濡。此血便之證型以下列何者最適當？
(A)寒濕困脾 (B)脾氣虛衰 (C)氣滯血瘀 (D)脾腎陽虛
- 45 41 歲黃先生罹患肝癌，症見腹部脹大，按下堅硬，腹部靜脈怒張，胸臂皮膚出現蜘蛛痣，脅腹刺痛，口乾不欲飲，大便色黑，青紫舌，脈細澀。證型以下列何者最適當？
(A)肝脾血瘀 (B)肝腎陰虛 (C)脾腎陽虛 (D)濕熱蘊結
- 46 68 歲蘇先生罹患肺癌，症見呼吸淺短，聲低氣弱，呼多吸少，張口抬肩，不能平臥，痰白如沫，心慌，動則喘促，形寒，汗出，舌淡黯紫，脈沉結代。下列何證型最適當？
(A)肺腎氣虛 (B)陽虛水泛 (C)痰熱鬱肺 (D)痰濁壅肺
- 47 63 歲趙先生罹患胃癌，歷經多次放射線及化學治療。主訴近來易健忘，頭暈，胸脘痞悶，納呆，泛惡，苔黃膩，脈滑。治以下列何方最適當？
(A)柴胡疏肝散 (B)歸脾湯 (C)溫膽湯 (D)孔聖枕中丹

- 48 肝硬化或是肝腫瘤引起腹水膨脹，若腹部脹滿，脘腹撐急，煩熱口苦，小便赤熱、大便秘結，兩目皮膚發黃，胸悶及氣喘不得平臥，舌紅、苔黃膩，脈弦滑數者，下列治則何者最適當？
(A)疏肝理氣，行濕散滿 (B)溫中健脾，行氣利水
(C)清熱利濕，攻水逐下 (D)活血化瘀，行氣利水
- 49 《達生篇》對孕婦臨產時提出的六字真言，下列何者最不適當？
(A)睡 (B)調息 (C)忍痛 (D)慢臨盆
- 50 下列何方最不適合治療「月經後期，但腹不脹痛，脈弱無力」？
(A)《醫宗金鑑》過期飲 (B)《醫宗金鑑》雙和飲
(C)《蘭室秘藏》聖愈湯 (D)《和劑局方》人參養榮湯
- 51 25 歲女性，月經量多，色深紅而有血塊，口乾，大便硬，舌紅，苔黃，脈滑數。下列何項最適當？
(A)白芍、生地、阿膠、麥冬、地骨皮、玄參
(B)黃柏、熟地、山茱萸、山藥、知母、茯苓、澤瀉、丹皮
(C)當歸、川芎、白芍、生地、黃芩、黃柏、知母、阿膠、艾葉、香附、炙甘草、黃連
(D)當歸、川芎、赤芍、生地、桃仁、紅花
- 52 關於痛經之敘述，下列何者最適當？①是指月經來潮或經行前後出現下腹疼痛 ②原發性痛經，是指無器質性病變，多發生在初經後不久 ③繼發性痛經，可能因為子宮內膜異位症引起，多發生在初經後數年
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 53 有關「經前乳脹」的辨證論治，下列何者最不適當？
(A)經前乳脹，以實證為多，即使是虛證，亦常虛中夾實
(B)經前乳脹治療總以調肝為要，實證多疏肝理氣；虛證多以滋腎養肝，佐以和胃通絡
(C)經前或行經時乳房脹痛而軟，腰膝痠軟，證屬肝氣鬱結，治宜丹梔逍遙散加減
(D)經前乳脹兼見食慾不振、腹痛必瀉，證型多夾肝木剋脾
- 54 有關「經行頭痛」的辨證論治，下列敘述何者最適當？
(A)若情志所傷致肝氣鬱結，氣鬱化火，經前衝脈氣旺，挾肝氣上逆，易出現肝經所循之巔頂頭痛
(B)若因肝火熾盛，肝陰耗損者，可以八珍湯加首烏、枸杞治療
(C)「薛一瓢滋營養液膏」乃於大劑峻補陰血藥中，加黃芩、柴胡，以除虛熱、清頭目
(D)常因氣鬱化火而漸致頭痛，患者應於經後以夏枯草、白蒺藜之品清鬱火，避免頭痛復發
- 55 依《醫宗金鑑·婦科心法》，治婦人七七四十九歲後，天癸不行，止而復來。下列敘述何者最不適當？
(A)無他證者，乃血有餘，不得用藥止之
(B)若因血熱者，宜芩心丸或益陰煎
(C)若血去過多，熱隨血去，衝任虛損，其血不固者，宜十全大補湯、八珍湯
(D)若因怒氣傷肝，肝不藏血，憂思傷脾，脾不攝血者，宜於小柴胡湯、六味地黃丸兩方斟酌用之
- 56 22 歲女性，因月經後期量少漸至閉經來診，面色蒼白，頭暈目眩，氣短懶言，神疲肢軟，舌淡，脈細弱。下列何方治療最適當？
(A)《醫林改錯》血府逐瘀湯 (B)《葉天士女科》蒼附導痰丸加當歸、川芎
(C)《景岳全書》歸腎丸加雞血藤、龜板、阿膠 (D)《證治準繩》八珍湯
- 57 30 歲女性病患，婚久未能懷孕，月經常提前，經量偏少，色鮮紅無血塊，形體消瘦，心悸失眠，腰膝痠軟，五心煩熱，舌紅苔少，脈細數，下列治則何者最適當？
(A)清熱涼血，調經助孕 (B)疏肝解鬱，養血理脾
(C)健脾益腎，理氣調經 (D)滋陰養血，調衝益精

- 58 關於「熱入血室」的敘述，下列何者最不適當？
(A)常發生於婦女經行前後或經行期間
(B)發病的內在因素是正氣不足
(C)治療瘀熱裡結型的熱入血室，可用《溫病條辨》清營湯
(D)少陽邪熱型熱入血室，可見經水或惡露適來適斷
- 59 30 歲蕭小姐，因「帶下」問題就醫，醫師處方《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯。醫師辨治之依據，下列何者最適當？①分泌物黃綠色，質黏稠，有異味 ②經前胸脅脹滿，口苦咽乾 ③舌紅，苔黃膩
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 60 依《醫宗金鑑·婦科心法》：產後頭疼惡寒發熱，因外感者，下列何方治療最適當？
(A)桂枝湯加當歸、川芎
(B)四物湯加柴胡、蔥白
(C)當歸補血湯加川芎、柴胡
(D)大柴胡湯去大黃加荊芥
- 61 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：「孕婦胸膈脹滿，名曰子懸，更加喘甚者，名曰胎上逼心」，下列何者治療最適當？
(A)藿香正氣散 (B)紫蘇飲
(C)小柴胡湯加茯苓、枳殼、山梔 (D)解鬱湯
- 62 41 歲邱女，已產有一女。自妊娠 32 週起常感小便頻數、淋瀝不暢，近日病勢逐漸加重，出現下肢輕度浮腫，疲乏無力，腰痠便溏。今妊娠 34 週來診，小腹脹急，小便不通，畏寒肢冷，舌淡苔薄白，脈沉遲而無力；BP：120/80 mmHg、實驗室尿常規檢查：無異常、胎心音正常。下列診斷何者最適當？
(A)子腫 (B)子淋 (C)子脹 (D)轉胞
- 63 承上題，其處方用藥，下列何者最適當？
(A)滑石、甘草梢、木通、車前子、白芍、當歸、生地、黃芩、澤瀉、黑梔子、赤茯苓
(B)扁豆、黨參、白朮、茯苓、桂枝、烏藥、通草、桔梗、炙升麻
(C)桂枝、生地黃、山茱萸、澤瀉、山藥、茯苓、巴戟天、菟絲子
(D)白朮、人參、當歸、白芍、炙甘草、熟地、杜仲、陳皮
- 64 傅青主治產後氣血兩虛乳汁不下，處方通乳丹之用意為何？
(A)補氣以生血而乳汁自出
(B)補血為先，佐以益氣
(C)滋養肝腎，生血而乳出
(D)健脾養血，血生而化乳
- 65 小兒面部望診之五部配五臟，最早見於《小兒藥證直訣·面上證》，下列何者最適當？
(A)額上為腎 (B)鼻為肺 (C)頰為心 (D)左腮為肝
- 66 依《幼科雜病心法要訣·痰證門·燥痰、濕痰》，關於燥痰、濕痰之治療，下列何者最不適當？
(A)治燥痰，輕者用清氣化痰丸
(B)治燥痰，重者用涼膈散加桔梗、桑白皮
(C)治濕痰，痰多者宜用枳桔二陳湯加蒼朮、白朮
(D)治濕痰，須用桂苓甘朮湯

- 67 關於小兒「肺炎喘嗽」病名之歷史文獻，下列何者最不適當？
(A)早在《素問》即有「乳子中風熱，喘鳴息肩」類似的描述
(B)「肺炎喘嗽」病名，首見於巢元方《諸病源候論》之《小兒雜病諸候》
(C)清《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》則對「火熱喘急」、「馬脾風」有專門的描述
(D)清《麻科活人書》描述麻疹期中出現肺閉喘嗽症狀
- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》疳疾傷脾因作瀉，先清後補為妙訣。初起先以清熱和中湯清之，若久瀉不愈，治以下列何方最適當？
(A)消疳理脾湯 (B)香連導滯湯 (C)肥兒丸 (D)參苓白朮散
- 69 小兒癰疽的常見病因病理，下列何者最適當？①先天元陽不足 ②頑痰阻竅 ③血滯心竅 ④驚後成癰
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》水腫門，小兒症見頭面手足皆腫，屬內停濕飲，外感風邪，風濕相搏，水道不利，外攻肌表，因而作腫，輕者用茯苓導水湯和解之，重者治以下列何方最適當？
(A)雙解通聖湯 (B)疏鑿飲 (C)蘇葶丸 (D)舟車神祐丸
- 71 7 歲的李小妹，因長期夜間遺尿由父母帶來看診，症見身倦乏力，面色蒼黃，食慾不振，大便溏薄，常自汗出，苔薄嫩，脈無力。治以縮泉丸加下列何方最適當？
(A)胃苓湯 (B)菟絲子散 (C)八正散 (D)補中益氣湯
- 72 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，寒痢日久，治療以何方最適當？
(A)當歸、白芍、木香、黃芩、黃連、肉桂、大黃、甘草、檳榔
(B)人參、白朮、木香、當歸、白芍、肉桂、甘草、罌粟殼、訶子肉、肉果
(C)人參、乾薑、甘草、白朮
(D)人參、川連、蓮子肉
- 73 小兒麻痺的後期出現肢體痿軟，肌肉弛緩並萎縮，骨骺畸形，類似於下列何種病證？
(A)脾疳 (B)五軟症 (C)軟腳瘟 (D)小兒暑溫
- 74 10 歲女孩體型瘦弱，病後氣血虛弱，症見神倦氣乏，兼有口渴引飲而嘔者，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，治以下列何方最適當？
(A)白通湯 (B)竹葉石膏湯 (C)補中益氣湯 (D)香朴四君子湯
- 75 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，凡出痘腹痛，因風寒鬱結，痘出不快，煩躁而痛者，以下列何者治療最適當？
(A)加味平胃散 (B)桂枝大黃湯 (C)芍藥防風湯 (D)加味逍遙散
- 76 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，痘初發熱，以至既出之後，或噴嚏頻頻，或鼻流清水而喘者，治以下列何方最適當？
(A)葛根湯 (B)杏蘇飲 (C)清上防風湯 (D)銀翹散
- 77 依《幼科雜病心法·疳證門》：「厚味過度生濕熱，復觸風寒疳氣成，囊縱紅腫常刺痛」，治以下列何方最適當？
(A)烏頭梔子湯 (B)金榮丸 (C)金鈴散 (D)十味蒼蘘散
- 78 依《幼科雜病心法·雜證門》小兒語遲，菖蒲丸主之。關於「菖蒲丸」的組成，下列何者最不適當？
(A)人參 (B)乳香 (C)遠志 (D)鬱金
- 79 關於兒童成長評估，下列敘述何者最不適當？
(A)12 個月到 24 個月大，一年身長增加約 10 公分
(B)國小學童在青春期前，一年身高增加約 6 公分
(C)青春期快速生長尖峰，女生一年身高增加約 8 公分
(D)男生的遺傳身高 (midparental height, MPH) 為 (父親身高 + 母親身高 - 13 公分) 除以 2
- 80 下列何者為診斷白血病 (Leukemia) 最重要的依據？
(A)血液白血球細胞數目 (B)血清腫瘤標記 (Tumor marker)
(C)骨髓檢查 (Bone marrow aspiration) (D)X 光檢查