

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、  
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術  
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2102  
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 30 歲患者，感冒後 7 天，出現咳嗽、發熱不惡寒、口渴、痰黃稠、便乾硬，以下列何方治療最適合？  
(A)小青龍加石膏湯 (B)越婢湯 (C)大青龍湯 (D)涼膈散
- 2 18 歲患者氣喘已多年，3 天前和同學打籃球後，即在冷氣房內喝冰水，開始咳嗽頻繁，痰如白沫且量多，呼吸喘滿不得臥，舌質淡紅、苔白，脈弦緊。下列證型何者最適合？  
(A)寒飲伏肺 (B)風寒束肺 (C)痰濁壅肺 (D)脾肺陽虛
- 3 承上題，治以下列何方最適宜？  
(A)理中湯 (B)小青龍湯 (C)二陳湯 (D)荊防敗毒散
- 4 15 歲男性患者，來診時主訴頭痛 2 天，患者於 3 天前開始感覺惡寒微發熱，鼻塞，身體疼痛，口不渴，2 天前出現頭脹痛，診其苔薄黃，脈浮緊數。處以下列何方劑最適合？  
(A)葛根湯 (B)荊防敗毒散 (C)大青龍湯 (D)九味羌活湯
- 5 暑假過後，新學期開始，小明升上大學 2 年級，期中考後小明利用星期天至郊區走走，第 2 天上課時，小明感覺到全身發熱，出現頭痛，咳嗽，痰不多稍黏，咽喉乾燥，口渴，舌質稍紅，舌津少，脈診右寸浮數，處以下列何方最適合？  
(A)桑杏湯 (B)銀翹散 (C)加減萎蕤湯 (D)麻杏石甘湯
- 6 67 歲女性因長期患高血壓未規則服藥而近來心悸胸悶，小便短少，夜間端坐呼吸，渴不欲飲，形寒肢冷，眩暈，舌淡苔白滑，脈弦滑。治以下列何方最適合？  
(A)炙甘草湯 (B)六味地黃丸 (C)桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (D)苓桂朮甘湯
- 7 77 歲男性病患服藥控制高血壓和高血脂之病症，20 多年一直平穩，近來常胸痛如刺，舌紫暗有瘀斑，脈弦有歇止。治以下列何方最適合？  
(A)瓜蒌薤白半夏湯 (B)瓜蒌薤白枳殼湯 (C)血府逐瘀湯 (D)瓜蒌薤白白酒湯
- 8 有關「胸痹」文獻回顧的敘述，下列何者錯誤？  
(A)《素問·藏氣法時論篇》：「心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛」所描述的情形，接近現今的心絞痛發作的部位分布  
(B)《靈樞·厥論》：「真心痛，手足青至節，心痛甚，旦發夕死，夕發旦死」所敘述的病情發展，近似現今心肌梗塞的情形  
(C)《金匱要略·胸痹心痛短氣》：「心病宜食薤。」當中「薤」即指薤白，為活血通絡之品  
(D)《世醫得效方·心痛門》提出了蘇合香丸「治卒暴心痛」

- 9 30 歲女性患者，自訴胸悶、心悸，病程已數年，每逢月經過後開始發病，且伴隨睡眠品質差、健忘、頭暈等症狀，視其舌淡紅、苔薄白，切其脈細弱，最宜下列何方治療？  
(A)四物湯 (B)歸脾湯 (C)安神定志丸 (D)養心湯
- 10 有關心悸之敘述，下列何者錯誤？  
(A)本證主要病變部位在心 (B)證候特點是虛實相兼，以虛為主  
(C)邪實以痰飲內停及瘀血阻絡最常見 (D)邪實是此病的轉化關鍵點
- 11 李先生 51 歲，罹患高血壓，頭暈，頭脹痛，心煩易怒，脅痛，夜眠不寧，心悸健忘，口苦，舌紅苔薄黃，脈弦有力。此屬下列何證型？  
(A)痰濁壅盛 (B)陰虛陽亢 (C)肝火上炎 (D)肝氣鬱結
- 12 承上題，應選何方治療最適合？  
(A)知柏地黃丸 (B)龍膽瀉肝湯 (C)半夏白朮天麻湯 (D)柴胡疏肝散
- 13 55 歲女性患者胃痛隱隱，受涼後發作，喜溫喜按，得食則緩，手足冷，大便成形，脈弱，苔薄白，治以下列何方最適宜？  
(A)平胃散 (B)柴胡疏肝散 (C)黃耆建中湯 (D)安中散
- 14 32 歲女性患者，主訴慢性腹瀉。面白體瘦，易緊張，納差，少食即胃脹，腹痛作瀉一日六七行，怕冷，頭暈，疲倦，脈濡澀，舌質淡、苔白膩。下列何方最適宜？  
(A)甘麥大棗湯加郁李仁 (B)理中湯加茯神 (C)葛根芩連湯加柴胡 (D)柴胡龍骨牡蠣湯
- 15 85 歲女性患者主訴大便排出困難，便乾硬，大便四五日一行，下列敘述何者錯誤？  
(A)若口臭、面紅心煩、小便短赤、脈弦、舌紅者，屬胃腸積熱  
(B)若腹痛拘急、脹滿拒按、呃逆嘔吐者，屬氣血虧虛  
(C)若口乾、五心煩熱、小便短、舌紅、少苔、脈細者，屬陰津不足  
(D)若便而不爽、腸鳴矢氣、噯氣頻作、兩脅悶脹者，屬肝氣鬱結
- 16 《金匱要略》論述酒疸病，證見心中懊憹而熱，不能食，時欲吐，宜以何方治之？  
(A)小柴胡湯 (B)梔子大黃湯 (C)茵陳蒿湯 (D)大黃硝石湯
- 17 有關痛風 (gout) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)好發於中年男性，常合併有高尿酸血症 (B)其痛甚如虎咬，故曰白虎歷節  
(C)《醫學正傳》：痛風，古名痛痺 (D)屬風痺
- 18 癭病的基本治則，宜下列何者為主？  
(A)行氣活血 (B)祛痰化瘀 (C)滋陰通絡 (D)理氣化痰
- 19 陳小姐經檢查出為無黃疸性 B 型肝炎，症見往來寒熱，胸脅苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，口苦，咽乾，目眩，舌苔薄白，脈弦。以下列何方治之最適宜？  
(A)茵陳蒿湯 (B)大柴胡湯 (C)柴胡疏肝散 (D)小柴胡湯
- 20 55 歲男性患者，平素口渴喜冷飲，有腎結石病史。某日運動後，突覺左下背持續劇痛，伴隨頻尿、尿量少、小便色赤、小便困難的症狀。就診時患者面色紅潤泛油光，自述飲水時有噁心、反胃感，腹脹不舒，便溏，脈沉數，舌暗紅、苔白黃膩。診斷以下列何者最適合？  
(A)氣虛下陷 (B)濕熱下注 (C)血瘀互結 (D)肝腎陰虛

- 21 63 歲男性患者患糖尿病多年，服藥不規律，也無按時追蹤血糖。近日尿量逐漸變少而色清，面色蒼白，畏寒怕冷，下肢欠溫，嘔吐清水，足腫加重，苔白滑，脈沉弱。治以下列何方最適合？  
(A)實脾飲 (B)四君子湯 (C)六味地黃丸 (D)四神丸
- 22 有關腰痛、腰酸的辨證，下列敘述何者錯誤？  
(A)腰重痛，臥時不能轉身，行時重痛無力者，辨證應先考慮腎虛  
(B)腰重痛，日輕夜重者，辨證屬瘀血  
(C)腰背拘急疼痛兼有惡寒發熱、小便淋瀝澀痛者，病位在腑，但亦常見腎虛之證  
(D)腰酸痛伴有陰莖疼痛、睪丸脹痛，會陰不舒者，辨證屬肝經氣滯
- 23 關於肺痿的敘述，下列何者錯誤？  
(A)可見咳吐濁唾涎沫 (B)證型以虛寒為多見  
(C)治療以補肺生津為原則 (D)脾腎兩臟也要重視調理
- 24 70 歲男性，經泌尿科診斷為前列腺肥大，小便點滴無力，解尿時需久站，常抱怨氣虛乏力，腰痠背痛，診其脈象，下列何脈最適切？  
(A)脈沉數 (B)脈弦 (C)脈細澀 (D)脈沉細而尺弱
- 25 25 歲王先生因水腫就診，症見小便短少，身重神疲，胸悶、納呆、泛惡、苔白膩、脈緩。下列何方治療最宜？  
(A)胃苓湯 (B)濟生腎氣丸 (C)越婢湯 (D)疏鑿飲子
- 26 下列有關桂枝芍藥知母湯之敘述，何者錯誤？  
(A)乃《金匱要略》中治療痹證之方劑  
(B)桂枝、芍藥為主，合麻黃、防風補肝益營，疏風散邪  
(C)方中以茯苓利濕健脾  
(D)組成中尚有附子、生薑、甘草
- 27 75 歲男性患者，症見腰膝冷痛、關節疼痛反覆發作，日久不癒、肢節屈伸不利、面色少華，舌淡苔白，脈細無力。治以下列何方最適合？  
(A)羌活勝濕湯 (B)當歸拈痛湯 (C)小活絡丹 (D)獨活寄生湯
- 28 下列有關免疫觀念之敘述，何者錯誤？  
(A)隋朝巢元方《諸病源候論》提及漆有毒，人有稟性畏漆，亦有性自耐者  
(B)預防醫學「治未病」的思想一直到《傷寒論》的記載才出現  
(C)張璐《張氏醫通》中，詳細介紹了接種痘痂、痘衣來預防天花  
(D)《素問·皮部論》記載：「是故百病之始生也，必先於皮毛」
- 29 下列有關瘰癧的敘述，何者錯誤？  
(A)瘰癧即抽搐 (B)瘰癧為瘰癧證症狀表現之一  
(C)瘰者蠕動引縮之謂 (D)瘰者筋脈拘急也
- 30 有關痹證的治療，下列何者最正確？  
(A)關節灼熱紅腫、發熱、口渴、舌紅、苔黃燥、脈滑數，白虎加桂枝湯主之  
(B)久痹不癒、肢體倦怠、腰脊冷痛、舌淡、苔白、脈細，桂枝芍藥知母湯主之  
(C)肌膚麻木、肢體關節重著、苔白膩、脈濡緩者，宣痹湯主之  
(D)久痹不癒、舌紅、苔白、關節腫大乃至強直畸形者，獨活寄生湯主之

- 31 50 歲林小姐發現有復發性口腔潰瘍、外陰部潰瘍及眼結膜炎。就診時，症見口腔、外陰瘡色暗紅，久不癒合，伴見頭昏目眩，腰膝痠軟，午後潮熱，時烘熱出，手足心熱，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最適當？
- (A)涼膈散 (B)知柏地黃丸 (C)理中湯 (D)瀉黃散
- 32 35 歲女性，原發性甲狀腺功能低下，畏寒、乏力、浮腫，氣短已 2 年多，經服用甲狀腺素效果不明顯。近 1 個月症狀又加重，來診時四診：消瘦，身高 153 公分，體重 36 公斤。面白，面部及雙下肢浮腫，尤其以面部明顯，肢冷畏寒，倦怠乏力，氣短懶言，納差食少，下利清穀，掉髮多，腰背痠痛，頻尿，月經延後量少色淡，舌質淡胖，舌苔淡白，脈沉弱。TSH 偏高：6.4 mU/L（正常參考值 0.3~5.5 mU/L）。本病症的主要病機下列何者最適宜？
- (A)氣血兩虛 (B)寒邪直中 (C)陰陽兩虛 (D)脾腎陽虛
- 33 消渴病是一個標本寒熱虛實複雜的疾病，關於此病的虛損，下列敘述之組合何者最正確？①常見肺、脾胃與腎的虛損 ②虛損之中又以腎虛最為重要 ③腎的虛損是指腎陰虛而非腎陽虛
- (A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 34 關於眩暈的敘述，下列何者錯誤？
- (A)發病與肝脾腎等臟腑最相關 (B)病因歸納為風痰瘀虛  
(C)朱丹溪認為無痰不作眩 (D)張景岳認為無虛不作眩
- 35 消渴，下消證，見氣短，潮熱，咽燥，乾咳，盜汗，顴赤，咳嗽有血絲，治療時下列何方最不適宜？
- (A)麥味地黃丸 (B)清燥救肺湯 (C)六味地黃丸合生脈散 (D)生地黃飲子
- 36 45 歲男性業務員有高血壓和高血脂症病史，工作壓力大，易緊張，焦慮，頭暈，頸項酸緊，胸悶，心悸，口乾喜冷飲，眠可，偶手麻，脈弦數，下列何方最適宜？
- (A)鉤藤散 (B)血府逐瘀湯 (C)炙甘草湯 (D)天王補心丹
- 37 56 歲陳先生罹患糖尿病，出現口渴喜飲，飲水量雖多卻不解渴，食量正常，大便正常，舌邊紅赤，苔薄黃，脈洪數。診斷為下列何者最正確？
- (A)上消肺燥 (B)胃火消中 (C)脾胃氣虛 (D)腎虛火亢
- 38 53 歲男性患者，就診時主訴神疲乏力、遇勞則甚，兼見頭痛、眩暈、少寐多夢、心悸怔忡。診其舌淡紅，苔薄白、脈沉細弱。治以下列何方最適宜？
- (A)大補元煎 (B)人參養榮湯 (C)知柏地黃丸 (D)天麻鉤藤飲
- 39 35 歲男性患者，主訴失眠近 1 週，其症狀有性情急躁易怒，不思飲食，目赤口苦，小便黃赤，大便秘結，舌紅苔黃，脈弦數。診斷以下列何者最正確？
- (A)肝鬱化火 (B)痰熱內擾 (C)氣血兩燔 (D)陰虛火旺
- 40 承上題，治以下列何方最適合？
- (A)龍膽瀉肝湯 (B)溫膽湯加黃連、山梔 (C)玉女煎 (D)黃連阿膠湯

- 41 26 歲王先生腰痛已半年，初發時每遇天雨或天熱時加重，而且痛處摸起來熱熱的，活動後可以稍稍緩解，小便量不多而且顏色深黃，口渴喜飲，大便偏軟。近來常有手足心熱的感覺，且不時腰酸，診其苔薄黃微膩，舌邊少苔，脈濡而略數。此腰痛之診斷屬下列何者最適合？  
(A)濕熱 (B)寒濕 (C)瘀血 (D)腎虛
- 42 56 歲男性肝病患者，症見右脅下的癥塊，身目俱黃，黃色轉晦暗，如有煙熏感，腹脹，大便稀軟，神疲畏寒，口淡不渴，舌質淡、苔膩，脈沉心率緩。以下列治法何者最適合？  
(A)健脾和胃，溫化寒濕 (B)利濕化濁，佐以清熱  
(C)溫陽補腎，疏肝扶脾 (D)清熱利濕，佐以瀉下
- 43 65 歲男性患者身倦已多年，症見易外感，動則呼吸短促，心率變快不穩定，情緒上易受驚嚇，睡眠時眠淺易醒，常會咽乾口瘡，舌紅、少津，脈細數乏力。下列病機何者最適宜？  
(A)心脾氣血兩虛 (B)心肺氣陰兩虛 (C)心腎陰血兩虛 (D)心肝血虛不足
- 44 積聚之證，下列治則何者錯誤？  
(A)病邪初期，正氣尚強，邪氣尚淺，則以攻伐為主  
(B)末期者，正氣消殘，則以扶正為主  
(C)若氣滯血瘀者，屬正虛瘀結，則應用扶正祛瘀之法  
(D)積聚日久，仍宜祛邪扶正，可用下藥大劑攻伐
- 45 50 歲崔女士因頸部的腫塊而前來就診中醫，症見頸前腫塊經久不消，質硬有結節狀產生，胸口悶，食慾不佳，青紫舌。治以下列何方最宜？  
(A)四海舒鬱丸 (B)梔子清肝湯 (C)海藻玉壺湯 (D)天王補心丹
- 46 承上題，病機以下列何者最正確？  
(A)氣鬱痰凝，痰氣壅結 (B)痰氣壅結，火鬱陰傷  
(C)痰氣壅結，鬱而化火 (D)氣痰瘀壅結頸前
- 47 36 歲女性患者，有過敏性鼻炎與氣喘病史，平時工作不順，心情不舒暢，近日氣喘發作，症見咳嗽氣喘，右脇肋不舒，胸脘脹悶，痰白，來診時舌診苔薄白，脈診弦脈。下列何藥物組合最適合？  
(A)麻黃、杏仁、柴胡、枳實、炒白芍，蘇子、紫菀、生甘草  
(B)麻黃、杏仁、白果、蘇子、款冬花、桑皮、黃芩、法半夏、生甘草  
(C)紫蘇子、半夏、當歸、前胡、厚朴、陳皮、薑汁、肉桂、甘草  
(D)麻黃、射干、細辛、紫菀、款冬花、半夏、五味子、生薑、大棗
- 48 64 歲蔡先生罹患淋巴癌，淋巴結腫大，經常頭暈，口乾不苦，咽痰梗，善太息，情緒抑鬱，脇下痞悶脹，大便成形，苔薄白，脈弦，診斷以下列何者最適宜？  
(A)膽火上擾 (B)肝膽濕熱 (C)肝脾瘀阻 (D)肝鬱氣滯
- 49 依《傳青主女科》所述，月經後期而來多者，下列何者最宜？  
(A)氣虛而不攝 (B)血寒而有餘 (C)氣滯而夾熱 (D)血瘀而有熱

- 50 下列何者不是經行發熱之主要病因病機？  
(A)時熱乘虛而入，營衛失調 (B)勞倦思慮傷脾，氣血虛弱  
(C)產後惡露未淨，瘀血停留 (D)素體陰血不足，房勞多產
- 51 依《醫宗金鑒·婦科心法要訣》關於經行發熱之敘述，下列何者錯誤？  
(A)經來發熱，有表邪證者，用桂枝四物湯發之  
(B)經來發熱，若為內熱者，用知柏地黃丸清之  
(C)經後發熱，若為血虛內熱，用六神湯補而涼之  
(D)經後發熱，若為脾虛肝熱，用逍遙散理脾而清肝
- 52 32 歲患者因卵巢子宮內膜異位接受腹腔鏡手術，術後接受柳普林（Leuplin）治療，出現陰部紅腫、灼熱、乾澀、搔癢的症狀，夜晚加劇，並伴隨心悸、身燥熱、難入眠等症狀，最宜下列何組藥治療？  
(A)山藥、芡實、黃柏、車前子、白果  
(B)薏苡仁、黃柏、丹皮、澤瀉、通草、赤茯苓、滑石、萆薢  
(C)知母、黃柏、熟地、牡丹皮、茯苓、澤瀉、山茱萸、山藥  
(D)牡丹皮、山梔子、薄荷、茯苓、白朮、生甘草、白芍、當歸、生薑、柴胡
- 53 閉經的治療原則，虛者補而通之，實者瀉而通之，下列何者屬「虛者補而通之」？  
(A)補益肝腎 (B)活血化瘀 (C)理氣行滯 (D)化痰除濕
- 54 中醫所謂「五不女」，大多屬女子先天性缺陷，下列何者錯誤？  
(A)紋 (B)鼓 (C)角 (D)變
- 55 《醫宗金鑒·婦科心法要訣》中對於帶下證治之敘述，下列何者錯誤？  
(A)帶下色黑清稀者，肝火，宜龍膽瀉肝湯 (B)帶下色白清稀者，虛寒，宜補中益氣湯  
(C)帶下色黃而淡者，脾虛，宜六君子湯 (D)帶下五色濁黏者，濕熱，宜清白散
- 56 下列何者是陰痛最少見的證型？  
(A)肝腎陰虛 (B)肝經鬱火 (C)氣虛下陷 (D)少陽邪熱
- 57 有關妊娠惡阻的敘述，下列何者正確？  
(A)在妊娠 3 至 4 個月之後多可逐漸消失 (B)病因為胎氣上沖  
(C)病機為肝氣犯脾 (D)亦名子懸
- 58 38 歲女性，曾懷孕 3 次，皆於懷孕 8 至 10 週間流產。平素月經量少，潮熱盜汗，脈細數。下列病機何者正確？  
(A)陰虛導致胎失血養，胞宮虛寒 (B)陰虛血熱導致胎熱血動  
(C)陰虛導致胎失氣載而胎元殞墮 (D)陰血不足導致血循不暢而胎失血養
- 59 患者懷孕中，因小便艱澀而痛，溲少色深黃，自覺煩躁而來診。望其面色紅，舌紅有瘡而痛，苔少而乾，脈細數。下列何組藥最宜治療此病患？  
(A)生地、山藥、山茱萸、茯苓、牡丹皮、澤瀉、車前草、麥冬、五味子  
(B)當歸、生地、車前子、木通、甘草、黃芩、梔子、龍膽草、澤瀉、柴胡  
(C)生地、木通、甘草梢、淡竹葉、玄參、麥冬  
(D)熟地、山藥、山茱萸、茯苓、牡丹皮、澤瀉、知母、黃柏

- 60 產後惡露過期不止，量較多，色紫紅，質黏稠，氣臭穢，口燥咽乾，面色潮紅，舌紅，脈虛細而數。  
下列止血原則，何者最為適宜？  
(A)活血化瘀 (B)清熱解毒 (C)補氣攝血 (D)養陰清熱
- 61 承上題，針對以上之症狀與診斷，最宜以下列何方治之？  
(A)保陰煎 (B)舉元煎 (C)固陰煎 (D)固本止崩湯
- 62 張小姐產後有心情鬱悶之情形，並有乳房脹痛，觸摸有硬塊且疼痛拒按，乳房皮膚微紅稍熱，時覺寒熱，口渴煩躁，溺黃便結，見其舌紅苔黃，脈弦數，最宜以下何者為主方治療？  
(A)栝蒌牛蒡子湯（《醫宗金鑑》） (B)人參養榮湯（《和劑局方》）  
(C)通乳丹（《傅青主女科》） (D)泰山磐石散（《景岳全書》）
- 63 傅青主的完帶湯是用來治療脾虛肝鬱之白帶，方中用以疏肝的藥物為何？  
(A)香附 (B)川楝子 (C)防風 (D)柴胡
- 64 下列何者是《傅青主女科》健固湯之組成藥物？①人參、黃耆 ②白朮、苡仁 ③巴戟天、茯苓  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 65 小兒面部望診中，下列敘述何者錯誤？  
(A)面呈白色，多為寒證、虛證 (B)面呈紅色，多屬熱證  
(C)面呈黃色，多屬體虛或有濕 (D)面呈黑色，多屬瘀證
- 66 有關風熱咳嗽的主要特徵，下列何者最正確？①痰黃黏稠 ②口渴咽痛 ③鼻流濁涕 ④全身酸痛  
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 67 王小弟 6 歲，因反覆嘔吐來求診，經詳細問診後發現，該患者每逢要補習即嘔吐，平日精神鬱悶，易怒，噯氣頻頻，嘔吐酸水，舌紅苔薄白，則下列處方何者最適宜？  
(A)丁香、蠍尾、半夏、棗肉  
(B)白芍、蘇葉、砂仁、厚朴、陳皮、半夏  
(C)黃連、陳皮、枳實、半夏、竹茹、茯苓、麥冬、甘草  
(D)香附、神麴、麥芽、陳皮、砂仁、炙甘草
- 68 6 歲馬小弟因不喜進食來看診，症見口乾喜歡飲水，大便羊矢，皮膚乾燥，缺乏潤澤，舌苔光剝，甚至有時光紅少津，舌質紅，脈細稍數。治以下列何方最適宜？  
(A)參苓白朮散 (B)保和丸 (C)養胃增液湯 (D)沙參麥門冬湯
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒症發時吐舌急叫，面色乍紅、乍白，悚惕不安，如人將捕之狀，先服①，次服②，則癇自定矣。下列選項何者最正確？  
(A)①大青膏 ②鎮驚丸 (B)①瀉青丸 ②龍膽湯  
(C)①一捻金 ②硃衣滾痰丸 (D)①牛黃散 ②鉤藤飲

- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》淋證門「血淋心熱傷血分，尿血同出莖中疼」，莖中不時作痛，下列何方治療最適當？  
(A)小薊飲子 (B)十味導赤散 (C)八正散 (D)葵子散
- 71 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》寒瘡與風瘡之主要鑑別，下列何者最不適當？  
(A)有汗、無汗 (B)寒熱先後 (C)寒熱多少 (D)瘡發於晝或夜
- 72 與水痘鑑別診斷，有關膿疱瘡之敘述，下列何者最正確？①多發於夏季 ②疱疹較大 ③疹較易潰破 ④疹較透亮  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 73 有關鵝口瘡的敘述，下列何者錯誤？  
(A)因其色白如雪片，又稱「雪口」  
(B)本病可因先天胎熱內蘊，或口腔不潔，感受穢毒之邪所致  
(C)以早產兒，久病，久瀉，體質羸弱之乳兒常見  
(D)屬心脾積熱，治以《醫宗金鑑》緩肝理脾湯
- 74 3歲孩童有餘積熱，午後潮熱，蒸蒸有汗，肚腹脹滿，小便赤，大便難，煩渴啼叫，口舌生瘡，腮頰紅赤，脈洪數有力。根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，下列何方最適宜？  
(A)涼膈散 (B)竹葉石膏湯 (C)白通湯 (D)千金消癍丸
- 75 依《醫宗金鑑·痘疹心法》麻疹收沒證治所述，「當散不散虛熱醫」，此時治療以下列何方最適宜？  
(A)柴胡四物湯 (B)涼血四物湯 (C)柴胡清熱飲 (D)溫清飲
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》喘證門所述，「火喘燥渴面唇紅，肺胃涼膈白虎清，瀉心宜用導赤散」，若陰虛者以下列何方治療？  
(A)百合固金湯 (B)補肺阿膠散 (C)大補陰丸 (D)知柏地黃丸
- 77 關於凶門的敘述，下列何者錯誤？  
(A)一般 10 至 12 月大時前凶門會關閉 (B)嚴重脫水時凶門易塌陷  
(C)哭泣時凶門可能會鼓出 (D)甲狀腺機能亢進，前凶門易變窄小
- 78 有關嬰幼兒的腹脹，下列敘述何者正確？①嬰兒胃脹常因奶嘴洞太大或太小造成餵養不當，吞入太多空氣 ②幼兒氣脹，以瀉泄為首位 ③乳糖消化不良也是造成腹脹常見主因  
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅①③ (D)①②③
- 79 「看指紋」是古代醫家對幾歲內小兒，用以代替脈診的輔助診斷？  
(A) 1 歲 (B) 3 歲 (C) 5 歲 (D) 7 歲
- 80 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關五鞭的敘述下列何者正確？  
(A)五鞭者，仰頭取氣，難以動搖，氣壅疼痛，連胸膈間，手心，足心冰涼而鞭  
(B)輕者，以小續命湯疏其風  
(C)重者，以烏藥順氣散調其氣  
(D)若肝木乘脾，食少氣弱者，香砂六君子湯治之